

---

Ketabton.com

زِي اساسات








# د پرازیتولوژی اساسات

د ساینس، وترنری او طب د محصلینو لپاره

## Principles of Parasitology



مولف: ډاکتر محمد صابر  
Dr. Mohammad Saber

د کتاب نوم د پرازیتولوژي اساسات

لیکوال دوکتور محمد صابر

خپرنډوی ننګرهار طب پوهنځی

ویب پاڼه www.nu.edu.af

چاپ ځای سهرمطبعه، کابل، افغانستان

چاپ شمېر ۱۰۰۰

د چاپ نېټه ۱۳۹۰

د کتاب ډاونلوډ www.ecampus-afghanistan.org

دا کتاب د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې ([www.Kinderhilfe-Afghanistan.de](http://www.Kinderhilfe-Afghanistan.de))

لخوا تمويل شوی دی.

اداری او تخنیکي چاري بي د افغانیک موسسی لخوا ترسره شوي دي.

د کتاب د محتوا او لیکنې مسؤلیت د کتاب په لیکوال او اړونده پوهنځي پوري اړه لري. مرسته کوونکي

او تطبیق کوونکي ټولني په دي اړه مسولیت نه لري.

د تدریسي کتابونو د چاپولو لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ:

ډاکتر یحیی وردک، د لوړو زدکړو وزارت، کابل

دفتر: ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

موبایل: ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴

ایمیل: wardak@afghanic.org

د چاپ ټول حقوق له مؤلف سره خوندي دي.

ای اس بی ان: ISBN: 978 993 640 0535

## د لوړو زده کړو وزارت پیغام

کتاب د علم او تکنالوژۍ په تر لاسه کولو کې د تاریخ په اوږدو کې یو ډېر مهم رول درلودلی دی او د تحصیلي نصاب اساسي جز او د زده کړو د کیفیت په لوړولو کې خورا مهم رول لري. نو ځکه باید په علمي معیارونو برابر او تازه مواد د ټولني د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره د محصلینو لپاره برابر او چاپ شي.

زه د هغو محترمو استاذانو ستاینه او ورڅخه مننه کوم چې کلونه، کلونه یې زحمت ویستلی دی، او کتابونه یې تألیف او ژباړلي دي او نورو ښاغلو استاذانو ته بلنه ورکوم چې دوی هم پخپلو رشتو کې درسي کتابونه برابر کړي، تر څو چاپ او د گټې اخیستنې لپاره بېرته د محصلینو په واک کې ورکړل شي.

د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بولي چې د خپلو گرانو محصلینو د ښه روزلو لپاره نوي او تازه درسي مواد برابر کړي.

په پای کې د ټولو هغه ادارو او کسانو څخه، په تېره بیا د Dr. Eroes او ډاکټر یحیی وردگ څخه مننه کوم، چې د طبي کتابونو د چاپ زمینه یې برابره کړې ده. هیله لرم چې دغه گټور کار ته ادامه ورکړل شي او هم د نورو برخو تدریسي کتابونه د چاپ په ځایه سمبال شي.

په درنښت

قانونپوه سرور دانش

د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست، کابل ۱۳۹۰

## د درسي کتابونو چاپ او د طب پوهنځيو سره مرسته

قدرمنو استادانو او گرانو محصلينو!

د افغانستان په پوهنتونونو کې د درسي کتابونو کموالی او نشتوالی یوه لویه ستونزه گڼل کيږي. د دې ستونزې د هوارولو لپاره مور په تېرو دوو کلونو کې د طب پوهنځيو د درسي کتابونو د چاپ لړۍ پيل او تر اوسه مو ۶۰ طبي درسي کتابونه چاپ او د افغانستان ټولو طب پوهنځيو ته ورکړل.

د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ۲۰۱۰-۲۰۱۴ کلونو په ملي ستراتيژيک پلان کې راغلي چې:

”د لوړو زده کړو او د ښوونې د ښه کیفیت او محصلينو ته د نويو، کره او علمي معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې په دري او پښتو ژبو د درسي کتابونو د لیکلو فرصت برابر شي، د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انګلیسي ژبې څخه دري او پښتو ژبو ته د کتابونو او مجلو ژباړل اړین دي، له دې امکاناتو څخه پرته د پوهنتونونو محصلین او ښوونکي نشي کولای عصري، نویو، تازه او کره معلوماتو ته لاس رسی پیدا کړي“.

د افغانستان د طب پوهنځيو محصلین او استادان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی په زاړه مېتود تدریس کوي، محصلین او استادان نوي، تازه او عصري معلومات په واک کې نلري، دوی له کتابونو او هغه چپټرونو څخه ګټه اخلي، چې زاړه او په بازار کې په ټیټ کیفیت کاپي کيږي. باید هغه شمېر کتابونه چې د استادانو له خوا لیکل شوي دي راټول او چاپ شي.

په ۲۰۱۱ کال کې د کابل طبي پوهنتون څخه (۹ عنوانه)، د ننگرهار (۱۳ عنوانه)، کندهار (۷ عنوانه) او هرات (۴ عنوانه) طبي درسي کتابونه (ټول ۳۳ عنوانه) راټول او چاپ کړل، چې یوه بېلګه یې ستاسې په لاس کې همدا کتاب دی.

د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنو له مخې، غواړو، چې دغه پروګرام د هېواد نورو پوهنځيو ته هم وغځوو.

لکه څنګه چې زموږ هېواد تکړه او مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا لري، نو باید د هېواد د طب

پوهنځيو ته لازياته پاملرنه وشي.

خرنگه چې د کتابونو چاپول زموږ د پروگرام يوه برخه ده، غواړم دلته زموږ د نورو هڅو په اړوند خو ټکي راوړم:

## ۱. درسي طبي کتابونه

دا کتاب چې ستاسو په لاس کې دی د درسي کتابونو د چاپ د لړۍ يوه برخه ده. موږ غواړو چې دې کار ته دوام ورکړو او د چاپېرې او نوبت وړکولو دوران ختم شي.

## ۲. د نوي مېتود او پرمختللو وسايلو په کارولو سره تدريس

د ننگرهار او بلخ پوهنتونونو طب پوهنځي يوازې د يو پروجيکتور درلودونکې وو، چې په ټول تدريس کې به ترې ځکه اخیستل کېده او ډېرو استادانو به په تيوريکي شکل درس ورکاوه. په ۲۰۱۰ کې مو د DAAD په مرسته وکولای شول د ننگرهار، خوست، مزار، کندهار او هرات طب پوهنځيو ټولو تدريسي ټولگيو کې پروجيکتورونه نصب کړو.

## ۳. د هيدل برگ پوهنتون په نړيوال طب کې ماستري

په نظر کې ده چې د هېواد د طب پوهنځيو د عامې روغتيا د څانگو استادان د جرمني هيدل برگ پوهنتون ته د ماستري لپاره ولېږل شي.

## ۴. د اړتياوو ارزونه

په کار ده چې د پوهنځيو روان وضعيت (اوسنی ستونزې او راتلونکي چلېنجونه) و ارزول شي، او بيا ددې پر بنسټ په منظمه توگه اداري، اکاډميک کارونه او پرمختيايي پروژې پلې شي.

## ۵. کتابتونونه

په انگليسي ژبه په ټولو مهمو مسلکي مضمونونو کې نوي نړيوال معياري کتابونه د پوهنځيو کتابتونونو ته وسپارل شي.

## ۶. لابراتوارونه

په هر طب پوهنځي کې بايد په بېلابېلو برخو کې لابراتوارونه موجود وي.

## ۷. کدري روغتونونه (د پوهنتون روغتونونه)

د هېواد هره طب پوهنځي بايد کادري روغتون ولري او يا هم په نورو روغتونونو کې د طب محصلينو لپاره د عملي زده کړو زمينه برابره شي.

## ۸. ستراتيژيک پلان

دا به ډېره گټوره وي، چې د طب هر پوهنځي د اړونده پوهنتون د ستراتيژيک پلان په

له ټولو محترمو استادانو څخه هيله كوم، چې په خپلو مسلکي برخو کې نوي کتابونه وليکي،  
وژباړي او يا هم خپل پخواني ليکل شوي کتابونه، لکچر نوټونه او چيپټرونه اډېټ او د چاپولو لپاره  
تيار کړي او بيا يې زموږ په واک کې راکړي، چې په ښه کيفيت چاپ او بيا يې په وړيا توگه طب  
پوهنځيو او د محصلينو په واک کې ورکړو.

همدارنگه د پورته يادو شوو نورو ټکو په اړوند خپل وړانديزونه موږ ته په لاندې آدرس وسپارئ،  
څو په گډه مؤثر گامونه واخلو.

له گرانو محصلينو هيله كوم، چې په يادو چارو کې له خپلو استادانو او موږ سره مرستندوی شي.

په آلمان کې د افغاني ماشومانو سره د مرستې ټولني (Kinderhilfe-Afghanistan e.V.)

او د ټولني مشر ښاغلي Dr Eroes نه د زړه له کومې مننه كوم، چې تر اوسه يې  
د دغه کتاب پر شمول د ۱۳ کتابونو د چاپ لگښت په ورين تندي پر غاړه واخيسته او له  
دې سربېره يې د لانورو مرستو وعده هم کړې ده. همداراز د افغانیک (Afghanic)  
موسسې څخه هم مننه كوم، چې د کتابونو د چاپ تخنيکي او اداري کارونه يې تر سره  
کړي .

په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست  
قانونپوه سرور دانش، علمي معین پوهنوال محمد عثمان بابري، مالي او اداري معین پوهاند  
صابر خويشکي، د پوهنتونو او پوهنځيو له رييسانو او درنو استادانو څخه يوه نړۍ مننه  
كوم، چې موږ يې تشويق کړي يو او د کتابونو د چاپ په برخه کې يې له موږ سره  
همکارۍ کړې .

ډاکټر يحيي وردگ، د لوړو زده کړو وزارت

کابل، ۲۰۱۱ م، دسامبر

د دفتر تليفون : ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰

موبايل تليفون : ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴۰

ايميل : wardak@afghanic.org

× × ×

## تقریظ

د محترم ډاکټر محمد صابر له خوا د پرازیتولوژي اساساتو تر عنوان لاندې کتاب مې چې په دقیقه توګه مطالعه کې، په دغه کتاب کې د پرازیتولوژي تعریف، د پرازیتي ژوند پدیده، د کوربه او پرازیت ترمینځ اړیکې، د پرازیت د ثبوت مهم میتودونه، یو حجروي پرازیتونه، مختلف چنچیان، د ارتروپودا د کلاس پورې مربوط پرازیتونه، په علمي ډول او په روانه او سلیسه پښتو ژبه لیکل شوی، چې لوستونکي په ډیره اسانۍ ترې ګټه اخیستلی شي.

ددې کتاب اهمیت په دې کې هم دی چې د معتبرو علمي آثارو څخه استفاده شوي ده او همدارنګه هغه پرازیتي ناروغۍ چې د افغانستان وګړي ورسره لاس او ګرېوان دي، په دې اثر کې تر مطالعې لاندې نیول شوي. زما په نظر دا کتاب د طب، و ترنری علومو او ساینس دمحصلینو او استادانو لپاره یو ښه علمي منبع ګرځېدلای شي.

زه د نوموړي استاد د دغه علمي اثر د چاپولو وړاندیز کوم او لیکوونکي ته دلوی څښتن تعالی څخه د لابیالیتوبونو هیله او آرزو لرم تر څو په راتلونکي کې هم د داسې نورو ورته علمي آثارو د لیکلو په هڅه او هاند کې بریالی شي.  
په درنښت

پوهندوی الفت (شېرزی)

د ننگرهار پوهنتون د طب پوهنځي

د بیولوژي د پیاوړتیا امر او استاد



## تقریظ

کتاب درسی محترم داکتر محمد صابر را که تحت عنوان (دپرازیتولوژی اساسات) تالیف نموده اند جهت ارزیابی و اظهار نظر به اینجانب سپرده شده است. از لحاظ مسلک به علاقه تمام مطالعه نمودم.

این کتاب با در نظر داشت پروگرام درسی مضمون متذکره در چهار فصل که حاوی (عمومیات پرازیتولوژی، پروتوزوا، کرم ها و ارتروپودا) و دارای مأخذ بوده در ۲۱۲ صفحه تحریر گردیده است.

کتاب متذکره از نگاه شکلیات مطابقت کامل با مقررات تالیف و ترجمه داشته و با جملات روان و کلمات عام فهم تحریر یافته است و از نگاه علمی جامع و مفید بوده و در شرایط کنونی که کمبود کتب درسی در همه پوهنتون های کشور محسوس است. بنأ آنعده استادانیکه با قبول همه مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به امکانات جدید جرئت نموده و اقدام به تالیف کتاب درسی مینمایند یک کار فوق العاده عالی و دارای اهمیت زیاد اکادمیک میباشد، اثر مذکور جواب گوی مقتضیات محصلان پوهنخی های ساینس، و ترنری، طب و علاقمندان میباشد.

اینجانب اثر متذکره را قابل نشر و چاپ دانسته و مو فقیت های هرچه بیشتر علمی و مسلکی شانرا در راه تالیف همچو آثار برای غنای هرچه بیشتر ذخایر علمی کشور از بارگاه خداوند متعال ارزومندم.

بالحترام  
پوهنوال دوکتور سید رفیع الله حلیم  
۱۳۹۱/۱۰/۱۹

استاد پرازیتولوژی، پوهنخی علوم و ترنری، پوهنتون ننکرهار

## فهرست

### لومړی فصل: عمومي پرازیتولوژي

- ۱..... د پرازیتولوژي تعريف
- ۱..... د پرازيتي ژوند پدیده
- ۳..... د پرازیت د کوربه انواع
- ۳..... د کوربه او پرازیت اړیکې
- ۴..... د پرازیت وده
- ۵..... د کوربه سره د پرازیت خان عیارول
- ۷..... د پرازیت د ناروغولو قابلیت
- ۹..... د پرازیت د اثبات میتودونه
- ۱۲..... د انسان او کورني حیواناتو پرازیتونه

### دوهم فصل: پروتوزوا یا یو حجروي حیوانات

- ۱۶..... فلاجیلاتا
- ۱۷..... دیپلومونادینا
- ۱۹..... تریشومونادینا
- ۲۳..... کینیتوپلاستیدا

۲۴	.....	تريپانوزوماتيداي
۲۸	.....	د تريپانوزوما بروسيي مختلف گروپونه
۳۲	.....	تريپانوزوما كروزي
۳۴	.....	د ليشمانيا جنس
۳۴	.....	بطني ليشمانيا
۳۵	.....	د پوستكي ليشمانيا
۳۸	.....	ريزوپودا
۳۸	.....	اميبينا
۳۸	.....	د انتاميبيا جنس
۴۳	.....	سپوروزوا
۴۵	.....	گريگارينيدا
۴۵	.....	ويگريگارينينا
۴۵	.....	شيزوگريگارينينا
۴۶	.....	كوكسيديا
۵۱	.....	هيموسپورينا
۵۲	.....	پلازمودي يداي
۵۲	.....	پلازموديم
۶۴	.....	مايکروسپورا
۶۵	.....	ميکسوزوا
۶۶	.....	سليياتا

## دریم فصل: چینجیان

- ۶۸..... هواریا پلن چینجیان
- ۷۱..... تریماتودا
- ۷۱..... اسپیدوبوتریا
- ۷۱..... مونوگینیا
- ۷۴..... مونو اوپیستو کوتیلیا
- ۷۴..... گیر و دکتیلیدای
- ۷۴..... گیر و دکتیلوس
- ۷۶..... پولی اوپیستو کوتیلیا
- ۷۶..... پولیستوماتیدای
- ۷۶..... پولیستوموم انتیگریموم
- ۷۹..... دییلوزون پارادوکسوم
- ۸۲..... دایگینیا
- ۱۰۰..... ستریگیدا
- ۱۰۰..... شیسستوزوماتیدیا
- ۱۰۰..... شیسستوزوماتیدای
- ۱۰۰..... شیسستوزوما
- ۱۰۱..... شیسستوزوما هیماتوبیوم
- ۱۰۴..... شیسستوزومامانسونی

- ۱۰۶..... شيستوزوما جاپانيكوم
- ۱۰۷..... ايشينو ستوميدا
- ۱۰۸..... ايشينو ستوماتيداي
- ۱۰۸..... فاسيوليداي
- ۱۰۹..... فاسيولا هيپاتيكا
- ۱۱۱..... فاسيولا بوسكي
- ۱۱۲..... پلاگيروشيدا
- ۱۱۲..... ديكر و سوليم ديندر يتيكوم
- ۱۱۶..... اوپيستور شيدا
- ۱۱۶..... اوپستور شيز سايننسيز
- ۱۱۸..... سيستودا
- ۱۱۸..... ويسيستودا
- ۱۳۱..... پسويدو فيليديا
- ۱۳۲..... ديفيلو بوتريوم لاتوم
- ۱۳۵..... سيكلو فيليديا
- ۱۳۶..... تائنيا سگيناتا
- ۱۳۸..... تائنيا سوليوم
- ۱۴۱..... ايشينو كوكوس
- ۱۴۲..... ايشينو كوكوس گرانولوسوس
- ۱۴۷..... ايشينو كوكوس مولتيلو كولاريس

- ۱۵۰..... هیمینو لیبیدای
- ۱۵۰..... هیمینو لیبیس نانا
- ۱۵۲..... نیماتیل مینتس
- ۱۵۲..... نیماتودا
- ۱۶۲..... تریشینیلیدای
- ۱۶۲..... تریشینیل اسپیرالس
- ۱۶۳..... تریشیوریدای
- ۱۶۳..... تریشوریس تریشیورا
- ۱۶۴..... انتر ویبوس ویر میکولاریس
- ۱۶۵..... اسکاریدیدای
- ۱۶۵..... اسکاریس لومبریکویدس
- ۱۶۸..... انیکلوستوماتیدای
- ۱۶۹..... ستر ونگیلویدی دای
- ۱۷۰..... ستر ونگیلویدیس ستر کورالیس
- ۱۷۱..... در اکونکولویدیا
- ۱۷۱..... در اکونکولوس میدینینسیز
- ۱۷۳..... فیلاریویدیا
- ۱۷۳..... اونکوسیرکیدای
- ۱۷۳..... اونکوسیرکا ولولوس
- ۱۷۵..... فیلاریدای

- ۱۷۵..... وخیریریا بانکروفتی
- ۱۷۷..... لوا لوا
- ۱۷۸..... بینتاستومیدا
- ۱۷۹..... لینگواتولا سیراتا
- ۱۷۹..... ارمیلیفیر ارمیلاتوس
- ۱۸۱..... انیلیدا
- ۱۸۲..... رینچوبدیلیدای
- ۱۸۳..... فارینگوبدیلیدای
- ۱۸۳..... گناتوبدیلیدای

### خُلورم فصل: ارتروپودا

- ۱۸۶..... شیلیسیراتا
- ۱۸۶..... کنه یا کونای
- ۱۹۰..... اکارین، میلب
- ۱۹۱..... انسکتا یا حشرات
- ۱۹۳..... فتیراپتیرا یا سپری
- ۱۹۴..... رینچوتا یا خسکی
- ۱۹۵..... دیپتیرا
- ۱۹۷..... نیماتوسیرا
- ۱۹۷..... کولیسیدای

- ۱۹۹..... سیمولیدای
- ۲۰۰..... فلیوتومیدای
- ۲۰۰..... فلیوتوموس
- ۲۰۱..... سیراتوپوگونیدای
- ۲۰۱..... تابانیدای یا غوباری
- ۲۰۲..... سیکلورافا یا مچان
- ۲۰۲..... موسکیدای
- ۲۰۲..... گلوسینیدای
- ۲۰۳..... هیپوبوسکیدای
- ۲۰۴..... کالیفوریدای
- ۲۰۵..... کوتیریریدای
- ۲۰۵..... دیرماتوبیا هومینیس
- ۲۰۵..... گستیروفیلیدای
- ۲۰۵..... گستیروفیلوس انتیستینالس
- ۲۰۶..... ویستریدای
- ۲۰۶..... ویستروس اویس
- ۲۰۶..... هیپودرمس بویس
- ۲۰۸..... افنپتیرا یا ورری
- ۲۱۰..... کروستاسیا یا جنگانبونه



# لومړی فصل

## عمومي پرازیتولوژی

### د پرازیتولوژي تعريف

پرازیتولوژی د بیالوژي د علم یوه څانګه ده چې د دوو ژوندیو موجوداتو په منځ کې د روابطو څخه بحث کوي.

چې په عادي ډول کو چنی حیوان یعنی پرازیت د لوی حیوان یعنی کوربه څخه خپل غذایی مواد برابروي.

### د پرازیتي ژوند پدیده:

د ټولو ژویو مهم ګډ پرابلم د غذا لاس ته راوړل دي. کله چې دا پرابلم حل شي نو د ژوند بقا ممکنه شی.

همپشه لوی حیوانات ځان د کوچنیو حیواناتو څخه تغذیه کوي (په استثناء د نبات خوړونکو)، خو کله کوچني حیواناتو د لویو حیواناتو په غذا کی ځان شریکوي یعنی Kommensalism او یا د هغوئ د وجود له پاسه ژوند کوي یعنی Ektoparasitism داسی فکر کیږي چه د یو پخواني توافق له لیاری د یوی تکاملي پروسی په نتیجه کی د خارجي پرازیتیزم څخه داخلي پرازیتیزم یعنی Endoparasitism انکشاف کړی دی.

په عمومي ډول پرازیتونه په دوه ډول دي:

لمړې اکتوپرازیت: چه د کوربه د وجود په خارجي سطح ژوند کوي او خپل غذايي مواد له هغه څخه لاس ته راوړي.

دوهم ایندوپرازیت: چه د کوربه د وجود په داخل کی ژوند کوي او خپله غذا له هغه ځای څخه لاس ته راوړي.

اکتوپرازیتیزم کیدای شي همیشنی یعنی Stationaer وي مثال یې سپری یا موقتي یعنی Temporaer وي مثال یې ماشي او یا د هغوي په منځ کی وي چه مثال یې اورگی دي اندوپرازیتی ژوند شاید د داسی اکتوپرازیتونو څخه سرچشمه اخیستی وي، چه د خارجي پوستکي څخه غذا اخلي لکه د میچ لارو چه په جلدي زخمونو کی هگی. اچوي او لارو بیا د زخم د داخلي موادو څخه ځان تغذیه کوي. او یا د یو کو منسال ژوند څخه یې کلمو او یا د جسم نورو خالیگاو ته لپاره پیدا کړي وي چه نن ورځ د فقاریه یعنی شمزی، لرونکو حیواناتو ټول غړي د هغوی د حملو لاندی راځي. هغه پرازیتونه چه یو کوربه مبتلا کوي د Monoxen یعنی یو کوربه اي او هغه چه څو مختلف کوربه مبتلا کوي د heteroxen په نوم یاد یږي.

د پرازیت او کوربه رابطه که د هغوی په تکامل کې سره دومره نږدی شوی وي چه پرازیت یوازی په کوربه کی ژوندی پاتی کیدای شي نو دا رابطه د Obligat په نامه یاد یږي، ددی په خوا کی نور پرازیتونه شته چه د خپل انتخاب او ضرورت په اساس د کوربه سره رابطه قایموي چه د Fakultativ نوم ورته ورکړل شوی دی.

که چیری یو پرازیت په مختلفو کوربه او کی ژوند وکړي، اخرنی کوربه ته Endwirt چه ورته په انگلیسي کی د final host اصطلاح استعمالیږي، چه د پرازیت پخوالی او جنسي تکثیر په دغه کوربه کی منځ ته راځي لکه انسان د کدودانی چنچی یعنی Taenea لپاره، د

منځني کوربه يعنی Zwischenwirt په انگليسي کی intermedial host په نامه هغه کوربه حيواناتوته وايي چه په هغوئ کی غير جنسي تکثر او پخوالئ منح ته راځي، لکه غوائ د کدودانی چنجي لپاره.

د وکتور Vektor لفظ هغو خارجي پرازیتونو ته استعمالیږي چه د مریضی عامل ددوی په وجود کی وده کوي، اوی له دی چه په خپله مریض شي نورو ته پ انتقالوي، لکه د ملاریا غو ماشی، چی په دی مثال کی د اخري کوربه شکل هم نیولئ دی، ځکه چه جنسي وده يعنی تکثر پکی واقع کیږي.

د پرازیتونو د کوربه انواع :

1- ذخیروي کوربه يعنی Reservoir Wirt : دا حیوان پرازیت په خپل ځان کی ساتي خو په خپله نه مریض کیږي مگر نورو ته پ انتقالولی شي. لکه سپی او مره شکلي حیوانات چه د لیشمانیا مریضی انسان ته انتقالوي.

2- ترانسپورتي کوربه Transport Wirt : په دی کوربه کی د پرازیت نمو صورت نه نیسي خو یوازی انتقال کوي. چه دا عملیه د Phorese په نامه یادیږي.

3- غلط کوربه Fehlwirt : که چیری یو پرازیت دداسی کوربه وجود ته داخل شي چه د هغه څخه نه ځان خارجولای شي او نه پکی نمو کولای شي.

د کوربه او پرازیت اړیکی :

څرنګه چه د کوربه او پرازیت ګډ ژوند د یو پخواني تطابق او توافق له مخی صورت نیسي کیدای شي چه :

الف: ډیر ټینګ وي يعنی د پرازیت پواسطه یواځی یو نوع کوربه مصاب کیږی.

ب: دیر سست وي یعنی پرازیت مختلف کوربه مصاب کولای شي.

ج: د منځني کوربه سره ټینګ او اخرنی کوربه سره سست وي او یا برعکس.

د پرازیت Ontogenese یعنی شخصي وده په دوه ډوله واقع کیدای شي:

لمړي، مستقیمه وده- چه لارو او بالغ حیوان سره مشابه وي او نمو دیوی میتامورفوزی له لیاری صورت نیسي، لکه په حشراتو او نیماتودا کی. (Metamorphose)

دوهم، غیرمستقیمه وده- چی په هغی کی د نسل تغییر صورت نیسي، لکه په دایگینیا تریماتودا کی، چه د نمو مختلف نسلونه یوپه بل پسې منځ ته راځي.

د نسل تغییر په دوه ډوله صورت نیسي:

میتاگینیزی Metagenese په دی عملیه کی د یو یا څو غیرجنسي او جنسي نسلونو تناوب واقع کیږي.

هیتیروگینیزی Heterogenese په دی عملیه کی یوازی د یو جنسي یعنی مونث پارتینو گینیزی (Parthenogenese) او ددوه جنسي یعنی مونث او مذکر نسل تناوب منځ ته راځي.

نیوتینی Neotenie : په دی عملیه کی پرازیت د لارو په مرحله کی جنسي بلوغ ته رسیږي.

## د پرازیت وده:

د لارو وده په خارجي پرازیتونو کی د محیطي حرارت تابع ده، په داسی حال کی چه په داخلي پرازیتونو کی د کوربه دفاعي سیستم د پرازیت په وده مستقیم

تاثیر لري دودى دوره په مختلفو پرازیتونو کی د خو ورڅو څخه تر څو میاشتو پوری دوام کولای شي.

د کوربه د مصاب کیدو څخه د پرازیت یا دهغه د هگیو د خارجیدو پوری دوره د Präpatenz په نوم یادیري.

او د هگی د خارجیدو یا لارو د میندلو څخه تر هغه وخته چه پرازیت اخرنی هگی اچوي د Patenz د دوران په نوم یادیري. چه دغه زمانې واټن د خو ورڅو څخه تر څو کلونو پوری دوام کولای شي.

د مصاب کیدو څخه د مریضی د اولو علایمو تر څرگندیدو پوری دوره د Inkubation د وخت په نوم یادیري.

### د کوربه سره د پرازیت ځان عیارول : Adaptation

خارجي پرازیتونو د خولی داسی جوړښتونه او یا هضمي سیستمونه منع ته راوړی دي تر څو د کوربه له غذایی موادو څخه استفاده وکړي.

داخلي پرازیتونه باید کوربه ته د ننوتلو لپاره لاندی پرابلمونه حل کړي:

ا. وجود ته د ننوتلو لپاره پیدا کول

ب. په کوربه کی د ځان نښلول او د غذایی موادو اخیستل

ج. د کوربه د معافیتي سیستم سره مقابله

د. د خپل راتلونکي نسل ساتل او نوي کوربه ته د هغه رسول

ا. وجود ته د ننوتلو لیاری Invasionsmechanismen : د یو داخلي پرازیت پواسطه مصاب کیدل شاید پاسیف یعنی غیرفعال، لکه د کوربه پواسطه د خولی له خوا د هگیو یا لارو اخیستل او یا اکتیف وي یعنی فعال لکه د ماشي پواسطه د وینی اخیستلو په وخت کې د کوربه وجود ته د پرازیت انتقال.

ب. ځان نښلول او د غذا اخیستل: په مختلفو انساجو کې د ځان نښلولو لپاره پرازیتونو مختلف جوړښتونه را منځ ته کړيدي لکه خنځکونه ، اغزي، رودونکي جوړښتونه ... د غذا اخستل او هضمول په نورو حیواناتو کې د خولی او کلمو دنده ده، مگر په داخلي پرازیتونو کې دا وظیفه د وجود پوستکی هم اجرا ء کولاي شي لکه د کدو دانی په چنچي کې.

ج. د کوربه د معافیت سیستم سره مقابله: داخلي پرازیت باید د کوربه حیوان د هضمي انزیمونو او معافیتي سیستم څخه ځان وساتي. بعضی پرازیتونه لکه تریپانوزوما د خپل وجودد خارجي قشر د پاسه یو خارجي پوښ جوړوي چه د Surface Coat په نوم یادیري. دغه پوښ د ځان د بدلولو قابلیت لري. یعنی پرازیت کله چه د کوربه د انتی بادي د حملی لاندی راځي، ډیر زیات یی له منځه ځي خو یوه ډیره کمه فیصدي یی خپل خارجي قشر بدلوي او نمو کوي، تر څو چه د کوربه انتی بادي د تغیر شوي قشر په مقابل کی جوړیري ددوي تعداد زیاتیري. پرازیت کولای شي تر سلو وارو پوری دا عملیه تکرار کړي خو مصاب شوی حیوان بالاخره ضعیف کیږي او نشي کولای چه نوره انتی بادي جوړه کړي. بعضی پرازیتونه د کوربه د وجود په شان مواد په خپله خارجي سطح کی جوړوی یا رانغاړي، چه دغه عملیه د molekulare Mimikry په نامه یادیري، یعنی د کوربه تقلید کوي لکه په شستوزوما Schistosoma، فاسیولا Fasciola او فلاریا Filaria کی. همدارنگه نور پرازیتونه ځان ته داسی ماسک یعنی خیره جوړوي

چه د هغوی انتي جن د پرازیت د انتي بادي پواسطه احاطه شوي ښکاري او یا د بدن په هغو برخو کی خای نیسي چه لږ انتي بادي جوړوي لکه مغز، او یا دا چه پرازیت دومره زیات انتي جن تولیدوي چه دکوربه ټول انتي بادي په هغه نښلي او پرازیت نه شي تشخیصیدلای، کله چه د کوربه انتي بادی ضعیفه شي، پرازیت د موقع څخه په استفاده سره خپل تعداد زیاتوي.

د. د راتلونکي نسل ساتل یا پالنه: اندوپرازیتونه باید خپل راتلونکی نسل هم د کوربه د معافیتي سیستم د حملی څخه وساتي یو امکان دیو پندو پوست درلودل او یا د هگی کپسول دی، همدارنگه کیدای شي آینده نسل یی د کوربه د وجود په هغه برخه کی وي، چه خارجیدل تری اسان وي، لکه د شستوزوما هگی چه په کلمو او مثانه کی او یا د ملاریا گمیتونه د وینی د رگونو په سطحی برخه کی ژوند کوي، ترڅو په اسانۍ د ما شي د وینو اخیستو په وخت کې د هغه وجود ته داخل شي. یوه بله ستراتیژی دزیاتولارو او هگیو تولید او یا د غیرجنسي لیاری د زیاتوالي امکان دی، چه په دی ډول نوي کوربه ته د انتقال او د ژوندي پاتی کیدو چانس زیاتیري.

## د پرازیت د ناروغولو قابلیت Pathogeny:

پرازیتونه خپل کوربه ته د مختلفو لارو زیان رسوي:

- ◀ حجرات او غړي په میخانیکي ډول تخریبول لکه د پلازمودیم، انکوسیرا او انکیلوستوما له خوا
- ◀ انساج اضافي نمو ته مجبورول او د سرطاني جوړښتونو جوړول مثال د ځگر چینجی
- ◀ د وجود څخه د غذایی موادو اخیستل لکه د ژوری له خوا

- ◀ د زهري موادو خارجول لکه د ملاریا د پرازیت او کنی له خوا
- ◀ د بکتریایی مریضیو د تولید د زمینی برابرول لکه د انتامیبا او اسکاریس د لاروي له خوا په سږي کی.
- ◀ د خارجي پرازیت په ډول کوربه ته مستقیم او یا د ثانوي انفکشن له لیاری ضرر رسول، لکه د پوستکي ناروغی، د حشراتو او چنجیانو له خوا.

د پرازیت ضرر رسونه په کوربه حیواناتو کی د پرازیت د Virulenzgrad یعنی د ناروغولو وړتیا پورې اړه لري، په عمومي ډول ښه پرازیت هغه دئ چه خپل کوربه ژر مړ نکړي، ځکه چه دا پخپله دده د مرگ سبب هم گزي. هغه پرازیتونه چه د کوربه سره یې ښه توافق کړی وي، کوربه ته لږ ضرر رسوي، چه کولای شي دواړه تر ډیر وخته سره گډ ژوند وکړي، لکه د کدو داني چنجی چه په انسان کی تر شلو کلو پورې ژوند کولای شي.

هغه مریضی، چه د پرازیت له خوا منځ ته راځي یا Akut یعنی حاد شکل لري، چه کوربه یو لنډ خو قوي عکس العمل ښيي، خو اکثرا د کوربه او پرازیت په منځ کې یو نسبي تعادل منځ ته راځي او مریضی په یو مزمین یعنی Chronic شکل ادامه پیدا کوي، خو کله د مریضی علایم نه معلومیري، مریضی په Latent یعنی پټ شکل ادامه پیدا کوي، بی له دې چه د کوربه لخوا احساس شي.

حیواني مریضی Zoonose: داسې مریضی چه د عین پراریت له خوا هم په حیوان او هم په انسان کې مریضی پیدا کوي. لکه توکسوپلازموزې Toxoplasmosis او تریشینوزې Trichinosis په داسې حال کې چه Anthroponosen هغه مریضیو ته وایي چه یوازې د انسان څخه انسان ته انتقالیري. لکه د کښکي چنجی Enterobius vermicularis.



د پرازیت او کوربه روابط ډیر پیچلې دي، خو کوم شی چه بنسکاره دی هغه دادی چه کوربه د پرازیت په مقابل کې چه دانتی جن صفت لری، د انتی بادی په تولید سره عکس العمل بنسکاره کوي. ددې لپاره چه د پرازیت موجودیت د انتی جن- انتی بادی د تعامل پواسطه ثابت شي، مختلفې طریقې موجودې دي:

### د پرازیت د اثبات میتودونه:

اول - مستقیم میتود : چه پرازیت مستقیما د یو تازه ایمون سیروم سره په تماس کې راځي چه دهغې په نتیجه کې یو رسوب منخ ته راځي، چې د لیدو وړ دي لکه د شستوزوما سرکاریا چه تشخیصیږي.

دوهم- غیرمستقیم میتود: په دې میتود کې یو منځگړي مادي ته اړتیا ده چه د انتی جن- انتی بادی عکس العمل د سترگو او مایکروسکوپ پواسطه د لیدلو وړ کړي. د منځگړي مادي په حیث یو پلاستیکی ماده چې د Latex په نوم یادیږي، استعمالیږي، چې که ددې پلاستیکی مادي په اطرافو کې دیوې تکمې په شان ترسب منخ ته راشي، نو د مثبت عکس العمل او د پرازیت د موجودیت معنی لري او که نه نو منفي دي.

یو بل غیرمستقیم میتود دامون فلورسنس Immunfluorensens غیرمستقیم تست دي : کله چې انتی جن د انسان د وینې د سیروم د انتی بادی سره یو ځای شي ، نو یو مثبت تعامل داسې معلومیدای شي چې د انسان انتی سیروم د Fluoreszein Isothiocyanat سره وتړل شي او د انتی جن - انتی بادی پر مرکب باندې واچول شي نو که دغه د فلورسنس ماده په ماورای بنفش نور کې شین گونی زیر رنگ ولري نو د مثبت تعامل او سور رنگ یې د منفي تعامل معنی لري. نور تعاملونه د indirekt hämagglutinin test چې د تي لرونکي جېوان د وینو سره کرویات پکې د انتقال

کوونکي یعنی Träger په حیث استعمالیږي لکه ELISA یا

Radioimmunoassay (RIA) او Enzymlinkedimmuno sorbent assay نورې طریقې دي چې په RIA کې یو ایزوتوپ رادیو اکتیف استعمالیږي په داسې حال کې چې په ELISA کې د یو peroxidase انزایم څخه کار اخیستل کېږي. دا وروستۍ دواړه میتودونه ډېر حساس دي چې په لږه اندازه انټي جن- انټي باډي هم پرې معلومېدای شي.

د مالیکولي بیالوژي، خصوصاً د جین تخنیک میتودونه سره له دې چې ډیر صحیح او دقیق نتایج ورکوي، خو د ورځني لابراتواري کار لپاره ډیر مغلق او مصرفی زیات دي.

د پرازیت او کوربه د تماس په نتیجه کې انټي باډي تولیدیږي، چې د کسب شوي معافیت د erwobene یا aquiredresistent په نوم یادیږي، دغه معافیت د مصاب شوي حیوان د موجوده او نور زیات یعنی Superinfektion مخنیوی کوي. دا قسم معافیت باید د ارثي معافیت یعنی ererbte Resistent سره مغالطه نشي چې حیوان ئې په طبیعي ډول په وجود کې لري. همدارنگه یو بل ډول مقاومت هم شته چې پرازیت د کیمیاوي موادو او حشرات ضد درملو په مقابل کې معافیت پیدا کوي لکه د ملاریا او بعضې نباتي امراضو په مقابل کې معافیتونه، چې البته دا موضوع د ایمونولوژي او وراثت ډېرو پیچلو تعاملاتو نتیجه ده او ځانگړی بحث ته ضرورت لری.

## انتی جن انتی بادی Antigen Antibody:

په دې تعامل کې د اندیکاتور په صفت د پسه د وینې د سرو کرویاتو د کومپلیمنت مربوط دوینې د پاشلو یعنی Lyse یو سیستم دی، چه د انتی بادی له خوا تجزیه کیږي. (کومپلیمنت د سیروم یو فکتور دی چه د پردو حجراتو سره د انتی بادی د نسلولو په نتیجه کې د وینې د حجراتو د پاشلو سبب کیږي.) د پرازیت د انتی جن یا انتی باډي د معلومولو لپاره د تست مواد یعنی اندیکاتور د پرازیت د انتی جن یا انتی سیروم سره یو ځای کیږي، که چیرته مقابل ملگری یعنی انتی یا ضد موجود وي، د انتی جن انتی بادی عکس العمل واقع کیږي، چه کومپلیمنت د تعامل په نتیجه کې په مصرف رسیږي، نو له دی امله د اندیکاتور د ښکاره کیدو لپاره کافي کومپلیمنت موجود نه دې، د پسه سره کرویات نه پاشل کیږي، یعنی هیمولیزې منخ ته نه راځي، چه دا د کومپلیمنت د مثبت تعامل معنی لري، که چیرې مقابل ملگری نه وي موجود نو کمپلیمنت نه مصرفیږي او د اندیکاتور د ښکاره کیدو یا عکس العمل لپاره موجود دی، چه د پسه د وینو سره کرویات د تجزیه کوونکې انتی بادی پواسطه پاشي، چه د کومپلیمنت تست د منفي عکس العمل معنی لري.

## د انسان او کورني حيواناتو پرازیتونه:

په دې بحث کې موږ یوازې د هغو پرازیتونو څخه بحث کوو چې د انساني یا حیواني طب له نظره مهم دي. چې دغه پرازیتونه د څو محدودو گروپونو پورې اړه لري.

لمړۍ - Protisten یعنی پروتوزوا: چې یو حجروي حیوانات په دې گروپ کې راځي.

دوهم - Helminthen یعنی چنجیان: په دې گروپ کې مختلف چنجیان شامل دي چې د څو ملي مترو څخه بیا تر دیرشو مترو پورې اوږدوالې لرلای شي.

درېیم - Arthropoden یعنی بندپنښې لرونکي: ټول دغه گروپونه چې د یو سخت خارجي اسکلیت لرونکي دي، کیدای شي چې خپل کوربه مستقیماً متضرر کړي او یا د وینو څښلو په وخت کې د مریضۍ عوامل انتقال کړي.

څرنگه چې په پرازیتي ژوند کې د کوربه سره د توافق موضوع د پرازیت لپاره حیاتي اهمیت لري، نو داسې جوړښتونه پکې منځ ته راغلي، چې د هغوی د ازادو خپلوانو (غیرپرازیتي) سره ورته والی نلري، نو ځکه ددوي په طبقه بندۍ کې مشکلات پیدا کېږي. د دريو مخکې یاد شوو گروپونو طبقه بندي په لاندې ډول ده:

Kingdom (Reich) : Animalia

Subkingdom(Unterreich): Protista/Protozoa

Phylum(Stamm)

- Sarcomastigophora
- Opalozoa
- Sporozoa
- Microspora
- Myxozoa
- Ascetospora
- Ciliophora/Ciliata

Mesozoa

Subkingdom(Uterreich): Metazoa

Phylum(stamm):

Plathelminthes

Klasse:

Turbellaria

Trematoda

Cestoda

Phylum(Stamm): Nematelminthes/Aschelminthes

Subphylum(Unterstamm): Nematoda

Phylum(Stamm): Acanthocephala

Phylum(Stamm): Pentastomida

Phylum(Stamm): Annelida

Klasse: Polychaeta

:Clitellata

Phylum(Stamm): Arthropoda

Subphylum(Unterstamm):

Chelicerata

Branchiata

Tracheata

Klasse: Insecta

Order(Ordnung):Anoplura

Order(Ordnung):Rhynchota

Order(Ordnung):Diptera

Order(Ordnung):Aphaniptera

## دوهم فصل

# پروتوزوا/Protozoa/Protista

## یوحجروي حیوانات:

په پروتوزوا کې د ژوند ټول وظایف لکه غذا اخیستل ، طرح ، تکثیر ، تنبه ، حرکت او نور د یوې حجرې له خوا اداره کیږي. دا حیوانات کله د یوې او کله دڅو حقیقي هستو لرونکي دي. حجرات د یوې پردې پواسطه چه Plasmamembran نومېږي، احاطه شوي دي، چې په منځ کې ئې حجروي جوړښتونه لکه اندوپلازماتیک ریتیکولم، میتاکاندریا، گلجي باډي، واکيولونه، رايبوزومونه، سنتریولونه، فلاجيل، سلیا، لیزوزومونه، مایکروتوبولي، فلمنتونه او نور موجود دي.

## فلاجیلاتا Mastigophora/ Flagellata : قمچین لرونکی

فلاجیلاتا د Sarcomastigophora د فایلیم یو سب فایلیم دی. ددې گروپ لویه برخه ازاد ژوند لري، خو مورډلته یوازې پرازیتي انواع مطالعه کوو. د انسانانو لپاره هم د صحي او هم د اقتصادي پلوه مهم پرازیتونه په درې اردرو یعنی کینیتوپلاستیدا، دیپلومونادینا او تریشومونادینا کې پیدا کیږي، اخري دواړه گروپونه په کولمو او یا په اطراحي-جنسي یعنی Urogenital سیستم کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې اولنی گروپ اکثره په وینه او لمف او یا د هضمي سیستم بهر انساچو کې اوسېږي. څرنگه چې د دیپلومونادینا او تریشومونادینا په گروپونو کې د کومنسال څخه تر پرازیتي ژوند پورې د ژوند کولو مختلف شکلونه موجود دي، نو په اوله کې یې تشریح کوو:

Subphylum: Mastogophora

1. Klasse: Phytomastigophora

2. Klasse: Zoomastigophora

Order : Kinoplastida

Order : Proteromonadida

Order : Retoratamonadida

Order : Diplomonadida

Order : Oxymonadida

Order : Trichomonadida

Order : Hypermastigida




## Order : Diplomonadida د پیلو مونا دینا

ددې گروپ د حجراتو ارگانل یعنی داخلي جوړښتونه دوه چنده یعنی غبرگ دي، داسې فکر کيږي چه شاید دا حیوانات د حجراتو د یوې نامکملې تجزیې په نتیجه کې منع ته راغلې وي. د حجراتو لویوالی ئې شل مایکرون( مایکرون د ملي مترزمره برخه ده) دی. ددې گروپ نمایندگان د کوربه په کولمو کې ژوند کوي. د حجروي تقسیماتو په نتیجه کې تکثر کوي، چه یو حیوان په دوه برخو تقسیميږي. دا حیوانات ځان د کولمو د اپتیل په مایکروویلي نښلوي، چه مختلف انواع ئې د کولمو په بیلو بیلو برخو کې ژوند کوي. غذایي مواد د قپ وهلو (Phagocytose) په ډول د کولمود داخلي جدار څخه لاس ته راوړي. کاربو هایدريت د گلايکوجن په شکل ذخیره کوي، او د بې اکسیجن


یا (anaerob) شرایطو لاندې هغه په ایتانول، اسیتات او کاربن دای اوکساید باندي بدلوي.

دېو کوربه څخه بل ته انتقال د یو Cyst یعنی کخوړې پواسطه صورت نیسي، چې د غایطه موادو له لارې خارجيږي. د کخوړې په داخل کې هستوي تقسیمات صورت نیسي، خو حجروي مکمل تقسیمات د کخوړې د دیوال د انحلال څخه وروسته په نوي کوربه کې منع ته راځي، څرنگه چه دا حیوانات ډیر کوچني دي، نو داخلي جوړښتونه ئې د اولین ځل دپاره د الکترون مایکروسکوب پواسطه روښانه شول، چه ددې حیوان بطني دسک یعنی Ventral disk او د څلورو جوړو قمچینو موجودیت پکې ثابت شو، چه له هغې وروسته د بعضې جنسونو لکه Girardia یا Lambliia طبقه بندي ممکنه شوه. ټول انواع ئې د انسان په وجود کې مریضي نه تولیدوي، خو ځنې ئې د نس ناستي یعنی اسهال سبب گزي.



لمرې شکل د *Giardia lamblia* شیمایي رسم: په a- کې د تروفوزوایت بطني طرف او په b- کې د غایطه موادو یو څلور هستوي سیست لیدل کیږي B- قاعدوي جوړښت، CF- د انتهایي قمچین جوړه، F- قمچینونه، HSF- شاتنی جانبي قمچینې، N- هسته، VD- بطني دسک، VF- بطني قمچینې، VSF- مخکنی بطني قمچینې، CW- د سیست دیوال.

دا شکل درې زره واړې لوی شوی دی.



دوهم شکل:

د *Giardia lamblia* رستر الکترون  
مايکروسکوپي عکس چې د تروفوزويت بطني  
برخه پکې ښودل کيږي.

D-بطني دسک،

F-قمچين يا فلاجيل. دا شکل څلورزره واري لوی  
شويدي.

## تریښو موناډینا Order: Trichomonadina

دا پرازیتونه Kosmopolite دي یعنې په ټوله دنیا کې موجود دي. په خپل وجود کې  
لاندې جوړښتونه لري:

هسته یعنې Nucleus: د یوې غبرګې یعنې دوه گونې پردې پواسطه احاطه شوې ده چې  
د وجود په پاسنې برخه کې د قمچینې لاندې د Axostyl د مایکروتوبولي په منځ کې  
موقعیت لري. د کروموزومونو تعداد ئې د دريو او دولسو په منځ کې تخمینيږي. د  
هستې د تقسیم څخه مخکې قمچېن دوه چنده کیږي. هسته او د هغې مربوط قمچین  
قطب ته ځي، چې د دې عملېې وروسته حجروي تقسیمات صورت نیسي.

قمچینونه یعنی Geiseln: په عمومي ډول د *Trichomonas* جنس د څلورو تر شپږو پورې قمچینې لري. د هغوی څخه یوه ئې کشکونکې قمچینه ده ، چې دیوې موجي پردې په شکل د ټول وجود سره په موازي شکل امتداد مومي. د قمچینو تعداد د حیوان د طبقه بندۍ لپاره مهم دی. یو جوړښت د قاعدوي جوړښت Basalapparat په نوم یادېږي، چې د حیوان د تکثیر په وخت کې دهستې څخه مخکې دوه چنده کیږي د خپل بهر ته راوتلي جوړښتو پواسطه په کوربه د پرازیت د نسلولو دنده په غاړه لري.

حجروي سکلیت Cytoskelett: د وجود خارجي برخه دیوې پردې پواسطه احاطه شویده، خو په سایتوپلازما کې نور جوړښتونه شته چې د حجرې د کلکوالي سبب گرځي، لکه Pelta, Axostyl او رشتوي جوړښتونه لکه Costa او Parabasal طنابونه اکسوستیل او پیلتا د یوې ناوې غونډې جوړښت منځ ته راوړي چې په هغې کې هسته او قاعدوي جوړښت ځای نیسي. Costa یو رشتوي جوړښت دی چې یوازې په موجي ممبران لرونکي غړو کې موجود او د کشکونکې او دوهمې قمچینې په منځ کې ځای نیسي.

هغه رشتوي طنابونه چې د پارابازال په نوم یادېږي د گلجې جوړښتونو د کلکوالي سبب گرزي.



موجي پرده: دغه پرده په *Trichomonas vaginalis* کې چه د انسان د مونث جنس په اطراحي او جنسي سیستم کې پیدا کیږي ، د وجود دوه دریمه برخه احتوا کوي په داسې حال کې چې په نورو انواعو کې د ټول وجود څخه تېرېږي او همدارنگه د ظاهري جوړښت له پلوه هم په مختلفو انواعو کې فرق لري.

تغذیه: تغذیه د قپ کولو یا رانگارلو یعنی Phagocytose په شکل د وجود د خارجي سطحې پواسطه صورت نیسي. هغه انواع چه د کوربه د وجود په داخل کې ژوند کوي د بکترياو خخه ځان تغذیه کوي، لکه T.vaginalis کله چه د حاملگۍ ضد دوا د خوړلو په نتیجه کې د بکترياو تعداد د ښځو په تناسلي اله کې زیات شي ددې حیواناتو تعداد هم زیاتېږي

هایدروگنوزوم **Hydrognosom**: تریشومونادینا میتاکاندریا نلري خو د یو مایکرون په غټوالي جوړښتونه لري چې ددو پردو پواسطه احاطه شويدي، او حیوان کولای شي ددې جوړښتونو پواسطه داکسیجن په موجودیت او یا غیاب کې په Aerotolerant شکل تنفس او ژوند وکړي. ددې جوړښت په باره کې داسې فکر کېږي چه په تکاملي لحاظ ئی دیو Endosymbiont خخه سرچینه اخیستې چه بیاد اکسیجن په موجودیت کې د میتاکاندریا او په غیاب کی د هایدروگنوزوم جوړښت وده کړیده.

انتقال: ددوي تکثر د کوربه په وجود کې ددوه گوني تقسیم په شکل صورت نیسي، د تکثر په نتیجه کې منخ ته راغلې حجرات د وچیدو په مقابل کې ډیر حساس دي، ځکه چه محافظ دیوال نلري، سره ددې چې دځان گرد چاپیره سیست یعنی کخوره جوړوي، یعنی انتقال ئې مثلاً په T. vaginalis کې یوازې د مستقیم تماس له لپارې د جنسي مقاربت پواسطه صورت نیسي. بعضې نور انواع ئې چه قوي سیستونه جوړوي مریضي نه انتقالوي. T. vaginalis د مورکانو د وجود په خالیگا کې هم وده کوي.

مصا بول **Pathogeny** : په اثبات رسيدلې چې ددوي بعضې غړي په مستقيم يا غير مستقيم ډول كوربه حيوان ته ډير تاوان رسوي ، د تريشومونا نبتل په اډيتيل د زخمونو سبب گرځي ، چه د بكتريا او پوپنكونو يعنې چنپاسو لپاره د يو ثانوي انفكشن په حيث ليار پرانيزي چې په انسانانو كې *T.vaginalis* دښځو د شنډوالي ، د مارغانو په كولمو كې *T. gallinae* د دهغوي د مړينې ، دغوايانو په ملابندي يعنې پلاستنا كې *T.foetus* دهغوي د شنډوالي سبب گرزي .



دريم شكل: انساني  
تريشوموناد. -AX  
اكسوسټيل، BK- د  
قاعدوي جسم  
كامپلكس، U- موجي  
پرده

داشكل بيوزراو اته سوه  
واړې لوی شويدي .

## Order : Kinetoplastida کینیتوپلاستیډا

ددوي نوم د Kinetoplast څخه چې د میتاکاندریا یوه برخه ده او د قمچینې د قاعدوي جوړښت یعنی Basalapparart تر څنګ ځای لري، اخیستل شوی دې

اول: سب اردر: Bodonina

فامیلی: Bodonidae چې دوه قمچینې لري.

فامیلی: Cryptobiidae د ماهي او حلزونونو پرازیتونه

دوهم: سب اردر: Trypanosomatina چې یوه قمچینه لري.

فامیلی: Trypanosomatidae: په دې کورنۍ کې د کوربه مصاب کیدل ددوو مختلفو لیاړو صورت نیسي.

اول: مصاب کوونکې مرحلې په غایطه موادو کې موجودی دي چې د Stercoraria په نوم یادېږي.


دوهم: مصاب کوونکې مرحلې د خولې په جوړښتونو کې او یا لعابیه غدواتو کې وي چې Salivaria ئی بولي.

ددې فامیلی پورې مربوط جنسونه عبارت دي له: Herpetomonas، Leptomonas، Crithidia، Blastocrithidia، Phytomonas، Leishmania او Trypanosoma څخه.

## فامیلی تریپانوزوما تی دای : Trypanosomatidae

په دې فامیلی پورې دانسان ډیر مهم پرازیتونه اړه لري. ددې ګروپ یو مهم خاصیت دنمو په دوران کې دهغوی د شکل بدلول دي، چې په څو کوربه اي یعنی heteroxen پرازیتونو کې په دوو مختلفو کوربه او لکه فقاریه حیوان او حشره کې او په یو کوربه اي یعنی monoxen پرازیتونو کې یوازې په حشره کې صورت نیسي. د شکل په تغییر کې د حیوان قمچین د وجود په مختلفو برخو کې موجود او لیدل کیدای شي، چې دغه تغییر د Polymorphism په نوم او که د حیوان قمچین یو شاتنه مګر د حیوان جسم پڼه یعنی stumpy او یا نرئ یعنی slender وي، دغه تغییر د نسل ته Pleomorphism ویل کیږي. په پخوانیو کتابونو کې د پولې مورفیزم د مختلفو مرحلو نومونه د مختلفو جنسونو دنمو څخه اخیستل شويدي لکه لیشمانیا، لپتوموناس، کریتیدیا او تریپانوزوما. د نولس سوه شپږ شپینم کال وروسته دا نومونه د قمچین له مخی ټاکل شويدي، لکه د Krypto-amastigot بې قمچین د لپشمانیا فورم، epimastigot قمچین د وجود په نیمایي برخه کې د هستې د پاسه کریتیدیا فورم، promastigot د وجود په پاسنی برخه کې لپتوموناس فورم او trypomastigot چه قمچین ئې په ټول وجود کې تېریږي د تریپانوزوما فورم ته وائي. د تریپانوزوما په دوران کې یوازې خاصې مرحلې یو بل پسې تکراریږي، او په څو کوربه اي پرازیتونو کې یوازې خاصې مرحلې د یو کوربه څخه و بل ته انتقال کیدای شي، دا ځکه چه د مختلفو شکلونو او مرحلو په منځ کې فرق یوازې د شکل په لحاظ نه بلکه اساسي تفاوتونه یې په میتابولیزم کې موجود دي، چې په خاص حیوان کې د ژوندي پاتی کیدو او ودې امکانات محدود وي، لکه د میتاکاندریا موجودیت یا نشتوالی او داسې نور عوامل.





څلورم شکل د تریپانوزوما نوې او زاړه نومونه او مهمې مرحلې B- قاعدوي جوړښت، F- قمچین، K- کینیتوپلاست، N- هسته، T- د قمچین کڅوړه

سایتولوژي: ددې گروپ حجرات دیوې داسې پردې پهنې ممبران څخه جوړ شوي دي چې د هغې لاندې فنرشکل مایکروتوبولي موقعیت لري او حجرې ته کلکوالی ورکوي، او دیو حجروي سکلیت شکل نیسي. دوینې په مرحله یا bloodform کې د حجروي پردې د پاسه یو د لس تر پنځلس نانومتر پندېه طبقه ده چې د surface coat یا Glykokalyx په نامه یادېږي، چې پرازیت د کوربه د انتې باډي او کمپلمنت څخه ساتي، دغه طبقه په افریقایي تریپانوزوما کې د یو گلوکوپروتین څخه جوړه شویده. څرنګه چې دا پروتین د هر حجروي تقسیمات څخه وروسته بدلېږي نو په انګلیسي ژبه کې د variant surface glycoprotein یا مختصراً VSG په نوم یادېږي، چې معنی یې تغیرکوونکی سطحی پروتین دی. دا پروتین د پنځه سوه امینواسیدونو څخه جوړ دی. زر جینونه موندل شوي دي چې دغه پروتین جوړوي، چې دا په خپل وار د هستوي DNA لس په سلو کې جوړوي. ددې زرو جینونو څخه په یو وخت کې یوازې یو

جين فعاليري، چې دغه فعاليدل اکثرا د حجروي تقسيمات څخه وروسته صورت نيسي، او په دې ډول د پرازيت ژوندي پاتې کيدل په کوربه کې تضمينوي. البته کله چې پرازيت د Tse-tse مچ ته انتقال کوي دغه پروتين له منځه ځي او په ځايې ئې يو بل پروتين چې Procyclin نومېږي جوړېږي. چه د کيمياوي لحاظه له پخواني څخه بيخي فرق لري.

قمچين: ټولې مرحلې يوازې يو قمچين لري. چې يوازې د اوږدوالي له لحاظه سره فرق لري. قمچين د يوې خاليگا څخه سرچينه اخلي او د يو قاعدوي جوړښت پواسطه په پلازما کې نښتې وي. قمچين نه يوازې د حرکت بلکه په فقاريه حيوان کې د نښلولو وظيفه هم په غاړه لري.

موجي پرده: دا جوړښت په عادي مايکروسکوپ کې د يوې کرې وړې پردې په شکل ښکاري، خو په الکترون مايکروسکوپ کې ليدل کيږي چې دا يوه پرده نه ده بلکه قمچين په ځينو ځايو کې د حجري سره نښتې او کله جدا ده.

کينيتوپلاست Kinetoplast: د ميتاکاندریا يوه برخه ده چه خپل DNA لري. په دی جوړښت کې د تنفسي ځنځير پروتينونه او دهغی په خوا کې د RNA خصوصاً mRNA جوړښت تنظيميږي.

تغذيه: دا گروپ تيار حل يا هضم شوي مواد د کوربه د وجود څخه اخلي چه گلوکوز او اکسيجن ئې ډير مهم دي. ددې په خوا کې شحميات، امينواسيدونه او ويتامينونه خصوصاً B,C ددوي د نمو دپاره ډير ضرور دي. د غذا اخيستل د


Endocytose او يا Phagocytose په شکل د قمچینې د کڅوړې په برخه کې صورت نیسي. د گلوکوز تجزیه په Glykosom کې صورت نیسي، چې د Glykolyse مختلف انزایمونه لري.

وده: د تریپانوزوما مختلفې انواعې د مریضۍ د پیداکیدو او د هغې د شدت په اندازه کې مختلفې دي، چې بعضې ئې دنورو څخه ډیر خطرناک دي. د مریضۍ عامل په کوربه کې نه یوازې د غذاي موادو کمښت، بلکې د زهري موادو خوشې کیدل په وینه کې او د حجراتو تخریب دی چې ډیر زله ناخاپي شوک منځ ته راوړي چې ژر د کوربه د مړینې سبب گرزي، په داسې حال کې چې په انتقالکوونکو حشراتو پرازیت هیڅ منفي تاثیر نلري. د پرازیتونو تکثر یا وده د طولی تقسیو پواسطه چې قاعدوي جوړښت او کینیتوپلاست د هستې د تقسیم څخه مخکې دوه چنده کیږي، صورت نیسي. په دې نږدې وختو کې په *Trypanosoma brucei* کې د یو جنسي تکثر راپور هم ورکړل شوی دی. د پرازیتونو د کروموزومونو تعداد مختلف دی، چې پکې لوی اوواړه کروموزومونه شامل دي. د بې قمچین یا amastigot شکل څخه پغیر نور ټول شکلونه د حجرې په خارج کې ژوند کوي.

انتشار یا انتقال: د پرازیت انتقال اکثرا د یو فعال ویکتور پواسطه صورت نیسي چه په هغوي کې د پرازیت د انکشاف لپاره بعضې مهمې او حتی ضروري مرحلې پرمخ ځي، چې بې له دې مرحلو د پرازیت انکشاف ناممکن دی. همدارنگه د مریض د وینې د انتقال له لپارې او همدارنگه په مایع نایتروجن کی د ساتلو له لپارې کیدای شي پرازیت د تجربوي او یا د تحقیقاتي اهدافو لپاره په لابراتوار کې نورو حیواناتو ته انتقال شي.

## دتریپانوزوما بروسیی *Trypanosoma brucei* مختلف گروپونه:

ددې گروپ پورې مربوط *Trypanosoma brucei brucei* په لویو تي لرونکو حیواناتو کې د Nagana د مریضی، *Trypanosoma brucei gambiense* په غربي افريقا او *Trypanosoma brucei rhodesiense* په شرقي افريقا کې دانسانانو د خوب د مریضی سبب کېږي. انتقال ئې د *Glossina* يا *Tsetse* دمچ پواسطه دوينې داخيستلو په وخت کې صورت نیسي، داسې چې د چيچلو په وخت کې د پرازیت په لیاړو کې موجود پرازیتونه و کوربه حیوان یا انسان ته داخلېږي، چې ورته له دې امله د *Salivaria* یعنی د لیاړو گروپ یا د لیاړو د لارې انتقال کیدونکی گروپ هم وائي. درې واړه پرازیتونه د مارفولوژي یعنی خارجي جوړښت له لحاظه سره مشابه خو یو له بله ارثي یعنی جنتیکي فرق لري.



پنجم شکل: په دې شکل کې د *Trypanosoma brucei gambiense* او *Trypanosoma brucei rhodesiense* د ژوند دوران تشریح شوی دی. ES- د جوړیدو په حال کې Surface coat یا سطحی پوښ، F- قمچین، KF- لنډ قمچین، KI- کینیتوپلاست، MI- میتاکاندریا، N- هسته، SC- سطحی پوښ د کوچنیو خطونو په شکل ښودل شوی دی.

## د شکل تشریح

اول: نړئ شکل یعنی Trypomastigot: دغه شکل د انسان په مغزي مایع کې داخليږي دوهم: منځنی شکل: په دې مرحله کې د طولې تقسیم پواسطه د تریپانوزوما تعداد زیاتېږي درېیم: پېر شکل: یوازې دا شکل په تسي تسي مچ کې وده کولای شي.

خلورم: دا مرحله چې د مچ په ججوره یا حلق کې موجوده وي Surface coat یعنی سطحې پوښ نلري، په دې مرحله کې په میتاکاندریا کې اساسي تغیر منځ ته راځي تر لسو ورځو پورې پرازیت په تریپومستیگوت فورم په منځنی کلمو کې پاتې کیږي او تعداد ئې زیاتېږي، چه بالاخره د یو نا معلوم میکانیزم له ليارې ممکن دکلمو د اپتیل او یا د لعابیه غدو د نلونو څخه لعابیه یعنی د لیاری غدو ته رسېږي، په دې مرحله کې د پرازیت کینیتوپلاست او قمچینه د هستې خواته نږدې کیږي پنځم: د ایپیمستیگوت شکل ته انتقال او د پرازیتونو زیاتیدل د طولې تقسیم له ليارې په لعابیه غدواتو کې

شپږم: ایپیمستیگوت شکل چه یوه میتاکاندریا لري د نویو تحقیقاتو له مخې په دې مرحله کې د کروموزومونو د تنقیص یعنی Reduction له ليارې د پرازیت هیلوبید شکل او بیا د یوځای کیدو یعنی Fusion پواسطه بیرته دیپلوید شکل منځ ته راځي.

اووم: مریض کونکي یعنی Metacyclic تریپومستیگوت شکل چې ددې عملیې په نتیجه کې منځ ته راځي، سطحې پوښ لري او د گلا سینا په لعابیه غدواتو کې موجود وي، چې د وینې اخیستلو په وخت کې کوربه ته انتقالیدلای شي. دا ټوله دوره د حرارت د تاثیر لاندې د پنځه ویشتو څخه تر پنځوسو ورځو پورې وخت نیسي.


په انسان کې د پرازیت نمو او د مریضۍ شکل: مریضی د یوې مصاب شوي گلا سینا مچ د چیچلو پواسطه کوربه ته انتقالیږي. چې د یوې څخه تر دریو هفتو په جریان کې یو التهاب یا زخم منځ ته راځي، دا زخم خارښت او درد کوي او غوټه کیږي. دا لمړۍ مرحله د جلدې مرحلې په نوم هم یادېږي، ددې مرحلې په پای کې د دوو تر څلورو هفتو

وروسته ترېپانوزوما وینې ته داخلېږي ، مریض په غیر منظم ډول تبه کوي د تبې په هره دوره کې چې په وینه کې د کوربه د انتني باډي د عکس العمل په نتیجه کې د مړه شوو پرازیتونو د انډوتوکسین د ازادیدو له امله منځ ته راځي تر ننه نوي په سلو کې زیات پرازیتونه له منځه ځي، خو یو کم تعداد ئې په دې موفق کېږي چې خپل خارجي پوښ یعنی Surface coat داسې بدل کړي، چې خپل ژوند ته په کوربه کې دوام ورکړي او تکثیر یعنی وده وکړي او تعداد ئې زیات شي، ترڅو کوربه دنوي خارجي پوښ لرونکو په مقابل کې د انتني باډي په جوړولو سره عکس العمل وښائي. پرازیت کولای شي دا عملیه تر سلو وارو تکرار کړي، چې بالاخره کوربه ضعیف او د کافي انتني باډي په جوړولو نه قادرېږي. دڅو میاشتو وروسته ترېپانوزوما د وینې څخه بیخي ورکېږي، چې له دې سره سم د ترېپانوزوما دوهمه یعنی دوینې مرحله پای ته رسېږي. ددې دورې په جریان او یا له هغې وروسته لمفواوي غدوات مصاب کېږي او پرسېږي. له دې وروسته ترېپانوزوما ددماغ او شوکي نخاع مایع یعنی Liquor Cerebrospinalis ته داخلېږي او دریمه مرحله یعنی ددماغ د مایع دوره شروع کېږي. په دې مرحله کې مریض ته اعصاب خرابي او بیخوبي پیدا چې بالاخره دیوې بېهوشۍ ، بې تفاوتۍ او وزن د زیات کمښت سره مریض په یو ځای کې پروت وي او داسې معلومېږي لکه ویده چې وي. د خوب د مریضۍ اصطلاح د همدغې مرحلې څخه اخیستې شویده. ددې مرحلې په دوهمه برخه کې مریض له ځایه پاڅیدای نه شي او غذا نه خوري. د مریضۍ عامل په دماغی مایع کې د زهري موادو خارجیدل او ډېرو مړو پرازیتونو موجودیت دی. په دې مرحله کې د مریضۍ اعلاج تقریبا ناممکن دی. زیاتره مریضان له دې امله چې دفاعي سیستم ئې ډیر ضعیف دی دنورو مریضیو پواسطه لکه نیمنیا ، AIDS او نور... مړه کېږي.

## تريپانوزوما کروزې: *Trypanosoma cruzi*

دا نوع د وينې څښونکې خسکو چې د Reduviidae د فاميل پورې اړه لري د کود پواسطه انتقالیږي. له دې امله دغه گروپ د *Stercoraria* يعنې د غايطه موادو له لارې انتقاليدونکې په نوم هم ياديږي. کله چې خسک اکثراً د سترگې د شاوخوا څخه وينه اخلي د زخمي شوي ځاي په خوا کې غايطه مواد افرازوي چې بيا ددې ځاي دگرولو په نتيجه کې پرازيت زخم ته داخلېږي. دغه مريضې په لاتيني امريکا کې پيدا کېږي، چې د دوولس تر پنځه لس مليون وگړي پرې مصاب او ددې تعداد تقريباً درې چنده ئې د مريضيدو تر خطر لاندې دي ځکه چې ډير کورني او وحشي حيوانات د Reservoir په شکل دا پرازيت په ځان کې لري. په چيچلي ځاي کې لمړی يو پارسوب منځ ته راځي، بيا پرازيت لمفاوي سيستم او له هغه ځايه وينې ته داخلېږي، چې بيا توري، ځگر، د هډوکو مغز، د زړه عضلاتو، د اسکلټ عضلاتو د کولمو او مری غشا او د اعصابو د *Galia* حجراتو ته داخلېږي، چې په حجراتو کې په بې قمچينه يعنې *amastigot* شکل بدليږي. حجرات د پرازيت د زياتوالي په نتيجه کې چوي او له منځه ځي. د حجري څخه خارج شوي پرازيتونه نور حجرات تر حملې لاندې راولي چې بالاخره د يوې مياشتې تېې څخه وروسته مريضې په مزمن شکل بدليږي. چې په نتيجه کې ئې د زړه د عضلاتو لويوالي يعنې *Myocarditis* او همدارنگه د توري او ځگر د لويوالي سبب کېږي. دا مريضې کيدای شي د مور د شيدو له ليارې اولاد ته انتقال شي. د لس څخه تر شل کالو پورې د مريضۍ له دوام وروسته د زړه زيات عضلات له منځه ځي زړه غټيږي او په ناڅاپي ډول د زړه د عضلاتو د شکيدو له امله کوربه له منځه ځي. دا مريضې چې د لومړي ځل لپاره د يو برازيلی داکټر *Carlos Chagas* له خوا کشفه شوې ده، نو د چگاس د مريضۍ په نوم ياديږي.





شپږم شکل: د تریپانوزوما کروزې د ژوند دوران ES- جوړیدونکی سطحی پوښ، F- قمچین KI- کینیتوپلاست، KF- لڼه قمچین، MI- میتاکاندریا، N- هسته، NH- د کوربه حیوان هسته، SC- سطحی پوښ WZ- د کوربه حجره.

## د لیشمانیا Leishmania جنس:

دا جنس د کینیتوپلاستیدا د گروپ پورې اړه لري چې د فقاریه حیواناتو په انساجو او حجراتو کې د بې قمچین amastigot او د غیرفقاریه حیواناتو په کولمو کې د promastigot په شکل ژوند کوي. دا مریضی په جنوبی اروپا کې د یو ماشی پواسطه چې Phlebotomus نومېږي، انتقالیږي. د اعضاو د مصاب کولو له نظره په دوو ډولونو تقسیمېږي: یعنی د پوستکي Hautleishmaniasis او بطني viszerale Leishmaniasis

### بطني لیشمانیا

#### viszerale Leishmaniasis : Leishmania donovani

دا مریضی د اسیا په گرمو منطقو د روسی د جنوب په شمول، چین او منگولیا په اروپا او شمالي افریقا کې د مدیترانې شاوخوا، همدارنگه په برازیل او پاراگوای کې پیدا کیږي. پرازیت بې قمچین ډیر کوچنی د دوه ترخلورو مایکرونو پورې جسامت لري او د حجرې په داخل کې ژوند کوي. پرازیت د ماشی د چیچلو پواسطه د پوستکي دوینو رگونو ته داخل او بیا د کوربه د سپینو کرویاتو لخوا بلع یعنی تیرول کیږي. چی په همدې کرویاتو کې وده کوي او بالاخره د هډوکو مغز څگر او توري ته داخلېږي. مریض دورځې دوه واره تبه کوي. په اخر کې څگر او توری ډیر لویږي. په پوستکي باندې تور ټکي پیدا کیږي، له دې امله دا مریضی د Kala Azar یعنی تورې مریضی. په نوم هم یادېږي. که دا مریضی تداوي نشي د نیم څخه په درې کالو کې دمرگ سبب گرځي. سپی دبطني لیشمانیا او مورکان، مږې او خانی د پوستکي لیشمانیا د Reservoir یعنی ذخیرونکي په شکل انتقالوي.


## د پوستکي لېشمانيا:

### Orient Beule Bagdad Beule:Leishmania tropica

Inkubation یعنی تفریخ دوره یې د څو هفتو څخه تر میاشتو پورې دوام کوي کله نا کله د یو څخه تر دوه کالو پورې دوام کوي. دغه مریضي د مدیترانې د شاوخوا څخه تر جنوبی هسپانیه، حبشه، کینیا، جنوبی امریکا او همدارنگه په افغانستان کې هم پیدا کیږي. دا مریضي د یو ماشي پواسطه چې ریگي ماشې ئې بولي چې د جنس نوم ئې Phlebotomus دې انسان ته ددوبي په اخر وخت کې انتقالیږي. د پرازیت انتشار یوازې په چیچل شوي ځای محدود پاتې کیږي او نور وجود ته سرایت نکوي. د چیچلو په ځایونو کې چې اکثرا پزه، مخ، لاسونه او دمت لاندې برخې (دوجود هغه برخې چې د شپې بنکاره وي) یو زخم پیدا کیږي. په چیچلي ځای کې اول یوه سره غوټه پیدا کیږي چې ددوو څخه په شپږو هفتو کې لویري او کلکیږي. بالاخره دپوستکي دانساجو دتخریب له امله زخم منځ ته راځي. دا زخم د پوستکي د سطحې څخه لږ ژور او ځنډې ئې لوړې او سړی وي. د زخم قطر دوخت په تیریدو لویري. څرنگه چې زخم د یو کال له تیریدو وروسته په طبیعي ډول جوړیږي. نو ځکه ورته کالدانه یا سالدانه ویل کیږي. د زخم د جوړیدو وروسته د زخم ځای ژور پاتې کیږي. د جوړیدو وروسته همیشنی معافیت پاتې کیږي چې یو وار مصاب شوی ددوهم ځل لپاره نه مصاب کیږي. په پخوا وختونو کې به نجونې په مصنوعی ډول په هغه ځایونو چې نه معلومیږي په دې پرازیت مصاب کیدلې تر څو د بدرنگوالي څخه ئې مخنیوی وشي. په افغانستان کې دکالدانې دوه شکله موجود دي چې یو ئې اطرافي یعنی کلیوال شکل دې د لمدې کالدانې په نوم چې فکر کیږي د یو ذخیروي حیوان څخه او یو بل شکل ئې د بناري شکل دې دوچې کالدانې په شکل چې د یو انسان څخه بل ته مستقیما انتقالیږي.

دپرازیت د اثبات لپاره دزخم د ځنډې څخه مواد اخیستل کیږي او دسلایددپاسه پرې

گمزا رنگ Giemsa اچول کیرپری. د زخم په منځنۍ برخه کې د پرازیت پیدا کول مشکل دي. یوه دریمه نوع لیشمانیا د منځنۍ او جنوبی امریکا په گرمو منطقو کې پیدا کیرپری چی *L. braziliensis* یعنی برازیلی لیشمانیا په نوم یادیرپری، دا هم د پوستکي لیشمانیا ده خو دایمی معافیت پکې منځ ته نه راځي.



اووم شکل: دلشمانیا د انواعو د ژوند دوران: B- قاعدوي جوړښت، F- قمچین، KI- کینیتوپلاست، KF- لنډ قمچین، N- هسته، NH- دکوربه د حجرې هسته، PV- پرازیتي واکيولونه، RW- دکوربه د حجرې باقي پاتې ساینوپلازما، WZ- دکوربه حجره.

د شکل تشریح: 1- پرومستیگوت شکل د مچ د چیچلو وروسته د پوستکي په مکرډاگ حجراتو کې داخلېږي. 2- یو مایکرومستیگوت فورم ته تبدیلیدل دکوربه په حجره کې او د واکيولونو جوړول په څلورویشتو ساعتونو کې. 3- دوه گوني تکثیر یواسطه د پرازیت تعداد زیاتېږي او بالاخره دکوربه حجره چوي. 4- د مچ د چیچلوله لارې پرازیتونه د مچ په کولمو کې په پرومستیگوت شکل بدلېږي. 5- د طولي تقسیم له لارې ډیریدل، 6- 7 مصاب کوونکي شکل ته تغییر کول

## ریزوپودا Rhizopoda : Klasse

### آمیبینا Amoebina : U.Klasse

ددې گروپ مشخصه د کاذبو پښو یعنی Pseudopodien جوړول دي چې په ناڅاپي ډول د حیوان د حجرې په د باندې سطحه کې تشکیلېږي چې د حیوان د حرکت او غذا اخیستلو وظيفه په غاړه لري. داسې چې غذايي مواد احاطه کوي چې بیا د مخصوصو انزایمونو پواسطه هضمیږي. ددې گروپ اکثره غړي ازاد ژوند لري خو په انسان کې د امیبونو اوه نوع د اجباري پرازیت او یا کومنزال په شکل ژوند کوي لکه د خولې په خالیگاه کې *Entamoeba gingivalis* او یا په غټو کلمو کې اوسیدونکې *Entamoeba coli* چې په عادي حالت کې بې ضرره دي. بعضې نور لکه *Entamoeba histolytica* کولای شي په کومنزال شکل خو کله د مریضۍ د عامل په حیث د سختې مریضۍ سبب وگرزي.

ددې گروپ حجرات د یوې پردې پواسطه احاطه شويدي او په مرطوبو محیطونو کې ژوند کوي، چی د وچیدو په مقابل کې حساس دي. خو کولای شي چې سیستونه یعنی کڅوړې جوړې کړي او په سختو محیطي شرایطو کی د خپل ژوند بقا ته ادامه ورکړي. تکثري د ساده تقسیم په شکل صورت نیسي.

### د انتامیبا جنس *Entamoeba* یعنی اسهالي امیبونه:

ددې جنس پورې مربوط اقلا دوه نوع یعنی *Entamoeba histolytica* او *Entamoeba vaders* پتوجن دي چې د کوربه په انساجو کې داخل او دهغه د حجراتو خصوصاً د وینو د سره کرویاتو څخه ځان تغذیه کوي. انتامیبا د خوني اسهال په

څنگ کې خطرناکې اېبسی یعنی Abzess د بدن په مهمو غړو لکه ځگر، سږې او مغز کې تولیدوي. دا امیب په دوه شکلو کې ظاهرېږي. چې یو ته ئې د Minuta مینوتا او بل ته ئې د Magna مگنا فورم وائی. د پرازیت انتقال د خولې له لپارې د سیستونو پواسطه صورت نیسي. سیستونه دمصاب شوی انسان په غایطه موادو کې موجودوي کله چې دا مواد د سږې یعنی کود په قسم په سبزیجاتو و اچول شي او ناپاک سبزیجات نور انسانان و خوري او یا چټلې اوبه وچېني نو نورو انسانانو ته انتقالېږي. همدارنگه کیدای شي مچان هم د میخانیکي انتقالکوونکي په حیث رول ولوبوي. دا سیستونه څلور هستوي وي، بالاخره په اته هستوي مینوتا فورم بدلیږي. د نا معلومو علتونو له مخې دغه فورم په یو بل ویني خوړونکي مگنا فورم بدلیږي. چې کولای شي د کولمو د غشا او ویني سیستم له لپارې ځان ځگر، سږې او مغز ته ورسوي. ددی فورم پواسطه منځ ته راغلي زخمونه او په عین حال کې د بکتریاو موجودیت د ثانوي انفکشن په حیث دویني دردوونکي اسهلات او دکولمو څخه د باندې په نورو غړو کې خطرناکې اېبسی منځ ته راوړي، چې که تداوي نه شي د مرگ سبب گرزي. ددې مریضۍ د تیرولو څخه وروسته معافیت منځ ته نه راځي اود بیا مریض کیدو امکان شته. د انتامیبا هستولیتیکا مشخصه دهغې گردې هستې دي چې هسته چې ئې د یو ټکي په شکل ښکاري. دا پرازیت میتاکاندریا او پرکسیزوم نلري، ځکه چې تنفس ئې د تخمر په شکل دی.

د مالکیولي بیالوژي څېړنو څخه څرگنده شوې ده چې د انتامیبا هستولیتیکا د اصطلاح لاندې یو مریض کوونکې شکل چې د Entamoeba dysenteriae او بل نه مریض کوونکې شکل چې د Entamoeba dispar نومېږي موجود دي. د بعضې محققینو په نظر یو شکل په بل شکل بدلیدای شي. مریضي پیدا کوونکې شکل کیدای شي تر ډیر وخته په کلمو کې ژوند وکړي بې له دې چې مریضی تولیده کړي.

مريض کوونکي یعنی Pathogen شکل لاندې خواص لري:

اول: دوي په کولمو پورې دځان نښلولو يو سيستم لري چې د لکتين او بعضې کاربوهايډریتو څخه جوړډي.

دوهم: دوي دحجراتو د منځه وړلو یعنی Cytolyse قابلیت لري چې له دې ليارې د حيوان دفاعي قوت ضعيفوي.

دریم: د پروتيني انزایمونو پواسطه دحجراتو پروتین تجزیه کوي یعنی Protolyse منع ته راوړي.

تداوي: Mitronidazol, Paromomycin


وقایه: پاکي او نظافت، د پاکو اوبو څښل، سلات او مېوې پرېمینځل.

تشخيص: د ناروغ انسان امیبونه په غایطه موادو کې تشخيصول، د دې لپاره غایطه مواد په سلايد اچول کېږي او په کور سلايد پوښل کېږي. که چیري د تبست نتیجه مثبت وي نو امیبونه د حرکت په حال کې لیدل کېږي چې سایتو پلازم یې د وینې د موجودیت له امله نارنجي شکل لري. په آخرو وختو کې داسې واقعات لیدل شوي دي چې آزاد ژوندي امیبونه چې په اوبو کې ژوند کوي د فاکولتاتيف پرازیت شکل اختیار کړي دی او د سختو مریضیو سبب گرځېدلي دي چې لاندې انواع یې مهم دي.

لومړی، د Naegleria مختلف انواع چې د چټلو اوبو په واسطه پزې او د هغه ځایه څخه د بویولو عصب nervus olfactorius او بیا د دماغ مایع Liquor cerebrospondialis ته داخلېږي چې د یوه نه تر نهو ورځو وروسته په امیبیایي میننگو سفالیتیس Meningocephaliths بدلېږي چې اکثرا د مرگ سبب گزري.



دوهم، Acanthamoeba وجود ته ننوتل د تنفسي، بولي او جنسي جهاز او يا د پوستکي د لارې صورت نيسي. د Naegleria بر عکس دغه پرازیت يوازې هغه انسانان مريضوي چې دفاعي سيستم يې ضعيف وي.



اتم شکل: په انتامیبا هیستولیتیکا کې د تکثر او انتقال امکانات AB- اېسی، CH- رنگه جسم CW- د سیست دیوال، E- د وینې سره کرویات، P- اکتوپلازم، N- هسته، NV- غذایي واکيول، V- واکيول

1- څلور هستوي سیست د خولې له لارې اخیستل کیږي

2- امیب په معده کې د سیست څخه راوړي اکثره یوه کاډبه پښه لري

3- هستوي تکثر او په اته امیبونو تقسیمیدل

4- 6 کوچني یا د مینوتا فورم د دوه گوني تکثر پواسطه زیاتیري

7- یو حجروي سیست د رنگه جسم لرونکي

8- دوه هستوي سیست

9- په غایطه موادو کې موجود څلور هستوي سیست

10- د مینوتا فورم کله چې انساجو ته داخلیري و مگنا فورم ته تغییر کوي

11- په څگر a، سرې b، او دماغ c کې د بکتريايوي ثانوي انفکشن پواسطه اېسی جوړیږي چې په هغوي کې نو یا زوې او د مگنا فورم موجود وي

## کلاس: سپوروزوا      Klass : Sporozoa

په دې کلاس کې ټول هغه پروتوزوا چې سپوروزویت جوړوي شامل دي. سپوروزویت د پرازیت یوه تکثري مرحله ده چې د زایگوت څخه جوړیږي. زایگوت په هغه ساده گروپونو کې چې په انکشافی دوران کې یواځې یو کوربه لري او د مونوگینیا په نوم یادېږي، د یو سپور په شکل موجود دی. سپور د زایگوت یو مقاوم شکل دی چې یو قوی حجروي دیوال لري او په دې ډول د وجود څخه د باندې د ژوندي پاتې کېدو قدرت لري. په پرمختللو گروپونو کې چې د ایگینیا نومېږي او په خپل انکشافی دوران کې یو اضافی منځنی کوربه هم لري زایگوت د وجود څخه نه خارجېږي بلکه د کوربه په داخل کې پاته کیږي سره له دې چې سپور نه جوړېږي خو بیا هم د نمو یعنی انکشاف هغه مرحله چې د زایگوت څخه منځ ته راځي د سپوروزویت په نوم یادېږي. په الکترون مایکروسکوپ کې د وجود په پاسني قطب کې یو مغلق جوړښت ښکاري چې مختلف حجروي ارگانل پکې موجود دي چې د Apicomplex په نوم یادېږي چې خصوصاً د Eimeriina په گروپ کې ډیر ښه معلومیږي. ځکه د سپوروزوا کلاس ته کله Apicomplexa هم ویل کیږي.

د سپوروزوا په انکشافی دوران کې چې په حقیقت کې د نسل د تبدیل یو دوران دي لاندې درې برخې لیدل کیږي :

غیرجنسي تکثر یعنی شیزوگوني Schizogonie

جنسي تکثر یعنی گموگوني Gamogonie او د القاح یعنی بلاریدلو عملیه

د زایگوت غیر جنسي تکثر یعنی سپوروگوني Sporogonie چې سپوروزویت پکې تولیدېږي.

د سپوروگوني د مرحلې پواسطه حجروي دوران ختمیږي او سپوروزويتونه نوو حجراتو ته داخلېږي او هغوي مصابوي.

د شیزوگوني په مرحله کې پرازیتونو ته شایزونت Schizont وائي. او د شیزوگوني څخه منځ ته راغلې تکثري مرحله د میروزویت Merozoit په نامه یادېږي. چې له دې امله کله د شیزوگوني او میروگوني اصطلاح عینې مرحلې ته استعمال مومي. په ډیرو حالاتو کې جنسي حجرات یعنی گمیتونه مستقیماً نه جوړېږي بلکه د جنسي لمړني حجراتو یعنی گمیتوسیت یا گمونت څخه منځ ته رائي. چې مذکر جنس ئې د Mikrogamont او مونث جنس ته ئې Makrogamont وائي.

Oocyste اوو سیست او سپور د اصطلاح څخه هدف یو بدل شوی زیگوت دې په یو اوو سیست کې کیدای شي چې یو تعداد سپوروسیسټ او بیا په هر یو سپوروسیسټ کې یو معین تعداد سپوروزویتونه ځای شوي وي. د جوړید په حالت کې سپوروسیسټ ته سپوروبلاست Sporoblast وائي.

په بعضي حالاتو کې چې زیگوت د سپور په شکل نه وي یعنی قوي ممبران یا حجروي دیوال ونلري کیدای شي چې متحرک وي دا ډول زیگوت ته Ookinete وائي.

په ځینو سپوروزواو کې لکه گریگارینا او یا بعضي کوکسیدا کې گمونتونه مخکې له دې چې گمیت تولید کړي د یو بل په خوا کې قرار نیسي او یو خارجي مشترک ممبران جوړوي چې داسې گمیتونو ته Syzygiten او یو داسې ټول جوړښت ته Syzygium وائي.

## Order : Gregarinida اردر گريگارينيډا

دا گروپ د غيرفقاريه او بعضې ساده کورداتا حيواناتو د وجود په خاليگاه کې د پرازيت په شکل ژوند کوي. چې بعضې ئې د لسو ملي مترو پورې اوږدوالي لري. د Monocystis جنس چې د باران چنجي ( انيليدا پورې مربوط ) په تناسلي برخه کې او Gregarina چې دوږو د گنگوت د لارو په کولموکې ژوند کوي لږڅه کوچني خو تعداد ئې ډير زيات دي. سره له دې چې ددې گروپ اکثره غړي د حجرې د باندې کې په کومنزال شکل او سپرې خو بعضې ئې د خپل وجودد مخکنۍ برخې يعنې Epimerit پواسطه د کوربه حجراتو پورې ځان نښلوي لکه *corycella armata*. د Schizogregarina گروپ د حجرې په داخل کې ژوند او تکثر کوي.


### Suborder : Eugregarinina سب اردرويگريگارينيډا

دا گروپ د شايوگونې مرحله نلري چې يوازې د سپوروگونې پواسطه تکثر کوي. مثال ئې Monocystis دي

### Suborder : Schizogregarinina سب اردر شيزوگريگارينيډا

دا گروپ د شايوگونې مرحله لري چې تر هغه وخته پورې تکرارېږي ترڅو د شايوونتو په ځاي Syzygiten جوړ شي. ددوي مثال *Caulleriella pipientis* دي چه دخپل Epimerit پواسطه د کولیکس ماشي د لارو په کولموکې ننوزي خو بالاخره د کولموخه

خان جدا کوي او د شایزو گوني مرحله طی کوي. چې بیا کیدای شي دغه عملیه تکرار او یا بیرته Syzygium جوړ شي.




نهم شکل: a. د *Corycella armata* عمومي شکل چې Deuterit لاندینی برخه Dm او Protomerit منځنی برخه Pm او Epimerit پاسنی برخه Em پکې لیدل کیږي b دغه پرازیت د پاسنی برخې پواسطه د کوربه د کلمو په حجراتو کې کلک دی

### Ord: Coccidida اردر کوکسیدیدا

په دې گروپ کې یوازې مایکرو گمونت Mikrogamont تکثر کوي چې په نتیجه کې کوچني او اکثراً قمچین لرونکي مایکرو گمیتونه Mikrogamet ترې منځ ته راځي. په داسې حال کې چې مکرو گمونت Makrogamont مستقیماً په یوه لوی او غیر

متحرک مکروگمیت Makrogamet تبدیلېږي يعنې تکثر نکوي کوكسيديا د حجري د داخلي پرازیتونو شکل نیولایې دی ، چې اکثرا د کلمو د اپیتیل په حجراتو ، د ترېخي په نلونو او پرمختللي گروپونه یې په ځگر او د وینو په حجراتو کې ژوند کوي. دا پرازیتونه نه یوازې په ابتدايي حیواناتو لکه غیرفقاریه کې بلکې همدارنگه په فقاریه او گرم وینو حیواناتو او ځینې یې حتی په انسان کې هم پرازیتي ژوند کوي چې د گریگارینا د گروپ په مقایسه دوي زیات پرمختگ کړیدی. ددې گروپ اکثره غړي په خپله نمو یا دژوند دوران کې د شیزوگوني مرحله لري. چې دا مرحله تکراریدای هم شي او په دې ډول د زیاتو پرازیتونو منځ ته راتلل تضمینوي. ددې گروپ پورې تړلي پرازیتونه په غوایانو ، پسونو ، خوگانو ، سویو ، مورگانو او مړو ، چرگانو ، قانسانو ، مار او مارماهي د مریضۍ سبب گزوي او ډیرې اقتصادي خسارې منځ ته راوړي. مثلا *Eimeria tenella* د چرگانو په فارمونو کې ، *Eimeria stiedae* په سویو کې مریضی منځ ته راوړي. ددې گروپ يعنې *Eimeria* پرازیتونه monoxen دي يعنې ټولې مرحلې یې په یو کوربه کې تیرېږي.



لسم شکل: د Eimeria مختلفو انواعو د ژوند دوران مثال: د کورني چرگانو Eimeria


1 - سپوروزويت د اووسيسټ په منځ کې د خولې لخوا اخیستل کېږي. 2-4 د شایزونت څخه د کولمو په اپیتیل حجراتو کې حرکت کوونکي میروزویټونه منځ ته راځي. 5- میروزویټ چې په گمونت بدلېږي. 6.1 مونث یا ماکروگمونت، 6.2 مذکر یا میکروگمونت چې میکروگمیتونه تولیدوي. 7.1 میکروگمیت چې القاح کېدای شي. 7.2 قمچین لرونکی میکروگمیت، 8 - زایگوت، 9 - د زایگوت دیوال چې د دواړو گمیتونو پواسطه منځ ته راځي. 10 - اووسيسټ یا زایگوتو سيسټ چې په غایطه موادو کې خارجېږي



11- 12 سپورجورول د جسم خخه خارج، چې په دې وخت کې په هر اوسیسټ کې څلور سپوروسیسټونه موجود وي چې هر یو سپوروسیسټ په ځان کې دوه دانې سپوروزویټونه لري. په دغه وخت کې اوسیسټ مصابوونکی دی.

ددې ګروپ پورې مربوط ځینې پرازیتونه لکه *Toxoplasma gondii* چې اخرنی کوربه یې پیشو ده او *Oocyst* خارجوي. دغه اوسیسټ نورې پیشیانې او منځني کوربه لکه مورک، انسان او نور مصابوي ددې ګروپ یوه خاصه داده چې د مور د پلاستنا له لارې په رحم کې کوچني ته انتقالیدای شي. د کوچني دا مصابیدل د مور د امیندواری یا حاملګۍ په اخري دریمه برخه کې صورت نیسي. دا پرازیت د انسان لمفوي سیستم او همدارنگه زړه، ځگر او توري یا طحال ته ضرر رسوي. په دې ګروپ کې منځنی کوربه د *fakultativ* حیثیت لري یعنې د پرازیت د تکثر لپاره حتمي ندی. په اروپا کې امیندواری بنځې ددې مریضۍ له امله تست کیږي. که څوک دا مریضی یو وار تیره کړي د بیا مریضیدو په مقابل کې معافیت حاصلوي.

ځینې نور ګروپونه شته چې د کوربه تبدیلول پکې حتمي یعنې *obligat* دي لکه *Sarcocystis* د مثال په ډول *Sarcocystis suihominis* چې منځنی کوربه یې څوګ او اخري کوربه یې انسان دی چې د انسان د غایطه موادو له لارې *Sporocyst* خارج او څوګ پرې مصابېږي.



بیولسم شکل د *Sarcocystis suis hominis* د ژوند دوران.

1- په سپوروسیسټ کې موجود سپوروزیټ د خولې لخوا اخیستل کیږي

2- د شایزونت دوه نسلونه د رگونو په اندوتیل کې په ډیر تعداد یعنی د پنځوس تر نوي پورې میروزویټونه جوړوي

3- میروزویټ، 4- په خاصو حجراتو لکه د عضلې او دماغ په حجراتو کې د سیستونو جوړول، 5- د اخري کوربه په کولمو کې د سیستونو میروزویټونه آزادېږي. کله چې اخري کوربه مصاب شوې غوښه و خوري

a6- د کولمو په داخل کې ماکروگمونت ، b6- میکروگمونت ، a7- ماکروگمیت ، b7- قمچین لرونکی ماکروگمیت ، 8- د کوربه په حجره کې موجود زایگوت ، 9- 11 د سپورجوریدل یا Sporulation د کولمو په حجراتو کې ، 11- مصاب کونکی سپوروسیست چې څلور سپوروزویټونه لري ، K- هسته

## لاندي اردر هیمو سپورینا Suborder: Haemosporina

ددې گروپ ټول پرازیتونه دوه کوربه ای ژوند لري چې فقاریه حیوانات د منځني کوربه په حیث د غیر جنسي تکثر لپاره او وینې څښونکي حشرات د جنسي تکثر او انتقالونکي په حیث خپل رول اجرا کوي. په دې گروپ کې پرازیت د کوربه د وجود څخه نه خارجېږي، بلکې د انتقالکونکي د خولو د جوړښتونو او چیچلو له لارې د دوه کوربه او په منځ کې یو او بل ته انتقالیږي. د Oocyst په ځای دلته Ookinete یعنې د زایگوت متحرک شکل د حشرې د کولمو د حجروي پردې حجراتو ته ننوزي چې هلته تکثر کوي او بې له دې چې په سپوروسیست بدل شي مستقیما د زیاتو سپوروزویټونو د منځ ته راتللو وروسته د حشرې د هیمولف له لارې د حشراتو د لارو یا لعابیه غدواتو ته داخل او د چیچلو په وخت کې د حشرې د لارو د تزریق سره یو ځای فقاریه حیوان ته داخلېږي. د مصاب شوي انسان څخه بیا د وینې اخستلو په وخت کې بیرته د ماشي وجود ته داخلېږي.

## Fam : Leucocytozoidae فامیلی لیوکوسیتوزویدا

ددې گروپ پرازیتونه د مرغانو په انساجو کې ژوند کوي او د Gnitzen د ماشو پواسطه انتقالیږي.

## Fam : Haemoproteidae فامیلي هیموپروتیدای

ددې ګروپ زیات کوربه مرغان تشکیلوي خو ددې په خوا کې ځینې يې تي لرونکو حیوانات او رپټیلیا کې هم مصابوي. خو انسان ددې څخه مستثنا دی. دا ګروپ د راتلونکي ګروپ یعنی Plasmodiidae څخه دوه فرقه لري:

اول: یوازې ګمونونه يې سره کرویيات مصابوي شیزوګوني یوازې د اندوتیل په حجراتو کې صورت نیسي.


دوهم: انتقال کونکي يې هغه ماشي ندي چې د Culicidae د کورنۍ پورې اړه لري.

## Fam : Plasmodiidae فامیلي پلازمودیدای

### جنس پلازمودیم: Plasmodium

دغه جنس یعنی Plasmodium د طبي لحاظه ډیر مهم دی. دا ځکه چې د ملاریا د مریضۍ عامل دی. دا مریضی په نورو تي لونکو حیواناتو همدارنگه په مرغانو ، څښونکو او امفیبیا کې هم منع ته راځي خو د مریضۍ شدت يې کم وي. ددې مریضۍ عوامل د منځنیو پیړیو څخه مشهور دي چې د جبه زارو ځمکو د خرابې هوا یعنی mala- aria نوم یی ورته ورکړی وو. بې له دې چې څوک ددوي په تکثري دوران وپوهیږي داسې عقیده وه چې د جبه زارو ځمکو په خوا کې د خرابې هوا څخه دغه مریضی پیدا کیږي. ددې مریضۍ انتقالونکې د انافیل Anopheles ماشی دی. دتکثر دوران يې یوازې په یوه کوربه کې صورت نیسي او د هغې پورې ټینګ تړلی دی. ددې پرازیت انکشاف یا نمو چې د میروزویت په شکل د وینې په سرو کرویياتو کې تر دوه مایکرونو پورې لوییدلای شي. د سپروزوا په اختصاصي شکل په درې مرحلو کې

صورت نیسي. یعنی شیزوگوني، گموگوني او سپوروگوني. د انافیل مونث ماشی د وینو څښلو په وخت کې د لیاړو له لارې تر شلو پورې سپوروزیټونه تزریقوي. دا سپوروزیټونه د وینې د جریان له لارې تقریبا په نیمه دقیقه کې د ځیگر په حجراتو کې ننوزي چې هلته د حجرې په داخل کې د شایزونت شکل ته تغییر کوي. چې تقریبا تر یو ملي متر قطر لري. دغه شایزونتونه په فالسیپاروم *Pl. falciparum* کې تر څلویښت زرو میروزویټونه جوړوي. چې د شپږو تر نهه ورځو پورې د وینې سره کرویات مصابوي. په *Pl. ovale* او *Pl. vivax* کې سپوروزیټونه او یا میروزویټونه د ځیگر په حجراتو کې تر څو نسلونو ژوند کوي چې د *Dormozoiten* یا *Hypnozoiten* په نامه یادېږي او کیدای شي دخو کالو وروسته د ملاریا د مریضۍ سبب وگرزي. همدارنگه د *Pl. malaria* داسې واقعات تر دیرشو کالو وروسته پورې هم خبر ورکړل شويدي. چې په دې صورت کې د وینې د سرو کرویاتو لږ تعداد مصابېږي. د ځیگر د پرائشیم حجراتو څخه د میروزویټونو د وتلو او د وینو حجراتو ته د ننوتلو سره د *prae* یا *exoerythrocytaere* یعنی د وینې د باندې مرحله خلاصېږي. په سرو کرویاتو کې میروزویټونه په شایزونت تبدیلېږي چې شایزونت بیا د نوع مربوط یو تعداد میروزویټونه جوړوي او د وینې سره کرویات مصابوي. کله چې د وینې سره کرویات چوي د هیموگلوبین پاته شوې برخه د یو رنگ یا پگمنت په شکل ترې خارجېږي. د ملاریا تبه په اول کې نه محسوسېږي خو کله چې د میروزویټونو تعداد زیات او په یو وخت یعنی *Synchron* ډول ډیر کرویات چوي تبه منځ ته راځي.



دولسم شکل: د پلازموډيم فالسيپاروم د ژوند دوران

1- د 2 د انافيل ماشي مونث جنس د وينو څښلو په وخت کې سپوروزويتونه د وينې کوچني رگونو ته داخلوي چې دوي بيا په دیرشو تانيو کې ځان د ځگرد پرانثسيم حجراتو ته رسوي.

3 - په دې حجراتو کې په زرگونو ميروزويتونه توليد يږي چې دې مرحلې ته Exoerythrocytäre

Schizogonie یا د وینو د سر و کرویاتو څخه بهر شیزوگوني وایي. حجرات بالاخره چوي او میروزویتونه په وینه کې ازادېږي.

4- 6 د میروزویتونه د وینو سره کرویاتو ته ننوزي او په شایزوتنو تبدیلېږي چې هغوي بیا په خپل وار میروزویتونه جوړوي کله چې د وینې سره کره چوي میروزویتونه نور کرویات مصابوي. هغه سره کرویات چې شایزوت لري، ترومب جوړوي چې دا ترومب د کوچنیو رگونو خصوصاً په مغز کې د بندیدو سبب ګزي د توکسین او انټي جن د خارجیدو په نتیجه کې تبه منځ ته راځي.


7- 8 ځینې میروزویتونه په کیله شکلو مذكر او مونثو ګمونونو بدلېږي چې علت یې تراوسه معلوم نه دی (a-b) چې د ماشي د بیا وینې اخیستو په نتیجه کې د ماشي کولمو ته رسېږي.

9- د ماشي په کولمو کې د یو مکروګمونت څه یو مکروګمیت او د یو میکروګمونت څخه د څلورو تر اته اوږد ډولي میکروګمیتونه پیدا کېږي.

10 - 12 ګمیتونه یو دایروي زاښکوت د الفاح په نتیجه کې منځ ته راوړي چې دغه زاښکوت په Ookinete اووکنیت چې اوږد شکل لري بدلېږي. دغه اووکنیت د کولمو د اپیتیل حجراتو داخل خواته نموکوي او د مایوزې Meiose د عملي په نتیجه کې تکثر کوي.

13 - 16 د دغه هستوي مایوزې په نتیجه کې وینبته ډولي سپوروزویتونه منځ ته راځي چې د اووسیسټ د چاودلو په نتیجه کې د وجود د خالیګا له لارې د ماشي د لارو غدواتو یا لعابیه غدواتو ته رسېږي. دلته ددوي په وجود یو سطحی پوښ یا Surface coat تشکیلېږي چې د انسان په وجود کې د داخليدو په وخت کې له منځه ولاړنه شي کله چې ماشي انسان وچيچي دغه سپوروزویتونه انسان ته داخليږي.

د وینو سره کرویات E، پوستکي یا اپیدرمس H، هسته N، د کوربه حیوان هسته NH، پرازیتي واکيولونه PV، د وینو د سره کرویاتو پاتي شونکي R.



دیار لسم شکل: د پلازموڈیم ویواکس د ژوند دوران

د شکل پاسنی برخه د ملاریا په ماشی او لاندینی برخه په انسان کی د ملاریا د پرازیت وده نیایی د شکل څخه لاندې په یو گراف کې د ملاریا تبه د هغې د نوبتې خاصیت سره لیدل کیږي چه پکې په هر ودریو ورځو کې یو وار تبه راځي



دغه تبه چې د نوبتي تبه په نامه هم ياديږي د ملاريا د نوع پورې مربوطه ده چې *Malaria tertiana* چې عامل يې *Pl.vivax* *Pl.ovale* دي په هر اته څلويښتو ساعتو کې يعنې يوه ورځ پس په *Malaria quartana* کې چې د *Pl.malaria* پواسطه منځ ته راځي په دوه اويا ساعتونو يعنې په هرو دريو ورځو کې تبه منځ ته راځي. په *Malaria tropica* کې چې د مريضۍ عامل يې *Pl.falciparum* دې حالت بل رنگ دې چې د اته څلويښت ساعتو تبه په خوا کې په غير منظم ډول ډيره سخته تبه منځ ته راځي چې ددې خطرناکې مريضۍ تشخيص مشکلوې او اکثرا غلط تداوي کيږي. همدارنگه مختلط مصابونه د غير منظمو تبه او غلط تشخيص سبب کيداې شي چې عواقب يې خطرناک دي. د ترکي هيواد ماشومان چې د جرمني څخه خپل هيواد ته ددوبي درختيو لپاره ځي که په *Pl.vivax* مصاب شي مستقيما نه مريضېږي، بلکه په راتلونکي پسرلي کې پکې د مريضۍ علايم ښکاره کيږي چې د مريضۍ ددې وروسته کيدو علت معلوم نه دی.

د ميروزويتونو پواسطه د وينو د سرو کروياتو د مصابيدو څخه تر پنځه اکثرا د لس يا دولسو ورځو وروسته ځينې ميروزويتونه په مذكر يعنې نارينه او ځينې په مونثو يعنې ښځينه گمونتنو بدليږي. کله چې ماشي وينه وڅښي دا گمونتنه د ماشي په کولمو کې له خو دقيقو وروسته په گميتو بدليږي. په داسې حال کې چې مونث گميت نه تقسيمېږي د مذكر گميت څخه د څلورو تر اتو پورې فنر شکلي گميتونه جوړېږي. دا گميتونه بيا په خپل وار د يو مونث گميت يعنې ماکروگميت سره يو ځای او د اووکينيت *Ookinete* په شکل زايگوت منځ ته راوړي. دغه اووکينيت *Pellicola* پيليکولا يا يوقشر لري چې ددريو پردو څخه جوړ دی او همدارنگه متحرک دی. چې د ماشي د *Peritrophische Membran* له ليارې د ماشي د کولمو د اپيتيل حجراتو ته ننوزي چې د حجرې د سايتوپلازما څخه تير او د قاعدوي پردې يعنې *Basalmembran* په منځ کې ځای نيسي. ديو کروموزومي تنقيص يا *Meiose* وروسته هسته بيا د يو اندو مايوزي


Endomeiose پواسطه په څو هستو تقسیمیري چې ټولې هستې د یو دیوال پواسطه احاطه شوې وي او د Oocyst او سیست په نامه یادیري. ددې او سیست په منځ کې زیات سپوروزیتونه منځ ته راځي چې د ماشي د هیمولف له لیاري لعابیه حجراتو ته رسیږي. د ماشي د وینو څښلو سره د سپوروزیتونو انتقال انسان ته صورت نیسي او د ملاریا د پرازیت د ژوند دوران له سره شروع کیږي.

نوي تحقیقات ښایي چې دا دوران یوازې د زایگوت څخه په غیر نور ټول په هیلوید haploid شکل صورت نیسي. چې د کروموزونو تعداد ټي په ټولو څیرل شوو انواعو کې څوارلس دي خو د کروموزونو لویوالي یو له بل څخه فرق لري. همدارنگه د هستې د باندې په سایتو پلازم او میتاکاندریا کې هم کروموزومونه موجود دي.

د سرو کرویاتو حجروي ممبران د میروزیتونو دد اخلیدو څخه وروسته داخل خوا ته یو کوډوالی یا انحنای پیدا کوي. میروزیت دیو واکبول په منځ کې ځای نیسي. سرو کرویاتو ته د داخلیدو په پروسه کې همیشه د پرازیت مخکنی برخه اول داخلیري چې دا برخه لږ څه پنډه او کلکه ده. د حجراتو د تماس لپاره پروتینونه او بعضي انزایمونه رول لري چې د پرازیت د داخل څخه د وجود خارجي برخې ته افزایږي چې ډیر اختصاصي دي. شاید همدا علت وي چې Pl.vivax او Pl.ovale یوازې ځوان سره کرویات Pl.malaria یوازې زاړه په داسې حال کې چې Pl.falciparum هر نوع سره کرویات تر حملې لاندې نیسي. چې ددوي پوسطه پنځوس په سلو کې کرویات په عین وخت کې مصابیدای شي خو په پلازموديو ویوکس او پلازمودیم اوالې کې د مصاب شوو حجراتو شمیره د دوه څخه تر پنځه پر سلو کی رسیږي.

د داخلیدو وروسته د پرازیت پروتینونه د کرویاتو په خارجي پرده کې ځای نیسي. چې په دې ډول مصاب شوي کرویات د انتی جن حیثیت نیسي او د کرویاتو په جوړښت کې اساسي بدلون راځي لکه د واکبولونو پیداکیدل او نور چې دا تغییرات په

مایکروسکوبی معایناتو کې د پرازیت د تعیینولو لپاره خاص اهمیت لري. چې په لاندی شکل کې به ولیدل شی:



څوارلسم شکل: د درې نوع ملاریا عامل د وینې په سلایده کې:

د a څخه تر آپورې Plasmodium vivax چې د شایزونت ځوان شکل د وینې په سره کره کې b لږ څه پنځه مرحله c زړه مرحله چې امیبې شکل او لوی خالیگا لري. d ځوان شایزونت د جوړیدو په حال کې e

شایزونت مخکې له دې چه په میروزویتونو باندې تجزیه شي. f په میروزویتونو تجزیه کېدل په منځ کي باقي جوړښت په تور رنگ لیدل کیږي. g میکروگمونت Makrogamont, میکروگمونت h یا Mikrogamont قمچین لرونکې شکل اد میکروگمیت تولیدیدل ښایي.

د ټکر n پورې Plasmodium falciparum ښایي k کوچني داږوي شکل چې دوه پرازیته پکې لیدل کیږي الره پخه مرحله ښایي m Makrogamont او n Mikrogamont

د ټخه تر ټ پورې د Plasmodium malaria د ودې مرحلې دي. ټ شایزونت د ودې په حالت کې دی چې دوه هستې او اوږد شکل لري. p پوخ شایزونت، q Makrogamont او r Mikrogamont ښایي

په نوو تحقیقاتو کې ثابت شویده چی د Pl.falciparum پرازیت د وینو سره کرویات دې ته اړ باسي چې خپل ممبران د خارج خواته کوږ کړي چې دا کوږوالې د انټي جني موادو د ترسب په نتیجه کې منځ ته راځي. د مصاب شوو کرویاتو ممبران خپل الاستیکیت له لاسه ورکوي او د نورو سرو کرویاتو سره یو ځای کیږي او غونډاري جوړوي چې د رگونو د دیوال سره نښلي او دا پروسه بیا د ترومبوزې Thrombose یعنی دوینې د لخته یا پرندکیدو او د وړو رگونو د بندیدو سبب گرځي. ددې په نتیجه کې مغز او نورو اعضاو ته وینه نه رسیږي چې بالاخره مریض د کوما حالت ته ځي او په ډیر لږ وخت کې مریض ددې مغزي ملاریا یعنی Cerebral malaria له امله مړ کیږي. په دې مرحله کې یوازې دوینی ترمب یعنی لخته یا پرندشوې وینه لیدل کیږي. شایزونتونه په دې مرحله کې په وینه کې ډیر کم وي او پیدا کول ئې مشکل دي.

تغذیه: پرازیتونه په مختلفو مرحلو کې د کوربه د سائیتوپلازما څخه استفاده کوي. گلوکوز د حجراتو څخه اخلي تنفس ئې په Anaerob یعنی بې له اکسیجنه یعنی د تحمض په شکل صورت نیسي. پرازیت د خپل ضرورت وړ پروتین د هیموگلوبین څخه لاس ته راوړي.

د انسان مصابيدل د ملاريا پواسطه په ټولو انسانانو کې په يو شکل نه دي بلکه بعضې جنيتنکي فکتورونه چې د تکامل په جريان کې په مختلفو انساني نژادو کې منع ته راغلې دي. د ملاريا د مصاب کيدو لپاره خنډ واقع کېږي. په غربي افريقا کې دخالص نژادي خلکو په سرو کروياتو کې بعضې فکتورونه موجود دي چې هغوي د پلازموډيم ويواکس په مقابل کې مقاوم کړي دي. مگر د پلازموډيم اووالې او پلازموډيم فالسيپارم پواسطه مصابيداي شي.

په Sichelzellanämie چې يو نوعه کم خوني ده اخته کسان د پلازموډيم فالسيپارم په مقابل کې مقاوم دي.

په Thalassämie اخته کسانو سره کرويات په پلازموډيم مصابېږي خو نمو پکې نشي کولای. همدارنگه د گلوکوز شپږ فسفات ديهايډرو جينيز چې دقندونود ميتابوليزم يو مهم انزيم دی کمبود تقريباً سل مليونه خلک د پلازموډيم فالسيپارم د ملاريا څخه ساتي. د دې انزيم کمبود خصوصاً د مديتراني په منطقه کې زيات ليدل کېږي.

تداوي: د کلوروکوئين Chloroquin پواسطه د مريضۍ تداوي اووقايه په اکثره حالاتو کې ممکنه ده. چې د شيزوگوني مخنيوی کوي خو د مصاب کيدو جلوگیری نه کوي. په اخرو کلونو کې په اسيا، جنوبي او مرکزي امريکا او غربي او شرقي افريقا کې د کلوروکوئين په مقابل کې مقاوم يا ريسيسنتت پرازيتونه پيدا شويدي..

مفلوکوئين Mefoquin يا Lariam ددې مقاومو پرازيتونو په مقابل کې اغيزه کوي خو د پرازيتونو نوي گروپونه پيدا شوي چې ددې دوا په مقابل کې هم مقاومت کوي.

ارتيميسينين Artemisinin يا Qinghaosu او Halofantrine يا Halofan د پلازموديم فالسيپارم د مقاومو گروپو په مقابل کې استعماليدای شي. تر اوسه هم يوه داسې دوا چې جانبي عوارض ئې کم او يا د انسان د مصاب کيدو مخنيوی وکړي، نه ده پيدا شوې. د اویا کالو را هيسې د يو واکسين په جوړولو کار کيږي. خو تر اوسه ئې د قناعت وړ نتيجه نه ده ورکړې. د ملاريا په دوران کې مختلف انتي جن توليديري چې کيدا شي د وجود انتي بادي فعاله کړي او په دې بنياد يو واکسين منخ ته را شي خو څرنگه چې پلازموديمونه خپله انتي جن بدلوي نو له دې امله د واکسين جوړول مشکل دي.

په 1993 عيسوي کال کې يو کولمبياي عالم چې Patarroyo نومېږي يو مصنوعي واکسين جوړ کړ چې څلويښت په سلو کې انسانانو ته ئې په جنوبي امريکا کې معافيت ورکړ، خو په اسيا او افريقا کې يوازې لس په سلو کې انسانانو ته فايده وکړه، اوس په دې کار کيږي چې د مختلفو معافيوي موادو يو مخلوط جوړ او د واکسين په شکل ترې استفاده وشي. په اخره کې د داسې يو واکسين خبر ورکړل شوې چې په انسان تطبيقېږي او د انسان په وينه کې د ماشي د يو پروتين په مقابل کې انتي بادي جوړېږي. په دې معنی چې که ماشي يو انسان چې واکسين يې کړې وي، وچيچي نو د ملاريا عامل په ماشي کې نمو نشي کولای. خو واکسين شوې انسان د ملاريا په تبه اخته کيداې شي. نوکه د ملاريا په يوه منطقه کې ټول انسانان واکسين شي نو پلازموديم له منځه ځي او نمو نشي کولای. په ملاريا مصاب شوي انسانان بايد تداوي شي.

همدارنگه د ايدس او ملاريا عوامل د يو بل د تقويي سبب گزری يعنی په دی معنی چې په ملاريا اخته مريضانو کې د ايدس ناروغی زړ وده کوی او برعکس.

د ملاريا جلوگيري او وقایه: څرنگه چې د ملاريا په مريضی کې انسان او د انافيل ماشی دواړه داخل دي او دژوند يو معلق دوران لري نو مختلفو ټکو ته پاملرنه پکار ده:

- ◀ د مصابو انسانانو تداوي تر څو روغو انسانانو ته د ماشي پواسطه مريضې انتقال نشي.
- ◀ د ملاريا د ماشي مدافعه ، چې د دې لپاره په لاندې برخو کې توجه پکار ده:
- ◀ د ماشي په مقابل کې د کيمياوي موادو استعمال يعنې دوا شيندنه
- ◀ د ماشي د لارو له منځه وړل د ډنډونو وچول، د گامبوزا ماهيانو پواسطه د لارو خوړل او له منځه وړل
- ◀ د جاليو پواسطه د ماشي چيچلو څخه ځان ساتنه
- ◀ بيالوژيکي مدافعه د خنډې يا خسي شوو نرو ماشو خوشی کول تر څو د القاح عمليه واقع نه شي او د ماشو د توليد څخه مخنيوی وشي.

## فایلم مایکروسپورا Phylum : Microspora

ددې گروپ انتقال د سپورونو پواسطه صورت نیسي. دا د حجرې د داخل یعنی Intracellular اجباري یعنی Obligat پرازیتونه دي. چې په بې شمزۍ یا غیر فقاریه حیواناتو، ماهیانو او حتی انسانانو کې پیدا کیږي.

ددوي سپورونه ئې د غایطه موادو سره خارج او د بل کوربه پواسطه د خولې له ليارې اخیستل کیږي چې د کولموخه د نا معلومو ليارو نه نورو انساجو ته رسیږي، په داسې ډول چې د حجرې سره د تماس په وخت کې یو نل شکلی جوړښت د خارج خوا ته غزیږي، حجره سورۍ کوي او ددې ليارې د سپور داخلي مواد د کوربه جراتو ته داخلېږي.

ددې گروپ بعضې نمایندگان چې د اقتصادي خساراتو سبب گرځي:

دورینسمود چنجي پرازیت *Nosema bombycis* Naegeli 1857: دا پرازیت یوازې د ورینسمو چنجي مختلف انساج مصابوي. ددريو او اتو ورځو په منځ کې ترې د کوربه ټول وجود ډکېږي چې په وجود ئې تور ټکي پیدا او چنجی تور رنگ پیدا کوي. دا پرازیت کیدای شي چې په *Transverieill* شکل د هگیو له ليارې نوي نسل ته انتقال شي.

دشاتومچيو پرازیت *Nosema apis* Zander 1909: دا پرازیت یوازې د شاتو مچۍ یا *Apis mellifera* د منځنو کولمو په جراتو کې ژوند کوي. په اول کې بې ضرره وي، خو په خرابو اقلیمي شرایطو او یا د غذا د کمښت له امله د پرازیت او کوربه روابط د کوربه په ضرر تمام او د یوې سختې مریضۍ سبب گرځي. سپورونه د حیوان د کود له ليارې خارجېږي.



د Encephalitozoon جنس مختلفې انواع د انسان د سترګې په قرنيه ، پزه ، پختورګو ، سرو ، کلمو ، زړه ، ځيګر او دماغ کې پيدا کيږي چې د اپرتونست يعنې موقع شناس پرازيت په حيث په هغه انسانانو کې چې معافيت ئې ضعيف وي لکه د AIDS د مريضانو د مرګ سبب ګرځي.

### فایلم میکسوزوا: Phylum : Myxozoa

ددې ګروپ مربوط ټول انواع پرازيتي ژوند لري چې دداسې سپورونو پواسطه انتقالیږي او تکثر کوي چې هغوي په خپل وار د څو حجروي اجدادو يعنې نيکونو څخه منځ ته راځي. سپور ئې ددوه نلونو لرونکی دی، چې هريو ئې د يو تاو شوي قمچين ډولي جوړښت سره چې په يو کپسول کې موقعيت لري، ارتباط لري. تکثر يا نمو ئې د غضروف او نورو منضمو انساجو په منځ کې صورت نیسي. ددوي تقريبا ديارلس سوه پنځوس انواع چې اکثرا په ماهيانو کې پيدا کيږي او لوی اقتصادي تاوانونه رسوي. دوي د ماهيانو د لامبو پوکنې او پختورګي مبتلا کوي او د چورلکي د مريضۍ سبب ګرځي. چې ماهيان د اوبو په سر څرخيږي. ددې پرازيتونو يوه مشخصه داده چې د سپور په مرحله کې څو حجروي دي چې بعضي دوي د څو حجروي حيواناتو په قطار کې راولي. او عقیده لري چې د پرازيتي ژوند له امله ئې داسې تغييرات تحمل کړيدي. داسې فکر کيږي چې دوي د سيلنتراتا Coelentrata د فایلم سره اړیکې لري. ځکه چې په دې فایلم کې هم دغسې تاو شوي قمچينونه چې د Nessel حجرات نومیږي موجود دي چې د حيوان د مدافعي او د ښکار شوي حيوان د بيهوش کولو او ټينګ نیولو د پاره استعمالیږي.

## فایلم سیلیاتا: Phylum : Ciliata

ددې گروپ مشخصه د وجود په خارجي برخه د برسونو یعنی Cilia او ددوه مختلفو هستو یعنی لوی هستې Macronucleus او کوچنۍ هستې Micronucleus درلودل دي. دا حیوانات اکثرا ازاد ژوند لري. دانسان لپاره یوازې Balantidium Coli چې په کومنزال شکل د خوگ په غټو کولمو کې ژوند کوي مهم دی بزگران او قصابان کیدای شي په هغو مناطقو کې چې د خوگ غوښه خوړل کېږي ددې پرازیت پواسطه مصاب شي. ددې پرازیت تکثر د غرضي تقسیم له لپارې په غیر جنسي ډول او انتقال ئې د سیستونو پواسطه چې په غایطه موادو کې موجود دي، صورت نیسي. په دې پرازیت مصاب شوي انسانان د ثانوي انفکشن پواسطه چې سبب ئې بکتريا دي. په نس ناسته اخته کېږي. خصوصاً د AIDS د مریضانو لپاره چې ضعیف معافیوي سیستم لري ډیر خطرناک دي.

نور انواع ئې په ماهیانو کې چې داوبو حرارت ئې غیر مناسب وي او په تنگ ځای کې په ډیر تعداد اوسېږي لکه د ماهیانو په فارمونو کې د ډیرو خساراتو سبب گرځي. ددې پرازیتونو تکثر ډیر په سرعت صورت نیسي. چې کولای شي د دوه ورځو په جریان کې د ماهیانو ډیر تعداد مصاب کړي او د ماهیانو فارمونه بیخي له منځه یوسي.



## دوهم فصل

### چنجيان: Hilminthes

په دوي کې هغه پرازيتي گروپونه شامل دي چې د چنجي په شان ظاهري شکل لري. خو داخلي جوړښت او د کيمياوي موادو په مقابل کې عکس العمل ئې بيخي مختلف دی. ددوي فرق د يو حجروي پرازيتونو څخه په دې کې دی چې په اکثرو انواعو کې په اخري کوربه کې نه بلکه په منځني کوربه کې تکثر کوي. په اخري کوربه کې همدومره پرازيتونه ژوند کوي په کوم تعداد لارو چې وجود ته داخل شوي وي يعنې يوازې هگي. پکې اچوي. په داسې حال کې چې په منځني کوربه کې ډير زيات تکثر صورت نيسي. مثلاً په تريما تودا کې.

د چنجيانو څخه د پيدا شوو مریضيو د تداوی په برخه کې په اخرو کلونو کې ډير پرمختگونه منع ته راغلي. داسې دواگانې جوړې شوي چې جانبي تاثيرات ئې کم دي. خو بياهم ددې دواگانو په مقابل کې معاقبت پيدا شويدي چې نوو دواگانو ته ضرورت دې. داسې هم ليدل شويدي چې په چنجيانو کې ددوا په مقابل کې دا معافيت د يو څه وخت لپاره دوا دنه استعمال په نتيجه کې په طبيعي ډول له منځه ځي. مهمه داده چې ډيره او دوامداره تداوي چې ډيره ضرور نه وي ونه کارول شي. يعنې تشخيص، ددوا اندازه او ددوا استعمال وخت هميشه په نظر کې ونيول شي.

## هوار يا پلن چنځيان Phylum : Plathelminthes

ددې چنځيانو يو مشترک جوړښتي خاصيت دادی چې په بالغ حالت کې د پاس او لاندي له خوا يعني dorsoventral پلن شوی دي. له دې امله خصوصا په بې کولمو انواعو کې د غذايي موادو د ترانسپورت لياره لنډه شويده. وجود ئې يوه لومړنۍ خاليگاه لري. دا خاليگاه چې د اکتودرم او انتودرم په منځ کې موقعيت لري د پرائشيم Parenchym د حجراتو نه ډکه ده. له دې امله دغه گروپ د acoelomatic يعني د اصلي خاليگاه نه لرونکي يا Parenchymia په نوم هم ياديږي. ددې گروپ کولمې ډيرې خانگې لری، چې دا هم د غذايي موادو انتقال د وجود نورو غړو ته اسانوي. کولمې کوم مقعد نه لري. ددې گروپ ټول غړي د خارج له خوا د يو نوع پوست پواسطه چې Tegument يعني تيگومنت نومېږي احاطه شويدي. د تيگومنت د حجراتو په منځ کې کومه پرده نه شته يعني د Syncytium يعني سينسيسيم شکل لري. د سينسيسيم حجرات په پرائشيم کې واقع او د تيگومنت سره د نلونو پواسطه په تماس کې دي. تيگومنت چې يو ژوندي قشر دی ميتاکاندریا لري او کيمياوي تعاملات پکې صورت نيسي له دې امله پلن چنځيان پوستکی نه اچوي خو د وچوالي په مقابل کې ډير حساس دي او هميشه يو مرطوب محيط ته ضرورت لري. د تيگومنت جوړونکي حجرات شايد ميزودرمي منبع ولري. د دی گروپ ازاد لامبووهونکی لارو د يو حجروي اپيدرمس پواسطه چې برسونه يا سلليا لري احاطه شوېدی. لارو بالغ حيوان ته د نمو په دوران کې دغه سليلارونکی اپيدرمس غورزوي او بو تيگومنت و منځ ته راوړي. چې دا تيگومنت بيا په مختلفو گروپونو کې يو له بله فرق لري. د تيگومنت لاندي طولي، عرضي او د شا څخه د بطن خوا ته يعني dorsoventral اوږد شوي عضلات قرار لري چې ددوي پواسطه چنځی هر نوع حرکات اجرا کولای شي.

اطراحیه ارگان د پروتینیفرید Protonephridium په شکل وجود لري چې د Cryptocyten په نامه هم یادېږي.

د عصبي سیستم په حیث په پرازیتي گروپونو کې اوږده طولی تارونه موجود دي چې د وجود په پاسنۍ برخه کې د عصبي عقدو یو تراکم موجود دی چې عرضي رابطې هم پکې لیدل کېږي. نور حسي ارگانونه په بالغو داخلي پرازیتونو کې له منځه تللي دي (ضرورت هم ورته نلري).

له لږو استثناو پرته پلن پنجیان نر بنځي یعنی Zwitter یا Hermaphrodit دي. یعنې هر حیوان ئې هم نارینه او هم بنځینه جنسي اعضا لري. چې د جنسي جوړښتونو ځانگړتیاوې د حیوان په طبقه بندۍ کې ډیر رول لري.

د حیوان وده یا انکشاف په ازادو گروپونو کې مستقیم مگر په پرازیتي گروپونو کې لکه د کدودانې پنجیان د کوربه تغییر صورت موندلای شي. چې بعضې ددوي لکه Digenea د کوربه د تغییر پخوا کې یو د نسل تغییر یا Generationwechsel هم اجرا کوي.

په ډیرو حیواني او انساني طبي کتابونو کې لاندې سیستماتیک یا طبقه بندي انتخاب شویده. سره له دې چې ددوي په منځ کې د تکاملي لحاظه یا د مدرنو الکترون مایکروسکوپي او مالکیولي بیالوژي د تحقیقاتو له مخې کومه خپلوي نه لیدله کېږي.

**:Phylum: Plathelminthes**

Klass: Turbellaria

Klass: Trematoda

Subklass: Aspidobothrea( Aspidogastrea(

Subklass: Monogenea

Subklass: Digenea

Klass: Cestoda

Subklass: Cestodaria

Subklass: Eucestoda

خړنگه چې د توربلاريا اکثرا ازاد ژوند لري د تشریح څخه ئې صرف نظر کوو.

## کلاس تریما تودا **Klass : Trematoda**

ددې گروپ مشخصه د یو تیگومنت درلودل او د مقعد نه لرونکي کولمو موجودیت دی. په دې گروپ کې Metamerie یعنی د مشابه جوړښتونو تکرار وجود نه لري. ددې کلاس ټول غړي پرازیتي ژوند لري. داگروپ د کوربه د وجود په داخلي او خارجي سطح باندې د ځان ټینګولو لپاره ټینګوونکي جوړښتونه لري چې دا جوړښتونه د طبقه بندۍ لپاره ډیر مهم دي.

### سب کلاس اسپیدو بوتريا **Subklass : Aspidobothrea**

په دې گروپ پورې لږ انواع مربوط دي چې مشخصه ئې د مېسلولو لپاره یو لوی جوړښت دې چې Opisthaptor یا Baers disc نومېږي. دې جوړښت د پرازیت تقریبا ټوله بطني برخه نیولې ده. چې چنگکونه نه لري. دا گروپ اکثرا یوازې په Poikilotherm یا غیرثابت حرارت لرونکو حیواناتو کې چې په اوبو کې ژوند کوي د داخلي پرازیت په شکل ژوند کوي. خو همدارنگه د اکتوپرازیت او شاید اکتوکومنزال په شکل په حلزون او چنگانانو ژوند کولای شي. انکشاف ئې مستقیم او بې له نسلي تناوب څخه خو په بعضو انواعو کې ئې د لارونمو په مختلفو کوربه و تقسیمه وي.

### سب کلاس مونوگینیا **Subklass : Monogenea**

ددې گروپ مشخصه داده چې د کوربه د نسل تغییر پکې نشته. اکثرا اکتوپرازیت او Ovipaar یعنی هگی. اچونکي دي. خو بعضې ئې ژوندي بچیان تولیدوي. یعنی Vivipaar دي. اکثر مونوگینیا په اکتوپرازیتي شکل د پایکیلوترم

حيواناتو لکه ماهيانو، خزندگانو او امفیبیا یعنی ذومعیشتیانو په پوستکي او برانشي او په استثنای ډول د اندوپرازیټ په شکل د مثانی په کڅوړو او په مری کې هم پیدا کېږي. خو هیڅکله په کولمو کې نه پیدا کېږي. په کوربه د ځان منلولو لپاره د یو څخه تر ډېرو پورې د خولې د سوري راچاپیره رودونکي جوړښتونه یعنی جوشکونه د Prohaptor پروهپتر په نوم او په شانتی برخه کې یو لوی Opisthohaptor او پستوهپتر لري. چې ددې جوړښت په اساس د Mono Opisthocotylea او Poly Opisthocotylea کې فرق کېږي. لومړني گروپ د یو لوی غیر منظم رودونکي جوړښت لرونکی دې چې هغه په خپل وار د یو څخه تر ډېرو جوړو پورې لوی خنځکونه او ددولسو څخه تر شپاړلسو پورې اطرافي کوچني خنځکونه لري. په داسې حال کې چې د دوهم گروپ او پستوهپتر د یو تعداد رودونکو سورو څخه جوړ چې د هغې په خوا کې کیدای شي چې خنځکونه هم موجود وي. ددې حیواناتو نمویا Ontogenie مستقیمه ده. چې یو کوربه او په خپل تکثري دوران کې یوازې یوه د تکثر مرحله لري. د ډیرو مونوگینیا هگی پوښ لري چې بعضې ئې د ځان د کلکولو لپاره قمچین شکلي جوړښتونه لري. د هگیو څخه یو لارو پیدا کېږي چې د تولد په وخت کې د وجود په خارجي سطح سلیا او د سترگو جوړښتونه لري. چې دا لارو د Oncomiracidium په نامه یادېږي. په دې مرحله کې هم او پستوهپتر د هغې د خاص جوړښتونو سره لیدل کېږي. تر څلورویشت ساعتو پورې لارو خپل کوربه په اکتیف شکل یعنی د لامبو پواسطه پیدا کوي او یا له منځه ځي. د کوربه مصابیدل په دې ډول اسانېږي چې د پرازیټ د هگی اچولو په وخت او د کوربه د انکشاف په وران کې یو همغاړیتوب یعنی Synchronisation منځ ته راځي.

د مونوگینیا غذا د کوربه وینه یا د مخاطي غشا حجرات تشکیلوي. د بدن په مخکنۍ برخه کې یو رودونکی سوری لري. د هغې شاته حلقوم چې یو تش عضلاتي جوړښت دی د



هغه شاته کولمې ددوه اوږدو نلونو په ډول امتداد پیدا کوي.

مذکر تناسلي اله دیوې جوړې خصې یعنی Hoden ، د مني نل Ureter او د هغه په امتداد د یو دستکش ډوله جوړښت چې د خارج خوا ته قاتیډای شي او د Cirrus سیروس په نامه یادېږي جوړشوی دی. سیروس د Kopulation یعنی جنسي جوړه کیدو یو جوړښت دی. سیروس چې د ټولو پلن چنچیانو یو مشخصه جوړښت دی په عادي حالت کې په یوه خلطه کې پروت وي.

موث تناسلي جوړښت د یو تخمدان Ovarium چې دهگي نل Oviduct پواسطه د یو بل جوړښت سره چې Ootyp نومېږي او د هگیو د جوړېدو مرکز دی په تماس کې دی. مونوگینیا دوه Vagina یا فرج او یو کانال چې د Genito intestinal په نوم یادېږي هم لري. همدارنگه دیو جوړه د زیرو موادو جوړښتونه چې د Dotterstock په نوم یادېږي لرونکي دي.

## سوپراردرمونوپیستو کوتیلیا


### Ueberord : Monoopisthocotylea

ددې گروپ او پیستوهپتر Opisthaptor ساده او یوځایي جوړښت لري. دا گروپ Genito- intestinal Kanal نلري.

Familie : Gyrodactylidae فامیلی گیرو دک تیلی دای

جنس گیرو دک تیلوس 1832 Gyrodactylus Nordmann

ددې جنس غړي یو ملي متر اوږدوالي لري چې یوازې د یو کوربه پورې تړلي دي. د ماهي په پوستکي حرکت کوي او له دې لپارې د ماهي د پزې سورو ته داخلېږي. د نورو مونوگینیا په خلاف دوي Vivipaar دي یعنې ژوندي بچي اچوي. یو لارو چه پیدا کیږي په هغه کې له پخوا څخه دوهم، دریم او څلورم نسل موجود وي. چې دې عملیې ته Polyembrie یا امبریوني وائي. یعنې د حیوان په وجود کې لمړی نسل یا اولاد، دوهم نسل لمسی، دریم نسل کروسی، څلورم نسل کودی پروت وي. د Kopulation یا جنسي نږدی والي په وخت کې سپرماتوزوا د سیروس پواسطه په یو سوري کې داخلېږي دا سوری د وجود په یوه خاصه برخه کې د سیروس د خنجرک پواسطه منځ ته راځي. چې له دې لپارې بیا سپرماتوزوا ځان د پرانسیم له لپارې په Ootyp کې موجودو هگیو ته رسوي. چې هگی بیا رحم یعنې Uterus ته انتقالېږي. چې په لپاره او یا په اووتیپ کې القاح صورت نیسي. او د هگی پخوالی په رحم کې صورت نیسي. دا هگی په رحم کې ځان نښلوي او نمو کوي. کله چې لارو خارجېږي نو درې نسلونه په ځان کې لري چې په G.elegans کې یو جنسي تکثر د هگی او سپرم دیو ځای کیدو څخه او یو غیر جنسي تکثر یعنې دا اولاد او لمسي امبریو منځ ته راتلل د یو بل پسې په متناوب ډول منځ ته راځي.



پنخلم شکل: د *Aspidobothrea* / او دوو مونوگینیا یعنی *Gyrodactylus* / او *Polystomum*  
شیمایی شکل

کولمې *Darm*, خنچکې *Haken*, خوله *Mund*, او پستوهپتر *Opisthaptor*, حلق *Pharynx*,  
رودونکی جوړښت *Saugnapf*, رودونکی دسک *Saugzscheibe*

سو پرارد رپولی او پیستو کوتلیا: Ueberord Polyopisthocotylea

ددې گروه Opisthohaptor مغلق او د مختلفو برخو څخه تشکیل شوی دی. genitalo-intestinal Kanal یعنی جنسی او او د کولمو گډ کانال لري. هگی. اکثر قطبي تارونه لري.

فامیلی پولی ستوما تیدای Family : Polystomatidae

پولیستوموم انتیگریموم:

Polystomum integerrimum Fröhlich 1791, Rudolphi 1808:

دا پرازیت چې د پاسنی فامیلی یو مثال دی، د دوه لحاظه ډیر د دلچسپی وړ دی.


لومړی: پرازیت دا کتوپراتیزي څخه اندوپرازیتی ژوند شکل ته تغییر کړې دی.

دوهم: پرازیت نمود کوربه د هارمونو لخوا اداره کیږي.

پرازیت لس ملي متره اوږدوالی لري. دا پرازیت د څنگښو په مثانه کې د اندوپرازیت په شکل ژوند کوي. ددوي ژوند او نمود کوربه د جنسي هارمونو پورې تړلی دی. چې په نتیجه کې یو همغاریتوب یعنی Synchronisation منځ ته راځي چې د پرازیت د بقا لپاره ضرور دی ځکه چې څنگښې یوازې د هگی د اچولو لپاره او بو ته ځي چې یوازې دلته د پرازیت د راتلونکي نسل لپاره د یو کوربه د پیدا کولو احتمال شته. په پسرلي کې د پولیستوموم سرپوښ لرونکې هگی. د پرازیت لخوا په هغه وخت کې خوشې کیږي چې

څنگښې هم په اوبو کې هگۍ اچوي د څلورو تر شپږو هفتو وروسته ددې هگيو څخه Oncomeracidium لارو چې لامبو وهلاې شي، خارجيږي. په عين وخت کې د څنگښو له هگيو څخه Kaulquappe يعنې د څنگښو بچي چې لکۍ لري منع ته راځي. پرازيت د کوربه برانشي مصابوي. کله چې په دويمې کې د ميتامورفوزې په مرحله کې کوربه خپل برانشي له لاسه ورکوي په دې وخت کې پرازيتونه د حيوان په حلق کې پاتې او دبلع کولو يا قپ وهلو پواسطه د Kloake له ليارې مثانه مصاب کوي. جنسي بلوغ ته کوربه او پرازيت دواړه درې کاله وخت ضرورت لري په دې ډول په عين وخت کې د کوربه او پرازيت هگۍ اچول صورت نيسي. چې په دې ډول د مصابولو عمليه تکرارېږي. په عادي حالت کې پرازيتونه يو بل بلاروي خو که په مثانه کې پرازيت يوازې وي نو خپل ځاني القاح يا Self fertilization صورت نيسي. دپرازيت عمر په کوربه کې د پنځه تر شپږو کلونو پورې دوام کوي.

ددې نورمال دوران په خوا کې يو لنډ دوران هم ممکن دی چې انکوميراسيديم د Kaulquappe په خارجي برانشي ځان ونبڼلوي ددرې څلورو هفتو په جريان کې په بالغ پرازيت بدلېږي. چې جسامت يې کوچنی ددوه تر درې ملي مترو پورې وي او لږې هگۍ اچوي. کله چې هگۍ اوبو ته ورسېږي يو انکوميراسيديم ترې پيدا چې بيا دا د څنگښې د بچي داخلي برانشي مصابوي او خپل نورمال دوران ته دوام ورکوي. چې دغه لاروي بلوغت ته Neotenie هم وائي.



شپار لسم شکل: د *Polystomum integerrimum* د ژوند دوران:

- 1- د بالغې چنگښې په شانته کې بالغ چينجی
- 2- په پسرلي کې چينجی هگی اچوي چې پکې د *Oncomeracidium* لارو وده کوي او بيا د هگی تخخه وځي او په اوبو کې لامبو وهي د **a** تخخه تر **c** پورې
- 3- انکوميراسيديم د نمودو له لارې پرمخ بيولاې شي چې يا:
- 4- انکوميراسيديم د *Kaulquappe* يعنې د چنگښې د بچي په خارجي برانشيو نښلي چې ترې يو
- 5- کوچنې فورم د چينجی پيدا کيږي يعنې *Neoten* شکل چې هغه بيا

6- په يولبروخت کې خودانې هگۍ اچوي چې د هغوي څخه بيا

7- نور انکو میرا سید پیدا کيږي

او يا دا چې:

8- انکو میرا سید يم داخلي برانشيو ته ننوزي چې بيا ځوان پولیستوموم د چنگښې د میتامورفوزې سره سم د کلمو څخه د Kloake له لارې مشانې ته لار پیدا کوي چې د دوه څخه تر درې کلونو په موده کې بيا د چنگښې سره يو ځای بلوغت ته رسېږي

دسترگو تکی AU, سلیا CI, کولمې Da, خنجکي HK, اوپست هپتر OH, تخمدان OV, پروتونیفریدین


PR

د پیلوزون پرا دوکسوم

### Diplzoon paradoxum Nordmann 1832:

دا پرازیت د جوړه اي پرازیت په شکل ترخلورو ملي متره لویيږي چې د بعضې ماهیانو لکه کارپ په برانشي کې ژوند کوي چې دوه چنجي په یو غیر عادي ډول په خپل منځ کې د القاح عملیه تضمینوي. داسې چې کله او نکومیرا سیدیم لارو د هغه هگیو څخه چې په پسرلي کې د یو بالغ پرازیت څخه خوشې شوي وي د یو کوربه د برانشي په مصابولو موفق شي نو هلته خپل سلیا غورزوي او یوې بلې لاروي مرحلې ته چې دیپورپا Diporpa نومېږي، بدلیږي. په دې مرحله کې یو بطني Ventral رودونکي جوړښت Saugnaf او یو خلفي یعنی dorsal برامدگی یا راوتلی ځای Zapfen لري چې پرازیت په دې وخت کې یوازې یعنی solitär ژوند کوي. کله چې دغه لارو یو بل لارو پیدا کړي نو له یو بل سره یو ځای شي. په دې شکل چې د یو پرازیت بطني رودونکي جوړښت دبل پرازیت د برامدگی څخه راتاو شي. د تماس د ساحې خارجي انساج

له منځه ځي او يو له بل سره گډه نمو کوي. له دې وروسته دغه غبرگ پرازيت د کوربه د برانشي دوینې په خوړلو شروع کوي چې په نتيجه کې نمو کوي او جنسي حجرات منځ ته راوړي. دواړه پرازيتونه يو له بل سره په داسې شکل وصل وي چې ديو پرازيت د مني نل Vas defferens د بل پرازيت په Vagina يعنې فرج کې ختمیږي. او په دې ډول د ژوند تر اخره تقريبا پنځه کاله پاتې کیږي او په پسرلي کې بيا د هگيو توليد له سره شروع کوي.



اولسم شکل: د *Diplozoon paradoxum* د ژوند دوران

بالغ جینجی د ماهی په برانشي A, هگی د لارو سره B, د هگی څخه یو اونکو میرا سیدیم لارو خارجيږي C

دغه لارو په برانشي د نښتو وروسته په *Diporpa* لارو بدلیږي د دوو دیپوریا لارو یو ځای کیدل E, د



یوځای کیدو وروسته وینه/خلی او په تکثیر شروع کوي

سترگې AU, بطني رودونکی جورښت BS, سلیا CI, کولمې Darm, د کولمو جانبي جورښتونه DD, اوږد  
تار FI, خنجکونه HK, خوتپې یا خصیې HO, خوله Mund, اونکومیراسیدیم ON, اووتیپ OT,  
اوپستوهپترد رودونکي دسک سره OS, تخمدان OV; حلق Pharynx, پروتونیفریدیم PR, دشا خوانه  
وتلی جورښت RZ, رودونکی دسک SS, د رحم سوری U, ویتیلاریم یا زیرمواد VI

مونوگینیا د ماهیانو په فارمونو کې ډیر خسارات منځ ته راوړي. لکه د مارماهی د  
Pseudodactylogyrus برانشي پرازیت پسویدودکتیلوگیروس انگویلی  
anguilla د لامبو د کڅوړې د پرازیت سره یو ځای چې یو نوع نیماتودا دی او  
Anguillicola crassus نومېږي د مارماهی د فارمونو ماهیان په ډیر لږ وخت کې له  
منځه وړلای شي.

## سب کلاس دایگینیا Subclass : Digenea

ددې گروپ د نوم معنې دوه نسله ده. یعنې په خپله انتوگیني کې د نسل تناوب او د کوربه تغییر صورت نیسي. ددوي منځني کوربه اکثرا حلزونونه چې د ملسکا Molluska پورې اړه لري په یو مثال کې هم انیلیدا څخه عبارت دی. خو اړخنی کوربه ئی همیشه یو شمزی لرونکې یا فقاریه حیوان وي. څرنگه چې ددې گروپ تعداد ډیر زیات دی نو د تشخیص او طبقه بندی لپاره ئی په بالغو چنجیانو کې ددواړو رودونکو جوړښتونو شکل او موقعیت چې دهغوي څخه پاسنی ئی همیشه دخولې گردچاپیره واقع وي ، مهم رول لري چې ددې مشخصې په نظر کې نیولو سره لاندې بالغ شکلونه موجود دي:

لومړی: گستروستوم Gastrostom: چې کولمې ئی ساده دي، بوجی شکل او د وجود په پاسنی برخه کې شروع کیږي.

دوهم: مونوستوم Monostom : یو رودونکې جوړښت لري چې اکثرا د معدې رودونکی جوړښت پکې له منځه تللی دی.

دریم: دایستوم Distome : د معدې رودونکې جوړښت په مختلفو موقعیتو کې واقع وی خو دنوع مربوط په بطني برخه کې قرار لري.

څلورم امفیستوم: Amphistom: ددوي رودونکی جوړښت د وجود په اړخې برخه کې موقعیت لري.


پنځم ایشینوستوم: Echinostom: ددې گروپ د خولې رودونکی جوړښت د اغزو پواسطه احاطه شوی دی. چې د کمیس د غاړې غونډې ښکاري.

شپږم هولوستوم: Holostom: دا گروپ ددوو رودونکو جوړښتونو پخوا کې یو

دریم گړی د ټینګولو جوړښت لري چې د Tribocystisches Halteorgan په نامه یادېږي.

تر اوسه ټول یاد شوي گړیونه نرښځي دي. یوازې هغه گړوپ چې ښځه او نر پکې جدا دي. د شستوزوما گړوپ دی.

اوم شیسټوزومین : Schistosomen : په دې گړوپ کې بالغ مذکر جنس د پانې غونډې یو پلن شکل لري چې د وجود په یو کانال کې مونث جنس چې گرد شکل لري، احاطه کوي. دواړه جنسونه د ژوند تر اخره سره یو ځای پاتې کېږي. نو ځکه دې چنچي ته جوړه اي چنچي هم وا ئي. دا چنچیان په انسان او کورني حیواناتو کې ډیر صحي او اقتصادي تاوانونه رسوي. له دې امله ددوي په باره کې ډیر تحقیقات شوي او کېږي.



اته لسم شکل:

د بالغو د ایگینیا تریما تودا مختلف شکلونه چې د جنسی ارگانونو موقعیت پکې یوازې په نښه شوی دی. د یاستوم شکل A، امفیستوم شکل B، مونوستوم شکل C، گستیروستوم شکل D، هولوستوم شکل E، ایشینوستوم شکل F، شیسستوزوم شکل G.

بطني رودونکی جوړښت BS، کولمې DS، خوتې HO، شاتنی رودونکی جوړښت HS، چپه گردن KR، خوله M، د خولې رودونکی جوړښت MS، تخمدان OV، حلقوم Pharynx، د ځان تینګولو جوړښت TR


## د بالغو یا Adult د یاستومو Diastom تریما تودا مارفولوژي:

د پرازیت د وجود خارجي سطحه، کولمې، اطراحیه سیستم او جنسي جوړښتونه د مایکروسکوپ په کمه قوه هم د لیدو وړ دي.

خارجي سطح: خارجي سطح د یو تګومنت پواسطه احاطه شوې ده. چې په هغې کې بطني دوه رودونکي جوړښتونه موجود دي چې د هغوي موقعیت په مختلفو فامیلو کې یو له بله فرق لري. دسکننگ الکترون مایکروسکوپ ScanningElektronmikroskop (دا مایکروسکوپ د وجود خارجي سطح تر څو سوو زره وارې لویه بنائې) عکسونه د تیګومنت په خلفي یا شاتنی او بطني یعنی د گیدې خوا ډیر واره اغزي بنائې. یو مغلق کانالي سیستم د حیوان خارجي سطحه ډیره لویه کړیده. د خارجي سطحې مقطع بنائې چې دغه سطحه د Syncytium سینسیسیم په شکل ده یعنی د حجراتو سرحد پکې له منځه تللی دی. ددې حجراتو هستې په دې سینسیسیم کې نه بلکې داخل طرف ته په کڅوړشکلو جوړښتونو کې موقعیت لري چې دنلونو پواسطه د هغه سره په تماس کې دي. د بدن د خارجي سطحې پواسطه غذائي مواد اخیستل کېږي. درودونکو او جنسي جوړښتونو په خوا کې تیګومنت حسي حجرات لري چې هغوي بیا پخپل وار سلیا یعنی

برسونه لري او د عصبي طولې رشتو سره په تماس کې دي. د تیګومنت په خارجي برخه د موکوپولی سکراید یو غشا قرار لري چې د Surface coat یعنی سطحي پوښ په نامه یادېږي. چې د پرازیت د معافیت د پاره مهم رول لري. ددې غشا کیمیاوي جوړښت په مختلفو پرازیتونو کې سره فرق لري. چې د پرازیت د Mimikry یعنی تقلید د پاره مهم دي چې د کوربه د انتي بادي څخه پرې ځان ساتي ترڅو د انتی جن یحیث تشخیص نه شي.

کولمې: د کولمو سیستم په پاسنۍ برخه کې د یو واحد نل څخه جوړ شوی چې قوي عضلوي حلقوم لري. دا سیستم بیا په دوه برخو تقسیمېږي. چې اکثرا د وجود د اخري برخې پورې رسېږي، خو د خارج طرف ته سوری نلري. د کولمو نلونه کیدای شي په ځینو چنجیانو کې لکه Fasciola hepatica فاسیولا هیپاتیکا جانبي نلونه ولري چې د اصلي نلونو څخه جدا شويدي. د کولمو داخلي سطحه د مایکروویلي Mikrovilli پواسطه ډیره لویه شویده ترڅو د کوربه د غذائي موادو څخه چې د وینې او انساجو څخه جوړه شویده، اعظمي استفاده وکولای شي.



نولسم شکل: د دایستوم د ایگینیا بدني جوړښت په شمیاتیک شکل:

کولمې او اطراحی ارگان په O، پوښ لرونکې هگۍ په B، او جنسی سیستم په C، کې ښودل شوي دي:

دلپوروتین د باندني پوښ ÄL، بطني رودونکې جوړښت يا چوشک BS، د سيروس خلظه CB، سيروس CI، کولمې D، د پروستاتا غدوات DR، د زيرموادو حجرات DZ، هگۍ EI، اطراحی پوکنۍ EX، يوځایي د زيرونل GD، جنسي سوري GÖ، د لیبوپروتین داخلي پوښ l، خوتې HO، د لاورکانال LK، د میهل غدواتو کامپلکس MD، د خولې چوشک MS، د اوپرکولم د ماتیدو نقطه OP، اووتیپ OT، تخمدان OV، حلق Pharynx، ریسپیتاکولوم سیمینیس RS، اخري حجرات TZ، رحم JT، د مني لوی نل VD، د مني کوچني نل VE، ویتیلاریم یا د زيرموادو نل VE، کلک دیوال W، زایگوت Z.

اطراحی سیستم: په دایستوما د ایگینیا کې مختلف انواع د پروتونیفریدونو مختلف تعداد لري چې د خپلو پاسنی حجراتو یعنی Cryptocytin پواسطه د پرائشیم سره په تماس کې دي. ددې حجراتو ترتیب د پرازیت پورې مربوط او د طبقه بندۍ لپاره مهم دی. مثلاً د ځیگر په کوچني چنجي *Dicrocoelium dendriticum* کې څلیریشت حجرات دي چې په هر طرف کې دولس چې ددوه جمع دوه څخه منځ ته راغلي دي. د پروتونیفرید پاسنی برخه لکه د ماهی نیولو د جالی په شان ده چې شاوخوا متحرک برسونه لري او ددې حرکت په نتیجه کې د پروتونیفرید په داخل کې فشار راتیټیري او اطراح کیدونکي مواد پروتونیفرید ته داخل او بیا د یو نل یا Tubulus پواسطه چې د ډیرو حجراتو څخه جوړ دی. دغه مواد د وجود په اخر کې په یوه پوکنۍ کې جمع او خارجیري. په مختلفو لاروي مرحلو کې دا جوړښتونه نور شکلونه لري او هم د خارجیدو ځایونه ټي یو له بله فرق لري.

عصبي سیستم: په حیواني سیستم کې د مونوگینیا او د ایگینیا عصبي سیستم لمړی سیستم دی چې سرته ورته جوړښت یا Cephalisation لري چې په هغې کې دوه سري عقدې یا غدې Cerebral ganglien د یوې خلفي او یوې بطني رشتې پواسطه

يو تر بل سره نښلول شويدي، چې د بدن په پاسني دريمه برخه کې پرتي دي. ددی رشتو پواسطه يو زينه يا جال ډولی جوړښت منع ته راځي. خصوصاً د رودونکو جوړښتونو او جنسي سيستم په شاوخوا کې ئې عصبي رشتې ډيرې گڼې دي. دا اعصاب د Myelin پوښ نه لري، او کيدای شي يو، دوه يا څو قطبه اوسي. چې مختلف Transmitter لکه Acetylcholin د حرکت د سرعت کمولو لپاره او Serotonin د حرکت د تيزولو لپاره پکې ليدل کيږي.

جنسي سيستم: دا يستوم تريما تودا نر ښځي دي چې سپرم پکې د هگي څخه مخکې د پخيدو مرحلې ته رسيري يعنې Protandrisch دي. القاح په نورمال ډول د مقابل جنس پواسطه صورت نيسي خو خپل ځاني القاح هم پکې په استثنايي ډول موجوده ده. په داسې حالت کې چې په بعضې انواعو کې د نوي نسل د منع ته راتلو د پاره د القاح عمليه حتمي ده لکه په Philopthalmus يعنې د سترگو په چينجي کې، خو په بعضې نورو کې بې له القاح څخه هگي توليديري چې مثالونه ئې Paragonium او Schistosoma دی چې ددوي هگي يو جوړه اي يعنې haploid کروموزومونه لري. هغه حيوان چې دداسې هگيو څخه منع ته راځي هم هپلوبيد کروموزومونه لري. دغه ډول يو جنسي تکثر د Parthenogenese پارټينو جينيس په نامه ياديري. د تکثر دغه ډول په حشراتو او نيماتودا کې زيات ليدل کيږي. د کروموزومونو تعداد په دايگينيا کې اکثراً دپلوبيد دي خو کله کله پکې هپلوبيد او تريپلوبيد ډول هم پيدا کيږي.

مذکر جنسي جوړښتونه: چې اکثراً دوه خصي Hoden لري. چې د هر يوې څخه کوچنی نل د Vas efferens په نوم سرچينه اخلي او په يولوې نل کې چې د Vas defferens په نوم ياديري سره يو ځای کيږي. دا نل يوې د مني کڅوړې يعنې Vesicula seminalis ته او هغه په خپل وار يو اغزي لرونکي جوړښت يعنې Cirrus ته امتداد



پیدا کوي. د مني کڅوړه او سيروس په نه غزول شوي حالت کې د سيروس په کڅوړه کې سره يو ځای پراته وي. سيروس ددې کڅوړې څخه د مني د انتقال په وخت کې خارج خوا ته راووځي. چې د يو Penis په شکل سپرمونه مونث جنسي جوړښت ته انتقالوي چې د رحم څخه بيا د سپرم ذخيروې يعنې ريسپيټاکولوم سيمينيس Receptaculum seminis ته رسېږي خپل ځاني القاح هم ليدل شويده خو عامه نه ده او استثنايي شکل لري.

مونث جنسي جوړښتونه: د يو تخمدان يا هگيتون يعنې Ovarium، د يو جوړه زيرو موادو جوړښتونه يا Dotterstock يا Vitellarien، يو Ootyp چې په هغې کې د القاح شوې نطفې شاوخوا زيرو مواد راټول او يوه هگي ترې جوړېږي د هگي د پوستکي د جوړيدو په باره کې داسې عقیده ده چې د زيرو موادو د حجراتو پواسطه چې د Mehrlische غدواتو د يو مایع له خوا تنبه کېږي، جوړېږي. دغه غدوات چې د لويو حجراتو څخه جوړ دي او په خوا کې ئې کوچني حجرات هم موجود دي، د هگيو په خارجولو او د سپرم په فعالولو کې مرسته کوي. دا هگي بيا يو اوږد رحم ته داخل، چې رحم يا Uterus بيا په بطني برخه کې د سيروس د خلطې سره مشترکه مجرا لري. په بعضې انواعو کې د رحم څخه د خارج خوا ته يو کانال موجود دی چې د غه کانال د Laursche Kanal په نوم ياديږي چې د Vagina سره هومولوگ دی او د اجماع يعنې Kopulation لپاره مهم دی.

د ډيرو دايجينا هگي په استثنا د شيسټوزوما سرپوښ لرونکې دي. د لارو د پيدا کيدو په وخت کې سرپوښ د لارو د کاډبو پښو يا Pseudopodium د حرکت پواسطه خلاصېږي. هگي او لارو د خپلې نمو د پاره او بو ته ضرورت لري، که نه نو وچيږي او له منځه ځي.


په شيسټوزوما کې مونث او مذکر جنس جدا دی. چې د هغوي جنس د جينونو پواسطه

تشبیتبیری. یوه الفاح یا شربول شوې هگی. اکثرا شپاړس کروموزومونه لري چې مذکریې یوه جوړه ZZ جنسي کروموزومونه او مونث یې ZW کروموزومونه لري. Z کروموزوم لوی او W کروموزوم کوچنی دی یعنی مذکر homogametisch یا دوه ورته کروموزومونه او مونث heterogametisch یعنی مختلف جنسي کروموزومونه لري. حتی په لاروي مرحله کې هم نارینه او ښځینه جنس تثبیت شوی دی. په ځینو شیستوزوما کې د یو جنس په واسطه د مصاب کېدو په وخت کې د پرتینوگینیس عملیه منځ ته راځي چې هپلوید کروموزومونه لري او د هغوی څخه یوازې مونث شیستوزوما منځ ته راځي. هپلوید مذکر جنس مخکې له دې چې بلوغت ته ورسېږي مړه کېږي. خو په لابروتوار کې د شیستوزوما منزوني هپلوید د هگیو څخه پیدا شوی او همدارنگه نر جنس د هپلوید یا دیپلوید مونث جنس سره یو ځای شوی او عادي هگی یې تولیدی کېږي.

## د دایگینا تریماتودا انکشافی دوران:

ددی تریماتودا ځانگړتیا د هغوي د نسل تناوب دی، چې دکوربه د یو حتمي تغییر سره تړلې دي. چې رنگارنگ شکلونه او د انتقال مختلف ډولونه پکې شامل دي. اخرني کوربه ئې همیشه فقاریه حیوانات دي، چې په هغې کې لکه څنگه چې پخوا مو وویل پرازیت بلوغت ته رسېږي. د لمړني منځني کوربه په حیث اکثرا حلزونونه رول ادا کوي. دوهمي او دریمي منځني کوربه هم په دې دوران کې شاملیدلای شي. په اخري کوربه کې د حیوان تکثر صورت نه نیسي بلکه پرازیت پکې دکوربه د مصابولو قابلیت پیدا کوي. یعنی داسی کوربه یوازې د مصابکونکو مرحلو انتقالوونکې دي. په دایگینیا کې د نسل د تناوب په ارتباط دوه اصطلاح گانې مهمې دي چې د میتاگینیزې Metagenesis یعنی دجنسي او غیر جنسي تکثر یو په بل پسې منځ ته راتلل او د

هیتیروگونی Heterogonie یعنی د یو غیر جنسی یعنی پارتینو جینیسیس او دوه جنسی تکثیر څخه عبارت دی. ددې گروه د ژوند دوران په مختلفو انواعو کې سره فرق لري خود مهمو غړو دورانونه په لاندې شکلونو کې تشریح کېږي:



شلم شکل: د مهمو دایگینو د ژوند دوران په غایطه موادو کې هگی، Fäzes-Eier، مصابیدل Infektion،  
د خولې له خوا Oral، د پوستکي پواسطه Percutan، داوبو نباتات Wasserpflanzen،

	Gattung	Miracidium	Sporocyste		Redie		Cercarie im Wasser	Meta-cercarie
			I	II	I	II		
I	SCHISTOSOMA	+	+	+	-	-	+	-
	SCHISTOSOMATUM	+	+	+	-	-	+	-
II	DICROCOELIUM	+	+	+	-	-	In Schleim	+
	PROSTHOGONIMUS	+	+	+	-	-	+	+
III	CLON-/OPISTHORCHIS	+	+	-	+	+	+	+
	METORCHIS	+	+	-	+	+	+	+
	ECHINOSTOMA	+	+	-	+	+	+	+
	PARAGONIMUS	+	+	-	+	+	+	+
	HETEROPHYES	+	+	-	+	+	+	+
	PARAMPHISTOMUM	+	+	-	+	?	+	+
	FASCIOLA	+	+	-	+	+	+	+
	FASCIOLOPSIS	+	+	-	+	+	+	+
IV	NANOPHYETUS	+	?	-	+	+	+	+
	GASTRODISCOIDES	+	?	-	+	+	+	+

= Adulte im Endwirt   
 = 1. Zwischenwirt   
 = 2. Zwischenw.   
 = an Pflanzen

په رومي بويوېشتم شکل: د مهمو دایگینو تریما تودا د انکشف دوران په څلورو مختلفو کلاسونو کې په رومي  
اعدادو د یو تر څلورو پوري په نېسه شوي دي

بالغ په اخري کوربه کې Adulte im Endwirt، لمومړني منځني کوربه 1. Zwischenwirt، دوهم منځني  
کوربه 2. Zwischenwirt، په نباتاتو باندې an Pflanzen، په بلغمو کې In Schleim، په اوبو کې  
Im Wasser

هگی: چې د اخري کوربه څخه د غايظه موادو، بولو او يا د ليارو له لارې خارجيږي. يعنې ددې پورې مربوط دي چې بالغ پرازيت دکوربه د وجود په کومه برخه کې ژوند کوي په هگی کې د اچولو په وخت کې کله لارو موجود وي خو په ځينو نورو کې لارو موجود نه وي بلکه د مناسبو محيطي شرايطو لکه اوبه د مناسب اکسيجن موجوديت او نورمال حرارت په موجوديت کې لارو نمو کوي. هگی په ځينو انواعوکې د پوښ Operculum لرونکی وي.

ميراسيديم *Miracidium*: په اکثرو پرازيتونو کې ميراسيديم د هگی څخه په اوبو کې خارجيږي چې البته محيطي شرايط لکه نور او حرارت پرې مستقيم تاثير لري. په ځينې نورو پرازيتونو کې هگی اوبو ته رسېږي خو د خپلې نمو لپاره بايد د منځني کوربه د خولې له ليارې واخيستل شي. تر څو لارو پکې انکشاف وکړي. د ځگر په واره چنجي *Dicrocoelium dendriticum* کې ميراسيديم د منځني کوربه په کولموچې په وچه کې اوسيدونکې يو حلزون دی دهغې هگی څخه چې د خولې له ليارې داخله شوې وي، راوځي. البته د کولموازايمونه د هگی خارجي قشر له منځه وړي اولارو ترې راوځي. د ميراسيديم خارجي سطحه د اپيدرمس د حجراتو څخه جوړه شويده چې هغوي په خپل وار سلليا لري. ددې سلياو پواسطه حيوان لامبو وهي او د حرکت سبب ئې گرځي. د اپيدرمس لاندې عرضي او طولې عضلات موجود دي. د ميراسيديم لويوالی د ملي متر دوه په لسو ته رسېږي چې بې له مايکروسکوبه د سترگو پواسطه ليدل کيدای شي. په ټولو ميراسيديمو کې لاندېني مشابهتونه ليدل کيدای شي:

اول: په سر کې د يو *Papille* پاپيلي درلودل چې د باندې خوا ته وتلای شي.

دوهم: په سر کې د غدو د یو سیستم موجودیت چې یوه د سر یعنې Apikal غده او یوه جوړه نورې غدې چې کوربه ته د ننوتلو یعنې Penetration لپاره مهمې دي. او همدارنگه دوه غدې چې موکوزالري او په کوربه د ځان نښلولو لپاره مهمې دي.

درېیم: حسي ارگانونه: چې د پگمنتي سترگو او یا جانبي پاپیلو څخه عبارت دی دوي په بیوتوپ کې د موقعیت ټاکنې یا د کوربه په پیدا کولو کې اساسي رول لري.

څلورم: یو پروتونیفرید یا اطراحي سیستم چې موقعیت ئې په مختلفو انواعو کې فرق لري.

پنځم: په سر کې یوه لویه عصبي گنډه یا Ganglion چې هرې خوا سره ارتباطات پیدا کوي.

شپږم: د پرانشیم په لاندینۍ برخه کې جنیني حجرات موجود دي چې ترې نوی نسل Sporocyst او Redie نمو کوي یعنې د Omniptenz حجراتو په شکل ترې نور حجرات پیدا کېږي. امنیپوتنزهغه حجرات دي چې مختلف حجرات ترې جوړیدلای شي.

اووم: د اصلي کولمونه موجودیت

میراسیدیم د کیمیاوي موادو پواسطه د پیدا کولو له ليارې یعنې Chemotaktische پواسطه په ثانیه کې ددوه ملي مترو په سرعت په اوبو کې ازاد حرکت کوي. کله چې میراسیدیم ځان د کوربه په ایبدرمس کې ننباسي نو خپل سلیا له لاسه ورکوي. د کوربه په داخل کې په میراسیدیم کې اساسي تغییرات منځ ته راځي چې میراسیدیم یومورني سپوروسیست ته تبدیلېږي چې کولمی او حلقوم نلري او غذا د وجودد خارجي سطحې پواسطه اخلي. دنوي نسل دراتلو دوه امکانات موجود دي. یا دا چې مورنۍ سپوروسیست لورني سپوروسیست منځ ته راوړي او یا ریډي Redie ته

نمو کوي. په داسی حال کې چې د سپوروسیسټ د نسلونو تعداد محدود دی اکثرا یوازې دوهم نسل منخ ته راځي د ریډی نسلونه کیدای شي زیات وي چې یوازی د منخني کوربه د لویوالي اوژوند د اوږدوالي پورې اړه لري. دا ټول نسلونه د پرازیت د زیاتیدو سره کومک کوي لیدل شوي چې په بعضې حلزونو کې د یو میراسیدیم څخه تراتیازرو پورې سرکاریا تولید شوی دي.

سرکاریا **Cercarie**: سرکاریا په فعال ډول اود مختلفو لیارو څخه خپل لمړني منخني کوربه یعنی حلزون پریرېږدي چې نور او حرارت په دی عملیه کې رول درلودلای شي. په زیاتو حالاتو کې سرکاریا په اوبو کې خوشې کیږي چې تقریبا دخلورویشتو ساعتو پورې په اوبو کې حرکت کولای شي. چې بیا خپل کوربه له مختلفو لیارو پیدا کوي:

خپل کوربه په اکتیف ډول پیدا کوي او په همدې شکل د لسو څخه تر دیرشو ثانیه په موده کې د پوستکي له لیارې کوربه ته داخلېږي.

او یا د نباتاتو په پانو یو سیست یعنې کڅوړه جوړوي او انتظار باسي ترڅو د خولې له لیارې داخري کوربه وجود ته داخل شي.

د ځینو چینجیانو سرکاریا (لکه د ځگر د کوچني چنجي) د لومړني منخني کوربه څخه چې یو د وچې حلزون دي د خرینخاکو کڅوړو په شکل خارجېږي چې بیا د دوهم منخني کوربه یعنی میري پواسطه د خولې له لیارې وجود ته داخل شي. سرکاریا مختلف شکلونه او لویوالي لري. په شیسټوزوما کې ئې اوږدوالي تقریبا نیم ملي متر ته رسیږي. خو په ټولو کې مشابهت دادې چې د سر دبرخې چې په انگلیسي کې ئې body او د یوې لکۍ د برخې چې tail ئې بولي، لرونکی دي. لکۍ په بعضو اشکالو لکه شستوزوما او الاریا کې د بیاتي یا قیچي شکل لري چې اخري کوربه یا دوهم منخني کوربه ته


د داخلیدو په وخت کې غورزول کېږي. د سر په برخه کې زیات هغه غړي شته چې وروسته په بالغ حیوان کې هم موجود وي. لکه چوشونکي غړي یعنې Saugnaf، کولمې، جنسي او اطراحیه سیستم. د خولې چوشونکي غړي کیدای شي د اغزو او خنجکونو لرونکي هم وي. د وجود په پاسني قطب یا Apikalpol کې غدې موجودې دي چې خربنناک مواد لري چې د لمړي کوربه څخه د خارجیدو او په دوهم یا اخري کوربه باندې د ځان نښلولو لپاره استعمالیږي. په دې موادو کې مهم انزایمونه لکه Hyaluronidase او Kollagenase ثابت شوي دي. په هغه سرکاریا کې چې سیست جوړوي نورې غدې هم شته چې د سیست د جوړولو وظیفه په غاړه لري. په ځینو انواعو کې سرکاریا د سترگو لرونکې دي. داخلي پرازیتونه په بالغ، ریډي یا سپورو سیست مرحلو کې سترگې نلري.

هغه سرکاریا چې مستقیما په اخري کوربه کې داخلېږي په مختلفو انساجو کې اوسېږي او په مختلفو وختو کې بلوغ ته رسېږي. د مثال په ډول *Schistosoma mansoni* د پنځه دیرش څخه تر دوه څلوېښت او *Schistosoma douthitti* د لسو څخه تر دولسو پورې ورځو ته ضرورت لري، چې بالغ شي.

هغه سرکاریا چې دوهم منځني کوربه ته داخلېږي اکثرا میتاسرکاریا *Metacercaria* ته تبدیلیږي. میتاسرکاریا نور تکثر نکوي او کیدای شي د یوې لاروي مرحلې په حیث وپېژندل شي چې په بعضی انواعو کې نمو کوي او لویږي میتاسرکاریا د یو سیست پواسطه احاطه شویده. په دې مرحله کې جنسي غړي انکشاف کوي او اپیدرمس یو تگومنت ته تبدیلیږي چې د پاسه ئې د موکوپولي سکراید یو دیوال یا پرده جوړېږي، دا پرده د Surface coat په نامه یادېږي چې پرازیت د کوربه د انتی بادي څخه ساتي. د دې انکشافی مرحلې څخه وروسته میتاسرکاریا د اخري پرازیت لپاره مصاب کوونکې دي. د پرازیت په معده او کولمو کې د سیست دیوال هضم او میتاسرکاریا پکې



ازاديرې چې بيا له دې ځايه مختلفو غړو ته انتقال کوي او هلته بلوغت ته رسېږي چې د جوړه کيدو Kopulation څخه وروسته دهگيو په اچولو شروع کوي. هغه ميتاسرکاريو چې په نباتاتو باندې سيست جوړوي لکه *Fasciola hepatica* ياد ځيگر لوی چينجی، د خپل بلوغت دپاره ډېر لږ وخت ته ضرورت لري يعنې د لږو ساعتو څخه بيا تر پنځو ورځو پورې په يو بالغ حيوان بدلېږي چې د مصاب کولو توان پيدا کړي.



دوه ويشتم شکل:

د/دایگینو تریما تودا/ دودی د مرحلو شیماتیکی شکل: a. میراسیدیم، b. سپوروسیست، c. ریډي، d. سرکاریا

خارج ته انتقالونکی نل AG، پاسنی پاپیلی AP، دسترگو تقطه AU، بطني چوشک BS، سرکاریا CE، سلیا CI، کولمې Darm، د چوشک لاندې غدې DH، د چوشک د پاسه غدې DR، اطراحی کانال EK، اطراحی سوری EP، اطراحی سیستم چې د خای د لروالی له امله په رسم کې قطع شویډي EX، د اپیتیل حجرات EZ، د تولد سوری GE، جنیني حجرات KB، جانبی غدوات LD، دخولې چوشک MS، عصب NP، د حرکت کومکي جوړښتونه NS، د ننوتلو غدوات PD، ریډي RE، جانبی جوړښت SO، د غاړې حلقه W

دایگینیا د مریضی د عامل په حیث:

د دایگینیا تریما تودا بالغ حیوان د آخري کوربه د وجود په مختلفو برخو کې لکه بیینه، د تریخې نلونه، کولمو، او سږو کې ژوند کوي چې لومړی د جودو په همدغو غړو کې د مریضی سبب کېږي. خو په ثانوي ډول د وجود نورو برخو لکه مرکزي عصبي سیستم ته هم انتشار کوي چې د میتابولیزم په نتیجه کې د زهري موادو تولید او یا د لاروو د حرکت په نتیجه کې نقصانونه منځ ته راوړي.

لومړی Schistosomiasis دا مریضی د کولمو او مثانې مریضی ده چې په طبي لحاظ ډېره مهمه ده چې د هغې د کشف کونکي بیلهارش په نامه یادېږي او Bilharziose نوم ورکړل شوی دی چې د څلورو مختلفو انواعو په واسطه منځ ته راځي.

الف Schistosoma haematobium چې په مثانې، اطراحی او جنسي سیستم کې اختلالات منځ ته راوړي خصوصا د مثانې دیوال او پښتورگی ته ډېر نقص رسوي دا مریضی په افریقا او منځني ختیځ کې پیدا کېږي، د میلاد نه یونیم زر کاله پخوا په

موميایي کې دا چينجی ليدل شوي دي.

ب: *Schistosoma mansoni* چې د کولمو او ځيگر مریضي منځ ته راوړي، چې د افریقا څخه یې د مریانو د تجارت په نتیجه کې جنوبي امریکا ته هم انتقال کړی دی.

ج: *Schistosoma japonicum* چې په شرقي آسیا کې د کولمو مریضي ده، دا مریضي د کتایاما مریضي په نامه هم یادېږي. د دې یو نږدې نوع د *Schistosoma mekongi* چې د مېکنګ په علاقه کې په لاوس او کمبودیا کې پیدا کېږي. سپی یې ذخیروي حیوان تشکیليوي. منځنی کوربه یې یو حلزون د *Lithoglyphopsis* په نامه دی چې مختلف انواع لري.

د: *Schistosoma intercalatum* چې په غربي او مرکزي افریقا کې د کولمو مریضي منځ ته راوړي، هګۍ یې په آخر سر کې اغزي لري. دوه نور انواع چې حیواني دي په انسان کې مریضي منځ ته راوړي خو دومره سخته نه ده. د نړۍ د روغتيايي سازمان WHO د احصایې په اساس په حاره او نیمه حاره منطوقو کې دوه سوه ملیونه انسانان په دې مریضي اخته دي. د مریضي انتقال ډېر ژر په هغو اوبو کې چې لارو یې په کې گرځي منځ ته راځي. د تطابق له مرحلې څخه وروسته چې په پوستکي کې صورت نیسي د نمو یا ودې یو پړاو په سږو کې واقع کېږي.

## د ستریگېدا ارډر Order Strigeida

د دې ډلې مشترک جوړښت د سرکاریا قیچي شکله لکی ده. میراسیدیم یې په اوبو کې خوشي کېږي او د پوستکي د لارې کوربه مصابوي.

### د شیسټوزوماتیدیا غټه کورنۍ Ueberfam: Schistosomatidea

دا ګروپ د فقاریه یا شمزی لرونکو حیواناتو د وینو په رګو کې اوسېږي. څرنګه چې وینه په آسانی اخیستلای شي نو ځکه فارینګس Pharynx نه لري. هګۍ یې سرپوښ نه لري، میراسیدیم یې دوه جوړه پروتو نېفریدونه لري، سرکاری یې قیچي لرونکې لکی لري. آخرنی کوربه د پوستکي د لارې مصاب کوي. د ودې دوران یې په دوه کوربه و کې په مخ ځي.

### د شیسټوزوماتیدی کورنۍ، Family Schistosomatidae

دا پرازیتونه په مرغانو او تي لرونکو حیواناتو کې پرازیتی ژوند تېروي. مذکر او مونث جنس یې له یو بله ډېر فرق لري.

### د شیسټوزوما جنس، Genus Schistosoma

په دې جنس کې د حیواني پرازیتونو په خوا کې د انسانانو د مریضۍ عامل هم شامل دی چې د ملاریا څخه وروسته ډېر زیات انسانان پرې مصاب دي.

شیستوزوما هېماتوبیوم (Schistosoma, Bilharz 1852)

haematobium

د اطراحي او جنسي سیستم د بیلهارثیوزه د مریضۍ عامل. د دې مریضۍ کلاسیک مملکت مصر دی چې د دې مریضۍ علایم په پخواني مصري لیکنو کې چې په پایپروس لیکل شوي دي او د میلاد څخه پنځه لس سوه کاله مخکېوالی لري. د دې وخت د مومیایي څخه د اتوپسی په نتیجه کې لاس ته راغلي دي.

جغرافیایي انتشار: دا پرازیت د افریقي په ډېرو برخو کې موجود دی. په هغو ځایونو کې چې اوبه موجودې دي، همدارنگه په باراني ځنگلونو، د نیل او نیگر سیند په امتداد، همدارنگه په مدغاسکر، عراق، د عرب په نیمه جزیره او د ایران په بعضو برخو کې پیدا کیږي.

مارفولوژي او وده:

مذکر جنس د اتو څخه تر پنځه لس ملي مترو پورې طول لري. د وجود جانبي خوا یې بطني طرف ته راقات شوې ده. چې په نتیجه کې یې د وجود پاسنی برخه د یوې ناوې شکل لري چې د *Canalis gynaecophorus* په نامه یادېږي. ددی ناوې په منځ کې مونث جنس چې د درې تر پنځه ملي متره اوږدوالی لري، ځای لري.

د وړاه جنسونه خوله او چوشک لري، چوشک په مونث جنس کې د وجود په ډېره پاسنی برخه کې واقع دی. د دواړو جنسونو د کولمو کانالونه د وجود په منځنۍ برخه کې سره یو ځای کېږي چې د وجود تر آخره پورې رسېږي. په دواړو جنسونو کې جنسي سوري د بطني چوشک تر شا واقع دي. مذکر جنس د څلورو تر پنځو پورې خصي لري چې د

بطني چوشک لاندې واقع دي. تخمدان او اووتیپ تقریبا د وجود په منځنۍ برخه کې په مونث جنس کې واقع دي. په یو اوږد او تېروس Uterus کې په بالغ حیوان کې تر دېرشو پورې هگۍ د یو قطار په شکل موقعیت لري. د هگۍ پوښ په یو قطب کې یو اغزی لري چې د پنځه تر یولس مایکرون پورې اوږدوالی لري. د مذکر جنس آخرنۍ درېیمه برخه د کولمو په خوا کې له زیرو موادو څخه ډکه ده. بالغ حیوان اکثرا د کوربه د مثانې او او تېروس په وریدونو کې پیدا کېږي. په نسو کې د جنسي اورگانونو په ژورو وریدونو او په زیاتو پرازیتي حالاتو کې د کولمو هغه وریدونه چې د ریکتم او اپنډیکس په خوا کې موقعیت لري د پرازیت لخوا مصابېږي. د شیسستوزما هگۍ د کوربه د بولي نلونو په واسطه خارج ته انتقالېږي. میراسیدیم د شپږو ورځو په جریان کې له هگیو څخه د راوتلو لپاره آماده وي. که چیري له هگۍ څخه ونه وځي، دوه یا درې هفتې وروسته مړ کېږي. میراسیدیم د هگۍ څخه په اوبو کې راوځي.

منځنۍ کوربه د بالینوس د جنس مربوط حلزونونه دي. میراسیدیم د هگۍ څخه د راوتلو وروسته په اولو پنځلسو دقیقو کې مثبت Phototaxis لري، یعنې د رڼا خوا ته خوځېږي. د هغې وروسته د هغه په عکس بدلېږي. که د اوو څخه تر یولسو ساعتو پورې کوربه پیدا کړي نو په هغه کې په مورني سپوروسیسټ بدلېږي چې د هغې څخه وروسته بیا لورنۍ سپوروسیسټ پیدا کېږي چې اوږدوالی یې تر یو نیم ملي متر پورې رسېدای شي. په اوبو کې د څلرویشته او دوه دېرش ورځو په منځ کې چې د تودوخې درجه د اوه ویشته او نهه ویشته سانتی گراد په منځ کې وي د هغې څخه سرکاریا خارجېږي. سرکاریا کولای شي چې د پوستکي د لارې وجود ته ننوځي. سرکاریا د کیمیاوي حسي حجراتو یعنې Chemoreceptors په واسطه د خپل کوربه پوستکي پېژني. په دې پېژندلو کې نا مشبوع شحمي اسیدونه unsaturated fatty acids رول لري. سرکاریا د پوستکي پورې نښلي او په هغې باندې حرکت کوي. کله چې د وېښته په خوا کې د پوستکي گونځه پیدا کړي نو اول خپله لکۍ غورځوي او بیا پوستکي ته ننوځي.

په دې وخت کې د وجود په آخر کې موجودې درې جوړه غدې خالي کوي. د څو ساعتو څخه تر درې ورځو په موده کې یو کوچنی عروقیه ورید ته ننوځي او د وینې د جریان د لارې څخه سرې او د هغه ځایه څخه د کین زړه د لارې د وینې لوی دوران ته داخلېږي. دا چې په څه ډول د اوسېدو اصلي ځای ته رسېږي معلومه نه ده. مونث جنس د دې لپاره چې بالغ شي باید د مذکر جنس په کانال کې واقع شي خو مذکر جنس به له مونث جنس هم بلوغت ته رسېږي. د Praepatenz وخت په دې شیسټوزوما کې اوږد دی چې د مصاب کېدو څخه وروسته د درې څخه تر شپږو میاشتو پورې موده کې هګۍ خارجېږي. بالغ حیوان تر لسو کالو پورې په کوربه کې ژوند کولای شي خو د قوي دفاعي سیستم د تاثیر له امله کېدای شي د پرازیت د ژوند موده رالنده شي.

پاتو جنسي: د پوستکي عکس العمل د شیسټوزوما په مقابل کې خاښت، سور کېدل او پړسېدل دي. د مصاب کېدو څخه د درې تر لسو هفتو وروسته تبه، د ملا د بندو درد او عمومي ستړتیا محسوسه کېږي. په وینه کې سپین کرویات زیاتېږي. د پریپیتېنڅ مودې په آخر کې د میتیازو په وخت کې سوځېنت او د لګن خاصره او کولمو د درد احساس کېږي. همدارنگه په ادرار کې وینه لیدل کېږي. مثانه هم خپل شکل بدلوي.

ایکالوژي او ایپیدیمولوژي:

د دې مریضۍ د منځ ته راتلو دپاره لاندني شرایط ضرور دي:

لومړی د منځني کوربه موجودیت، څومره چې د دوي تعداد په اوبو کې زیات وي هماغومره ډېرې هګۍ او سرکاریا اوبو ته خوشي کېږي.

دویم د هګیو خوشي کېدل په اوبو کې چې د درې نیمو هفتو وروسته ترې سرکاریا منځ ته راځي.

درېيم د پوستکي سره د سرکاري تماس چې په دې کې د انسان لوڅې پښې، او بو ته ننوتل او په هغو کې لمبېدل راځي. شيسټوزوما هېماتوبيوم کوم پرازيتي ذخيروي حيوان نه لري او د يو انسان څخه بل انسان ته مستقيم انتقال هم امکان نه لري.

### شيسټوزوما مانسوني *Schistosoma mansoni*:

دا پرازيت د افريقا د صحرا په جنوب په حبشه، سودان، دنيل په دلتا، د مدغاسکر په لوړو ځايونو، د عربو په نيمه وچه او په مرکزي او جنوبي امريکا کې پيدا کېږي. دا پرازيت په لوړو ځايو کې چې شيسټوزوما هېماتوبيوم پکې نه پيدا کېږي هم موجود دی. دنيل په دلتا کې کيداې شي انسان په دواړو پرازيتونو مصاب شي.

مارفولوژي او انکشاف:

دا پرازيت له مخکني څخه وروکی دی. دمذکر جنس په پوستکي باندې وينسته لرونکي زخې موجودې دي چې د پرازيت د کلکولو لپاره د وينو په رگو کې کمک کوي. د خصيو تعداد د اتو نه تر نهو پورې رسېږي. تخمدان د وجود د منځنۍ برخې څخه پاس واقع دی. رحم بې لنډ او په بالغ حالت کې څلور هگۍ لري. د هگۍ پاسنی قشريو جانبي اغزی لري. زير مواد د وجود په اخري برخه کې واقع دي چې د وجود تر نيمايي پورې امتداد پيدا کوي. د پرازيت د اوسيدو ځای د *Vena portae* شا او خوا دي. دا هغه رگ دی چې د هضمي سيستم څخه څگر ته امتداد مومي. ټول شيسټوزوما وينه خوړونکي دي. مونث جنس خپلې هگۍ د لويو کولمو او کله هم د کوچنيو کولمو خو په استثنايي ډول د مثاني په ديوال کې اچوي. خو انتقال بې خارج ته يوازې د غايطه موادو يعني ډکو ميتيازو له



لارې صورت نيسي. منځني كوربه يې د *Biomphalaria* د جنس مختلفې انواع دي.

پاتوجنسي:

د مريضۍ علايم د مخکني نوع سره فرق لري. د *Präpatence* وخت يې د پنځه تر لسو هفتو پورې دوام کوي. د پرازيت دهگۍ اچولو سره همزمان د مريضۍ علايم د قبضيت او ناستې يو په بل پسې راتگ، د خيتې درد، د کلمو ديوال پولۍ اود وينې د تجمع له امله سوررنگ لري چې حتي تر زخم *Ulceration* پورې رسيداي شي.

د پرازيت د ميتابوليزم د زهري موادو څخه زيات زهري مواد د پرازيت دهگيو او په هغوې کې د موجود ميراسيديم لخوا ازادېږي چې د کوربه په حجراتو زهري اثر لري. هگۍ د وينې د جريان له لارې د وجود مختلفو برخو لکه سږو او دماغ ته هم انتقال کوي خو اکثر منفي تاثيرات يې په ځگر او توري يا طحال کې ليدل کېږي يعنې ددې غړو لويوالی او بالاخره د ځگر د *Fibrose* او د مری د رگونود *Varizen* سبب گرزي. يعنې د ځگر د نه فعاليت په نتيجه کې د وينې د بنديدو او د هغه وريد چې ځگر ته وينه وړي د لويديو او بيا د هغه د چاوديدلو په نتيجه کې د مرگ سبب گرځيداي شي.

ايجاد يمولوژي:

ددې پرازيت پواسطه اکثرا ځوانان ډير مصاب کېږي د انسان نه پر ته ژونکي حيوانات *Rodent* لکه د مودکوکورنۍ هم مصاب کېږي خو يوازې د *Pavian* بيزوگانې کولاي شي دا مريضې انسان ته انتقال کړي.

## شيسټوزوما جاپانيکوم *Schistosoma japonicum*:

په جنوبي او شرقي اسيا خصوصاً په چين کې دا پرازيت زيات پيدا کيږي. ددی په خوا کې په جاپان، فلپاين، کمبوديا، لاوس، تایلند او ويتنام کې هم ليدل کيږي. مارفولوژي او انکشاف:

مذکر جنس تر شل ملي متره او مونث ئی تر دوه ويشت ملي متره پورې طول لري. د مذکر او مونث جنس د کولمو يو ځای والی د پرازيت دلاندینی څلورمې برخې څخه لږ پاس موقعيت لري. د مونث جنس رحم اوږد او تر درې سوه پورې هگی لري. چې هگی يې کوچنی، کروي شکلي او ډير کوچني اغزي لري. بالغ پرازيت د کولمو په وریدو کې ژوند کوي او هگی يې په غايطه موادو کې ليدل کيداې شي. منځني کوربه يې *Oncomelania* د جنس پورې مربوط حلزونونه دي چې تر ټولو مهم يې *Oncomelania hupensis* دی.

پاتوجنسي:

د مريضی علايم يې د مانسوني د مريضی سره مشابه دي خو نری کولمی زياتې مصابوي او د ځگر تکليفونه پکې زيات وي.

ايبیديمولوژي:

په دې نوع کې ذخيروي حيوان رول لري. اکثر کورني حيوانات تر ټولو مهم غواي په دوهمه درجه ميينې د هغی پسې څوگان، اسان، سپي، پيشوگان، پسونه، سوی او همدارنگه مږي دي.

مجادله: د حلزون ضد کيمياوي مواد استعمالیږي خو ددوي نقص ماهيانو ته رسيږي او

د هغوي د خنځي کيدو سبب کيږي. ددې په خوا کې د انسانانو تداوي د مجادلې تر ټولو مهمه لار ده.

د بلهرځيوزې تشخيص:

د پرازيت تشخيص د هغوي د هگيو پواسطه چې په شيستوزوما هيماتوبيم کې په ادارار يعنې تشو ميتيازو او په نورو دواړو کې په غايطه موادو يعنې ډکو ميتيازو کې کيږي. خو يوازې يو وار معاينات کفايت نکوي ځکه چې په زمينه مرحله کې دهگيو پيدا کول سخت دي نو بايد دا معاينات څو ځلې تکرار شي. همدارنگه د ايمون سيستم د عکس العمل يا انتي بادي له لارې د مريضې تشخيص کيدای شي.

ددې انواعو په خوا کې *Schistosoma intercalatum* دی چې په غربي افريقا کې دکولمو د بلهرځيوزې سبب گزى ددوي هگى هم يو قطبي اغزى لري.

دوه نور انواع چې اکثرا په بيا ژونکو حيواناتو کې ليدل کيږي په انسان کې په ندرت سره پيدا کيږي *Schistosoma mattheei* او *Schistosoma bovis* دي.

## اردر ايشي نو ستوميدا **Ord: Echinostomida**

ددې گروپ پورې مربوط ميراسيديم يوه جوړه پروتونيږيدونه لري.

### فامیلې ایشینو ستومیدای Fam: Echinostomatidae

دا فامیلې ډیر انواع لري. دا چنچیان زیاتره په مرغانو کې خو یو کم تعداد یې په تي لرونکو حیواناتو کې ژوند کوي. چې ځینې یې په انتخابي یعنی فاکولتاتيف شکل د اوسیدو له لارې په انسان کې د مریضۍ سبب گزي. دا چنچي د کولمو په دیوال پورې ځان نښلوي او د هغې څخه غذایی مواد اخلي. چې کله کله د دغه دیوال موکوزا هم د غد ابي موادو په حیث استعمالوي. په جنوبي اسیا مخصوصا جاوا، فلپاین، هند او دچین په جنوب کې ددې فامیلې بعضې پرازیتونه د معدې او کولمو اختلالات منځ ته راوړي.

همدارنگه نور انواع د نړۍ په مختلفو برخو کې په کورنو مرغانو لکه هیلپو، کوترو او کورني چرگانو کې د مریضۍ سبب گزي. چې په دوي کې پرازیت په کلاوک او د کولمو په لاندینۍ برخه کې اوسېږي.

پاتوجنسي: په کوترو کې د وینې د اسهالاتو سبب گزي.

### فامیلې فاسیولیدای Family : Fasciolidae

ددې فامیلې پورې تړلي چنچیان ډیر لوی دي. چې په وانبه خوړونکو حیواناتو کې پیدا کیږي. دکولمو د لوی چنچي Fasciolopsis buski په استثنا نور ټول چنچیان د ځیگرد زیرو په نلونو کې اوسېږي. د میتاسرکاریا لرونکې خلطې د نباتاتو له لارې کوربه ته انتقال کوي.

## فاسیولا هیپاتیکا (Linne1758, Braun1925): Fasciola hepatica

دا د ځیگر لوی چنجی د دنیا په ټولو برخو کې پیدا کیږي. په بیازوونکو او همدارنگه په اسانو، خوگانو، خرو، هوسیو، کنگرو، مرو او کله کله په سپو او انسانانو کې هم پیدا کیږي. دا پرازیت د ټولو تریما تودا او څخه پخوا پیژندل شوی او د ژوند دوران یې روښانه شوی دی. D.F. Weinland (1876) ددوی موجودیت په منځني کوربه چې یو نوع حلزون چې د *Lymnea (Galba) truncatula* په نامه یادېږي، تثبیت کړ. یو بل عالم د A.P.Thomas په نوم ددې پرازیت د ژوند دوران تشریح کړ.

مارفولوژي او انکشاف:

د ځیگر لوی چنجی د یو نیم څخه تر درې سانتي متره اوږد او تریو اعشاریه درې سانتي متره پورې پڼه دی. دا چنجی د پانې غونډې شکل لري او صورت یې هوار دی. څومره چې د پرازیت شمیر په کوربه کې زیات وي نو صورت یې هم کوچنی وي. خصیه او تخمدان یې د څانگو په شکل تقسیم شوي دي.

پرازیت د ځیگر په داخل کې د صفراوي نلونو اپیتیل ته تاوان رسوي. چې د هغې د لویوالي یا Proliferation سبب گرزي. فاسیولا هیپاتیکا د وینې څخه ځان تغذیه کوي، چې د هغې په کولمو کې په سترگو هم لیدل کیدای شي. یو بالغ پرازیت په ورځ کې د پنځه زره څخه تر شل زره پورې هگۍ اچوي. کله چې هگۍ او بو ته ورسېږي، نو ددووي څخه تر څو هفتو وروسته میراسیدیم پیدا کیږي. چې هغه بیا د لیمنیا ترونکولاتا په نوم یو حلزون مبتلا یعنی اخته کوي. همدارنگه کیدای شي نور حلزونونه هم مبتلا شي. د میراسیدیم څخه سپوروسیست او بیا څو نسلونه ریډي چې بالاخره سرکاریا منع ته راځي. سرکاریا یوه خلطه جوړوي او ځان د نبات په هغه برخه چې داوبو د سطحې څخه لاندی وي، نښلوي. د خلطې د جوړولو څخه څلیرویشته وروسته د کوربه لپاره

مصاؤونکی دی چې په میتاسرکاریا بدلیری. کله چې نبات د کوم حیوان له خوا خوړل کیږي نو په خلطه کې موجود میتاسرکاریا د حیوان نړیو کولمو ته داخلیری. د کولمو دیوال سوری کوي او د وجود په خالیگاه کې ازادیږي. د یو څخه د شپږو ورځو تر تیریدو وروسته ځیگر ته رسیږي دلته میتاسرکاریا د خلطې څخه خارجیری. لومړی د ځیگر په پرانثیم کې حرکت کوي چې د هغه ځایه څخه لمړی کوچنیو او بیا لویو صفراوي کانالونو ته داخلیری چې دلته بلوغ ته رسیږي. د اوه تر اته هفتو وروسته هگی اچوي او د Ductus choledoctus له لاري کولمو او د غایطه موادو پواسطه یې هگی بیرون ته خارجیری. چنچي کیدای شي څو کاله په ځیگر کې ژوند وکړي.

پاتوجنسي: د مریضۍ شکل د صفراوي نلونو د مزمن تخریش په نتیجه کې منع ته راځي. په انسان کې مریضی په دوه مرحلو کې لیدل کیږي.

لومړی: د Präpatenz په مرحله کې: په دې مرحله کې چې د هگی اچولو څخه مخکې مرحله ده په پرانثیم کې د پرازیت د حرکت په نتیجه کې په ځیگر د فشار احساس کیږي چې د مریضۍ علایم یې خاص نه وي.

دوهم: مزمنه یا Chronic مرحله کې: چې د ځیگر د لوییدلو، د صفراوي نلونو د بندیدلو او د انساجو د سرطاني کیدو حتی د ځیگر سیروس ترې منع ته راتلای شي. د وینو سپین کرویات زیاتیری. حتی په لومړۍ مرحله کې ددې کرویاتو زیاتیدل په وینه کې ددې مریضۍ د تشخیص او تداوی لپاره خاص اهمیت لري.

ایکالوژي اپیدومولوژي: د ځیگر د لوی چنچي اصلی بیوتوب (ژوندځای) هغه څرځایونه دي چې په تیتو او لمدو برخو یعنی جبه زارو ځمکو کې موجود وي. په دې

ځمکو کې منځنۍ کوربه يعنې حلزون ژوند کوي. دا حلزون په ډيرو لږو او بو کې ژوند کولای شي، حتې د وچې په مقابل کې مقاومت هم لري. سرکاريا په کوچنيو ډنډونو کې خصوصاً په گرمو ورځو کې لامبو وهي او بيا ځان په وښو نښلوي او سيست جوړوي. کله چې دغه واښه د حيواناتو له خوا وخورل شي. او يا دا چې مصاب شوي واښه ذخيره شي تر شپږو مياشتو پورې پکې ميتا سرکاريا ژوندی پاتې کيدای شي. انسان کيدای شي د خامو سبو او يا چټلو ميوو د خوړلو له لارې مصاب شي.

تشخيص: په غايطه موادو کې د هگيو د پيدا کيدو له لارې او يا د صفراوي نلونو څخه مستقيم د هگيو لاس ته راوړنه چې په دې صورت کې د نورو هگيو څخه په اسانۍ تفریق کيدای شي.

تداوي: د کيمياوي موادو په واسطه يعنې Bithinonol چې څلويښت ملي گرامه هره درېمه ورځ خوړل کېږي او تداوي شل ورځې دوام کوي.

د انسان او خوگ د کولمو چينجی، فاسيولا بوسکي

### **Fasciola buski (Lankester 1857)**

ددې پرازيت پيدايننت د اسيا د جنوب شرقي برخې پورې محدود دې. خصوصاً د جنوبي برما او تايليند څخه د چين د جنوب شرق، مايليزيا، بورنيو او فلپاين پورې انتشار لري. مجموعاً لس مليونه خلک ددې پرازيت پواسطه مصاب دي. د پرازيت د سرکاريا سيستونه د اوبو چارمغزيا *Trapa natans* او د اوبو دپيازو يا *Eliocharis*

tuberosa پورې ځان نښلوي د خوگانو مصابيدل د سيست لرونکو نباتاتو د خوړلو له ليارې او د انسان مصابيدل هغه وخت چې انسان د اوبو چارمغز باندې خوله ولگوي تر څو د هغې مزه لرونکې مغز و خوري، منع ته راځي. ميتاسرکاري کله چې د معدې څخه تير شي د سيست څخه راوځي او په نړيو کولمو کې ځان نښلوي. تر شپږو هفتو وروسته لومړني دردونه پيدا کيږي چې سهار وختي په وړې معده کې وي او د نس ناستي سره ملگري وي. که دا مريضې تداوي نه شي د مرگ سبب کيداې شي.

## اردر پلاگيروشيډا Order : Plagiorchiida

ددې گروپ د سرکاري په لکۍ کې اطراحي نلونه نشته. د زياتو فاميلونو سرکاريو بومه شکل اغزی لري. اکثرا پکې د سپوروسيسټ مرحله نشته خو په څلورو فاميلونو کې يې د ريډي مرحله موجوده ده.

د ځيگر کوچنی چينجی، دیکرو سوليوم دينتريکوم

## Dicrocoelium dendriticum (Rudolf 1818)

دا پرازيت په ټوله دنيا کې په غوايانو، پسونو او غرڅو کې پيدا کيږي. انسان پرې کم مصابيري پرازيت د ځيگر په صفراوي نلونو کې ژوند کوي. د بيالوژيکي تطبيقاتو د پاره ترې ډيره گټه اخيستل کيږي، ځکه چې په اسانۍ سره له مسلخونو څخه لاس ته راتلاې شي.




## مارفولوژي او انکشاف:

دا چينجی د شپږو څخه تر دولس ملي مترو پورې اوږدوالی لري. کولمی يې له دوه ساده نلونو څخه جوړی شوي يعنې جانبي کانالونه نلري. خصی او تخمدان يې گرد شکله دي. خصی د وجود په پاسنی او تخمدان يې د وجود په منځنی او اخري برخه کې پروت دې، چې تخمدان يې ډير اوږد او کوږ ووږدی. هگی يې 2641x مايکرون جسامت لري. ميراسيديم د هگی په منځ کې پخوالي ته رسېږي کله چې هگی په اوبو کې خوشی کيږي. که چيرې هگی مستقيما د خپل منځني کوربه پواسطه چې د وچې يو حلزون دی، واخيستل شي. نو ميراسيديم د هگی څخه خارج او د کولمو په ديوال کې ننوځي. تر اوسه پنځه لس نوع حلزونونه د لومړني منځني کوربه په حيث پيژندل شوي دي. په دوی کې پرازيت مورنی او لورنی سپوروسيسټ جوړوي. څرنگه چې ټول دا حلزونونه په وچه کې ژوند کوي نو سرکاريا ددې موقع نه پيدا کوي چې په اوبو کې لامبو ووهي. دوي د حلزون په تنفسي مجرا کې په سلونو جمع او د حلزون د لارو په پوکنيو کې خارجي محيط ته ازادېږي. دا پوکنی د Formica جنس د ميربانيو د مختلفو انواعو له خوا خوړل کيږي. دا ميربانيو ددوهم کوربه حيثيت لري. پرازيت د ميربي په معده کې لکی. غورزوي او د معدې ديوال سوړی کوي. پرازيت د وجود په اخري برخه کې يو سيسټ جوړوي او نمو کوي. د څلويښت تر شپيته ورځو وروسته دغه ميتاسرکاريا خپل اخري انکشاف تکميلوي او د اخري کوربه مصاب کولای شي. يو ميربې کولای شي تر سلو پورې ميتاسرکاريا ولري او ژوندی پاتی شي. د سرکريا څخه يو يې د ميربي هغې عصبي عقدې ته ننوزي چې د ميربې د خولې د جوړښتونو کنترول په لاس کې لري. د ننوتلو له امله دا عقده خپل کار نشي اجرا کولای چې په نتيجه کې د ميربي د منديل عضلات فلج کيږي او کله چې ميربي د يو نبات په پاڼه يا څانگه خوله ولگوي هملته په نبات د پاسه پاتي کيږي او خپل د خولې جوړښتونه د نبات څخه نه شي خارجولای او خپلې ځالې ته نه شي ستيندلای. کله چې سهار وختي حيوانات څر ته راشي او ميربي لرونکي نباتات وځوري

نوپه دې ډول میتاسرکاریا د کوربه معدې ته داخلېږي چې دلته او یا په اشنا عشر کی د سیست څخه ازادېږي چې بیا د Ductus choledocus مجرا ته ننوزي او له دی ځایه د ځیگر کوچنیو صفراوي نلونو ته داخلېږي. د اتو تر نهه هفتو وروسته په هگی اچولو شروع کوي. بالغ چینجی تر دریو کالو ژوندی پاتې کیدای شي.

پاتوجنسي: د مریضی علایم د ځیگر لوی چینجی ته ورته دي خو تاثیرات یی دهغه څخه کم دي. ځکه چې د ځیگر د حرکت مرحله پکې نشته یعنی د ځیگر پرانسیم ته د ځیگرد دې چینجی له خوا ضرر نه رسیږي. مریض حیوانات بې اشتها وي او وزن یی کمیږي. اقتصادي تاوان یی د حیوان ډنگرتیا او د ځیگر خرابوالې دي.



درویشتم شکل: د انسان د ځیگرد چینجو شیماتیکی رسمونه:

بطني چوشک BS, کولمې چې د تخنیکي مشکل له امله قطع شوي دي DSA, کولمې DS, اطراحي کانال EX, جنسي سوري GÖ, د پوستکي اغزي HK, خصبي HO, لورش کانال LK, د خولې چوشک MS, تخمدان, OV, د مني کڅوړه RS, رحم UT, د مني کوچنی نل VE, زیر مواد VI

## Order : Opisthorchiida اردر اوپستورنبيدا

په صفراوي نلونو او همدارنگه په کولمو کې پيدا کيږي. خصيې د وجود په اخره برخه کې پرتې دي. تخمدان يې ډير اوږد او کوږوږدی. هگۍ يې کوچنۍ دي چې د اچولو په وخت کې پکې امبريو موجود وي.

## Family : Opisthorchiidae فاميلي اوپستورشيدي

ټول انواع يې يوازې په صفراوي نلونو کې ژوند کوي.

## Opisthorchis sinensis دچيناي ځيگر چينجی، اوپستورشيز ساينس سيز

دا پرازيت په شرقي اسيا کې د انسانانو تر ټولو مهم پرازيت دی. د مصاب شوو انسانانو تعداد يې شل مليونو ته رسيږي. دا پرازيت د سيندونو او بحیرو په شاوخوا محيط کې زيات پيدا کيږي. مصابيدل يې د يو ماهي په ذريعه چې په خام ډول خوړل کيږي منع ته راځي. همدارنگه په جاپان، کوريا، شمالي ويتنام او لاوس کې هم پيدا کيږي.

مارفولوژي او انکشاف:

د بالغ حيوان اوږدوالی او ه لس ملي متره او سوري يې څلور ملي متره دی. چې د خيټې چوشک يې د خولې د چوشک څخه وړوکی دی. په دوه برخو تقسيم شوې کولمې يې د وجود تر اخره پورې امتداد پيدا کوي. خصيې او اووتپ يې د وجود په اخري دوه پر پنځمه برخه کې موقعيت لري. د زيړو کڅوړې او رحم يې د خيټې تر چوشک پورې امتداد پيدا کوي. چې د هغې په پاسنۍ برخه کې جنسي سوري موجود دی. چې دا ددې حيوان په تشخيص کې اساسي رول لري. په هگيو کې يې چې د ناک شکل لري او سر

لرونکې دي. یو مکمل میراسیدیم موجود وي. میراسیدیم کیدایې شي په مرطوب محیط کی په صفر درجه کې تر یوه کاله پورې په هگی کې ژوندی پاتې شي. میراسیدیم د لومړي کوربه په کولمو کې چې یو حلزون دی ازادېږي. د هغې څخه ریدي او د ریدي څخه سرکاریا منځ ته راځي. سرکاریا چې یو کوچنی شکل لري د لامبو پواسطه خپل کوربه چې ډیر ماهیان پکې شامل دي پیدا کوي. سرکاریا په پوستکي کې ننوزي او د پوستکي لاندې سیست جوړوي دننوتلو ځای یې اکثرا د ماهیانو د لامبو پرې وي. پرازیت په سیست کې انکشاف کوي. د دیرش تر پنځه دیرشو ورځو په جریان کې په سیست کې میتاسرکاریا انکشاف کوي چې کولای شي تر دریو کالو هم ژوندی پاتې شي. کله چې ماهي په خام ډول د اخرنی کوربه له خوا وخورل شي نو داخري کوربه په کولمو کې سیبست خلاصیږي او پرازیت د Ductus choledochus له لارې د ځیگر صفاوي نلونو ته رسیږي چې د دری تر څلورو هفتو وروسته پرازیت بالغیږي. پرازیت خپله غذا زیاتره د کوربه د وینې څخه لاس ته راوړي. پرازیت کیدای شي په انسان کې تر اته نیم کالو پورې ژوندی پاتې شي. ددی گروپ بالغ چینجیان شفاف دي.

پاتوجنسي: د پرپیټنز مرحله ددریو تر څلورو هفتو پورې رسیږي. د مریضی علایم د پرازیت د تعداد پورې مربوط دي. چې د صفاوي نلونو د بندیدو پورې رسیدای شي چې د سخت زیږي عامل گړزي. او کیدای شي د ځیگر د سیروس او سرطان سبب شي. د انسان نه علاوه کیدای شي سپی او پیشوگان هم په دې مریضی اخته او دانسان له پاره دذخیروي حیوان یا Reservoir حیثیت هم ولري.

## بند لرونکي چينجي، کلاس سيستودا Klasse : Cestoda

ددې گروپ د طبقه بندۍ په باره کې چې کولمې نلري او پلن شکل لري مختلف نظريات موجود دي. خو اکثرا په دوه گروپو قبول شويدي چې په لاروي حالت کې په مختلف تعداد خنجکونه لري. په اقتصادي او طبي لحاظ کم اهميته گروپ چې سيستوداريا Cestodaria نومېږي او د لسو خنجکو لرونکی دی چې د decanth په نوم هم يادېږي په داسې حال کې چې دوي سيستودا Eucestoda لارو شپږ خنجکي لري چې له دې امله د hexacanth نوم ورته ورکړل شويدي. همدارنگه سيستوداريا بندي شکل او سکولکس Scolex يا سر نلري او نرېنځی شکل لري.

مونږ د سيستوداريا د تشریح څخه له دې امله چې اهميت يې کم دی تيرېږو او يواځې دوي سيستودا گروپ ته مخه کوو.

## کلاس لاندی ويسيستودا Unterklass Eucestoda:

دا گروپ په ټولو فقاريه حيواناتو کې د کولمو د پرازيت په شکل ژوند کوي. د وجود تقسيمات يې په لاندې ډول دي:

◀ سر يا Scolex چې د خنجکو په کومک ځان د کوربه په وجود کلکوي

◀ د نمو برخه يا Proliferationszone

◀ د بندو يوه لړۍ يا Strobila برخه چې هره يوه يې د درې يا پنځو څخه

تر څلوروزرو پورې بندونو يا پروگلوټيدونو Proglottids څخه جوړه شويده. په پروگلوټيد کې هميشه مشابه جوړښتونه تکرارېږي. خو د پخواني درجه يي يو د بل څخه فرق لري. چې زاړه يا پخواني يي د وجود په اخرنۍ برخه کې واقع او د وجود څخه جدا کېږي. پداسې حال کې چې هر پروگلوټيد مکمل بنځينه او نارينه جنسي جوړښتونه لري خو عصبي سيستم ، طولاني يا اوږده عضلات او اطراحي سيستم په ډيره پيمانه د سکولکس په برخه کې واقع وي.

سر يا **Scolex**: د ټول وجود په تناسب چې په بعضې انواعو کې يي اوږدوالی شو مترو ته رسېږي، سر ډير کوچنی دی. يعنې لويوالی يي شو مليمتره دی. سکالکس په ويسيستودا کې دکوربه په وجود دځان نښلولو لپاره خاص جوړښتونه لري چې دا جوړښتونه د پرازيت په طبقه بندۍ يا سيستماتيک کې مهم رول لري. دا جوړښتونه داخري کوربه د کولمو په جدار باندې د پرازيت دځان نښلولو وظيفه په غاړه لري.

لمړۍ: چوشکي غارونه يا **Bothrium**: په **Pseudophyllidea** گروپ کې په جوړه اي شکل موجود دي. دا غارونه اوږده شکله دي چې ضعيف عضلات لري.

دوهم: چوشکونه يا **Acetabula**: په **Cyclophyllidea** گروپ کې څلور چوشکونه چې جاني او سيمتريک يعنې منظم شکل لري چې دقوي عضلاتو لرونکي دي په **Proteocephala** گروپ کې يو پنځم چوشک هم موجود دی چې د سکولکس په اخري برخه کې واقع دی.

درېم: خلطم (**Rostellum**) (**Rostrum**): په **Cyclophyllidea** گروپ کې سکولکس يو جوړښت لري چې خارج طرف ته راوتلی شي. په بعضې انواعو کې دغه جوړښت د يوې غنچې په شکل اغزي لري لکه په **Taenia solium** کې او په بعضو کې دغه اغزي موجود نه وي لکه په **Taenia saginata** کې. په نورو انواعو کې سکالکس مختلف

جوړښتونه لري چې په کوربه کې د ځان نښلولو د پاره استعمالیږي.

د نمو برخه Sprossungszone: دا برخه چې یوازې شو ملیمتره اوږده ده داسې یوه برخه ده چې په هغې کې د پروگلوټید جنیني اساس ایښودل کیږي له دې ځایه ستروبیلا شروع کیږي، نوو تحقیقاتو ښودلې چې دلته ډیر حجرات اساسي حجرات دي چې مختلف حجرات ترې نمو کولای شي.




د بندونو قطار Proglottiden: په ویسیستودا کې د بندونو تعداد مختلف دی. مثلاً په *Echinococcus granulosus* کې درې بندونه او په *Diphyllobothrium latum* کې تر څلورو زرو پورې بندونه موجود دي.

په هر پروگلوټید کې اقلا یو جوړه مونث او یو جوړه مذکر جنسي جوړښتونه او اطراحي سیستم موجود دي. د پروگلوټیدونو په منځ کې کوم جدا کوونکی دیوال موجود ندی خو د وجود څخه د پروگلوټید د جدا کیدو په وخت کې یو تگومنت جوړیږي چې هغه د باقي حیوان څخه جدا کوي او خارج ته انتقالیږي. په پروگلوټید کې لمړی نارینه او بیا ښځینه جنسي جوړښتونه پخپلې یعنی Protandrisch دي او څرنگه چې دواړه جنسونه په یو حیوان کې موجود دي نرنښخي یعنی هیرماډروفیت Hermaphrodit دي.

مذکر جنسي جوړښت: په اکثره انواعو کې خصی د یو *Kompakt* یعنی یو ځای جوړښت په شکل نه بلکې د کوچنیو پوکنیو په شکل په پرانسیم کې منتشرې او په هر پروگلوټید کې موجودي دي. د هرې خصي څخه یو کوچنی نل چې د *Vas efferens* په نوم یادېږي سرچینه اخلي چې بیا یو لوی نل *Vas deferens* کې ختمیږي. چې بیا دیو سیروس کڅوړې یا *Cirrusbeutel* له لارې په سیروس *Cirrus* کې ختمیږي. دا سیروس د خارج طرف ته قاطیدای شي او د جنسی یو ځای کیدو یا *Kopulation* په وخت کې د بل پروگلوټید په *Vagina* کې داخلېږي. د ډیرو پرازیتونو د موجودیت په



حالت کې د پردې بلاربولو خو په هغه چينجيانو کې چې يواځې يو چينجی موجود وي خپل بلاربول په داسې شکل چې د پرازيت يو پروگلوټيد بل هغه بلاربوي. په بعضې انواعو کې حتی په يو پروگلوټيد کې بلاربول ليدل کېږي چې په داسې حالت کې دواړه جنسي مواد د يو سوري څخه خارجېږي. د سيستودا سپرمونه د يو تار شکل لري چې پاسنۍ برخه يې لږ څه پندې ده. او په قوده قوده شکل د واس ډيفرينس او سيروس په کڅوړه کې پراته دي. د جنسي سوري موقعيت او لويوالی په مختلفو انواعو کې مختلف دی يعنې کله جانبي بڼې يا چپ طرف ته او کله د وجود د بطني برخې په مرکز کې موقعيت لري.



شیمیاتیکی رسم خلیرویشتم شکل: د Eucestoda د جوړښت

ستروویلا a. مخکینی. برخه b, د پاخه پروگلو تید طولی مقطع c, د یو پروگلو تید جوړښت d, د یو پروگلو تید عرضی مقطع e. په مختلفو انواعو کې پوڅ پروگلو تید f-h: تاینیا زولیموم f, تاینیا ساگیناتا g او د ایفیلوبوتریوم لاتوم h. د پوستکي مقطع ا.

زیر مواد D, شاتنی اطراحی نلونه DE, شاتنی بطني یا dorsoventral عضلات DM, د اطراحی کانالونو عرضی ارتباطات EQ, اطراحی کانال EX, د تاري عضلاتو طبقه FI, د خصیو پوکۍ H, د اغزو غنچه K, طولی عضله LM, کوچنی وینتته MT, عصب N, اووتیب OT, تخمدان OV, پروگلو تید یا بند P, جنسي جوړښت PA, پرانسیم حجرات د پوستکي سره نښتي PZ, خاظم R, حلقوي عضله RM, سر یا سکالکس S, روډونکی جوړښت SN, د نمو زون یا برخه SP, سینسیسیال یا syncytial غش, تگومنت یا پوست T, رحم U, بطني اطراحی کانال VE, د مني نل یا Vas deferens, واگینا VG.

مونث جنسي جوړښت: لکه په دایگینیا تریما تودا کې د ویسیستودا مونث جنسي جوړښت لاندې برخې لري:

◀ تخمدان Ovar یا Germarium

◀ زیر موادو گبینی Dotterstock یا Vitellarium

◀ اووتیب Ootyp

◀ میلشي غدوات Mehllischer Drüsenkomplex

◀ رحم Uterus

ددې په خوا کې یو خاص ډولې Vagina شته چې یو خلطه شکلی جوړښت لري چې د Receptaculum seminis په نوم یادېږي او سپرم پکې ذخیره کېږي. تخمدان همیشه یوه دانه موجوده ده ځواکثرا په دوه برخو تقسیم دی. د زیر موادو گبینی Dotterstock په بعضو کې جوړه ای کله غیر جوړه ای کله کوچنی او په بعضې انواعو

کې له منځه تللی دی. اووتیپ چې زیات وکم مرکزي شکل لري همیشه موجود او د میلشي غدواتو پواسطه احاطه شویدی. د اووتیپ څخه رحم Uterus سرچینه اخلي چې په ځوانو پروگلو تیدونو کې د یوې کڅوړې شکل لري. خو په پخو پروگلو تیدونو کې د هگيو څخه ډک وي او ځانگې لري او کله ډیر لوی وي. درحم جوړښت په مختلفو انواعو کې فرق لري او ددوي په سیستماتیک یا طبقه بندۍ کې ترې استفاده کیږي.

د هگۍ جوړیدل: د رحم څخه هگۍ خارج او په اووتیپ کې د سپرم سره چې په ریسیپتا کولوم سیمینیس کې موجود دی، القاح کیږي او زایگوت جوړیږي. د زایگوت گردچاپیره زیر مواد ځای نیسي او دهغی په شاوخوا یو پوستکی منځ ته راځي (پوستکی کیدای شي ډیر نری او کله موجود هم نه وي) او بالاخره هگۍ جوړیږي. د هگۍ انکشاف په مختلفو سیستمونو کې سره فرق لري خو په عمومي ډول په دوه گروپونو تقسیمیږي.

لومړۍ هگۍ: د یو کلک پوستکي لرونکې چې یو Operculum یا سرپوش هم لري. په هگۍ کې جنیني انکشاف د وجود په خارج کې صورت نیسي. لکه په Pseudophyllidea کې.

دوهم: هگۍ بې پوستکي او یا د نري پوستکي لرونکې چې سرپوش نلري. په دوي کې جنیني انکشاف حتی په رحم کې شروع کیږي. بعنې په هگۍ کې یو لارو د انکوسفیر Oncosphaera په نوم جوړیږي چې بیا هغه یو نازک دیوال خپل گردچاپیره جوړوي. په هر صورت د سیستمونو هگۍ د محیطي ناملايمو شرایطو په مقابل کې ډیر مقاومت لري. مثلاً په گیدره کې د موجود چینجی Echinococcus multilocularis هگۍ تر دوه کالو پورې مصابونکې پاتې کیدای شي. دا هگۍ کولای شي تر منفي خلیرویشته درجو پورې ژوندۍ پاتې شي. خو په منفي اتیا او مثبت شپیته درجو ساتني گرید کې خپل مصابونکې خاصیت له لاسه ورکوي.

خارجي پوست يا **Tegument**: بالغ ويسیستودا Eucestoda د کوربه په کولمو کې د پرازیت په شکل ژوند کوي چې د سکولکس ، خنجکو او چوشکو پواسطه هلته ځان کلکوي. څرنګه چې پرازیت کولمې نلري ټول غذايي مواد د وجود د خارجي سطحې له ليارې اخلي. له دې امله د پوستکي Syncital Tegument خارجي طرف د خاصو جوړښتونو لرونکی دی. چې د خارجي سطحې د لويوالي سبب ګرځي. دا جوړښتونه د Mikrotrichen په نوم يادېږي چې د نورو حیواناتو د کولمو د Mikro villi سره د مقایسې وړ دي. دا جوړښتونه په خپل وار ديو سطحې پوښ يا Surface coat پواسطه احاطه شوي چې پرازیت د کوربه د معافيوي سیستم د حملې څخه ساتي. ددغه تګومنت لاندې يوه Basal lamina يوه طبقه موجوده ده چې د هغې له منځ څخه يواځې د پرانثسيم حجراتو څوکې خارج خوا ته تيرېږي. څرنګه چې ددې حجراتو هستې په لاندې برخه کې دي نو د مايکروسکوب ليدلو په وخت کې د يو داخل خوا ته ننوتلي اپيتيل غونډې ښکاري. دغه د پرانثسيم حجرات د وجود پواسطه د غذايي موادو اخيستل اسانوي. د سيستودا په تګومنت او پرانثسيم کې ځينې منرالونه لکه کلسيم، مګنيزيم او فسفات موجود دي چې خصوصا په لاروي حالت کې زيات ليدل کېږي ددې منرالونو وظيفه تر اوسه صحيح معلومه نه ده خو فکر کېږي چې د نمو په وخت کې د ضروري ايونونو يوه ذخيره او همدارنګه د ميتابوليزم په نتيجه کې د توليد شوو تيزابونو د څنډې کولو لپاره استعمالېږي. د Basal lamina لاندې حلقوي، طولاني او dorso-ventral يعنې دشا څخه بطن خوا ته عضلات موجود دي. چې ددې عضلاتو په کمک ددې چينجيانو مشخص حرکات منځ ته راځي. حتی ددې عضلاتي حجراتو د انقباض په نتيجه کې بندونه يعنې Proglottid په اکثيف شکل د وجود څخه خارجېږي او هم دا عضلات د وجود څخه دهګۍ په خارجولو کې کومک کوي.

اطراحيه سیستم: دا سیستم د پروتونيډونو څخه جوړ يو سیستم دی، چې په هر يو پروګلوتيد کې يې انتهاي حجرات موجود دي چې د Cryptocyten په نامه يادېږي او

خپل فلتر شوي مواد په جانبي اطراحي نلونو کې تشوي. په Taeniidae کې دغه جانبي نلونه په جوړه اي شکل موجود دي چې يو بطني يا خيټنی او بل هغه يي ظهري يا شاتنی دی. چې بيا د سر په برخه کې د عرضي نلونو پواسطه يو له بل سره وصل شويدي. د هر پروگلوتيد په لاندینی. برخه کې يو بل لوی عرضي بطني نل موجود دی چې په اخري پروگلوتيد کې توييږي په داسې حال کې چې ظهري نل خارج ته مجرا نلري ډير محققين په دې عقیده دي چې په دوي کې مایعات د سر يا Rostrum خواته حرکت کوي.

عصبي سيستم: عصبي سيستم د يوې عصبي غوټی Ganglion او په سر کې اکثرا د شپږو نلونو څخه چې په طولي شکل امتداد لري عبارت دی ددې طولي نلونو څخه دوه جانبي نلونه د مايکروسکوپ لاندې ډير ښه ښکاري په پرنسيب کې دا جوړښتونه دنورو پلنو چينجيانو سره مشابه دي خو د سر په برخه کې Cephalisatin ډير انکشاف کړی دی. يعنې لويوالی پکې راغلی دی.

## د Eucestoda وده:

د ويسیستودا وده د لارو څخه تر بالغ حيوان پورې د ميتامورفوز په شکل بې د نسل له تغيير څخه صورت نیسي. چې له دې امله د دايجینيا تريما تودا څخه ساده ده. خو لاروي مرحله يي په څو مختلفو منځنيو کوربه او کې صورت نیسي چې بيا داخري کوربه له خوا د منځني کوربه د خوړلو په نتيجه کې پرازيت اخري کوربه ته داخليږي. د کوربه بدلول اکثرا حتمي خو په استثنايي ډول اختياري دي. يعنې کيداې شي چې په دې حالت کې ټوله نمو يوازې په اخري کوربه کې تر سره شي. د کوربه انتخاب په دې چينجيانو کې يوازې د يو کوربه پورې منحصر نه دی بلکه مختلف کوربه مصاب کيداې شي. په هگۍ.

کې چې په پاسیف یا اکتیف ډول د بالغ حیوان څخه خارجېږي یو لارو انکشاف کوي چې د *Oncosphaera* په نوم یادېږي او شپږ څنځکونه لري. په ځینو گروپونه کې لارو وروسته له هغې چې هڅې او بو ته ورسېږي جوړېږي خو په ځینو نورو کې لارو د هڅې اچولو په وخت کې په هڅې کې موجود وي. په ځینو گروپونو کې د انکوسفیر لارو د وجود د پاسه سلیا لري چې له دې امله د کوراسیدیم *Coracidium* په نوم یادېږي. کله چې انکوسفیر د منځني کوربه لخوا وخورل شي نو د هغه انساجو ته داخلېږي او په دوهمي لارو کې د *Metacestoden* په نوم یادېږي چې دا په خپل وار په لاندې ډولو تقسیمېږي:

لمړې *Proceroid*: یو کوچنی اوږد شکل لارو چې شپږ څنځکونه لري او سکالکس پکې وجود نلري.

دوهم *Cysticeroid*: چې په غیرفقاریه حیواناتو کې د منځني کوربه په حیث انکشاف کوي. د یوې مخکنۍ برخې چې سکالکس لري او د یوې لکۍ څخه جوړ دی چې شپږ څنځکونه لري.

دریم *Strobilocercus*: یو بند شکلی جوړښت دی چې په اخري برخه کې یوه پوکنۍ لري.

څلورم *Cysticercus*: چې د پوکنۍ چینجی یا *Finne* په نوم هم یادېږي چې یو سکالکس لري. چې د مایعاتو په یوه کڅوړه کې پروت دي. دا جوړښتونه یواځې په فقاریه حیواناتو کې موجود دي. په نورمال حالت پکې تکثر منع ته نه راځي خو په ځینې پرازیتونو کې پکې یو غیر جنسي تکثر د غوټۍ یا *Spross* په شکل صورت نیولای شي.


پنځم *Polycercus*: دا د *Cysticercus* یو خاص شکل دی چې په ځینې کوربه او کې

منځ ته راځي چې د څو Cysticeroid مجموعه ده.

شپږم Coenurus: چې پکې د پوکنۍ په ديوال کې د غير جنسي تکثر په نتيجه کې څو دانې سرو نه يا Scolex منځ ته راځي.

اووم Alvioläre Cysten يا گردۍ پوکنۍ: دا ډيرې لوې پوکنۍ دي. د پوکنۍ ديوال سکالکس نه جوړوي بلکې داخل خوا ته لورنۍ پوکنۍ جوړوي چې په دوي کې بيا لمسنۍ پوکنۍ جوړيداي شي او د لوسنۍ پوکنيو په منځ کې سکالکس منځ ته راځي. لکه د سپي او گيدرې د کدودانې په چينجي کې.





پنجه و بیستم شکل: د Eucestoda د لارو شیماتیکی رسمونه

بو تریوم یا رودونکی کنده BO, د بچیانو کپسول BR, سلیا Cl, لاندینی پوکنی EB, خنځگونه HK, جنینی قشر K, طبقه ایی قشر LS, اونکو سفیر ON, پروتوسکالکس PR, سکالکس SC, رودونکی جوړښت SN تیگومنت TG

د پروسرکویډ او سیستوسرکویډ ځینې نور شکلونه هم انکشاف کوي چې دا لاندې نومونه ورته ورکړل شوي دي:

پلیروسرکویډ Plerocercoid: په Pseudophyllidae کې د پروسرکویډ څخه منځ ته راځي چې یو سکالکس او بندداره ستریبیلا هم لري چې د Sparganum په نوم یادېږي او انساج یې د پوستکي لاندې تر لس سانتی مترو پورې اوږدېدلای شي.

تیترا تیریډیم Tetrathyridium: یو ډیر تعداد سکالکسونه چې د یوې لنډې سټې لرونکې دي چې د غیر جنسي زیاتوالي یو واسطه د Cysticercoid څخه منځ ته راځي.

د ویسیستودا دودې دوران هغه وخت ختمیږي چې چینجی داخري کوربه یو واسطه د خولې له خوا واخیستل شي او بیا په هغې کې بالغ چینجی ته انکشاف وکړي په ځینو چینجیانو کې کله د Plerocercoid د Neotenie یا Progenesis له لارې جنسي بلوغ ته رسیږي. خو په ځینو نورو کې جنسي او غیر جنسي تکثیر منځ ته راځي چې دلته د یو نسلي تغییر یا Metagenesis څخه غږیدلای شو.

### د Eucestoda طبقه بندي:

اردرد Ord : Tetraphyllidea: سکالکس د دوه تر څلورو پورې بوتریډیا لري اخري کوربه یې یوازې غضروفي کبان دي.

اردرد Ord : Trypanorhyncha: سکالکس د دوه تر څلورو پورې بوتریډیا او څلور خنجک لرونکي خلطمونه لري. اخري کوربه یې یوازې کبان دي.

اردرد Ord : Pseudophyllidea: سکالکس د جانب له خوا نری شوې چې یو بطني او یو خلفي بوتریډیوم لري. رحم یې په بطني او منځنۍ برخه کې خپل جدا سوری لري. له دې امله په هر پروگلوتید کې درې جنسي سوري موجود دي. د زیږو موادو خلطې په

پراتشیم کې منتشرې دي. دوران يې په دريو کوربه او يعنې ابتدايي چنګاښونو، هډو کينو ماهيانو او گرم وينو حيواناتو کې صورت نيسي.

اردر Ord : Proteocephala : سکالكس څلور اسيتابولا لري خو کله کله يوه پنځمه دسر په جانبي برخه کې هم لري. نور د تترافيليدا په شان دې اخري کوربه يې د سيندونو ماهيان ، چنګښي يا Amphibia او څښوونکي يا Reptilia دي.

اردر Ord : Cyclophyllidea : سکالكس د څلورو اسيتابولا او اکثرا د خنګونو د يوې غنچې Rostellum لرونکی دی. زير مواد يوځای يا په Kompakt شکل موجود دي چې اکثرا د پروگلوټيد په اخري څنډه کې واقع وي. جنسي سوري اکثرا جانبي خوا ته وي. پروگلوټيد يو پرېل پسې د لاندې خوا څخه پخپرې او په ځانګړي شکل د وجود څخه جدا او غورزول کيږي. اخري کوربه يې مرغان او تي لرونکي حيوانات دي. ددې ګروپ څخه دوه دانې Pseudophyllidea او Cyclophyllidea مطالعه کوو:

### اردر پسویدو فيليديا Ord : Pseudophyllidea

ددې ګروپ مهمه فاميلي د Diphyllbothriidae او ددې فاميلي مهم جنس د Diphyllbothrium جنس دی. د دې جنس شپاړس انواع په هغه گرم وينو يا homiotherm حيواناتو کې چې ماهيان خوري پيدا کيږي. ددې ګروپ د کوربه انتخاب ډير عام دی په دې معنی چې ددوي څخه اوه نوع يې هم په مارغانو او هم تي لرونکو، پنځه نوع په تي لرونکو او څلور نوع يې يوازې په مرغانو کې پيدا کيږي. په لسو انواعو کې يې Möve يا ټيوټيوکی د اخري کوربه په حيث د مختلفو براعظمونو تر منځ ددې پرازيت د انتقال سبب کيږي. يوازې تي لرونکي د Diphyllbothrium latum اخري کوربه تشکيلوي.

د انسان د ماهي چينجی، د فييلو بوترييوم لاتوم

**:Dipyllobothrium latum (linne1785 , Lühe 1910 )**

دا پرازیت چې Kosmopolitt دی یعنی په ټوله دنیا کې موجود دی په انسان، سپي، گيدر، پيشو، خوگ، خرس، داو بو سپي او نورو ماهي خوړونکو کې پیدا کېږي.

مارفولوژي او وده: دا چينجی د شپږو څخه تر دولسو مترو پورې اوږدېدلای شي او په دې لحاظ تر ټولو اوږد سيستودا دی چې د بندونو تعداد يې تر درې زرو پورې رسيدلای شي. خوکه د پرازیتونو تعداد د کوربه په وجود کې زیات وي نو اوږدوالی يې کم وي. یعنی د محيطي شرايطو لکه د غذايي موادو او ځای کموالي سره ځان ته تطابق ورکوي. سکالکس يې اوږدډولۍ دی. د چينجی وجود قوي اوږده عضلات لري چې له دې امله ښه حرکت کولای شي. پروگلوټيدونه د شپږسوم پروگلوټيد څخه لاندی بلوغت ته رسيدلای وي یعنی جنسي مواد توليدوي. په هر پروگلوټيد کې نارينه او ښځينه جنسي جوړښتونه موجود دي. چې هر يو يې دورځې زردانې هگی. توليدوي چې دا هگی بیضوي شکل او سر پوښ لري. په يو نهمه متره اوږد چينجی کې د هگیو تعداد دورځې د يو څخه تقریبا تر څلورو ملیونو پورې رسيږي. هگی د خپل انکشاف لپاره اوبو ته ضرورت لري په اوبو کې د هگیو څخه د محيطي حرارت او نورو شرايطو مربوط د لسو ورځو څخه تر څو هفتو پورې يو لارو چې Coracidium نومېږي راوځي. دا لارو په پلانکتون يا اوبو نباتاتو کې پاتې کېږي دلارو د ژوندي پاتې کيدو دوره په دولسو درجو کې د اوه تر نهو ورځو او په دوه ويشت درجو کې دوه ورځو څخه لږه ده. د پرازیت لومړی کوربه يا لومړنی منځنی کوربه يو پلانکتون خوړونکی چنگاښ چې د Copepoda د گروپ پورې مربوط او نوع يې Cyclops strenuus او ځينې نور دي. ددوي په وجود کې Embryophore هضم اولارو د وجود په خاليگاه کې ازادېږي چې دلته په Proceroid بدل او په انتظار

کې پاتي کيږي. (دغه پروسيروکويد نيم سانتی متر اوږدوالی لري). تر څو يو کوچنی ماهي دا چنگاښ وخوري په دې ماهي کې Procercoid د وجود اخرنی برخه له لاسه ورکوي او د خپلو غدو پواسطه د کولمو د دیوال له لارې د ماهي عضلاتو ته رسيږي. د شپږو هفتو وروسته په يو Plerocercoid بدليږي چې د يو څخه تر درې سانتی مترو پورې اوږدوالی لري. کله چې دغه لارو اخرنی کوربه ته ورسيږي هلته بلوغت ته رسيږي. په *D. norvegicum* کې دوه منځني کوربه حتمي دي.


په *D. latum* کې هم اکثرا يو يا څو منځني کوربه برخه لرلای شي مثلا کله چې کوچني ماهيان د لویو ماهيانو له خوا وخورل شي. کله چې Plerocercoid د اخري کوربه هضمي سیستم ته داخل شي. د نړيو کولمو په جدارونو ځان نښلوي او په دريو هفتو کې يو بالغ چينجي ته وده کوي. *D. latum* د نړۍ په سږو برخو کې هم زیات پیدا کيږي ددوي هگۍ د یخۍ په مقابل کې ډیر مقاومت لري. په کنگل کې تر دوه کالو پورې هم نه خرابيږي. څرنگه چې مختلف ماهيان د کوربه په حیث استعمالوي نو له دې امله د ځمکې په هره برخه کې پیدا کيږي. په الاسکا کې چې پنځوس په سلو کې سپي پرې مصاب دي د انسانانو لپاره د یوې رینستینې Zoonose حیثیت لري یعنې د سپو څخه انسانان پرې مصابيږي. دا پرازیت کیدای شي تر شلو کالو پورې په کوربه کې ژوندی پاتې شي.

پاتوجنسي: مریضان زیاتره د کولمو د درد څخه شکایت کوي. او ځانونه ډیر ستړي احساسوي. همدارنگه الرژیکي عکس العملونه او د وینو د سپینو کرويواتو زیاتوالی په کوربه کې لیدل کيږي. د ډیر وخت مریضۍ تیرولو وروسته په کوربه کې د Vitamin B<sub>12</sub> کمبود له امله Pernizöse Anämie یعنې د وینې کموالی منع ته راځي.

تشخیص: هگۍ په غایطه موادو کې موندلای شي. د ټولو سیستمونو پر خلاف چې په انسان کې پیدا کيږي ددې نوع هگۍ یو سرپوش لري.

تداوي: Niclosamid او د Vit. B12 پيچکاري او Praziquantel

وقايه: د ماهي غوښه بايد او مه ونه خوړل شي. هگۍ په منفي لس درجو کې له منځه ځي.



شمېرويشتم شکل: د ديفيلو بوتريوم لانوم د ژوند دوران:

بالغ Ad, کوراسيديم Cor, پليروسيرکويد Ple, پروسيرکويد Pro

د **Spirometra** جنس د **Sparagnosis** د مريضۍ عامل:

دا مريضۍ په انسان کې لږه خو په ټوله دنيا کې پيدا کيږي. خو اکثرا په جنوب

شرقي اسيا کې ليدل کيږي. Sparagnum په انسان کې موجود Plerocercoid ته وايي چې په اوږده يا تاو شوي ډول تر ديرشو سانتيمي مترو پورې طول لري. چې کله غير منظم شکل هم لري. دا پرازيت ددې يو مثال دی چې يو پرازيت يو غلط کوربه ته چې دلته دانسان خڅه عبارت دی داخليږي او د وجود په مختلفو برخو کې د پوستکي لاندې پيدا کيږي. Proceroid په Cyclops چنگاښ ، Plerocercoid په بالغو چينگښو او د هغوي په لارو او همدارنگه د اوبو په ځينو مارانو کې کې پيدا کيږي. بالغ پرازيت د غوښه خوړونکو حيواناتو په کولمو کې ژوند کوي. انسان کيداې شي د ناپاکو اوبو له لارې چې Cyclops پکې موجود وي. او يا د چينگښو د لارو د خوړلو له ليارې چې د اندونيزيا په ځينو برخو کې په ډيره مينه خوړل کيږي او يا دولسي طبابت له لارې چې د چينگښې خامه غوښه په خوړو يا مريضو سترگو ږدي، مصاب شي.

## اردر سيکلو فيليديا Ord : Cyclophyllidea

دا گروپ د مارغانو ، تي لرونکو او ځيني Reptilia يعنې څښيدونکو د کولمو پرازيت تشکيلوي د پرازيت انتخاب ډير محدود او يوازې يو کوربه مصابوي.

## فاميلي تاييني دای Fam : Taeniidae

ددي گروپ منځني کوربه تي لرونکي دي. دلته يوازې هغه پرازيتونه ذکر کوو چې په انسان کې د مريضۍ سبب گرځي.

د غواي د کدودانې چينجی، تينيا سگيناتا

:*Taenia saginata* (Goeze 1782)

ددې چينجی منځني کوربه غوايان او اخري کوربه انسانان دي. دا چينجی يوازې انسانان مصابوي. د کدودانې چينجی په نرو کولمو کې اوسپړي اوڅرنگه چې ډير اوږده دي هميشه په قات شوي شکل په کولمو کې موجود وي.

مارفولوژي او وده: اسکالکس د يونيم تر دوه ملي مترو پنډوالی لري. چې څلور اسيتابولا لري. خو د خنچکو غنچه نلري. د پرازيت اوږدوالی د پنځه تر لس متره او پنډوالی يې دولس ملي متره او د پروگلوتيد تعداد د يونيم زر تر دوه زره پورې رسپړي. پروگلوتيد د پاس څخه لاندې خوا ته غتپړي. چې لاندیني هميشه په ځانگړي شکل د چينجی د وجود څخه د ورځې د پنځه تر اووه په تعداد جدا او بيا د کوربه د وجود څخه خارجپړي. د وجودد منځنی برخې څخه بالغ پروگلوتيد شروع کيږي پاسني پروگلوتيد بالغ نه دي. رحم په مرکزي برخه کې د يوې کڅوړې په شکل موقعيت لري. تخمدان په دوه برخو تقسيم شويدي. جنسي سوری د پروگلوتيد په جانبي يعنې څنگنه برخه کې موقعيت لري. په يو پوخ پروگلوتيد کې چه لويدلو ته آماده وي تر ديرش زره پورې هگی. موجودې وي چې دا هگی. په رحم کې چې د پنځه لس څخه تر پنځه ويشت پورې څنگني يا جانبي بناخونه لري پرتې وي. نور ټول جوړښتونه کوچني شوي خو يوازې اطراحي سيستم او قوي عضلات په خپل ځای پاتې دي. چې ددې عضلاتو په کومک د وجود لاندیني برخه ډيره متحرکه ده. اکثره هگی. وروسته تر هغې د پروگلوتيد څخه خارجپړي چې کله پروگلوتيد د کوربه د وجود څخه وتلی وي. هگی. لږڅه بيضوي شکل لري. په هگيو کې موجود انکوسفير د څلورو ورځو د باندې پاتې کيدو وروسته مصاب کوونکی دی. کله چې دا هگی. د منځني کوربه يعنې غواي معدې ته ورسپړي د معدې د انزایمونو په کومک د هگی. خارجي قشر منحل او د هگی. داخلي قشر د انکوسفير له



خوا دداخل څخه منحل کيږي. د هگۍ څخه راوتلی انکوسفير د کولمو په ديوال کې نوزي چې بيا د Pfortader System يا قناوي سيستم له لارې د وينې لوی دوران ته داخلېږي چې بيا دوينې د جريان پواسطه د يو څخه تر ديو ورځو په موده کې د زامې يا جاملې، حجاب حاجز او همدارنگه د مری اوزره عضلاتو ته رسېږي. چې په څلورو مياشتو کې يو قوي Cysticercus ته انکشاف کوي. دا يوه سپين رنگه پوکڼۍ ده چې د څلورو تر نهه ملي مترو قطر لري. او يوه سپين رنگه مايع لري چې سکالکس پکې ليدل کيږي. دا يوه د انتظار مرحله ده چې تر دوه کالو پورې دوام کولای شي او پس له هغې د منځه ځي. خو کله چې يو مصاب کوونکی سيستي سیرکوس د انسان هضمي سيستم ته ورسېږي. په هضمي سيستم کې يې خارجي قشر له منځه ځي او پرازيت فعالېږي. سکالکس د کولمو په جدار نښلي ددوه نيمو مياشتو په موده کې پرازيت بالغېږي او پروگليدونه خارجوي. د پرازيت د ژوند موده تر لسو کلونو پورې دوام کوي چې په دې موده کې د يو ميلاردو پورې هگۍ اچوي.

اپيدو مولوژي: په دې پرازيت مصابيدل د خامې غوښې د خوراک له لارې کيږي. په کنگل شوې غوښه کې هم سيستې سیرکوس تر ډيره وخته ژوندي پاتې کيدای شي. خو پرازيت په منفي دېرش درجو کې له منځه ځي.

پاتوجنسي: دوزن بايلل او د هضمي سيستم اختلالات له دې مصاب کيدو څخه منع ته راتلاي شي.

## د خوگ د کدو دانې چینجی، تینیا سولیم (Linne 1758): *Taenia Solium*

دا چینجی د دنیا په هغو برخو کې په انسانانو کې پیدا کیږي چې د خوگ غوښه په خام ډول خوړله کیږي. په اروپا کې چې د خوگ غوښه مایکروسکوپي معاینه کیږي تقریبا ددې پرازیت مصاب کیدل له منځه تللي دي. په هندوستان، مدغاسکر، منځنۍ امریکا، مکسیکو تر وینزویلا او اکوادور پورې دا پرازیت په انسانانو کې پیدا کیږي. په اسلامي هیوادونو کې چې په دیني لحاظ د خوگ د غوښې خوړل ناروا دي دا مریضي نشته. په دی پرازیت کې هم انسان د اخرنی کوربه حیثیت لري. خود مخکنی برعکس دلته انسان د منځني کوربه په حیث هم مصایبېږي. چې د هغې په نتیجه کې مریضي ډیره خطرناکه ده چې کیدای شي انسان د Autoinfektion په شکل خپل ځان په خپله مصاب کړي. د *T. Solium* د خوگ *Finne* د *Cysticercus Cellulose* په نوم یادېږي.


مارفولوژي او وده: دلته یوازې د *T. Saginata* سره د هغه په فرقونو رغیږو: دا پرازیت د دريو څخه تر څلورو مترو پورې اوږدوالی لري. پروگلوتید د مخکیني پرازیت دریمه برخه لوی دی. سکالکس په سر کې یو *Rostellum* لري چې دوه قطاره خنجکونه لري. چې د هر قطار تعداد یې څوارلسو ته رسیږي چې په متناوب ډول موقعیت لري او د پاسني قطار خنجکونه یې کوچني دي. تخمدان یې درې برخې لري. رحم د پنځه تر دوولسو جانبي بناخونه لري. پروگلوتیدونه څو دانې یو له بل سره تړلي د وجود څخه د باندې غورزول کیږي او ښه حرکت نشي کولای. هگی یې دایروي شکل لري.

اپیدیمولوژي: د اپیدیمولوژي له لحاظه خوگ مهم دی. اوسنی انسان د منځني کوربه په حیث دومره اهمیت نلري ځکه چې د خوگ غوښه ددې مریضي په انتشار کې مهم رول لري. ددوي سیستې سیرکوس د *T. Saginata* څخه د یخني په مقابل کې زیات مقاومت لري. د اپیدیمولوژي له لحاظه د خوگ دا خاصیت چې دانسان غایطه مواد

خوري هم ډير مهم دى چې له دې لارې خوگان مصاب كيږي. په انسان کې د سيستي سیرکوس خطر ډير جدي دى ځکه چې پخپله هم ځان مصابولاي شي.

تشخيص: په غايظه موادو کې د هگيو پيدا کول مشکل دي. ځکه چې د پروگلو تيد څخه د کوربه په کولمو کې هگي نه خارجيږي. بايد پاخه پروگلو تيدونه موجود وي چې د هغوي څخه هگي د خاصو ميتودو په ذريعه لکه د رنگولو ميتود له لارې دنورو هگيو څخه فرق وشي. ددې هگيو سره بايد په لابراتوار کې احتياط وشي ځکه چې انسان ترې مستقيما مصابيدلای شي.

د تائينيا سوليم سيستي سیر کوسونه چې د سيستي سیرکوس سيلولوزاي په نوم هم ياديږي او په خوگ او انسان کې انکشاف کوي د تائينيا ساگيناتا برعکس نه يوازې په عضلاتو بلکې د وجود په نورو برخو لکه حجاب حاجز ، چنغړک ، زړه ، لمفاوي غدواتو او همدارنگه په مغز او د سترگو په گاتي کې پيدا كيږي. کلينيکي نښې يې مختلفې دي او په دې پورې اړه لري چې د وجود په کوم ځاي کې موقعيت لري. په مغز کې د هغوي موجوديت خطرناک دى. ځکه کيداى شي د مغز په حساسو برخو فشار راوړي او هغه د کاره وباسي. سيستي سیرکوسونه که د وجود په کوم حساس ځاي کې واقع نه وي ديو څه وخت وروسته له منځه ځي.



اوه ويشتتم شكل

د تائينيا ساگيناتا 1.1-5.1/ و تائينيا سوليموم 1-5 د ژوند دوران په شيماتيک شکل:

1.1.1 د بالغ چينجي سکالکس دانسان يعنې اخري کوربه په کولمو کې

2.2.1 پاخه پروگلویتیدونه په غایطه موادو کې خارجیري چې سپین رنگ لري، یو ساتني متر اوږده او متحرک دي

3.3.1 د پروگلویتید د باندیني دیوالونه له منځه ځي، هگی چې اونکوسفیر پکې موجود دی د رحم څخه خارجیري غوايي او خرس د منځني کوربه او په حیث دغه هگی د ونیوله لارې اخلي

4.4.1 په کولمو کې د اونکوسفیر لارو خارج او د کولمو په دیوال کې داخلیري او بیا د وینې د جریان له لارې مختلفو غړو خصوصاً عضلاتو ته داخل او په سیستې سرکوس **Cysticercus** بدلیري چې په یوه پوکښې کې وي او د فینې **Finne** په نوم یادیري. په دې مرحله کې سکالکس د داخل خواته راقات شوي لیدل کیږي

5.5.1 د خامی یا نیمه خامې غوښې د خوړلو په صورت کې چې سیستې سرکوس ولري. داڅو کوربه یعنی انسان وجود ته داخل او په بالغ چینجی بدلیري

که چیرې یو انسان د تاینیا سولیوم هگی، مثلاً د سبزجاتو له لارې وڅوري او دا هگی په مغز کې ځای ونیسي یوه ناروغي ترې پیدا کیږي چې د **Neurocysticercose** په نامه یادیري چې حتی د مرگ سبب کیږي

پوکښې **BL**، امبریفور **EB**، اطراحی کانالونه **EX**، جنسي جوړښت **GP**، د اونکوسفیرا خنجکونه **HO**، اونکوسفیرا **ON**، پاسنی د خنجکونو غنچه **RH**، سکالکس **SC**، رودونکی جوړښت **SU**، رحم په هگیو **UE** پک

## دایشینو کوکوس **Echinococcus** جنس:

دا ډیر واړه سیستودا دي. چې اکثراً په سپي ډوله حیواناتو یعنی **Caniden** او کله کله په پیشو ډوله حیواناتو یعنی **Feliden** په نړیو کولمو کې ژوند کوي. چې ستروبیلايي د دریو تر پنځه او پورې پروگلویتید لري. سکالکس یې د چنگکونو او چوشکونو لرونکی دی. منځني کوربه یې سم لرونکي حیوانات او مورک ډوله حیوانات دي. متاسفانه کیدای شي انسان هم د منځني کوربه حیثیت ولري. ددې جنس یو مهم خاصیت

د بې کنترول له نمو او د هغې د Finne د غوټیو جوړولو څخه دی. که چیرې انسان مصاب شي نو ډیر خطرناک دي.


## د ایشینو کوکوس گرانولوسوس *Echinococcus granulosus* نوع:

په ټوله دنیا کې موجود او په مختلفو Subspecies (د نوع لاندې) او جغرافیوي قبیلو تقسیم شوي دي. اخري کوربه يې سپی د هغه وروسته شرمښ ، شغال ، کور او نور دي.

مارفولوژي او وده: بالغ پرازیت درې پروگلوټیدونه لري چې اخري يې بارداریا Gravid دی. اوږدوالی يې دوه تر پنځه ملي متره دی چې د پنځوس تر شپيته په سلم کې برخه يې اخرنی پروگلوټید تشکیلوي چې پکې د هگيو يو ډک رحم موجود دی چې يو جانبي جنسي دهلیز لري. منځني یعنی داخري نه پاس پروگلوټید د پخیدو په حال کې وي چې جنسي دهلیز او Cirrusbeutel يې په نیماي کې واقع دي. په دې پروگلوټید کې رحم دیوي کڅوړې په شکل وي. تخمدان داس دسم غونډې شکل لري. د اووتیپ لاندې زیږ مواد موجود وي. د څلویښتو تر پنځوسو د خصیې پوکنی. پکې موجودې دي. په پروگلوټید کې ځاني القاح صورت نیسي. هگی. يې د تاینیا سره مشابه دي. چې په پوخوالي کې نصابي رنگ دیوال لري. منځني کوربه يې بیا شخوندو هونکي حیوانات خصوصاً پسونه په دویمه درجه څوگ خو يو منځنی کوربه يې متاسفانه انسان هم دی.

کله چې د سپي یا کوم بل کوربه په غایطه موادو کې موجودې هگی. د یو منځني کوربه هضمي سیستم ته ورسیري د معدې د تیزابو او انزایمو پواسطه د امبریوفور خارجي دیوال یو څه سستیږي بیا په کولمو کې د القلي محیط او د صفراوي مالگو موجودیت د انکوسفیر لپاره د هگی. څخه د بیرون راوتلو نښه یا سگنال دی. انکوسفیر د اثنا عشر په

دیوال کې ننوزي او دویني د یو لوې رگ Vena portae له لارې په درې ساعتونو کې ځیگر ته داخلېږي. اکثرا همدلته پاتې کیږي خو کله د وینې د کوچني دوران له لارې سرېو ته رسېږي. د لسو فیصدو څخه په کمو حالاتو کې د وینې د لوې جریان له لارې کولای شي ټول غړي مصاب کړي لکه مغز. په دې غړو کې Hydatide ته انکشاف کوي، چې یوه ورو خو غیر محدوده نمو منځ ته راځي داسې چې په اول کې د جنیني حجراتو یو جوړښت منځ ته راځي چې د یو څخه تر دریو ملي مترو پورې قطر لري او منځ یې د یوې مایع څخه ډک وي. د زیاتې ودې په نتیجه کې دا جوړښت لویږي او د یو کلک دیوال پواسطه احاطه او یوه پوکنۍ جوړوي ددې پوکنۍ داخلي برخه د یوې نرۍ پردې څخه چې جنیني حجرات پکې موجود دي جوړه شوې چې بیا ددې پردې څخه داخل خواته ثانوي پوکنۍ منځ ته راځي.



اته ویشتم شکل: د سپی د کدوانې چینجی *Echinococcus granulosus*: د هیداتیدا د دیوال جوړښت او د ثانوي پوکنیو منځ ته راتلل. د ثانوي پوکنیو څخه د پروتوسکالکس غوټی، وهل د چپ څخه نښي خواته یا د ساعت د حرکت په مسییر د غوټیو مختلفې مرحلې رسم شویدي. PW - د پرازیت دیوال، GW - د کوربه انساج.

دا پوکنی، په خپل وار ځان د اولنۍ پوکنۍ د جدار څخه د داخل خواته جدا کوي. په ثانوي پوکنیو کې پروتوسکالکسونه *Protoscolecis* منځ ته راځي چې په حقیقت کې د بالغ حیوان د ځوانې مرحلې سره سمون خوري. دا پروتوسکالکسونه په اوله مرحله کې د یوې قاعدې پواسطه د ثانوي پوکنیو پورې نښتي وي. چې وروسته بیا ځانونه جدا کوي او په زرونو تعداد د ثانوي پوکنیو منځونه دکوي. دهیداتیدو د چاودلو په وخت کې دغه پروتوسکالکس چې د سیستی سیرکوس سره مقایسه کیدلای شي بیا دریمه درجه پوکنی منځ ته راوړي چې دا حالت دیوې سرطاني میتاستازې یعنی لورني سرطاني حجراتو سره چې سرطان د وجود نورو برخو ته انتقالوي، مقایسه کیدای شي.

دا هیداتیدا د میاشتو او کلونو وروسته د لاس د موتي حتی د یو ماشوم د سر په اندازه لویدلای شي. د ددې هیداتیدا یوه برخه شنې وي او نور پروتوسکالکس نه جوړوي چې په غوایانو کې نوي په سلو، په اسانو کې دیرش په سلو کې په خوگ کې شل او په پسه کې اته په سلو کې دغه شنې هیداتیدا تشکیلوي. په انسان کې اکثر هیداتیدا بادار دي. یعنی پروتوسکولکس جوړوي. د منځني کوربه هیداتید لرونکي غړي د هغه وخت راپدیخوا چې پروتوسکالکس ولري د اخري کوربه لپاره مصاب کونکي دي. کله چې اخري کوربه د هیداتید لرونکي حیوان غوښه وخورې. پروتوسکالکس په نړیو کولمو کې ازادېږي او د *Jejunum* جیجینوم په پاسنۍ او منځنۍ برخه کې د کولمو د دیوال پورې نښلي چې تقریبا دوه میاشتو وروسته یې هگی. په غایطه موادو کې موندل شویدي. ددې چینجی د ژوند موده د درې تر څلورو میاشتو پورې دوام کوي. د لاروې



هيدا تيڊا ته يي Unilokulär ځکه چې يوه لويه پوکښی جوړوي.

اڀيد يمولوژي: د E. granulosus په انتشار کې سپی مهم رول لري. خصوصاً هغه سپی چې د ښارونو او کلیو کې په کوڅو کې بې څښتنه گرځي. او خپله غذا د مسلخونو د پاتې شوو غوښو او نورو خامو چټلو غوښو څخه لاس ته راوړي. په بالقان هیوادونو کې دیرش او په هندوستان کې حتی پنځوس په سلو کې بې څښتنه سپی په دې پرازیت مصاب دي. ددې پرازیت هگی. ډیرې مقاومتې دي. بعنې په منفي پنځه ويشت درجو کې تر څو میاشتو او د کافي رطوبت په موجودیت کې په بیرون کې تر دوه نیم کالو پوري مصاب کوونکی دي. په انډیمي برخو کې چې دا مریضي پکې زیاته ده د سپیو وینسته خصوصاً د سر په برخه کې په دې هگیو ککړ وي، علت يي د سپی اجتماعي سلوک دی چې د بل سپی مقعد ته پزه ورنږدې کوي.

په ډیرو برخو کې پسه منځنی کوربه دې خو په الاسکا او شمالي امریکا کې یو نوع غرڅه یعنی Ren دغه رول اجرا کوي. دا په دې معنې چې ددې پرازیت مختلفې جغرافیوي قبیلې یا Stamm موجودې دي چې مختلفو منځنیو کوربه او ته ترجیح ورکوي. لکه خوگ، غوايي، پسه، اس، اوبن او غرڅه.

د پرازیت تشخیص: د غایطه موادو معاینه کول او په هغې کې د هگیو پیدا کول.

په انسان کې دخلطه اي يا **cystische Echinococcosis** پاتوجنسي:

په انسان کې ځیگر پنځه پنځوس په سلو، د خیتې خالیگا پنځه لس په سلو، سړی پنځه لس په سلو نور ارگانونه پنځه لس په سلو کې چې مغز او زړه هم پکې حساب دي په دې مریضي مصابېږي. د مریضي بهیر کلونه دوام کوي. ځکه چې د هيدا تيډ وده ډیره په ورو ده. د مریضي شکایتونه او عوارض هم وروسته پیدا کېږي. چې اکثر د مریضي د تشخیص په مرحله کې مریضي ډیره وړاندې تلې وي او تداوي يي مشکله وي. یعنی د

هیداتید مکمله جراحی او د هغې لږې کول مشکل حتې نا ممکن دي. مهم پرابلم د هیداتید د لویدو په نتیجه کې په مربوطه ارگان باندې د ځای د کمید له امله فشار دی. مثلاً که په مغز او زړه کې داسې یو هیداتید نمو وکړي کیدای شي د مغز او زړه پر مهمو برخو منفي تاثیر واچوي او هغه له کاره وغورزوي. د تداوي نه غیر په څو کلونو کې د مرگ سبب گزي. همدارنگه د هیداتید د د چاودیدلو په نتیجه کې ډیر زیات انتي جن خارجیږي چې دیو عمومي شوک یا Anaphylaktische Schock سبب گزي.

تشخیص په انسان کې: د وینې د معایناتو له لارې او همدارنگه د هیداتید د ځای او لویوالي د معلومولو لپاره د اکسري او اولتراسوند د معایناتو څخه کار اخیستل کیږي.

د مریضی مخنیوی یا Prophylaxe:

- ◀ په مسلخونو کې د پاکوالي مراعات او دولتي کنترول.
- ◀ په سپولاس نه وهل
- ◀ سپي ته باید ځیگر او سړي خام ورنکړل شي.
- ◀ د سپو ساتونکي باید سپو ته همیشه ددې چینجی دوا ورکړي.

د ایشینو کوکوس مولتی لوکولاریس نوع:


### **Echinococcus multilocularis ( Leuckart 1863) Vogel 1955**

دا پرازیت یوازې په شمالي نیمه کره کې خصوصاً په سایبیریا، الاسکا همدارنگه په سویزرلیند او د المان په غرنیو منطقو پیدا کیږي. ددې پرازیت اخیستی کوربه گیدر دی. خصوصاً سورگیدر، د بیخ گیدر، ابی گیدر په دوهمه درجه سپی او په دریمه درجه پیشو .د.

مارفولوژي او وده: یو بالغ پرازیت د څلورو تر پنځه ستروبیلا لري. اوږدوالی یې د یو څخه تر درې ملي مترو پورې رسیږي. د اوږدوالي څلویښت په سلو کې یې اخیستی ستروبیلا جوړوي. سکالکس یې په دوه قطارو کې تنظیم خنځکونه لري چې تعداد یې د دیارلسو تر اته لسو پورې رسیږي. او په متنناوب ډول واقع دي. د اخیستی څخه پاس بند یې د پخوالي په حالت کې وي. اخیستی بند چې باډار دی د منځنۍ برخې نه پاس جنسي سوری لري. همدارنگه په همدې بند کې د پنځه لس تر یو دیرشو پورې د خصیې پوکښی موجودې دي. په داسې حال کې چې دغه تعداد په *E. granulosus* کې د اته ویشت تر دوه پنځوسو پورې رسیږي.

منځني کوربه موربک شکلي یعنی *Nager* دي. خصوصاً صحرايي موربکان او د *Rhesus* بیزوگانې دي، خو متاسفانه انسان هم د منځني کوربه په حیث پکې شامل دی. دا پرازیت د نوي په سلو کې زیات په ځیگر کې ځای نیسي. ددې پرازیت *Finne* فینی د پخواني څخه دا فرق لري چې د کوربه په انساجو کې د نلونو په شان جوړښتونه ځغلوې چې د سرطان دداني سره د مقایسې وړ دي. د کوربه د انساجو طرف ته دیوال یې د هیداتید څخه نازک او د یوې چسپینکې مادې پواسطه یې داخلي خالیگا ډکه ده. لومړنی او ثانوي پوکښی پکې لکه د *E. granulosus* پشان نشي فرق کیدلای. د پروتو سکالکس تعداد پکې د مخکني پرازیت څخه کم دی خو دودې نورې مرحلې یې هغه ته

ورته دي. څرنگه چې په دې پرازیت کې د کوربه انساج د پرازیت د انساجو سره یو هوار دیوال نلري نو ځکه یې جراحي عملیات سخت دي. ځکه چې د پرازیت دانساجو د زخمي کیدو او د پروتوسکالکس انتقال د وجود نورو برخو ته ممکن کوي. دا پرازیت په کورنیو حیواناتو کې کم پیدا کیږي خو کیدای شي د کورنی پيشو پواسطه انسانانو ته انتقال شي. همدارنگه ښکاریان ددې مریضۍ د خطر سره مخامخ دي.



نه ويشتتم: د 1.8 Echinococcus granulosus او 1.1-1.7 Echinococcus multilocularis چې اخرنی کوربه يي سپی او گید په دي او همدارنگه د E.multilocularis لپاره پيشو هم دغه رول لوبوي

2.2.1.2. بالغ چينجيان د پروگلتيدو په تعداد او اوږدوالي او همدارنگه د رحم دشکل او اخرنی کوربه له امله سره مختلف دي

3.3.1 پروگلتيد په غايطه موادو کې خارجيږي

4.4.1 لارو لرونکې هگي د منځني کوربه له خوا د خولې له لارې اخيستل کيږي

5.5.1 منځني کوربه مختلف دي چې انسان هم پکې شامل دي او د يو Fehlwirt يا غلط کوربه حيثيت لري که د عملياتو امکانات يي نه وي نو د مرگ سبب گرزي

6.6.1 دانکوسفير لارو د وينې د جريان له لارې مختلفو اعضاو خصوصاً څگر ته رسيږي چې هلته سيستونه جوړوي چې په دواړو انواعو کې يوله بله سره فرق لري

7.7.1 په تکثري کيسولونو کې پروتوسکالکس منع ته راځي

8 پروتوسکالکس په سيست کې نمو کوي. که دا سيستونه د اخري کوربه لخوا وخورل شي نو د پروتوسکالکس څخه بالغ چينجيان پيدا چې بيا د څلورو تر شپږو هفتو وروسته هگي لرونکي پروگلتيد خارجوي

تکثري کيسول BC, امريو فور EB, اطراحي کانال EX, جنسي جوړښت GP, هيد اتيد H, د اوناکوسفير خنجکونه HO, د پروتوسکالکس خنجکونه د نمو په حالت کې IR, پروگلتيس يا اخري پوخ شوی پروگلتيد P, پاسنی د خنجکونو غنچه RH, رودونکی جوړښت SU, طولي طنابونه TU, په هگيو ډک رحم UE

## فاميلي هيمنيوليبيداى Familie : Hymenolepidae

دغه فاميلي ډيرې انواع لري چې په الوتونكو او تي لرونكو كې پيدا كيږي. حتي په انسان كې هم پيدا كيږي. د سيستى سيركويد لپاره د منځني كوربه په حيث ځيني بند لرونكي يا ارتروپودا لكه د ورډې لارو او نور موجود دي چې دا د اخري كوربه د ژوند د شكل پورې ارتباط لري چې په اوبو او يا په وچه كې ژوند كوي. خود انسان پرازيت *Hymenolepis nana* كې منځنى پرازيت حتمي نه دى.

دا نسان كوچني چينجى، هيمنيوليبيس نانا

**:Hymenolepis nana(von Siebold 1852)Blanchard 1852**

د اچينجې د يو نه تر څلورو سانتي مترو پورې اوږدوالى او يو ملي متر عرض لري. تر دوه سوه پورې پروگلوټيدونه لري خصي په هر پروگلوټيد كې درې دانې دي. هگى چې په رحم كې موجودې دي. د پروگلوټيد د شليدو په نتيجه كې ازاد كيږي. په دې هگى كې انكوسفير موجود دى چې د ورډې په لارو كې په Cysticercoid بدليږي. خو ددې څخه مهم بي هغه مستقيم مصاب كيدل دي چې د ناپاكه خوړو يا د چټلو نوكانو له لارې هگى. دانسان وجود ته داخلېږي. نو انكوسفير په اثناعشر كې د هگى څخه ازاد كيږي او د كولمو د ديوال پورې ځان نېبلوي چې د څلورو ورځو په موده كې د كولمو په انساجو كې د هغې څخه سيستى سركويد منځ ته راځي چې بيا دا حجرات چوي او ترې په كولمو كې يو بالغ حيوان جوړيږي. چې د درې تر څلورو هفتو وروسته هگى اچوي. د بالغ پرازيت د ژوند موده څلورو هفتو ته رسيږي.

پاتوجنسي: كيداى شي چې سمپتوم يا د مريضى علامه موجوده نه وي. خو كله دنس ناسته او دگيډې درد منځ ته راوړي شي.

تشخيص: د هگيو پيدا کول په غايطه موادو کې.

تداوي: Niclosamid چې دوه وارې بايد د اتو يا لسو ورځو په فاصله استعمال شي  
ځکه چې په انساجو کې داخل شوي سيستوسيرکويډ ته دوا نشي رسيدلای.

## فایلم نیما تیلمنتیس Phylum : Nematelminthes

په دې گروپ کې د چینجیانو مختلف انواع شامل دي. ددې گروپ مشترک خاصیت د یوې کاډبې خلا یا Pseudocoel موجودیت دی چې د پرانثیم د انساجو څخه خالي ده. درې گروپونه Nematomorpha چې لارويي په ارتروپودا کې پرازیتي خو بالغ حیوان یې ازاد ژوند لري. Acanthocephala چې کولمې نلري او لارويي په ارتروپودا او بالغ حیوان یې په فقاریه و حیواناتو کې په استثنا د انسان په کولمو کې پیدا کیږي. دریم گروپ یې Nematoda دی چې د انسان پرازیتونه هم پکې شامل دي. مونږ دلته یوازې نیماتودا مطالعه کوو.

### سب فایلم نیماتودا Subphylum : Nematoda


نیماتودا یا گرد چینجیان یو ډیر لوی، گروپ جوړوي چې په ځمکه خوږو او بو او بحرونو کې د حیواناتو او نباتاتو په منځ کې پیدا کیږي. د نیماتودا ډیر چینجیان یعنې تر دیرش زره زیاتې انواع یې پرازیتي ژوند لري. د ازاد ژوند لرونکي چینجیانو څخه اکثرا په خوسا موادو کې پیدا کیږي. داسې محیط د نباتات خوږونکو حیواناتو د معدې او کولمو د محیط سره د مقایسې وړ دی چې هم پکې د اکسیجن اندازه کمه ده او همدارنگه پکې مختلفې بکتریاوې موجودې دي. دا په دې معنې ده چې په خوسا موادو کې د ژوند پواسطه په نیماتودا کې یو مخکینی تطابق یا Präadaptation منځ ته راغلی دی. چې ددې گام څخه وروسته دیو بل گام په شکل د داخلي انساجو پرازیتي ژوند منځ ته راغلی دی. یعنې کولمې او د وجود خالیگاوې د انساجو د پرازیتي ژوند د منځ ته راتلو لپاره مخکني جوړښتونه دي.




د نیاماتودا د وجود جوړښت:

وجود یې اوږد او گرد شکل لري. دوی خپل وجود کږولای شي، خو اوږدولای یې نشي. د وجود خارجي قشر یې دیوې کوتیکولا Cuticula له خوا احاطه شوی دی چې د مختلفو پروتینونو او فبریلونو یا تارونو څخه جوړ شوی دی. د کوتیکولا حجرات میتابولیزم او نمو نلري یعنې مړه مواد دي چې د Hypodermis هیپودرمس څخه خارج خوا ته افراز شوي دي. دا چینجیي یوازې اوږده عضلات لري چې د کوتیکولا او هیپودرمس سره نښتې دي یعنې دوي حلقوي عضلات نلري. څرنگه چې عضلات د خپلې وظیفې د اجرا کولو لپاره متضادو یا Antagonist انتاګونیست عضلاتو ته ضرورت لري. نو دا وظیفه په دوي کې د مایعاتو څخه ډکه خالیګا اجرا کوي. د عضلاتو تارونه په څلورو برخو کې تنظیم شوي دي چې دوه شاتني یا ظهري او دوه بطني یا خیتني دي چې د هیپودرمس پواسطه یو له بله جدا شوي دي. شاتني او خیتني عضلات یو طولاني عصب لري چې د شاتني او خیتني عصب په نوم یادېږي. د عضلې حجرات خپلې رېښې د خپل موقعیت مطابق یا شاتني او یا خیتني عصب سره په تماس کې کوي. دا په ټولو حیواناتو کې یوازینی ګروپ دی چې عضلې ځان عصب ته رسوي. په داسې حال کې چې په ټولو نورو حیواناتو کې عصب ځان عضلې ته رسوي.


اطراحیه سیستم ددې ګروپ په اکثرو غړو کې جانيبي خواته واقع دی.



در ششم شکل: د نیماتودا د یو مونث حیوان جوړښت په عرضي مقطع کې: کوتیکولا C, د کولمو سوری D, شاتنی یا ظهري طولی عصب dN, اطراحي کانال EK, هیپودرمس HY, د عضلوي رشتو ساحه MF, عضلاتي حجره MZ, رحم Ut, بطني طولی عصب vN



یو در ششم شکل: په اسکاریس کې د عصب او عضلې ارتباط: د عصب په عرضي مقطع کې ډیر اکسونونه لیدل کېږي. د عضلاتي حجرې د حسي تنبې اخیستلو برخه A, کوتیکولا C, هیپودرمس HY, عضلاتي حجره MZ, عضلاتي رشتې MF, عصب N



دوه درشم شکل: د نیماتودا بدنې جوړښت د مونث جنس طولې مقطع a - پاسنی برخه b - مذکر جنس د وجود دلاندینې برخې طولې مقطع:

مقعد A - امفیدونه AM - بولوس B - کولمې D, دهگیونل دهگیو سره EI, اطراحی سورې EP, جنسي سورې GÖ, خصي دنل په شکل H, کلوک K, شونډې L, خوله M, طولې عصب N, مری O, د تخمدان برخه OV, فاسمید P, حسی جوړښتونه PA, دا یروي عصب R, لکی S, دوه دانې سپیکولا مذکر جنسي جوړښت SP یا Spicula.

د عصبي سیستم مرکزي برخه یوه عصبي کړۍ تشکیلوي چې د حلقوم څخه را چاپیره شویده. چې Circumpharyngeal نومیږي. ددې کړۍ څخه عصبي طولې تارونه راوړي چې اته دانې پاس او څلور دانې لاندې خواته موجود دي او ددې څخه منځني شاتني Mediodorsal او منځني خیتني Medioventral حرکي اعصاب تشکیلیږي. Photorezeptor یا حسي نوري حجرات یوازې په غیر پرازیتي یا ازادو انواعو کې پیدا کیږي. د وجود په پوستکي کې حسي حجرات د کیمیاوي حجراتو څخه عبارت دی. نور حجرات د میخانیکي حسي حجراتو په نوم یادېږي.

ټول نیماتودا مکملې کولمې لري یعنې خوله او مقعد دواړه لري. خوله په بعضې انواعو کې د کلکو جوړښتونو لرونکې ده چې د چیچلو او غوڅولو وظیفه هم اجرا کوي. د خولې وروسته Pharynx راځي چې د یو عضلوي پمپ شکل لري او ډیر اوږد دی. د فارنکس هغه برخه چې عضلات کم لري د مری په نامه یادېږي. د مری په اخر کې د Bulbus په نامه یو بند لرونکی جوړښت موجود دی. په منځنیو کولمو کې چې دیو نل شکل لري، عضلات نشته. اخري یا لاندینۍ کولمې یو عضلوي قفل شکلی جوړښت لري.

اطراحیه سیستم: دا د طولې کانالونو یو سیستم دی چې منځنۍ بطني طرف ته خپل مواد خارجوي. په اسکاریس کې دوه کانالونه موجود دي چې د وجود په جانبې برخه کې

د حیوان دسر نه د وجود تر اخیږې پورې امتداد پیدا کوي. دا کانالونه د وجود په منځنۍ برخه کې دیو H په شکل سره نښتې دي. ددې عرضي پل څخه یو لنډه اتصالي نل د بطني اطراحیه سوري سره تماس لري. په اکثره ازادو انواعو کې دغه کانالونه نشته بلکې په بطني برخه کې یو یا دوه اطراحی غدې واقع دي چې Renette ورته وایي. د اسکاریس د اطراحی موادو او یا په سلو کې امونیا او باقي یوریا جوړوي.

نیماتودا دوه جنسه دي یعنې ښځه او نریي بیل دي خو په ځینو غیر پرازیتی انواعو کې خنځې پروتاندريش Prothandrisch چې مذكر سپرم پکې لومړی جوړېږي هم موجود دي. مذكر جنس د مونث څخه ډیر کوچنی او د جوړه کیدو Kopulation کومکي جوړښتونه لري.

مذكر جنسي جوړښت: دیو اوږد او کوږوږ نل څخه عبارت دی چې د سپرم څخه ډک دی او د واس ایفیرینس Vas efferens پواسطه په کلواک Kloake کې ختمېږي. سپرمونه بې لکۍ او هستې نلري او یوازې د مایکروفیلمنت پواسطه حرکت کوي. د کروموزومونو تعداد د جنس په تعییندلو کې رول لري. په ډیرو پرازیتی انواعو کې نر جنس XO او ښځینه جنس XX لري. په ځینو نیماتودا کې د XX-XY سیستم هم موجود دی. په ځینو پارتینوگیني انواعو کې د مونث جنس د کروموزومونو تعداد n3 وي. څرنگه چې د کروموزومونو تعداد او شکل په مختلفو انواعو کې فرق لري دزیات بحث څخه دلته تیرترو.

مونث جنسي سیستم: په اکثره انواعو کې دوه تخمدانونه موجود دي. استشنا Aphasmeida دي. تخمدانونه د Oviduct او Uterus له لارې په یوه Vagina کې ختمېږي.

د نیما تودا وده: په پرازیتي نیما تودا کې د مونث جنس څخه:

◀ داسی هگی. خارجيږي چې په خارج محیط کې نوره وده کوي. یعنی چینیان Ovipar یا هگی. اچونکي دي لکه اسکاریس، تریشویس، انکلوستوما.

◀ هغه هگی. چې د کوربه په کولمو کې ترې لارو خارجيږي لکه Strongloides او نور.

◀ هغه هگی. چې د تولد په مرحله کې ترې لارو خارجيږي چې د Ovovivipar شکلونه لکه فلاریا

لارو د کوربه څخه خارجيږي Vivipar یعنی بچي اچونکي شکلونه لکه Trichinella، Dracunculus

ځیني بیالوژستان د اخري دوه شکلونو فرق سره نکوي.

د امبریو یا لارو راوتل د هگی. څخه د خارجي محیط د شرایطو لکه اکسیجن، رطوبت او حرارت پورې اړه لري.

د هگیو څخه د لارو راوتل:

اول. لارو په خارج محیط کې د هگی. څخه خارجيږي لکه په Ancylostoma duodenale کې.

دوهم. لارو هغه وخت د هگی. څخه راوځي چې کله د کوربه د خولی له لارې د هغې وجود ته داخل شي. لکه اسکاریس.

په لومړي گروپ کې پخپله لارو د داخل له خوا څخه انزایمونه خارجوي او همدارنگه د

لارو د حرکت په نتیجه کې هگۍ چوي.

په دوهم گروپ کې د کوربه انزایمونه او د کاربن دای اکساید غلظت د هگۍ د پوستکي د حل کیدو سبب گرځي چې په نتیجه کې لارو د کوربه په کولمو کې خارجيږي.

د اکثر پرازيتي نيماتوداو وده د کوربه د بدلولو پواسطه صورت نیسي. خو وده يې په زیاتو حالاتو کې مستقیمه ده او د نسل تناوب پکې نه واقع کیږي. چې د څلورو لاروي مرحلوه لارې چې پوست اچول پکې صورت نیسي بالغ چینجی ته نمو کوي. دا مرحلې یا د لومړي، دوهم، دریم او څلورم لارو په نوم یعنې L1-L4 او یا په لاندې نومونو یادېږي:

د ځینو گروپونو لومړی او دوهم لارو د rhabditiform چې دا نوم ورته د هغوي د لښته شکلي او غوټه شکلي مری له امله ورکړل شويدي. چې دا ډول لارو په Necator americans او Ancylostoma duodenale او Strangyloides stercoralis کې پیدا کیږي.

دریم لارو چې د filariform په نوم یادېږي د پاسني څخه د پوست اچولو په نتیجه کې منع ته راځي. چې مری يې اوږدېږي او غوټه يې له منځه ځي.

مایکرو فلاریا Mikrofilaria چې د کوربه په وینه او لمف کې د فلاریا لومړني لارو دي چې دغه لارو vivipar دي. چې کیدای شي د هغې چاپیره د هگۍ یو نری قشر موجود یعنې gescheidet وي لکه په Wuchereria bancrofti او Loa loa کې او یا لارویوازې د کوتیکولا له خوا احاطه شوی وي یعنې ungescheidet وي. لکه په Onchocera volvulus کې.

## د نیماتودا د ودې او یرغل لارې:

اول: په مستقیم ډول وده په هغو چینجیانو کې چې منځنی کوربه نلري:

الف: د لارو لرونکي هگيو داخليدل د خولې له لارې چې ددغو هگيو څخه د کوربه په کولمو کې لارو پيدا کيږي لارو کيداې شي په کولمو کې پاتې او په بالغ چینجي بدل شي لکه په *Entrobilus vermicularis* دکښکي يا کڅ چینجي کې او يا کيداې شي لارو د زړه سرې، تراخيا دوره ووهي او په دوهم يا دريم لارو بدل شي. لکه په اسکاريس کې.

ب: په دی ډول چینجیانو کې داسې يو لارو چې د هگي څخه خارج شوی او دوه پوستکي يي اچولي وي. يا په پاسيف ډول د خولې له لارې وجود ته داخلېږي او يا په اکتيف ډول د پوستکي له لارې وجود ته داخلېږي. چې اخري شکل يي ددې لپاره چې کولمو ته داخل شي بايد د زړه، سرې او تراخيا دوره تيره کړي او بيا د کوربه د خولې لخوا تير يا بلع شي. لکه په انکيلوستوما دودينالې کې.

ج: د تريشين *Trichenella spiralis* او مشابه چینجيان يوه استثنا تشکيلوي ځکه چې لارو او هگي د وجود څخه نه خارجېږي بلکې ويو بيار لارو د کولمو څخه مستقیم عضلاتو ته داخلېږي چې په دې صورت کې يواځې غوښه خوړونکي يو له بله سره مصابوي. په پرازيت د خارجي حرارت تاثیر موجود ندی ځکه بيرون ته نه راوزي. له دې امله دا ډول پرازيتونه په ټوله دنيا کې پيدا کيږي.

دوهم: غير مستقیمه وده چې منځنی کوربه پکې شامل وي:

د فيلاريا انتقال د وينه څښونکو حشراتو او کونيو پواسطه د وينو اخستلو په وخت کې. لکه په *Loa loa* او *Wuchereria bancrofti* او ځينو نورو انواعو کې.

په ځينو نورو کې کيداې شي کوچني چنگاښونه او يا حلزونونه د منځني کوربه په حيث



وي چې بيا د اخرنی کوربه له خوا د غذایی موادو په حیث خوړل کیږي او په دې ډول چینجی اخري کوربه ته داخلېږي لکه په *Dracunculus medinensis* او *Parastrongylus cantonensis* کې. بالغ شوې بنځینه چینجیان خپل لارو په اوبو یا مرطوبو ځمکو کې اچوي چې هلته د منځني کوربه له خوا د غذایی موادو سره اخیستل کیږي.

د *Prostrongylinae* لارو د وچې په یو حلزون کې تر L3 یعنی دریم لارو پورې وده کوي چې په اکتیف شکل د منځني کوربه څخه خارج او د حیواناتو د خوراکی نباتاتو پواسطه اخرنی کوربه ته ځان رسوي.

نیماتودا د مریضۍ د عامل په حیث:

ډیر نیماتودا د انسان ، حیوان حتی د نباتاتو لپاره د مختلفو مریضیو سبب گرزي په انسان او تي لرونکو حیواناتو کې یې زیانونه د بالغ حیوان د موجودیت او یا د لارو پواسطه په وجود کې د هغوي د حرکت په نتیجه کې منځ ته راځي. د نیماتودا بالغ حیوانات د حجرو دباندي اوسېږي. خو په استثنايي ډول د تریشین یا *Trichinella spiralis* او *Trichuris muris* بالغ او همدارنگه لارو د حجرې په داخل کې اوسېږي. همدارنگه د *Ancylostoma caninum* او یو تعداد نورو پرازیتو نولارو د حجرې په داخل کې لیدل شويدي. خو دځینې نور پرازیتونه لاروهم په انساجو کې د حرکت په نتیجه کې د تخریب سبب گرزي لکه په سترگه کې. دداسې مریضیو او د هغوي د عاملینو یو څو نمایندگان لاندې مطالعه کوو:

## فامیلی تریشینیلیدای Family : Trichinellidae

دغه Vivipar چینجیان په بالغ حالت کې د کولمو په نلونو او همدارنگه په انساجو کې اوسېږي خو لارو یې یوازې د انساجو پرازیتونه دي. منځنی کوربه یی د پلرني نسل د اخري کوربه سره یو قسم دی چې وده یی په اساس کې نه مستقیمه او نه غیر مستقیمه ده.

### تریشینیلا سپیرالس (Owen 1835) : *Trichinella spiralis*

دا پرازیت د خپل لارو د لارې د کوربه په عضلاتو کې پاتې کیږي او د Trichinose په نامه مریضي منځ ته راوړي. د طبیعي ذخیروي حیوان یا Reservoir په حیث مږې، گیدرې، سپي، ایرې او همدارنگه قطبي تي لرونکې دي. د مږې تریشین لرونکې غوښه دکورني خوگ له خوا خوړل کیږي. په هغو ممالکو کې چې د خوگ غوښه خوړل کیږي انسانان او نور غوښه خوړونکې حیوانات لکه سپي او پیشو گان پرې مصاب کیږي. خرنګه چې په اروپا گډ بازار کې د هر یو خوگ غوښه د تریشین چینجی له نظره معاینه کیږي، نو دا مریضي پکې کمه ده. خو په امریکا، لاتین امریکا او افریقا کې پرې ډیر تعداد انسانان مصاب دي.

کله چې د خوگ په لارو ملوټه غوښه په خام ډول د غوښه خوړونکي حیوان یا انسان له خوا و خوړل شي. نو د خوگ په عضلاتو کې موجود لارو په نړیو کولمو کې خارجيږي چې د پنځه تر اوه ورځو پورې بلوغت ته رسېږي. بنځینه جنس د زرو تر دوه زرو پورې لارو خوشې کوي. دغه لارو د مصاب کیدو څخه یوولس ورځې وروسته عضلاتو ته رسېږي. او د عضلاتي حجراتو په منځ کې ځای نیسي چې بیا د کوربه د وجود د عکس العمل په نتیجه کې په یوه خلطه یا کپسول کې احاطه کیږي. په دې خلطو کې لارو تر دیرشو کلونو پورې ژوندی او مصاب کوونکی پاتې کیږي. په نوي فیصده واقعاتو کې د تریشین مصاب کیدل بې له کومې ظاهري ناروغتیا او یا دهغې د نښو پاتې کیږي. خو که نښې

بېي ښکاره شي نو د اثناعشر او جيجينم اختلالات او د عضلاتو دردونه دي. که د پرازیتونو تعداد زیات وي نو د زهري افزاتو له امله سخته تبه او پارسوب همدارنگه د عضلاتو مریضي یا Myocarditis او د ششونو د اختلالاتو سبب گزوي چې په نتیجه کې د مرگ او همدارنگه د موقتي او دايمي رنديدو سبب هم گزیدلای شي. بالغ مونث پرازیت د پنځه ويشت تر دیرشو ورځو پورې ژوندي پاتې کېږي چې د لارو د خوشې کولو څخه وروسته دوره په عاطل ډول تیروي.

## فاميلي تري شوریداى **Family: Trichuridae** یا قمچیني چينجي

د وجود مخکینى برخه يي اوږده او ډیره نرۍ ده. د يو لنډ او ضعيف فارنکس پسې يوه اوږده مری لري چې د ډيرو غدواتو څخه جوړه شويده. مذکر جنس يي يوه مذکره جنسي ال يا Spiculum او مونث جنس يي يو تخمدان او رحم لري. دوي د فقاريه حيواناتو د کولمو پرازیتونه دي وده يي مستقيمه ده يعنې منځنى کوربه نلري.

### تريشوريس تري شورا نوع **Trichuris trichiura**:

دا چينجی چې د قمچیني چينجي په نوم يادېږي د انسان، خوک او سپي په لويو کولمو او معده کې مریضي توليدوي. لارو د هگۍ څخه راوځي او د يوې څخه تر دريو مياشتو په موده کې بالغ کېږي. مونث چينجی د جنسي يو ځای کيدو وروسته د څلورو تر پنځو مياشتو پورې هگۍ اچوي. دا هگۍ ددې لپاره چې کوربه مصاب کړي د وجود په خارج محيط کې ډير وخت ته ضرورت لري. يعنې په پنځه لس درجو کې د څلورو تر شپږو مياشتو او په دیرشو درجو کې يو ازی ډولسو ورځو ته ضرورت لري. ددې پرازیت لږ

تعداد په کوربه کې مریضي منع ته نه راوړي. خو که په ډیر تعداد موجود وي د کوربه په اخرو یعنی لاندینیو کولمو کې د زخمونو سبب گرزي. مصاب کیده د هگیو پواسطه د خولې له لارې صورت نیسي. هگی. په چتلهو سبزیجاتو کې چې د انسان په غایطه موادو ککړ وي، موجودې وي. دا مریضي په حاره مناطقو کې ډیره معموله ده خو په نورو مناطقو کې هم پیدا کیږي. ددې پرازیت هگی. د انسانانو په دوه زره دری سوه کالو پخواني غایطه موادو کې پیدا شويدي.

انترویوس ورمیکولاریس نوع **Enterobius vermicularis** : یا د کنسکي چینجی

دا چینجی په غټو کولمو کې ژوند کوي. مذکر جنس د مونث جنس څخه ډیر کوچنی دی او د جنسي یو ځای کیدو څخه وروسته مړه کیږي. مونث جنس چې د وجود اخري برخه یې ډیره نیغه وتلې ده د هگیو اچولو لپاره مقعد ته ځي. دا چینجی د څلورو تر پنځو هفتو پورې ژوند کوي چې په دې وخت کې تر یوزر او سلو پورې هگی. اچوي. د هگیو څخه په کم وخت کې لارو خارجيږي. د کوربه مصاب کیده د خولې له لارې صورت نیسي. کلینیکي عوارض یې ډیر سخت ندي یوازې د مقعد دخارښت سبب کیږي. د خارښت علت د مونث جنس حرکت دی چې د موکوزا عکس العمل منع ته راوړي. دا مریضي اکثرا په کوچنیانو کې پیدا کیږي چې د خارښت په وخت کې په مقعد دلاس وهلو او بیا د همدغه لاس خولې ته د وړلو په نتیجه کې مصابیدل صورت نیسي.

## فامیلی اسکریدیدای Family : Ascarididae

ددې فامیل ځینې مثالونه په لاندې ډول دي:

اسکاریس چینجی، اسکاریس لومبریکویدس  
(*Ascaris lumbricoides*) (Linne 1758)


دا پرازیت د انسان د مهمو او لویو پرازیتونو د جملې څخه دی. مونث جنس چې په ورځ کې تر دوه سوه زرو پورې هگۍ اچوي په کولمو کې د یونیم کاله پورې ژوندی پاتې کیدلای شي. هگۍ یې بیضوي شکله دي چې د خپل لارو د نمو لپاره په خارجي محیط کې د سانتي گراد په شلو درجو کې د دیرشو تر څلویښتو پورې ورځو ته ضرورت لري. دا هگۍ کیدای شي دوه تر څلورو کالو پورې مصاب کوونکې وي. لارو په هگۍ کې یو وار پوستکی اچوي او په دوهم لارو L2 تبدیلېږي. که په دې وخت کې هگۍ د کوربه د خولې له خوا هضمي سیستم ته داخل شي، نو بیا د Vena portae له لارې ځیگر ته داخلېږي چې څلور پنځه ورځې هلته پاتې او بیا پوست اچوي او په دریم لارو L3 تبدیلېږي. دغه لارو د وینې د جریان د لارې دزړه څخه سرې ته رسېږي چې هلته د سرې په هوای پوکنیو یا Alveola کې داخل او هلته بیا پوست اچوي. او په L4 تبدیل چې په دې وخت کې یې اوږدوالی تقریبا دوه ملي مترو ته رسېږي. دغه لارو د ټوخي پواسطه تراخیا له لارې حلق او د لارو د تیروولو پواسطه مری او کولمو ته داخلېږي. چې هلته نوره نمو هم کوي او دوه ځله پوست اچوي او تقریبا په یو میاشت کې په بالغ چینجی بدلېږي. دلته د مونث او مذکر جنس د جنسي یو ځایوالي په نتیجه کې د مصاب کیدو څخه وروسته د یوې نیمې څخه تر دوه میاشتو په موده کې په غایطه موادو کې لومړۍ هگۍ لیدل کېږي. هگۍ د ملوټو او چټلو غذايي موادو له لارې مثلا په سبزیجاتو کې د انساني کود څخه د استفادې کولو په نتیجه کې چې دا سبزیجات ونه مینځل شي د انسان وجود ته داخلېږي.

داسکاريس چينجي پواسطه انسان ته ددوو لارو ضرر رسيږي:

اول د لارو حرکت خصوصاً په سپرو کې اختلالات پيدا کيږي چې له تېبې او ټوخي سره ملگرې وي.

دوهم د کولمو اختلالات چې د کولمو تر انسداد يا بنديدو پورې رسيږي. د زيات مصاب په نتيجه کې کيداې شي د وجود غړي لکه لاس او پښې کرې شي. کله کله ليدل شويدي چې د قې کولو په وخت کې چينجي د خولې له لارې خارج شويدي.

دري درشم شکل:



د انساني سيستودا يعني د a څخه تر c او د کولمو د نيماټود د d څخه تر اېورې هگۍ نښايي: a-Diphyllobothrium latum او

b-Taeniasaginata او

Hymenolepis nana


d-f Ancylostoma duodenale او

د لارو د نمو مختلفې مرحلې نښايي، او g-

h- Enterobius vermicularis او

i- Trichuris او Ascaris lumbricoides

trichiura



خليردرشم: د اسكارييس لومبريكويديس الکترون ماڼکروسکوپي شکل:

د وجود پاسنې برخه a- خلويښت واري لويه شوې ، په شونډه وکې د غاښونو قطار ليدل کېږي b- دوه سوه خلويښت واري لويه شويده.

د کوتیکولا خارجي سطح CR ، شونډې LI ، خوله M ، حسي ارگانونه SO ، غاښونه Z.

## نوع توکساس کریس : *Toxascaris sp*

چې دوه نوع یې په سپي او پیشکه کې ژوند کوي او په هغوي کې د مریضۍ سبب گرځي. کیدای شي چې انسان هم تري مصاب شي. سره ددې چې په انسان کې جنسي بلوغت ته نه رسېږي خو لارو په وجود کې گرځي او راگرځي او د اختلافاتو سبب کیږي.

## فامیلی انکیلو ستوماتیدای : *Family : Ancylostomatidae*

دا ګروپ د خنجکي چینجیانو یا Hakenwürmer په نامه هم یادېږي. دا چینجیان د خولې یو کپسول لري. چې د خنجکو غونډې جوړښتونه لري. ددې خنجکو په کومک چینجی ځان د کوربه په کولمو ټینګوي. لومړنۍ دوه لاروي مرحلې یې ازاد ژوند لري او د پنځه تر اوه ورځو په موده کې دوه وارې پوستکي اچوي. دریمه لاروي مرحله یا rhabditiform د کوربه په پوستکي کې خصوصاً د پښو د ګوتو په پنځوکې داخلېږي. لارو کله کله د کوربه د پیدا کولو لپاره دایروي حرکات کوي. که محیطي شرایط نامناسب شي لکه دزیات لمر او کم رطوبت له امله لارو په ځمکه ننوزي. لارو د پوستکي له لارې دزړه سږي مری، معدې او نړیو کولمو مرحله طې کوي ددې پرازیتونو دوه انواع انسانان مصابوي چې *Ancylostoma duodenale* او *Necator americans* نومېږي. دواړه انواع په ګرمو مملکتو کې ډیر پیدا کیږي. لارو چې نړیو کولمو ته ورسېږي د څلورو تر شپږو هفتو په جریان کې بالغ او په هګۍ اچولو شروع کوي. دا چینجی تر شلو کلونو پورې عمر کولای شي خو په متوسط ډول د دوو کلونو زیات عمر نکوي. مونث جنس هره ورځ په *Necator* کې نهه زره او په *Ancylostoma* کې شل زره هګۍ اچوي.



د انکلوستوما دودینالی بالغ چینجیان د سر په کپسول کې څلور غاښونه د نیکاتور امریکنس په خوله کې د لور په شکل غوڅونکې الې لري. چې ددې جوړښتونو پواسطه ځانونه په کولمو نښلوي او وینه خوري. هر چینجی دورځې د ملي لیتر دریمه برخه وینه څښي. دوینې زیان په ورځ کې شپېته ملي لیتر ته رسېږي. چې د وینې دکمبود په نتیجه کې د وجود عمومي ضعف، د وجود پارسوب، د زړه د عضلاتو ضعف او همدارنگه د کولمو د اختلالاتو سبب گرزي. ځینې نور پرازیتونه لکه *Ancylostoma brasiliensis* او کله هم انکلوستوما دودینالی په انسان کې نه بالغ کیږي او د کوربه په وجود کې حرکت کوي چې د پوستکي د تخریش او ضرر سبب گرزي. ددې پرازیتونو د مارفولوژي مشخصه د یو جوړښت یعنې د *Bursa copulatrix* موجودیت دې چې په انکلوستوما دودینالی کې د چترۍ شکل او په نیکاتور امریکنس ددوو ټوټو څخه جوړ شويدي. په دې پرازیتونو کې *Reservoir* یا زیرمتون حیوان وجود نلري.

## فامیلی سترانگیلوییدیای **Family : Strongyloididae**

ددې فامیلی زیات غړي ازاد ژوند لري. ځینې یې په انتخابي ډول د کولمو پرازیتونه دي. د *Strongyloides* جنس د انسانانو مهم پرازیت دی چې یو *heterogen* تغیر نسل لري. چې یو پار تینوگیني موث جنس یې اجباري پرازیت او یو اختیاري دوه جنسه یعنې موث او مذکر نسل یې ازاد ژوند لري.

جنس سترانگیلویدس سترکورالس

## Strongyloides stercoralis( Bavan 1876 ) Steiles and Hessel

1902: د انسان کوچنی چینجی

دا کوچنی پرازیت په ډیرو گرمو مملکتونو لکه حبشه، ایران او جنوبی امریکا کې پیدا کیږي. ددوی اهمیت نه تنها د مریضۍ د تولیدونکي په حیث بلکې همدارنگه ددوی د بیالوژی له لحاظه دی ځکه چې دوی  $n_1, n_2$  او  $n_3$  هگی. اچوي یعنی د کروموزومونو تعداد یی یو چند، دوه چنده او درې چنده وي. دا پرازیت په انسان کې د سختې مریضۍ سبب گزي. مونث او مذکر چینجی په ازاد محیط کې ژوند کوي د جنسي مقاربت په نتیجه کې مونث جنس هگی. اچوي. ددوه پوستکو اچولو څخه وروسته دریم لارو منځ ته راځي. دغه لارو وجود ته داخل او د پارتینوگینی د عملیې پواسطه ترې مونث جنس منځ ته راځي. چې د اوه لسو ورځو وروسته دغه مونث جنس مختلفې هگی. اچوي چې د کروموزومونو تعداد یی مختلف وي. ددې هگیو څخه په کولمو کې rhabditiform لارو منځ ته راځي. د  $n_3$  لرونکې هگی. د لاروي سیستم له لارې مونث نسل تولیدوي. په کولمو او په ازاد محیط کې د  $n_2$  هگی. په مونث چینجی تبدیلیږي چې په ازاد محیط کې ژوند کوي. د  $n_1$  هگی. په مذکر چینجی تبدیلیږي چې په ازاد محیط کې ژوند کوي. د هگیو تولید هم د شرایطو پورې مربوط دی. په ښو شرایطو کې  $n_3$  تولیدیږي خو که شرایط خراب شي نو بیا  $n_1$  او  $n_2$  تولیدوي.

پتو جنسي: د مریضۍ علایم په تنفسي جهاز کې نیمونیا یا د سرو التهاب او په کولمو کې سخت اسهال دی. د استوا په شاوخوا منطقو کې لکه په کولمبیا کې دیرش په سلو کې خلک په دې چینجی اخته دي چې ډیر ترې مړه کیږي. خصوصاً هغه څوک چې معافیوي سیستم یی ضعیف وي. لکه د ایډس مریضان او یا په مخدره موادو اخته کسان. همدارنگه مصاب کوونکې لارو په لابراتوار کې طبي پرسونل ته هم خطرناک واقع

کیدای شي. د Strongyloides ځینې نور انواع په انسان کې بلوغ ته نه رسېږي خو لارو یې تر ډیره وخته د پوستکي لاندې په حرکت کې وي.

## لوی فامیلی دراکونکولویډیا

### Ueberfam : Dracunculoidea

د خولې سوری یې کوچنی او بې شونډو دی. دغه چینجیان Ovovivipar او مونث او مذکر جنس له یو بله ډیر فرق لري یعنې Sexualdimorphism لري. منځني کوربه یې د Copepoda د گروپ پورې مربوط چنگاښونه دي.

د مدینې چینجې، دراکونکولوس میدینن سیز

### : Dracunculus medinensis (Linne1758)

دا چینجی انسان ته له ډیرو پخوا زمانو راهیسې معلوم دی. چینجې د بلوغت په وخت کې د پوستکي څخه راوځي. دا چینجې په عنعنوي ډول په یوه ورځ کې تر لسو سانتي مترو پورې د یو لرگي په شاوخوا د تاوولو په نتیجه کې د وجود څخه راویستل کېږي دا کار باید په ډیر احتیاط صورت ونیسي تر څو د چینجې د شکو لو څخه جلوگیری وشي. داسې فکر کېږي چې دغه تاو شوي چینجې د طب او فارمسي د سمبول په حیث تر نن ورځې پورې عمومیت لري. دا چینجې چې یوازې انسان مصاب کوي او د منځني کوربه پواسطه چې یو چنگاښ Cyclops دې داوبو څښلو په وخت کې انتقال کېږي. لارو د کولمو له دیوال څخه تیر او لمفای غدواتو ته ځان رسوي چې هلته یې نمو صورت نیسي. بالغ پرازیتونه د پوستکي لاندې انساجو خصوصاً په پښو کې ځای نیسي. هلته هگی اچوي چې سمدستي په لارو تبدیلیږي. مونث جنس د پښې پوستکي سوری کوي

او لارو په اوبو کې خوشې کوي چې هغه بيا د يو چنگاښ له خوا خوړل کيږي. چې 3 يا دريم لارو يې مصابوونکې دي. په اول کې دا مريضې نه احساسيږي خو د پوستکي څخه د راوتلو مخکې د راوتلو په ځاي کې د سوزيدلو دتناکي په شکل ليدل کيږي چې بيا همدغه ځاي سوری او چينجی ترې راوځي. د مونث چينجی لويوالی يو متر ته رسيږي. مذکر چينجی چې ډير کم ليدل شويدي درې ملي متره اوږد او د جنسي مقاربت څخه لږ وروسته له منځه ځي. دا چينجی په افريقا کې د استوا په شمال په عربي نيمه وچه، ايران ، پاکستان او هندوستان کې موجود وو خو په اوسني وخت کې يوازې په افريقا کې انتشار لري.



پنځه ديرشم شکل: د مدينې چينجی  
راويستل د زخم څخه ، چې په هغه کې  
چينجی د يو کوچني لرگي په شاوخوا  
راتاويري البته دا کار بايد په ډير احتياط  
صورت ونيسي.

## لوې فاميلي فيلاريويديا Überfam : Filarioidea

دا چينجيان تار شکل او Ovovivipar دي. دا دانساجو او وجود پرازيتونه دي چې غيرمستقيمه نمو لري. د ماهيانو په غير په ټولو نورو فقاريه حيواناتو کې پيدا کيږي. منځني کوربه يې وينې څښونکي بند پښې يا ارتروپودا دي. د هگۍ څخه خارج شوي مايکروفلاريا د اخري کوربه په وينه او يا انساجو کې پيدا کيږي. دا گروپ په دوو فاميلونو تقسيميږي چې دانسانانو ډيري استوايي مريضتياوې منع ته راوړي.

## فاميلي اونکو سيرکيداى Fam : Onchocercidae

د غړيو تر منځ نښلونکى نسجونو کې ددې کورنۍ چينجيان پيدا کيږي. منځنى کوربه يې ماشي چې د Simuliiden او Gnizen د گروپو مربوط دي. يوه نوع يې چې په انسان کې د يوې مهمې استوايي مريضۍ سبب گريزې تشریح کوو:

نوع اونکوسيرکا ولولوس *Onchocerca volvulus* (Leuckart 1893)  
د سيندونو د ړندوالي د مريضۍ عامل:

دا مريضې چې په غربي، مرکزي او شرقي افريقا په سينيگال، گينيا، لايبيريا، انگولا، تانزانيا، د حبشې په ځينو برخو د عرب نيمې جزيرې په جنوبي برخه کې پيدا کيږي. تقريبا تر څلويښتو مليونو خلک يې مصاب کړيدي. چې پنځه ويشت په سلو کې ترې ړنديري. دا مريضې همدارنگه د امريکا په براعظم کې د مکسيکو په جنوب، گواتيمالا، وينزويلا، کولمبيا او د برازيل په شمال کې عموميت لري. ددې مريضۍ انتقالوونکې

يعنې منځنۍ کوربه يو نوع ماشی دی چې د Simulium د جنس پورې مربوط دی ددی ماشي لارو په تيزو اوبو کې نمو کوي. په انسانانو کې بالغ چينجيان د کلولې په شکل د پوستکي لاندې موقعيت لري. چې بو تعداد بنځينه او نارينه چينجي په هره غوټه کې يوځای د کوربه دانساجو له خوا محاصره وي. چې د غوټې په خوا کې انساج خپل رنگ له لاسه ورکوي او ډير نری کيږي. بنځينه چينجي چې پنځه لس کاله ژوند کوي هميشه بې پردې مايکروفيلاريا خوشې کوي. چې لمفاوي نلونو او همدارنگه سترگو ته ننوزي. چې په سترگه کې مړه او دسترگې د معافيوي عکس العمل په نتيجه کې د سترگې دانساجو د تخريب او د پنډيدو سبب گزي. مايکروفيلاريا هميشه په انساجو کې ليدل کيدای شي او تر ډيرو مياشتو پورې ژوند کوي. د وينې څښونکي بنځينه ماشي پواسطه د وينې د اخيستلو په نتيجه کې د هغې وجود ته داخل چې د کولمو ديوال يې سوری کوي او د سينې عضلاتو ته انتقال کوي. پرازيت د ماشي په وجود کې دوه پوسته اچوي او دريم لارو ته وده کوي. د لارو د کولمو لرونکی دی. بيا د وينې اخيستلو په وخت کې په اکتيف شکل د ماشي چيچونکي کانال ته داخل او د اخري کوربه يعني د انسان وجود ته د ماشي پواسطه د وينې اخيستلو په وخت کې داخلېږي. چې په انسان کې دوه پوستکي اچوي او د نهه تر څوارلسو مياشتو په موده کې بالغ چينجي ته نمو کوي. د پرازيت د تشخيص لپاره د کوربه د بدن يو ټوټه پوستکی په فزيالوژي محلول کې اچوي. لارو د پوستکي څخه محلول ته داخلېږي. او د مايکروسکوپ لاندې د کوچنۍ قوې پواسطه هم ليدل کيدای شي. چې قطر يې 300 په 7 مايکرون کی دی.

## فاميلي فيلاريداي Family : Filaridae

ددې فاميلي مايکروفيلاريا داخري کوربه په وينه کې اوسېږي او حرکت کوي.


نوع و خيريږيا بانکروفتي، د پيل د مريضۍ توليدونکی:

**Wuchereria bancrofti (Cobbolt 1877) Seurat 1921**

### Elephantiasis

د طب د علم په تاريخ کې دا پرازيت لومړی هغه و چې انتقال يې د يو وينې څښونکي ارتروپودا پواسطه د Manson له خوا په 1884 عيسوي کال کشف شو. د پرازيت د اوسيدو ځای اکثرا لمفاوي غدوات او نلونه دي چې د لگن خاصره په لاندینۍ برخه او د پښو او لاسونو په لاندینۍ برخه کې واقع دي. خو کله کله په نښلونکو انساجو کې هم پيدا کېږي. اکثرا دغه تار شکل نيماتودا زيات وکم د يو بل نه چاپير شوي د لمفاوي غدواتو په خاليگاؤ کې واقع او د لمف غدوات بندوي. په مزمن ډول د مصاب شوي غړي د پارسوب سبب گززي چې د پيل د عضلاتو پشان معلومېږي چې له دې امله دې مريضۍ ته د پيل مريضې هم وايي. بنځينه پرازيت د شپږو څخه تر اوه کالو په جريان کې لارو خارجوي چې د يوې پردې پواسطه پوښل شوې وي. د لارو د شپې د لسو بجو په شاوخوا کې د وينې سطحي نلونو ته راځي چې د شپې فعالو ماشو پواسطه چې د Aedes، Culex او Anopheles د جنسو پورې مربوط دي د وينې د څښلو په وخت کې اخیستل کېږي په داسې حال کې چې دورځې له خوا د دې لارو تراکم د سږي په رگونو کې وي. ددوي په وجود کې دوه واري پوستکي اچوي چې بيا دريم لارو يا L3 د اخري کوربه وجود ته چې انسان دی، داخليږي. د نهو څخه تر دولس مياشتو په جريان کې بلوغت ته رسېږي. چې د جنسې نږدېوالي يا Kopulation وروسته هگۍ اچوي. دا

پرازیت یوازې په انسان کې ژوند کوي او Reservoir یا ذخیروي حیوان نلري. یوه بله نوع *W. bancrofti pacifica* د غرمې له خوا په وینه کې لیدل کیږي چې د *Aedes* جنس پواسطه چې د ورځې لخوا فعال دي و انسان ته انتقال کیږي. دلته په دې مثالونو کې دلارو او منځني کوربه په منځ کې یو تطابق لیدل کیږي. ځینې فیلاریا چې د *Burgia* د جنس پورې مربوط دي هم د شپې لخوا د وینې په سطحي نلونو کې لیدل کیږي. خو د مارفولوژي له خوا یو له بله سره فرق لري.



شپږدیرشم شکل: په دې شکل کې د *Wucheria bancrofti* د مصاب کیدو په نتیجه کې پرسیدلی لاس معلومیږي

د انسان لپاره مهم یې *Brugia malayi* دی چې د *Wucheria* پر عکس پکې ذخیروي حیوانات یو نوع پیشو او ځینې بیزوگان رول لري. او د جسامت له لحاظه هم د پخواني هغه څخه کوچنی دی.



## نوع لوالوا :Loa loa

دا پرازیت یوازې په Primaten کې پیدا کیږي چې په غربي افریقا کې پنځه لس ملیونه خلک پرې مصاب دي.

انتقال یې د یو میچ یا غوښه پواسطه چې د Chrysops د جنس پورې مربوط دي صورت نیسي. دغه میچان د ورځې د یوې او دريو بجو په منځ کې فعال دي او د سطحي رگونو څخه وینه اخلي لارويي د پخواني نوع په شکل د یوې پردې پواسطه پوښل شوي دي. د میچ په وجود کې لارو د اتوتر لسو ورځو وروسته دوه پوستکي اجوي او دریم لارو کیدای شي یو بل کوربه ته د وینې اخیستلو په وخت کې انتقال شي. په انسان کې د یو تر څلورو کالو په موده کې بلوغت ته رسېږي. د بالغیدو په وخت او د هغې څخه وروسته چې تر پنځه لسو کلونو پورې ژوند کوي د پوستکې لاندې حرکت کوي چې د چرگ د هڅې په اندازه یوه لویه غوټه د وجود د الرژیکي عکس العمل په نتیجه کې منځ ته راځي. دغه پاراسیټونه چې د لږ وخت یعنی دوه تر درې ورځو پورې دوام کوي. ناڅاپه د مایع څخه ډک او سخت څارښت او سوځاک کوي. چې د یو تر لسو سانتي مترو پورې قطر لري.

د حرکت په وخت کې سترگو ته هم داخلېږي چې کیدای شي په سترگو کې هم ولیدل شي. او بیا د سترگو څخه د عملیاتو په نتیجه کې رایستل کیږي. له دې امله ورته په انگلیسي ژبه کې د سترگو چینجی وايي.

## فایلم پنتاستومیدا ، ژبه شکلي چينجي

### Phylum : Pentastomida

دا گروپ چې پخوا د ارتروپودا پورې مربوط گڼل کیده په اخرو وختو کې د یو مستقل گروپ پدیده پیژندل شویږي. دا گروپ په سر کې څلور خنځکونه او خوله لري. چې دا پنځه جوړښتونه داسې معلومېږي لکه پنځه سوري له دې امله دې گروپ ته Pentastomida یا د پنځو سورو لرونکی وايي.

د وجود په خارجي قشر یعنی کوتیکولا کې د Chitin شیتین ماده لري. دا ماده په ارتروپودا کې عمومیت لري. په پنتاستومیدا کې مذکر او مونث جنس جدا دي چې په بالغ حالت کې د تي لرونکو ، الوتونکو او څښکونکي په پزه ، حلق او یا په تنفسي سیستم کې دایندوپرازیت په ډول ژوند کوي. چې ددوي څخه او یا په سلو کې یوازې په مارانو کې ژوند کوي. بالغ حیوان ځان د خنځکو پواسطه په انساجو کې نښلوي او د هغوي د اندوتیل ، لمف او وینې څخه ځان تغذیه کوي. د جنسي مقاربت وروسته مونث جنس هگۍ اچوي چې د پزې د مایعاتو سره یو ځای خارجېږي او یا مستقیما د خولې د لارې معدې او کولمو ته رسېږي او بیا د غایطه موادو سره خارجېږي. هگۍ بیا د منځني کوربه لخوا چې اکثرا فقاریه حیوانات دي اخیستل کېږي. د دې منځني کوربه په کولمو کې د هگۍ څخه لارو خارجېږي. دغه لارو د کولمو دیوال سوري کوي او بیا له دې لارې مختلف غړي مصابوي چې د وجود عکس العمل په نتیجه کې په یو کاپسول کې محاصره کېږي. بیا له خو وارو پوستکي غورځونې څخه وروسته په مصاب کونکې لارو بدلیږي. کله چې منځنی کوربه د یو غوښه خوړونکي حیوان لخوا خوړل کېږي نو اخیرنی کوربه د دې لارو په واسطه مصاب او د هغې د پزې او حلق برخې ته رسېږي. انسان کېدای شي چې د منځني کوربه په حیث د پرازیت د هگیو له لارې مثلاً د ناپاکه سبزي د

خوراک په واسطه او یا د آخري کوربه په حیث د منځني کوربه د خامې غوښې د خوړلو د لارې مصاب شي.

### نوع لینیوگواتولا سیراتا *Linguatula Serrata*:

دا پرازیت په ټوله دنیا کې وجود لري چې بندلرونکی شکل لري او د ژبې په شان هوار دی. نارینه بالغ حیوان دوه سانتي مېتر اوږد او نیم سانتي مېتر سور، بنځینه بالغ حیوان د اتو تر ديارلس سانتي مېتره اوږدوالی او یو سانتي مېتر سور لري. دا پرازیت پنځه لس میاشتي د سپي، گیدر او لپوه او کله کله د انسانانو د پزې په سمخو یعنی خالیگاو کې ژوند کوي. د دې پرازیت هگۍ چې د پزې د مایعاتو سره خارج ته گذارېږي. دا هگۍ یو لارو لري چې د داخلېدو یو جوړښت لري او د *Bohrlarve* یعنی برمه کوونکي لارو نوم ورته ورکړل شوی دی. کله چې دا هگۍ د نبات خوړونکي لخوا و خوړل شي (انسان هم دې کې شامل دی) د هغو په کولمو کې سوري پیدا کوي او د وینې د لارې مختلفو غړو لکه ځیگر او سږو ته داخلېږي چې هلته شپږ یا اووه میاشتي پاتې او پوستکې اچوي. اخرنی لارو چې د *Nymphe* په نامه هم یادېږي د خنجرکونو لرونکی او د بالغ حیوان سره ډېر ورته والی لري. دا لارو په یو کاپسول کې پاتې کېږي ترڅو دغه منځنی کوربه د یو غوښه خوړونکي لخوا و خوړل شي، چې پلاخره د پزې په خالیگاه کې د یو وار پوستکي غورځولو وروسته بالغ حیوان ته بدلېږي. کله کله کېدای شي چې دا لارو د منځني کوربه یعنی غوښه خوړونکي په وجود کې پزې ته ورسېږي او هلته بالغ شي. د دې پرازیت بنځینه جنس د ورځې تر پنځه سوه زره پورې هگۍ اچوي.

### نوع ارمیلیفیر ارمیلاتوس *Armillifer armillatus*

د دې پرازیت بالغ حیوان د یو مېخ شکل لري چې خارجي کوتیکولا یې مایل شکلي

دایرې لري. نارینه د درې تر څلور نیم سانتی مېتر اوږدوالی او نیم سانتی مېتر سور او بنځینه د نهو تر شپاړس سانتی مېتر اوږد او 0,7 سانتی مېتر سور لري. د گرمو منطوقو د مارانو په تنفسي سیستم کې ژوند کوي. د هگي څخه یې اولنی لارو راوځي. کله چې دا هگي د منځني کوربه لخوا چې مورک ورته حیوانات او بیزوگان دي او د مارانو لخوا د غذا په حیث استعمالېږي او خېستل شي نو د هغوی په وجود کې لارو پوستکی اچوي او اخري لارو د وجود د انساجو لخوا کاپسول کېږي. کله چې دا حیوانات د مار لخوا خوړل شي لکه د پیتون مار لخوا، نو د مار په وجود کې اخرنی پوستکی اچوي او بالغ حیوان ته نمو کوي. انسان کېدای شي د لاندنیو لیارو څخه مصاب شي.

اول، د هگيو اخیستل د چټلو اوبوله لارې.

دویم، په سلات کې د هگيو موجودیت

درېیم، د مار د پوست کولو په وخت کې د هگيو د لارې مصاب کېدل (د آسیا په ځینو هیوادونو کې ماران پخول رواج لري.)

د دې گروپ د نورو مثالونو د یادولو څخه چې د انسان د پاره هومره مهم نه دي تېرېږو.

## فایلم انیلیدا Phylum : Annelida حلقوي چينجيان

د انېليدا نوم د هغو حلقو څخه منځ ته راغلی چې هر یوه یې دوه حقیقي خالیگا

یا Coelum لري. د دې ګروپ د وجود جوړښت د پلنو او ګردو چينجيانو څخه اساساً  
فرق لري. دا ګروپ اکثراً په آزاد ډول ژوند کوي چې زیات یې نرېښي دي. دوی په ځمکه،  
ختو او بحر کې پیدا کېږي. د دې ګروپ څخه یوازې لږ انواع یې پرازيتي ژوند لري لکه د  
Hirudinea یا د ژورو ګروپ

سیستماتیک:

فایلم Phylum : Annelida

کلاس Klass : Polychaeta چې په وجود ډیر برسونه لري او آزاد ژوند لري.

کلاس Klass: Myzostomida په بحري ستورو کې پرازيتي ژوند لري.

کلاس Klass : Clitellata کمربندي چينجيان

اردر Order : Oligochaeta لږ برسونه لري مثال یې د ځمکې چينجی دی چې آزاد  
ژوند لري.

اردر Order : Hirudnea ژورې چې اکثراً پرازيتي ژوند لري.

فاميلي Family : Rhynchobdellida خلطمي ژورې

فاميلي Pharyngobdellidae: حلقومي ژورې Family

فامیلې Family : Gnathobdellidae ژاملې لرونکې ژورې.

فامیلې Family : Acanthobdellidae برس لرونکې ژورې

هیرو دینا اکثر په خوږو او یو یعنی د سیندونو او ولو او همدارنگه په ولاړو او یو او لمډو بیوتوپونو کې پیدا کیږي او بنکاري یا غلچکي ژوند لري. ډیر لږ تعداد یې وینه شبنونکي دي. چې له دې امله د وینې چینجې په نامه هم یاد یږي.

د هیرو دینا په وجود کې د پرازیتي ژوند یعنی د وینې شنبلو له امله ځینې توافقات منع ته راغلې دي.

اول: وجود یې نری او یا دپانې شکل لري چې مسطح دی. خو خپل خارجي شکل ته تغیر ورکولای شي.

دوهم: داخلي بندونه چې تعداد یې دوه دیرشو ته رسېږي نه لیدل کیږي هر یو بند د دوه تر خوارلسو پورې حلقې لري.

دریم: حقیقي خالیگاه یا Coelom بیرته له منځه ځي. او په ځای یې عضلات اود وینوڅخه ډکیدونکي انساج منع ته راځي.

څلورم: د وجود په اول او اخر کې قوي عضلاتي سوري لري چې د ځان د کلکولو او حرکت لپاره ترې استفاده کیږي.

اول فامیلې رنچوبدیلې دای Rhynchobdellidae:

دا چینجیان چې غابنونه او زامې نلري کولای شي خپل حلقوم د یو خلطم په شکل بیرون وباسي. او د زیات فشار پواسطه وینه او د اپیدرمس انساج وجود ته داخل کړي. ددې گروپ خپله وینه سپین رنگ لري. دا گروپ زیاتره د ماهیانو پرازیتونه تشکیلوي ځینې

بي د غوايانو او سپو په پزه کې کله چې هغوي اوبه څښي داخليږي چې د ثانوي انفکشن او د کوربه د ضعيفتيا له امله د هغوي د مرگ سبب گرځي.

### دوهم فاميلي فارنگوبديليدای *Pharyngobdellidae*:

دوي هم غابنونه او زامې نلري. او هم خپل خلطم بيرون ته نشي راويستلاي بلکه د يو قوي عضلاتي حلقوم پواسطه وينه اخلي. ددې گروپ خپله وينه سور رنگ لري او درې څلور جوړه سترگې لري چې دهغې پواسطه خپل کوربه په اکتيف ډول لټوي ددې گروپ هم زيات د ماهيانو پرازيتونه تشکيلوي.

### درېم فاميلي گناتوبديليدای *Gnathobdellidae*:

ددې گروپ اکثر غړي چې ځيني يې تر پنځوس سانتی مترو اوږده دي، غابنونه او زامې لري. ژورې خپل کوربه ته د اوبو د حرکاتو پواسطه چې د کوربه لخوا منع ته راځي ځان نږدې او په لنډه فاصله کې د بوي حس يا کيمياوي حس پواسطه خپل کوربه ته ځان رسوي. چې بيا د کوربه په پوستکي حرکت کوي او د وينو څښلو لپاره ځان مطلوب ځاي ته رسوي. ددوي تر ټولو مشهوره نوع *Hirudo medicinalis* دې چې د ډير پخوا څخه په طبابت کې استعمالیږي. په دې عقیده چې خرابه وينه څښي. دوي د وينې د څښلو په وخت کې اول يوه د بي حس کولو او د وينې د رقيق کولو يا نري کولو ماده د وينو څښلو ځاي ته داخلوي چې په دې ډول د وينې څښل اسانېږي او همدارنگه دا مواد د وينې فشار هم کموي. د وينې د څښلو په وخت کې د مريضی عوامل هم د کوربه وجود ته داخلېداي شي خو زيات زيان کوربه ته د وينې د کمبود له ليارې رسيږي. ژوره کولاي شي د خپل وزن لس چنده وينه وڅښي. او زياته وينه د څښلو وروسته د کوربه د زخم څخه د بهيدو په نتيجه کې ضايع شي. په مجموعي ډول د يوې ژورې پواسطه د يو وار وينې څښلو په نتيجه کې پنځوس ملی ليتره وينه ضايع کيداې شي. ژوره کولاي شي د يو وار وينې

اخيستلو وروسته تريونيم كاله پورې په هغې وينې ژوند وکړي. هگۍ چې د دوه نرنيځي حيواناتو د جنسي موادو د تبادلې وروسته منځ ته راځي د دوه سوو پورې په يو لزجي ماده کې سره يو ځای په کوم جسم کلکې شوي وي ځينې انواع يې هگۍ له ځانه سره گرځوي. د دوی وده مستقيمه ده يعنې لارو نه لري. د دې گروپ پورې اسيايي ژوره چې لس سانتي مېتره اوږده او د *Haemadipsa Ceylanica* په نوم يادېږي اړه لري چې ډېر تعداد انسانان او حيوانات مصابوي. بيا د ثانوي انفېکشن په واسطه د مختلفو امراضو حتی د مرگ سبب گرځي. د مريضو انتقال د ژورو په واسطه له ډېر پخوا څخه معلوم دی خو کم تحقيق پرې شوی دی. د تحقيقاتو په نتيجه کې چې په *Hirudo medicinalis* اجرا شوي دي معلومه شوې ده چې بکتريوفاگ، بکتريا او د کوربه ليمفوسيت تر نيم کاله پورې د ژورې په کولمو کې ژوندي پاتې کېږي. ځينې پرازيتونه لکه *Toxoplasma Gondii*, *Tripanosoma brucei* او د پلازموډيوم ځينې انواع اقله تريوي مياشتې د ژورې په کولمو کې مصاب کونکي پاته کېږي. خو د ژورې په لعابيه غدواتو کې تر اوسه نه دي موندل شوي. نو له دې امله مصاب کېدل يوازې د وينې څخه وينې ته د انتقال په واسطه ممکن دي. دا هغه وخت ممکن دي چې يا په ژوره باندي د ميخانيکي فشار په نتيجه کې او يا د کوربه په زخم کې او يا د ژورې لخوا د *Regurgitation* يعنې گرځون يا قي په نتيجه کې کوربه ته انتقال شي. په هر صورت بايد ژوره که له يوې خوا له دې امله چې يو ډېر مقدار وينه ځيني د مريضۍ انتقال کونکي په حيث هم له نظره ونه غورځول شي. په کامرون کې د سيندونو د ژورو په کولمو کې موجوده وينه د ايډز *HIV I* او *HIV II* او همدارنگه د زيږي *Hepatitis A* او *B* په مقابل کې مثبت عکس العمل بنودلی دی (Nehili and Mehlhorn 1995). دا بنيابي چې د کوربه څخه اخستې وينه تر ډېره وخته پورې مصاب کونکي ده.



## دریم فصل

### بند پنبی یا ارتروپودا : Arthropoda

ددې گروپ مشخصات د یو هیټیرونوم یا غیر مشابه بندونواو یو خارجي زیات او کم سخت اسکلیت موجودیت دې چې د شیتین څخه جوړ شویډي. حیوان د نمو لپاره اړ دی چې پوستکی واچوي. د وجود او پنبو هیټیرونوم جوړښتونه د پوستکي پواسطه نښتي دي. د خولې د جوړښتونو له پلوه ارتروپودا په Amandibulata چې مانډیبل نلري چې غڼې یا Chilecerata ورپورې اړه لري. او Mandibulata چې مانډیبل لري او چنگاښونه یا Crustacea او حشرات یا Insecta ورپورې مربوط دي، تقسیمېري.

ارتروپودا د پرازیتی نقطه نظره اهمیت لري:

اول: اکثر ارتروپودا د خارجي پرازیت په حیث کوربه ته تاوان رسوي.

دوهم: دویرسونو او بکتریاو او د ایندوپرازیتونو د ځینو مرحلو د انتقالوونکي په حیث.

دریم: د الوتونکو او تیز حرکت کوونکو حیواناتو په حیث د ویکتور په ډول اپیدیمیک مرضونه منځ ته راوړي.

## غڼې شکلي حیوانات یا شیلی سیراتا *Chilecerata*:

ددې ګروپ مشخصه داده چې بالغ حیوانات یې څلور جوړه پښې لري. د خولې جوړښتونه یې یو جوړه قیچې ډوله *Chelicer* او بند لرونکی لمسي ارګان یعنې *Pedipalp* لرونکي دي. حقیقي غڼې *Aranea* او لړمان ښکاري ژوند لري. خو په *Acarina* یعنې د کوناي په ګروپ کې د دوی ډیر تعداد اکتو پرازیتي او کله کله اندو پرازیتي ژوند لري. د *Acarina* ګروپ د مخکني ګروپ سره د وجود د جوړښت له امله فرق لري. په دې معنې چې د وجود بندونه یې سره یو ځای شوي او وجود یې په *Pro* او *Opisthosoma* نه دی تقسیم شوی خو د سر په برخه کې چې د خولې جوړښتونه لري د باقی وجود څخه جدا شوي او د *Gnathosoma* او *Capitulum* په نوم یادېږي. په *Acarina* کې *Metastigmata* او *Mesostigmata* یو د بل څخه فرق کولای شو.

## کنه یا کوناي *Ticks, Zecken*:

دوي چې د اکارینا *Acarina* د ګروپ پوری اړه لري، د ویني تراخیستلو وروسته تر درې سانتي مترو پورې غټېږي. انسان او کورني حیواناتو ته مختلفې مریضي ګانې انتقالوي چې عامل یې بکتريا، ویروس، رکیټسیا، پروتوزوا او چینجیان لکه نیماټودا دي. دا انتقال د وینې د اخیستلو په وخت کې صورت نیسي. د وینې داخیستلو لپاره د یو جوړښت پواسطه چې هیپوستوم *Hypostom* نومېږي په پوستکي کې یوه کنده وباسي چې بیا په هغې کې راټوله شوې وینه څښي. او د وینو دا څښل د څو دقیقو څخه تر ورځو پورې دوام کولای شي. همدارنگه د وینې داخیستلو په وخت کې داسې مواد زخم ته تزریق کوي چې درګونو د لویوالي او بې حسۍ سبب ګرزي او په عین وخت کې د وینې د پرند یا لخته کیدو مانع ګرزي. همدارنگه عصبي زهري مواد وجود ته داخلوي چې د

وجود د شل کیدلو سبب گزړي. چې اول پېښې بیا لاسونه او بالاخره تنفسي عضلات د حرکت څخه غورزوي. او بالاخره د مرگ سبب کیدای شي. البته دغه مریضي په لومړيو څلېرویشته ساعتونو کې د تداوی وړ ده. د وینې اخیستل د پوستکي او هڅې اچولو څخه مخکې ضرور دي خو کولای شي دوي تر ډیره وخته په بعضې انواعو کې تر لسو کالو هم بې وینې اخیستلو ژوند وکړي. د بعضې استثنا تو نه پرته ددوي دواړه جنسونه وینه څښي او په کوربه حیوان کې د وینې کموالي یا Anämie سبب گزړي. کوني ځانونه د خنجکونو پواسطه په کوربه حیوان کلکوي چې د وینې څښلو وروسته هم په کوربه پاتې کیږي. ددې لپاره چې کوني د وجود څخه لیرې کړل شي د کوني بدن د غوړو پواسطه پټیږي چې په دې صورت کې د کوني تنفسي سوري یا Stigma بندیږي او د کوني د مرگ سبب گزړي چې بیا یې جدا کول ممکن دي. کله کله کیدای شي چې په ډیره کراری سره دیو پنست پواسطه د کوني د وجود پاسنۍ برخه چې په پوستکي وي نیول کیږي او په ډیره کراری د کش کولو پواسطه د وجود څخه خارجیږي خو په هر صورت باید د ناڅاپي کش کولو څخه جلوگیری وشي ځکه چې د کوني په وجود کې موجوده وینه او په هغې کې د مریضۍ موجود عوامل بیرته د کوربه وجود ته داخلېږي. د وینې د څښلو په وخت کې دنر او نسجې القاح صورت نیسي. اوبنځه یی خوزره هڅې اچوي چې دهغې څخه بیا په ترتیب سره د کوني لارو، نیمف Nymph او بالغ یا Imago نمو کوي.

په کونو کې دوه فامیلونه چې Argasidae او Ixodidae نومېږي یو له بله فرق کیدای شي. خو په دواړو فامیلونو کې د هڅې څخه لارو، نمف او بالغ حیوان منع ته راځي. البته د هرې مرحلې په پای کې یو وار پوستکي اچول صورت نیسي.

د کوربه د پیدا کولو لپاره دوي کیمیاوي حسي جوړښتونه لري. چې په مخکینۍ پښو او

خاصو جوړښتونو کې چې د کندې شکل لري او د Hallersche Organ په نوم یادېږي موجود دي.

په Argasidae کې دهرې وینې څښلو وروسته کونی په ځمکه لوېږي خو په Ixodidae یو کوربه اي، دوه کوربه اي او درې کوربه اي کونی موجود دی. په یو کوربه ای کې کله چې لارو د هگۍ څخه راوځي یو کوربه پیدا کوي او د بلوغت تر وخته په همدې کوربه پاتی کیږي. یوازې مونث جنس د هگۍ د اچولو لپاره د کوربه څخه په ځمکه لوېږي او هگۍ اچوي. په دوه کوربه ای کې لارو یو کوربه مصابوي کله چې نمف وینه وڅښي په ځمکه لوېږي او په ځمکه کې پوستکی اچوي او کله چې بالغ شي نو بیا بل کوربه لټوي چې هلته بیا وینه څښي او جنسي مقاربت صورت نیسي. چې بیا مونث جنس په ځمکه لوېږي او هلته هگۍ اچوي. په درې کوربه اي کې د وینې څښلو وروسته هره مرحله خپل پوستکي اچول په ځمکه کې پایې ته رسوي او بیا نوی کوربه پیدا کوي. چې اکثره نوی کوربه له مخکنی څخه لوی وي. لکه مورک لمړی کوربه، سوی دوهم کوربه او غوایي دریم کوربه. دغه نمو کیدای شي د مختلفو اقلیمونو د تاثیر لاندې ددرې میاشتو څخه تر درې کالو پورې دوام وکړي.

غذا اخیستل: د وینې اخیستل په کونې کې د ماشي په پرتله ډیر دوام کوي. او دوي کولای شي د کیمیاوي موادو د تاثیر لاندې چې بې حس کول او د وینې د نري کول دي د خپل وجود څو برابره وینه وڅښي. همدارنگه د کونې څخه داسې مواد خارجېږي چې د کوربه معافیوي سیستم ضعیفوي.

په Ixodidae کې د وینې اخیستل په لاندې مرحلو کې صورت نیسي:

لومړی: د وینې د څښلو د کانال آماده کول      تر څلیرو بیشت ساعتونو پورې.

دوهم: په کراره د وینو خښل د دوو تر څلورو ورځو پورې

دریم: په سرعت د وینو خښل د دولس تر شپږدیرشو ساعتونو پورې

څلورم: د کوربه ژر پریښودل او ځمکې ته لویدل.

د مریضۍ د انتقال لارې:

لومړۍ: د مریضۍ د عواملو انتقال د لارو له لارې صورت نیسي. یا Transstadial

دوهم: د هگۍ پواسطه راتلونکې نسل ته انتقالیږي. یا Transovariell

دریم: د وینې د واپس قې کولو له لارې یا Regurgitation

د کونو پواسطه په اروپا کې دوه خطرناکې مریضۍ انتقال کیدای شي. چې یوه یې ویروسي ده او FSME یا پسرلني مینینګوسفلیتیس Meningocephalitis په نوم یادېږي چې ددوی په اولو وختو کې منځ ته راځي چې د دماغ د پردې التهاب منځ ته راوړي. او بله یې بکتریايي ده چې د Borreliose په نوم یادېږي. د کونې د چیچلو وروسته د ویروس په مقابل کې تر دريو ورځو پورې د پاسیف واکسین امکانات شته او اکتیف واکسینیشن هم لري. بکتریا چې Borella burgdorferi نومېږي د پنسلین او تتراسیکلین پواسطه تداوي کیدای شي او که تداوي نشي ډیره خطرناکه ده او د مرګ سبب ګرزي. ددوي انتقال کونکې کونې د Ixodes ricinus په نوم یادېږي. کونې څو کاله ژوندی پاتې کېږي او همیشه کولای شي انسان مصاب کړي. همدارنگه ویروس او بکتریا د هگۍ له لارې نوي نسل ته هم انتقال کیدای شي.

## اکارین (میلب) Mites, Milben:

دا پرازیتونه هم د اکارینا Acarina پوری اړه لري چې لویوالی یې د ملي متر د پنځمې برخې څخه تر یو ملي متر پورې رسیږي. چې ډیر کوچني دي. او کله د سترگو په واسطه هم نه لیدل کیږي. دوي هم د خپلې نمو دپاره د لارو، نمف او بالغ حیوان مرحلې ته ضرورت لري. چې بالغ حیوان یې څلور پښې لري. اکثراً ځان د هغه عضوي موادو څخه چې په ځمکه، نباتاتو او نورو غذایی موادو لکه اوږو کې موجود دي، تغذیه کوي. په اوږو کې ددوي د موجودیت له امله ډوډۍ پخونکو ته الرژي پیدا کیږي. د الرژي علت د میلب په وجود وپښته دي. همدارنگه د خوب په بسترو کې هم ددوي له امله انسانانو ته الرژي پیدا کیږي. په جرمني کې شل په سلو کې خلک دالرژي لري. همدارنگه په غالبو تغرونو او نورو فرشونو کې هم میلب پیدا کیږي چې د کور ددوړې الرژي په نامه یادېږي. چې په جرمني ژبه کې ورته Hausstauballergie وایي منځ ته راوړي. ځینې انواع یې د انسان په پوستکي کې ننوزي چې هلته د زخمونو او خرابت سبب گزي. یوه نوع یې چې اقتصادي اهمیت لري د *Varroa jacobsoni* په نامه یادېږي. دا میلب د اسيا او خصوصاً د افغانستان څخه د شاتو مچيو سره راوړل شوی دی چې په اروپا کې دډیرو شاتو مچيو د مرگ سبب گزي. دا ددې یو مثال دی چې د انسان په خپل لاس یو پرازیتي پرابلم چې پخوا په اروپایي یا غربي شاتو مچيو کې نه وو د شرقي شاتو مچيو پواسطه خلق شو یا منځ ته راغی. شرقي شاتو مچی ددې لپاره اروپا ته وړل شوي وې چې د غربي شاتو مچی سره القاح او یو نوې نسل ترې منځ ته راشي چې حاصلات یې زیات او د مریضیو په مقابل کې مقاوم وي خو نتیجه یې برعکس شوه او نوي پرابلمونه یې منځ ته راوستل.

## حشرات کلاس انسکتا (Hexapoda) :Klass : Insecta

داد حیواناتو ډیر لوی گروپ دی. ددې گروپ لومړي ابتدایي بې وزره انواع Apteriyota نومیري ددې په مقابل کې Pterygota وزر لرونکې حشرات دي خو په ځینو کې په ثانوي ډول وزرې له منځه تللی دي.

موږ دلته یوازې هغه حشرات چې پرازیتی ژوند لري مطالعه کوو:

د حشراتو رول مختلف دی:

اول: د منځني کوربه په حیث

دوهم: د ویکتور یا انتقالوونکي په حیث د بکتريا او ویروسونو لپاره

دریم: د میخانیکي انتقال کوونکي په حیث د پروتوزوا او بکتريا لپاره لکه د مچانو پواسطه د امیب د سیستونو انتقال.

د حشراتو د وجود جوړښت:

لومړی: وجود چې بندونه لري د سر یا Caput سینې یا Thorax او تنې یا Abdomen څخه جوړ شوی.

دوهم: خارجي اسکلیت د شپیتین څخه جوړ شوی. نسځینه او نارینه جنس یې یو له بل څخه فرق کیدای شي.

دریم: سر چې دیو بند څخه جوړ دی یوه جوړه انتن ، بطني طرف ته درې جوړه خولني جوړښتونه یعنی ماندیبل Mandibel، اول او دوهم Maxil لري. همدارنگه مرکبي سترگی لري چې په ځینو انواعو کې یې نقطه اي سترگو ته تناقص کړیدی.

خلورم: درې دسینې یا Thorax بندونه چې د Prothorax, Mesothorax, Metathorax یا پروتوراکس، میزوتوراکس او میتاتوراکس په نوم یادېږي د سینې هر بند یوه جوړه پښې لري او هره پښه د پنځو برخو یعنې Coxa, Trochanter, Femur, Tibia, Tarsus یا کوکسا، تروخانتر، فیمور، تیبیا، تارسوس څخه جوړه شویده. چې د ارتروپودا نوم هم له دې څخه یعنې چې پښې یې بندونه لري اخیستل شویدی.

پنځم: د میزو او میتا توراکس پواسطه دوه جوړه وزرونه جوړشوی چې کله په ثانوي ډول له منځه تللی دي.

شپږم: تنه یا Abdomen پښې نلري. خو پکې اطراحی او جنسي جوړښتونه موجود دي.

اووم: تنفس یې د تراخیا Trachea پواسطه صورت نیسي. د تراخیا نلونه تر هرې حجرې پورې رسېږي. او د بیرون سره د سورو پواسطه تماس لري.

اتم: زړه چې د یو نل شکل لري. شا خواته، عصبي سیستم د خیتې خواته او کولمې یې دیو نل پشان په مرکزي برخه کې موقعیت لري.

نهم: د بعضې حشراتو په منځنیو کولمو کې پردې موجودې دي. چې د Peritrophic Membran په نوم یادېږي. چې د کولمو اپیتیل ته د پرازیتونو او مضرو غذایی موادو د ننوتلو مخنیوی کوي.

وزر لرونکي حشرات یا Pterygota د خپلې ودې له کبله په دوه گروپونو تقسیمېږي:

اول: هیمي میتابولا Hemimetabola: په دې گروپ کې وده په تدریجي ډول د پوستکي اچولو پواسطه صورت نیسي. چې لارو د بالغ حیوان سره مشابهت لري چې د



نمف Nymph په نامه يادېږي. ددې گروپ مثالونه خسکې او سپرې دي.

دوهم: هولو ميتابولا **Holometabola**: په دې گروپ کې د لارو پسې د پوپې Puppe مرحله منځ ته راځي چې په دې مرحله کې د لارو شکل بيخي بدلېږي او يو ميتامورفوزې منځ ته راځي. چې د پوپې مرحله کله به حرکت او کله لکه په ماشي کې حرکت کوي. خو دا داستراحت يوه مرحله ده چې حيوان پکې غذا نه اخلي.

### سپرې، فتيراپتيرا Order : Phthiraptera

په دې گروپ پورې د فقاريه حيواناتو اکتوپرازيتونه مربوط دي. چې مهم يې Anoplura دي په انسان کې ددې گروپ پورې مربوط درې ډوله سپرې پيدا کېږي.

لومړی: د سر سپرې يا *Pediculus humanus capitis* چې ددوه تر درې نيم ملي متره اوږدوالی لري.

دوهم: د جامو سپرې يا *Pediculus humanus corporis* چې د درې تر څلور نيمو ملي مترو پورې اوږدوالی لري.

درېم: د شرم دوښتو سپرې يا *Phthirus pubis* چې د انسان د جنسی جوړښتونو پر ويښتو ځان نښلوي. چې د يو څخه تر يو اعشاريا دوه ملي مترو پورې لويوالی لري.

ددې ټولو مشخصه داده چې سر د سينې څخه کوچنې دي او وزرې نلري. او د خنجرک شکلو پښو پواسطه ځان په ويښتو يا جامو تينگوي. دوي کوچنۍ نقطه اي سترگې لري ټول انواع يې چيچونکې او وينه کشکونکې د خولې جوړښتونه لري. د جامو سپرې نشي کولای دديرشو ساعتو زيات به غذا ژوند وکړي. همدارنگه د ويښتو سپرې په لږو ورځو کې به غذا مړې کيږي. د سپرې بنځينه جنس د جنسي مقاربت وروسته د ورځې

درې يا څلور هگۍ اچوي او دريچې يا Nissen په شکل په جامو او ويښتو نښلي. انساني سپرې تقریبا تر نوي پورې هگۍ اچوي چې هگۍ يې يو سرپوښ لري. د محیط د حرارت مربوط د څلورو تر څوارلسو ورځو په جريان کې ترې يوه وينې څښونکې نمف يا کنه پيدا کيږي. چې د بلاغت تر مرحلې پورې درې وارې پوستکي اچوي او ټوله نمو يې د دوه تر څلورو هفتو پورې دوام کوي. سپرې د دیرشو تر پنځوسو ورځو پورې ژوند کولای شي. د سر او جامو سپرې په اکتيف ډول او يا په پاسيف ډول د رمنځې پواسطه انتقاليدای شي خو د شرم دوښتو سپرې بې حرکته ده او يوازې د جنسي مقاربت او مستقيم تماس پواسطه يې انتقال صورت مومي. د سپرو اهميت په دې کې دی چې وينه څښي او د جلدي مريضو سبب گزي خو ددې په خوا کې د مختلفو مريضو لکه حماي لکه دار د مريضۍ عامل انتقالوي.

### خسکې، رنچوتا **Order : Rhynchota**.

ددې گروپ څخه دوه نوع دانسان لپاره مهم دي:

#### ښکاري خسکې يا **Reduviidae** او د بستري خسکې يا **Bettwanzen**

ځينې نورې خسکې د نباتاتو څخه غذا اخلي له دې امله د نباتي امراضو سبب گزي.

ټولې خسکې چيچونکې کشکوونکې د خولې جوړښتونه لري چې د دوهم ماکسيل د تغيير څخه منځ ته راغلي يو پوښ جوړيږي. دا جوړښت د وينې اخيستلو په وخت کې بيرون ته راوځي. د کوربه په پوستکي کې تبغ شکل منډيبل او اول ماکسيل خپل مواد پيچکاري کوي چې دوه خاليگاوي جوړوي چې يوه د لارو دپاره او بله دغذايي موادو د اخيستلو دپاره. د خسکو نمو لکه د سپرو پشان د هيميميتا بول شکل يعنې لارو نمف او

بالغ حیوان له لارې صورت نیسي.

بنکاري یا غلچکې خسکې چې د چگاس مریضي انتقالوي چې د مریضي عامل  
Trypanosoma cruzi دی او دا خسکې د Triatoma او Rhodnius د جنس پورې  
اړه لري.


د بستري خسکې چې د Cimex او leptomimex د جنس پورې مربوط دي یوازې د  
انسانانو د ژوند په ځایونو کې اوسېږي. چې په وږي حالت کې مسطح شکل لري او د  
څلورو تر پنځه ملي متره اوږدې دي. دوي دورځې ځانونه په چاودونو کې پټوي. خو د  
شپې لخوا د انسان څخه وینه څښي. د چيچلو څخه وروسته د څارښت او حساسیت سبب  
گرزي چې د چيچلو ځای پرسپړی او متیو کې کیږي. بالغ حیوان تر یوه کاله پورې ژوند  
کوي او تر شپږو میاشتو بې له غذا ژوند کولای شي. هر بنځینه جنس د دوه سوه تر پنځه  
سوه پورې هگۍ اچوي. چې یو ملیمتر قطر او سپین رنگ لري. خسکې د مریضي د  
انتقال کوونکې په حیث دومره اهمیت نلري. خو د بویناکو غدو لرونکې دي چې ددغه  
بویناکو موادو د بوي پواسطه دوي سره راغونډیږي. د انسان پیدا کول د کیمیاوي حس  
پواسطه کوي دا سې چې د انسان د وجود شحمي تیزاب بوي کوي او د انسان خواته  
حرکت کوي او یا هغوي ځان د کوټو د چت څخه چیرې چې خسکې ژوند کوي ځان د  
انسان د پاسه راگوزاروي.

## دوه وزري حشرات یا دیپتیرا Order : Diptera

دا گروپ حیوانات Holometabola دي. ددې گروپ مشخصه د یو جوړه پاسني لویو  
وزرو او ددوه متناقصو لاندینیو وزرونو چې د Halter په نوم یادېږي. موجودیت دی.  
ددې اردر درې مهم گروپونه په لاندې ډول دي:

لمړې: Nematocera يا ماشي: انتنونه يې شپږ يا تر دې زيات بندونه لري.  
دوهم: Brachycera يا غوبارې: انتنونه يې درې بندونه لري.

درېم: Cyclorrhapha يا مچان: چې انتنونه يې درې بندونه لري خو د خاصو جوړښتونو چې د Arista په نوم ياديږي، لرونکي دي.



اوه د يرشم شکل: د Diptera مختلف فورمونه په شيماتيک شکل:

نيماټوسيرا a. براخي سيرا b. سيکلو رافا c

دلکې بندونه يې د شميرله پلوه سره ډير فرق لري او همدارنگه په حسي جوړښتونو کې چې په سر کې واقع دي څرگند تفاوت ليدل کېږي. شاتني وزرونو يې تناقص کړي او د Haltere په نوم ياديږي.

لکې AB, اريستا AR, انتن AT, سترگې AU, هلتير HA, مخکنی وزرونه VF

## ماشې يا نيماتوسيرا *Nematocera*:

تارشکلي اتنونونه لري. چې په مذکر جنس کې برسونه هم لري. څلور فاميلونه يې د انتقالوونکي يا منځني کوربه په حيث په انسانانو او حيواناتو کې مريضې توليدوي چې په لاندې ډول دي:


### فاميلي کولي سيداى *Family : Culicidae*

ددې گروپ بنځينه غړي چې د *Anopheles*, *Aedes*, *Culex* او نورو جنسونو پورې اړه لري د کوربه څخه د خپلو هگيو د نمو لپاره په هرو درې څلورو ورځو کې اکثرا د شپې له خوا يو وار وينه څښي. دوي کولاي شي د اتو تر لسو ورځو پورې لوړه تيره کړي. نارينه غړي يې د نباتاتو څخه د غذايي منبع په حيث استفاده کوي. بنځينه جنس په مختلفو انواعو کې د څلويښت تر څلورسوه پورې هگي. اچوي چې په *Anopheles* او *Aedes* کې جدا او په *Culex* کې د يوې کشتۍ په شکل سره يو ځای نښتي وي. دوي خپلې هگي يا په مرطوب بيو توپ او يا مستقيما په اوبو کې اچوي. د حرارت مربوط تري ددولسو ساعتو څخه تر دوه ورځو په موده کې يو بې سترگو لارو پيدا کيږي. چې د وجود په اخري برخه کې د يو موجود سوري له لارې چې د اوبو څخه راوتلی وي هوا اخلي. د *Aedes* او *Culex* لارو د اوبو د سطحې سره په يوه خاصه زاويه پروت او د ددې سوري چې د سيفون يو شکل لري د اوبو د سطحې سره په تماس کې دی. خو د *Anopheles* لارو د اوبو د سطحې سره موازي بې له کوم سيفون پروت وي. چې دا خاصيت د لارو په پيژندلو کې اهميت لري. لارو ځان د نباتاتو څخه تغذيه کوي. لارو څلور وارې پوستکي اچوي چې ټول د لسو تر څوارلسو ورځو پورې دوام کوي. بيا د څلورم لارو څخه پويې *Puppe* منځ ته راځي چې متحرکه ده خو غذا نه اخلي. ددريو ورځو

وروسته د پوپي څخه بالغ حيوان خارجيږي.

Aedes او Culex په جنس کې لږې انواع د مريضۍ عامل انتقالوي خو د انافيل شپيته مختلف انواع د ملاريا پرازيت انتقالوي. همدارنگه د هگيو د لارې د وروس انتقال هم په دوي کې ليدل شويدي. خو د هگۍ له لارې د پروتوزوا او چينجيانو انتقال ندې ليدل شوی.

د وينې د څښلو په وخت کې بنځينه حيوان بو کوچنې رگ سوري کوي چې دوي ته د Vessel feeder هم له دې امله ويل کيږي. ددې چيچلو په مقابل کې دکوربه وجود د خارښت او پرسيدلو په شکل الرژيکي عکس العمل ښکاره کوي.



اته د يرشم شکل:

په Culex او Anopheles کې د بالغو لارو په منځ کې توپيرونه د ناستي په حالت او په اوبو کې چې د ماشي په پيژند لگو کې مهمه ونډه لري

د ماشي د منځه وړلو طريقي:

د ماشي د منځه وړلو مختلفې لارې موجودې دي.

- ◀ کيمياوي طريقه: د مختلفو کيمياوي موادو د پاشلو له لارې.
- ◀ فزيکي طريقه: د فزيکي شعاعو پواسطه د نر جنس خنثي کول او دهغوې خوشې کول په محيط کې چې په نتيجه کې شنډې هگۍ منځ ته راځي.
- ◀ بيالوژيکي طريقه: د يوې بکتريا چې *Bacillus thuringiensis* نومېږي سپورونه د ماشي د لارو په معده کې زهري مواد خوشې کوي چې د لارو د کولمو ديوال تخريبي او لارو غذا نشي اخيستلای د سپور څخه پيدا شوې بکتريا د ماشي د وجود داخل ته ننوزي او هلته زهریت يا Sepsis منځ ته راوړي لارو له منځه ځي. ددې فاميلي غړي ملاريا ، انکوسيرا او فلاريا انتقالوي.

### فاميلي سيمولی دای Family : Simuliidae

ددوي بالغ ماشی تور رنګ لري. ددوه تر پنځه ملي متره جسامت لري. په دې گروپ کې هم مونث جنس خو يوازې د ورځې لخوا وينه څښي. مذکر جنس چې مرکبې سترگې لري. ځان د نباتاتو د شيرې څخه تغذيه کوي. د پخواني گروپ پر عکس دوي اړه شکل منديبل لري چې د لومړي ماکسيل سره يو ځای د انسان پوستکۍ شکوي او دهغه وينه څښي چې هم ورته وايي. Pool Feeder. ددې ماشي چيچل دردناک دي. دوي په خپل کوربه په

دیر تعداد یو ځای حمله کوي چې په نتیجه کې حتی په لویو حیواناتو لکه غوایانو کې د شوک او د حیوان د مرگ سبب گزي. کله چې بالغ حیوان د پوپې څخه راوځي سمدستي جنسي مقاربت صورت نیسي. مونث ماشی د هگی د اچولو دپاره وینې ته ضرورت لري. څلور پنځه ورځې د وینې څښلو څخه وروسته تقریبا دوه نیم سوه هگی اچوي چې د اوبو په نباتاتو او یا تیږو یې کلکوي. په داسې اوبو کې چې تېزې بهیرې لارو اوبه فیلتر کوي او غذایی مواد ترې لاس ته راوړي. لارو پنځه وارې پوستکی اچوي چې د حرارت پورې مربوط تقریبا په پنځو ورځو کې په پوپې بدلېږي. د ټولې نمو دپاره نهه ورځو ته ضرورت لري. یوازې لږ انواع یې یو نیماتودا چې د *Onchocera volvulus* په نامه یادېږي او د انسان د روندوالي سبب گرځي انتقالوي.

### فامیلی فلی بوتومیډای Family : Phlebotomidae

#### جنس فلیبوتوموس *Phlebotomus* :

ددې جنس انواع دوه نیم ملي متره جسامت لري، بدن یې پلن او وزرونه یې د وینستو لرونکي دي. مذکر او مونث جنس یې د نباتاتو څخه ځان تغذیه کوي خو مونث جنس ددې پخوا کې د مختلفو کوربه او وینه څښي. د وینې اخیستلو او جنسي مقاربت وروسته پس له یو دوه ورځو په لمده ځمکه کې څو وارې د دیرشو تر پنځوسو پورې هگی اچوي. ددې هگیو څخه د شپږو تر دولسو ورځو په موده کې یو لارو منځ ته راځي. د لارو د څلورو او شپږو هفتو په منځ کې څلور وارې پوستکی اچوي. په دې وخت کې دوي ځان د خوسا شوو یعنې تجزیه شوو موادو څخه تغذیه کوي. بیا وروسته په پوپې *Puppe* بدل او د شپږ تر څوارلسو ورځو پورې ددې پوپې څخه بالغ حیوان منځ ته راځي. دا ماشي هم د بعضي مریضیو د انتقال سبب کېږي. لکه د لیشمانیا



## فامیلې سیراتوپوگونیدای Family : Ceratopogonidae

ددې فامیلې مربوط کوچني ماشي د يو تر څلور ملي متره جسامت چې انسان او ځينې کورني حيواناتو ته مختلف ويروسونه انتقالوي. ځينې انواع يې نيماتودا هم انتقالوي خو طبي اهميت يې کم دی. يوازې نبځينه ماشي يې وينه څښي چې د سترگو شاوخوا د څيټې ځينې برخې او د جامونه وتلي ځايونو نه خپله وينه لاس ته راوړي. ددوي لخوا چيچل شوي ځايونه سخت سوزي لارو يې داوبو شاوخوا لمدو ځمکو او دونو په پايو باندې ژوند کوي. د خپلې نمو لپاره دا ماشی څو هفتو ته ضرورت لري. خو نمو يې په استوايي گرمو منطقو کې يوه هفته دوام کوي.

## فامیلې تابانیدای Family : Tabanidae غوبارې يا Brachycera

ددې گروپ حشرات قوي او لوې دي. چې تر دیرشو ملي مترو پورې جسامت لري. يوازې نبځينه جنس يې وينه څښي. د جنسي مقاربت وروسته د سلو تر زرو يو ځای نښتي هگۍ اچوي چې د سيندونو د غاړې د بوټو په څانگو نښتي وي. د پنځه تر اوه ورځو وروسته لارو نمو کوي. لارو په خټو او خړو اوبو کې او سپرې چې د خوسا شوو موادو څخه او يا په غارتگر شکل ژوند کوي. د نهه ځلې پوست اچولو وروسته اخرنی لارو ځان وچو ځايونو ته رسوي او ددوه درې هفتو لپاره په کوکون يا Puppe کې پاتې کېږي. چې بيا بالغ حيوان ته نمو کوي. ددې پنخوا کې چې وينه څښي او د پوستکي بخار منځ ته راوړي د ځينو پرازیتونو لکه Loa loa لپاره د منځني کوربه پحيث کار کوي. ددې مریضۍ انتقال يوازې په څو محدودو انواع پورې مربوط دی چې ټول يوازې د Chrysops د جنس پورې مربوط دي.

## مچان یا سیکلورافا :Cyclorapha

لاندی فامیلونه ورپوری اړه لري:

Family : Muscidae : A : فامیلی الف موسکی دای:

ددې فامیلی غړي په بالغ حالت کې څټونکي او چیچونکي د خولې جوړښتونه لري. چې د هغوي پواسطه د حیواني او نباتي تجزیه شوي موادو څخه او یا د وینې څښلو لپاره استفاده کوي. دوي پروتوزوا، بکتريا او ویروس په میخانیکي ډول انتقالوي یعنی د پښو او یا د خولې د جوړښتونو له لارې د چټلو ځایونو څخه انسانانو او نورو حیواناتو ته د مریضۍ عوامل انتقالوي. د کور مچان یا *Musca domestica* تقریباً زردانې هگۍ د غواي، اس او انسان په فاضله موادو کې اچوي. ددې هگيو څخه لارو پیدا کیږي. چې هغوي یا په فاضله موادو او یا د فقاریه حیواناتو په هضمي سیستم کې نمو کوي. او د *Myasis* په نامه یوه مریضی په فقاریه حیواناتو کې منځ ته راوړي. د اوبو د گړي په شکل یوې *Puppe* څخه بالغ حیوان یا *Imago* منځ ته راځي. د نمو دوام یې د حرارت پورې مربوط د اتو تر پنځوسو ورځو پورې دوام کوي. ددې فامیلی د وینې څښونکي مثال په حیث د *Stomoxys calcitrans* څخه یادونه کوو چې نموبې د اوه ویشته او اوه دیرشو ورځو پورې دوام کوي. او د شپیتو تر سلو پورې هگۍ اچوي. مونث جنس یې او یا ورځې ژوند کوي. نر او بنځه دواړه یې وینه څښي. څرنگه چې همیشه خپل کوربه بدلوي نو په میخانیکي ډول د مریضۍ انتقال ددوي پواسطه صورت نیسي.

Family : Glossinidae : B : فامیلی ب: گلو سینی دای

دی مچانو ته د ژبې مچان هم وایي او د *Tse tse* د مچانو په نوم هم مشهور دي. دوي یو خلطم لري چې لکه د ژبې سر راوتلی وي. کوچني انواع یې د شپږ تراټه ملی متره او

او لوی یې د نهو تر خوارلسو ملي مترو پورې جسامت لري. د استراحت په حالت کې یې وزرونه یو بل پټوي او د نورو مچانو غوندې د وجود سره موازي نه دي واقع شوي. دواړه جنسه یې وینه څښي. د خولې جوړښتونه یې د سوهان شکل لري. دوي هم لکه د Simuliidae او کونو په شان رگونه شکوي او د هغې څخه وینه څښي یعنې Pool feeder دي. په خپلو لارو کې د وینې د پرند یا لخته کیدو ضد مواد لري ترڅو وینه اسانه وڅښلای شي. ددوي یوه خاصه مشخصه داده چې خپل یوازینی لارو په رحم کې د شدو د غدواتو پواسطه تغذیه کوي. کله چې دریم لارو ته ورسیري نو بیا یې یو خوندي یا محفوظ ځای ته انتقالوي او د پنځه او پنځه لس ساعتو په منځ کې ترې Puppe جوړیږي. ددې پوښې څخه د شلو او پنځه دیرشو ورځو په منځ کې بالغ حیوان منځ ته راځي. مونث جنس چې ټول نوي ورځې ژوند کوي په دې موده کې یوازې د اتو تر نهو لارو اچوي او ضرورت نلري چې د نورو غوندي په سلگونو هگی. واچوي ځکه چې دوي د خپلو بچیانو بڼه حفاظت کوي او د ژوندي پاتې کیدلو چانس یې ډیر دی. ددې مچ نولس انواع انسان او حیوان ته تریپانوزوما انتقالوي. چې په هغوي کې نهه انواع او خصوصاً Glossina morsitans او Gl. palpalis او Gl. pallidipes ددوه مهمو انساني تریپانوزوما یعنې Trypanosoma brucei rhodesiense او Trypanosoma brucei gambiense دانتقال کوونکې پحيث ډیر اهمیت لري.

### C : family Hippoboscidae : فامیلی ج هیپوبوسکی دای :

دا مچان د سپرې شکل لري. ددوي نوم له دې څخه اخیستل شوې چې د کوربه په ویښتو کې ژوند کوي. گردی قوي جسامت او قوي پښی لري چې د خنجکونو لرونکې دي. وزرونو پکې په مختلفو اندازو تنقیص کړیدی. مثلاً د اس مچ وزر لري خو د پسه مچ وزر نلري او همیشه په کوربه پاتې کیږي او انتقال یې یوازې د وجود د مستقیم تماس له لارې صورت نیسي. ټول انواع کولای شي چې انسان هم تر حملې لاندې راولي. نارینه او

بشپښه دواړه وینه خښي ، چيچل يې دردونکي او خارښت منځ ته راوړي. په حيواناتو کې وزن د کمیدو او او د وړيو د کمیت د خرابیدو سبب گرزي يعنې اقتصادي نقصان رسوي.

### میاسیس Myiasis:

دا مریضي چې د Diptera حشراتو له خوا منځ ته راځي. انتخابي او اجباري دي. او عاملونه يې په اوو فامیلونو کې موجود دي. اکثرا دغه مریضی د مچانو څخه منځ ته راځي.

### فامیلی کالیفوریدای Family : Calliphoridae

ددې فامیل مربوط د غوښې مچ دی چې فلزي ډوله ځلیدونکی طلايي رنگ لري چې نوم يې *Lucilia sericata* نومیري. مونث جنس يې په مړو موادو باندې تر پنځه سوه پورې هگۍ اچوي. چې د هغې څخه لارو چې nekrophage دی يعنې ځان د مړو انساجو څخه تغذیه کوي. منځ ته راځي. څرنگه چې دوي مړه څاروي تجزیه کوي د محیط په پاک ساتلو او غذايي دوران يا ځنځير کې مهم رول لوبوي. مونث جنس د بوي له لارې خپل کوربه پیدا کوي. او په بویناکو زخمونو کې هگۍ اچوي. د هگيو څخه لارو راوځي لمړی ځان ددغه خوسا شوو انساجو څخه تغذیه کوي خو د غذا د کمبود په وخت کې دغه متحرک لارو روغ انساج هم تر حملې لاندې نیسي زخمونه نور هم لویوي او د جوړیدو څخه يې مخنیوی کوي. اکثرا پسونه او میرې ددوي د حملې لاندې راځي ځکه چې د هغې پوستکي او وړۍ د لارو د نمو دپاره ښه شرایط برابروي.

## فاميلي کوتيربريدای : Family : Cuterbridae

### نوع ديرماتوبيا هومينيس : Dermatobia hominis

د امريکا د براعظم په استوايي منطقو کې د انسان او نورو تي لرونکو پرازيت دی. مونث جنس يې خپلې هگۍ چې شمير يې د لسو تر شلو پورې رسېږي د يو بل ماشي د تنې په لاندینۍ برخه کې اچوي او په هغه يې سریش کوي. د يوې هفتې وروسته په هگۍ کې يو لارو منځ ته راځي. کله چې دغه ماشي په کوربه کنبيني سمدستي لارو خارج او د کوربه پوستکي ته ننوزي. داسې انتقال چې په هغه کې يو بل حيوان يوازې د انتقال لپاره استعمالېږي د Phorese په نوم يادېږي.

## فاميلي گستروفيلي دای : Family : Gasterophilidae

د آس د معدې غوبارې يا گستروفيلوس انتس تينالس

### :Gasterophilus intestinalis

د دنيا په ټولو ځايونو کې پيدا کېږي رنگ يې تور او زير دی، جسامت يې لوي او په وجود وېنسته لري. د دوېي په اخر کې د اس په پوستکي هگۍ اچوي چې د هغې څخه لارو پيدا کېږي. دا لارو بيا کله چې اسونه د يو بل پوستکي په خوله چيچي خولې ته او له دې لارې معدې ته رسېږي. ځان د خنځکونو پواسطه د معدې په جدار نښلوي د لس يا دولسو مياشتو وروسته پوپې جوړوي چې بيا د فاضله موادو سره لويږي. د دوه تر څلورو هفتو وروسته ترې بالغ حيوان منځ ته راځي چې غذا نشي اخيستلای ځکه چې د خولې جوړښتونه نلري. په لږ وخت کې بايد هگۍ په کوم حيوان ونښلوي. دا پرازيت کولای شي اس ته ډير ضرر ورسوي. اسونه په غريزوي ډول له دې پرازيت څخه ويره لري چې دهغې د نږدې کيدو په وخت کې ترې منډې وهي او ډير هيجانې کېږي. حشره د اس په

سر او مخکې پښو باندې الوزې او تاویرې راتاویرې.

## فامیلې او ایستریدای Family : Oestridae

د دغه فامیل دوه مثالونه ذکر کوو:


د پسه د پزې غوبارې یا ویستروس او یس **Oestrus ovis**:

د لسو تر دولسو ملي مترو جسامت لري. وزرېي خاكي نساوړې رنگ لري. تنه يې لنډه ده. مونث جنس يې بچي اچونكی يا Vivipar دي. خپل لارو د پسونو او وزو په پزه كې د يو مقدار مایع سره يو ځای اچوي. لارو ډیر ژر په پزه كې ځان پتوي او د خپلو خنچكو پواسطه ځان د پزې په دنني ديوال ټینګوي. دوه واړې پوستکي اچوي او د پوښې مرحلې ته ځان اماده کوي. ژمې د حیوان په پزه كې تیروي كله چې هوا گرمه شي ځان د پزې څخه بهر ته غورزوي. په ځمکه كې په پوښې بدلیرې. د دوه تر او هفتو پورې په بالغ حیوان بدلیرې چې بالغ غوبارې بیا غذا نه خوري.

نوع هیپودرمس بويس **Hypodermis bovis**:

دا يو لوی مچ دی چې ډیر بڼایسته ، زیو ، سپین او تور رنگ لري. د دیارلس او پنځه لس ملي متره جسامت لري. دا پرازیت په اسیا ، اروپا ، افریقا او امریکا كې او همدارنگه په افغانستان كې هم په غوايانو كې پیدا کیږي. چې د غوايانو پوستکي سوري کوي او جنسیت ته يې صدمه رسوي او اقتصادي تاوانونه منځ ته راوړي. یوازی د امریکا په متحده ایالاتو كې په کال كې نیم ملیارد دالر تاوان رسوي. مونث جنس خپله هگی. چې تعداد يې د شپږسوه تر اته سوه پورې رسیږي په اوړي كې د شا دډوډو او د شا د

پښود پوستکي په ويښتونښلوي. د څلورو تر اوو ورځو وروسته د هگۍ څخه يو لارو چې پښې نلري او د Maden په نوم يادېږي خارج او د خپلو د خولې جوړښتونو او د پروتئين انزایمونو پواسطه د غوايي پوستکي سوري کوي داسې چې لومړی لارو يا L1 د څو هفتو لپاره د پوستکي لاندې حرکت کوي تر څو د دولس تر پنځه لسو ملي مترو په اندازه لوې شي. بالاخره د پوستکي لاندې د يوې غوټې شکل نيسي چې خارج ته يو سوري لري. په همدې شکل دوه پوستکي اچوي او دريم لارويي د پنځه ويشت تر دېرشو ملي مترو پورې جسامت لري چې د Puppe جوړولو ته آماده دی. سهار وختي د پوستکي څخه راوځي او ځان په ځمکه اچوي چې هلته په وښو کې په پوپې بدلېږي ددوه تر نهو هفتو وروسته ترې يو بالغ حيوان يا Imago پيدا کېږي. د جنسي مقاربت وروسته سمدستي د يو ساعت وروسته هگۍ اچوي. بالغ حيوان غذا نه خوري غوايان ددې پرازيت څخه هم يوه غريزوي ويره لري او ترې تنبتي. د مصاب کيدو وروسته حيوان ډنگريږي، خوراک نکوي او شدي يي کميږي.



نه دیرشم شکل:

د Hypoderma

bovis مختلفې دودې

د دورې: بالغ حیوان a. د

غوايي په ويښتونښتي

هگۍ b.

دريمه لاروي مرحله c.

## اردرفانیپتیرا Order : Aphaniptera ورږې

ورږې د جانبي خوا څخه هواری شويدي. ددوی وزرونه په ثانوي ډول له منځه تللي دي. د بالغ حیوان دریمه جوړه پښې يې ډیرې اوږدې شويدي چې ددوې پواسطه ډیر وړاندې توپ وهلاې شي. مذکر او مونث جنس يې وینه څښي څلور نوي په سلو کې د تي لرونکو او شپږ په سلو کې د مرغانو څخه وینه اخلي د نیم کال لپاره بې وینې ژوند کولای شي. د خولې جوړښتونه د بالغ حیوان دوه د چيچلو کانالونه لري. چې د لوی کانال پواسطه وینه څښي او د کوچني کانال پواسطه لارې زخم ته داخلوي. چې د لارې د وینې د پرند کیدو مانع گزي. د کوربه پیدا کول د حسي وینستانو او په هغو کې د موجودو حسي حجراتو له لارې صورت نیسي. د دوي سترگې یوازې تیاره او رڼا لیدلای شي. او د کوربه په پیدا کولو کې رول نلري. ورږې تر یو نیم کاله پورې ژوند کوي. جنسي مقاربت اکثر د کوربه د پاسه صورت نیسي. مونث جنس هره ورځ د لسو تر پنځه ویشتنو پورې هگۍ اچوي. خود پیشو گانو ورږې د اته سوه تر زرو پورې هگۍ اچوي. د پنځو ورځو وروسته د هگۍ څخه یو لارو پیدا کیږي. چې سترگې نلري او د یو برس شکل لري. او ځان د تجزیه شوو او خسا موادو څخه تغذیه کوي. ددوه درې هفتو وروسته او ددوه پوستکي اچولو پس لارو د خپل لعابیه غدواتو پواسطه یو کوکون یا خلطه جوړوي. او بیا د یو څخه تر دوو هفتو پورې بیحرکنه پاتې کیږي. که کوربه ورته پیدا نشي کیدای شي تر ډیره وخته پورې همداسې پاتې شي. خو کله چې کوربه پیدا شي. په ناڅاپي ډول د کوکون څخه راوځي او کوربه په زیات تعداد مصابوي. ورږې ددې پخوا کې چې وینه څښي د مختلفو مرضونو د انتقال سبب گزي.

لومړې د وبا د مریضۍ انتقالونکې: د پست بکتريا چې *Yersinia pestis* نومېږي په مږو کې پیدا کیږي او بیا د یوې ورږې لخوا چې *Xenopsylla cheopsis* نومېږي انسان او نورو حیواناتو ته انتقال پیدا کوي. دا انتقال د د خولې د جوړښتونو له لارې او



یا د ورېږې د کولمو څخه د قې شوي موادو پواسطه چې په چيچل شوي ځای کې تزريقیږي ، صورت نیسي. په منځنیو پیږیو کې دا مریضي هغه وخت زیاتیده چې کله به مږې په ډیر تعداد د مریضي له امله مږې کیدلې . نو وږو وږو به نور حیوانات لکه سپي ، پیشوگان ، او حتی انسانان د وینې اخیستلو په وخت کې مبتلا کول.

دوهم: دانسانانو ، سپو او پیشوگانو ورېږې د مختلفو چینجیانو لپاره د منځني کوربه په حیث استعمالیږي او همدارنگه د خطر ناکو مریضیو یعنی بکتريایی ، ویروسی او ریکیتسیاد انتقال سبب گزي.

همدارنگه د شگې ورېږه *Tunga penetrans* مونث جنس په پوستکي کې ننوزي او په او په اته یا لسو ورځو کې د دوه درې ملي مترو لویو غوتو په شکل نمو کوي خصوصاً د پنبو د نوکانو لاندې د ورېږې د بدن اخري برخه درحم او تنفسي سورو سره بهر ته وتلې وي. چې د مذکر حیوان سره ترې دجنسي مقاربت په نتیجې کې څو زره هگي. ځمکې ته لویږي چې په دریو هفتو کې ترې لارو پوی او بالغ حیوان منع ته راځي. چې نوی کوربه مصابوي.

## کلاس کروستاسیا **Klass : Crustacea** یا چنگانبنونه

دوي يو خارجي سکلیت يا Exoskelett لري چې په هغه کې د شتین او مختلفو پگمنتونو په خوا کې په ډیر مقدار کلسیم هم موجود دی چې د سکلیت دزیات کلکوالي سبب گزري. دوي له دې امله د خپلې نمو لپاره پوستکي اچولو ته ضرورت لري. چې پدې پروسه کې د Ecdyson په نامه یو هارمون زیات رول لري. د پوستکي د اچولو څخه وروسته کولای شي چې د نوي سکلیت د جوړیدو تر وخته پورې نمو وکړي. ځکه چې په دې وخت کې خارجي سکلیت دومره کلک نه وي. د چنگانبنونو د وجود بندونه غیر مشابه یا Heteronom دي.

چنگانبنونه په دوه برخو تقسیمیري چې ابتدایي چنگانبنونه Entomostraca او لارویی Naupilus بولي او پرمختللي چنگانبنونه Malacostraca او لارویی د Zoëa په نوم یادیري. ددوي ترمنځ مشابهتونه په اوبو کې ژوند، د تراخیا پواسطه تنفس کول او ددوه جوړه انتونونو درلودل دي. د خولې جوړښتونه یې لکه د حشراتو پو شان یو جوړه مندیبل او دوه جوړه ماکسیل دي.


په اکثره چنگانبنونو کې هر بند یوه جوړه پښې لري. چې په سر کې د خولې د پښو یا Maxillipeden، په سینه کې د جنگي پښو یا Pereiopoden، او په تنه کې د لامبو پښو او یا د جوړه کیدو جوړښتونه چې د Pleopoden په نوم یادیري څخه عبارت دی.

ددوي نمو لکه د حشراتو په شان د هگۍ څخه لارو او د څو واړه پوستکي اچولو وروسته بالغ حیوان ته بدلیدل دي. په دوي کې نارینه او بنځینه جنسونه وجود لري. تقریبا د چنگانبنونو په ټولو گروپونو کې پرازیتي انواع وجود لري. چې وجود یې د پرازیتي ژوند سره تطابق پیدا کړیدی. چې کله یې حتی د یو چنگانښ پحيث پیژندل گران دي.

خيني انواع يي د انسان د داخلي پرازيتونو لپاره لکه د کدودانې د چينجي  
Diphyllobothrium latum او د مدينې چينجي Dracunculus medinensi د  
منخني کوربه په حيث مشهور دي. همدارنگه نور خرچنگونه، کله په تي لرونکي  
حيواناتو کې د پرازيت په شکل ژوند اختياروي. په ماهيانو کې ددوي د پرازيتي ژوند له  
امله ډير خسارات منع ته راضي چې د مطالعې څخه يي دلته تير پرو.

ماخذونه:

1. Grundrisse der Parasitenkunde. Heinz Mehlhorn , Gerhard Piekarski, 2002
2. Biologie für Mediziner und Naturwissenschaftler. M. Hirsch Kaufmann und M. Schweiger, 1996
3. Parasitologie. Johannes Dönges, 1980
4. Zoologische Praktikum. W . Kükental, 1980



Book Name        Principles of Parasitology  
Author            Dr. Mohammad Saber  
Publisher         Nangarhar Medical Faculty  
Website           www.nu.edu.af  
Number           1000  
Published        2011  
Download         www.ecampus-afghanistan.org

This Publication was financed by German Aid for Afghan Children (**www.Kinderhilfe-Afghanistan.de**) a private initiative of the Eroes family in Germany. The administrative and technical affairs of this publication have been supported by Afghanic ([www.afghanic.org](http://www.afghanic.org)). The contents and textual structure of this book have been developed by concerning author and relevant faculty and being responsible for it. Funding and supporting agencies are not holding any responsibilities.

If you want to publish your text books please contact us:  
Dr. Yahya Wardak, Ministry of Higher Education, Kabul  
Office: 0756014640  
Mobile: 0706320844  
Email: [wardak@afghanic.org](mailto:wardak@afghanic.org)

All rights are reserved with the author.

ISBN: 978 993 640 0535

Printed in Afghanistan. 2011





## د مولف پيژندنه

ډاکټر محمد صابر په ۱۳۳۲ ل کال کې د ننگرهار په «گوشته» کې زېږېدلی دی.

لومړنۍ زده کړې يې د گوشتي د حميد مومند په ښوونځي کې ، منځنۍ يې د کابل په ابن سینا لېسه کې او ثانوي يې د کابل په دارالمعلمين کې تر سره کړې دي. په ۱۳۵۵ کال کې د کابل پوهنتون له ساينس پوهنځي څخه فارغ شوی دی. تر ۱۳۵۸ کال پورې يې د ساينس پوهنځي د علمي کدر غړی او د فارمسي پوهنځي تدریسي مدير او مرستيال په توگه دندې تر سره کړي دي.

د لوړو زده کړو لپاره په ۱۳۵۸ کال کې جرمني ته راغلی او دین د پوهنتون د ساينس پوهنځي د تطبیقي زولوژي په انستیتوت کې يې ماسټري او د بن د فزیولوژي کیمیا له انستیتوت څخه يې دکتورا واخيسته.

په دغه وخت کې يې د نوموړي انستیتوت د علمي غړي په توگه هم دنده اجرا کړې ده. ۱۳۶۶ - ۱۳۷۱ د بن پوهنتون د طب پوهنځي مربوط د فزیولوژيکي کیمیا په انستیتوت کې ډاکټري، په عين وخت کې يې په همدغه انستیتوت کې د علمي غړي په حيث وظيفه اجرا کوله.

په المان کې د مختلفو علمي او اجتماعي فعاليتونو وروسته په ۱۳۸۷ کال کې د تعليمي نصاب د ملی پروژې په چوکاټ کې د اووم څخه تر دولسم ټولگيو پورې د کتابونو په ليکولو کې د مؤلف او اډيتور په توگه برخه واخيسته.

د ۱۳۸۸ څخه تر نن ورځې پورې د ننگرهار پوهنتون د رئيس په توگه دنده اجرا کوي.





Nangarhar Medical Faculty

AFGHANIC

Dr. Mohammad Saber

# Principles of Parasitology

Funded by:  
**Kinderhilfe-Afghanistan**



ISBN 978-9936-400-53-5



9 789936 400535 >

Printed in Afghanistan

2011



**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)  
Ketabton.com: The Digital Library**