

لومړۍ طبي مرستې

د هرچا لپاره په هرځای کې



Ketabton.com

پکوال: ډاکټر مجيب الرحمن (رحمانی)

1

بسم الله الرحمن الرحيم

مخکی لدی چی درس درته تشریح کرم لومړی باید یو مهم یادونه درته وکړم هغه دا چی
لومړی مرستی د هر چا لپاره

ضروری دی هغه که هر څوک وی په هر ځای کی وی لکه کور، سړک، دوکان، دفتر او د هر
مسلك خاوند وی: داکتر، نرس، موټروان، او هر ډول کاریگر لپاره د لومړیو طبی مرستو زده کول
ضرور دی چی باید هر څوک ورباندی پوهه شی او وکولی شی د ضرورت په وخت کی له نور سره
مرسته وکړی او د یو شخص ژوند وژغوری

ستاسی د بنی زده کړی په هیله داکتر مجیب الرحمن رحمانی

د کتاب نوم: لومړی طبی مرستی

لیکوال: داکتر مجیب الرحمن رحمانی

ډیزاین: داکتر مجیب الرحمن رحمانی

د نشر ډول: ډیجیټل کتابتون

د لیکوال: د اړیکې شماره: ۰۷۳۱۵۷۲۴۶۹

د فونت ډول: Alfajr Medium

د صفحه شمیر: 53

لومړۍ طبي مرستې

د لومړۍ طبي مرستې تعریف: لومړنۍ طبي مرستې هغه لومړني او عاجل ګامونه دي چې په بېرنيو حالاتو کې د ناروغ يا ټپي شوي کس د ژوند ژغورلو، روغتيا ساتلو، يا حالت ښه کولو لپاره اخیستل کېږي، ترڅو د مسلکي مرستورارسېدو پورې د ناروغ وضعیت کنټرول شي. دا مرستې عموماً لومړني کسان لکه د کورنۍ غړي، ملګري يا نور خلک ترسره کوي چې د پېښې ځای کې شتون لري.

په لومړنيو طبي مرستو کې لاندې مهمې کړنې شاملې دي:

- د وينې بندول: د وينې بندول د ژوند ژغورلو لپاره مهم دی. د فشار ورکولو، زخم تړلو او د بندولو باندونو کارول کولای شي د وينې بهېدنه کمه کړي.
- د تنفس او زړه درول: که چيرې يو کس تنفس يا زړه درول لري، CPR يا ABC (د زړه او تنفس ژوندي کولو کړنه) ورته ترسره کېږي، چې هدف يې د وينې او اکسيجن جريان ساتل دي.
- سوځېدنې: د سوځېدنې په حالت کې، سوځيدلی ځای يخ اوبو ته کېښودل کېږي، او سوځېدنې نورې برخې نرمو او پاکو پوښاکونو سره پوښل کېږي.
- هډوکي ماتېدل: د مات شوي هډوکي حالت تثبيت کول مهم دي، ترڅو حرکت ونه کړي او حالت خراب نشي.
- بې هوشي: که يو کس بې هوشه وي، هغه بايد په داسې ډول کېښودل شي چې هوا په سمه توګه جريان ولري، او سريو څه پورته کړي ترڅو تنفس اسان شي.
- د زهر ضد مرستې: که څوک زهري مواد وځوري، نو لومړی زهر د بدن څخه لرې کول او مسلکي مرستې ته په عاجله توګه رابلل کيږي.
- د "لومړنۍ طبي مرستې" اصول درلودل، نه يوازې په ناڅاپي حالاتو کې مرسته کوي بلکې د وخت په تېرېدو سره د ناروغ د حالت ښه کولو او د ژر رغېدو لپاره هم مهم دي.

د لومړنۍ طبي مرستې هدفونه په لاندې ډول دي:

- د ژوند ژغورنه: تر ټولو مهم هدف د ناروغ يا ټپي شوي کس ژوند ژغورل دي، ترڅو مسلکي روغتيايي مرستې ته د رسېدو پورې وضعیت ښه وساتل شي.
- د حالت خرابېدو مخنيوی: د لومړنيو مرستو سره د ناروغ يا ټپي حالت خرابېدل کنټرول کېږي او د ستونزې لاسپسي پراخېدو مخه نيول کېږي.
- د درد او تکليف کمول: د لومړنيو مرستو هدف دا هم دی چې د ناروغ يا ټپي شوي کس درد او تکليف کم کړي، ترڅو هغوی لږ تر لږه آرام احساس کړي.

4. د رغېدو بهير چټک کول: په سمه توگه د لومړنۍ طبي مرستې ترسره کول د ناروغ د روغېدو بهير گړندی کوي او د اوږدمهاله ستونزو مخه نيسي.

5. د باور او ډاډ ورکول: په بېرنيو حالاتو کې، د لومړنيو مرستو ترسره کول ناروغ يا ټپي کس او د هغوی کورنۍ ته باور او ډاډ ورکوي چې هغوی ته پاملرنه کېږي او مرستې ته لومړی گام پورته شوی دی.

په ټوليزه توگه، د لومړنۍ طبي مرستې هدف دادی چې په بېرنيو حالاتو کې سمدستي مرسته ترسره شي، ترڅو د ناروغ وضعیت تر مسلکي مرستو پورې ښه وساتل شي.

د لومړۍ درس پای استاد داکتر مجيب الرحمن (رحمانی)

لومړۍ طبي مرستې بايد څوک وړاندې کړي:

لومړنۍ طبي مرستې هر هغه څوک ترسره کولی شي چې په بېرني حالت کې حاضر وي او د لومړنيو مرستو په اساسي اصولو پوه وي. په ځانگړې توگه لاندې کسان بايد لومړنۍ طبي مرستې ترسره کړي:

1. کورنۍ غړي: اکثره بېرني حالتونه په کورونو کې پېښېږي، نو کورنۍ غړي بايد لومړنۍ مرستې زده کړي وي، ترڅو د کورنيو غړو ژوند وژغوري او مرسته وکړي.
2. ښوونکي او ښوونځي کارکوونکي: ښوونکي او ښوونځي کارکوونکي له زده کوونکو سره وخت تېروي او په بېرنيو حالاتو کې د لومړنۍ مرستې وړتيا لرل د زده کوونکو لپاره مهم دي.
3. د کار ځايونو کارکوونکي: په فابريکو، دفترونو او کارځايونو کې د بېرنيو حالاتو لپاره لومړنۍ مرستې اړينې دي. کارکوونکي بايد په خطرناکو حالتونو کې لومړنۍ مرستې ترسره کړي.
4. پوليس او امنيتي ځواکونه: د پوليسو او امنيتي کسانو لپاره ضروري ده چې د لومړنيو مرستو مهارتونه ولري، ځکه چې دوی اکثره له ناڅاپي پېښو او ټپي کسانو سره مخ کېږي.
5. موټر چلوونکي: د ترافيکي پېښو پر وخت موټر چلوونکي او د ترانسپورټ کارکوونکي لومړني کسان دي چې ټپي کسانو سره مخ کېږي، نو هغوی ته د لومړنۍ مرستې مهارتونه اړين دي.
6. استادان او ښوونکي: د ښوونکو لپاره د لومړنيو مرستو پوهه ضروري ده، ځکه چې دوی په ښوونځيو کې له ماشومانو او ځوانانو سره وخت تېروي.
7. ورزشکاران او روزونکي: په ورزشي ميدانونو کې د ټپونو او پېښو امکان زيات وي، نو روزونکي بايد لومړنۍ مرستې ترسره کړي، ترڅو د لوبغاړو حالت سم کنټرول کړي.
8. عام خلک: هر څوک بايد لږ تر لږه د لومړنيو طبي مرستو اصول زده کړي، ځکه چې بېرني حالات هر ځای او هر وخت پېښېدای شي.

په پایله کې، هر څوک باید د لومړنیو مرستو په اساسي اصولو پوه وي، ترڅو په بېرنيو حالاتو کې مرسته وکړي او د ژر روغتیايي مرستو رارسېدو پورې د ناروغ یا ټپي کس ژوند وژغوري.

د مرستې کوونکي شخص لپاره ځینې ځانګړنې:

1. ارام او سړې خوندیتوب:

مرستې کوونکی باید په بېرنيو حالتونو کې ارام پاتې شي او خپل ځواب ورکولو وړتیا له لاسه ورنکړي. دا مهمه ده چې د هر ډول فشار یا ویږې په حالت کې ارام پاتې شي ترڅو سمې او مؤثرې پرېکړې وکړي.

2. د لومړنیو مرستو پوهه:

مرستې کوونکی باید د لومړنیو طبی مرستو په اصولو او کړنو پوه وي. دا د ناروغ یا ټپي شوي کس د ژوند ژغورلو لپاره اړین دي، لکه د تنفس، زړه د درملنې، د وینې بهېدنې بندول او د زخمونو سم مدیریت.

3. د وضعیت ارزونه او تحلیل:

مرستې کوونکی باید د پېښې وضعیت په دقیقه توګه و ارزوي. هغه باید د ناروغ یا ټپي کس حالت، د ټپونو نوعیت او د خطرناکو شرایطو احتمالي د لیلونه وڅیړي ترڅو مؤثره مرسته وکړي.

4. د بدلونونو سره تطابق:

د بېرنيو حالتونو په اړه پوهه او چالاکی ته اړتیا ده. مرستې کوونکی باید د وضعیت بدلون ته ژر ځواب ورکړي او خپل اقدامات د پېښې سره سم تنظیم کړي.

5. فزیکي او ذهني قوت:

مرستې کوونکی باید فزیکي او ذهني ځواک ولري ترڅو اوږده او ستونزمنې مرستې ترسره کړي. هغه باید د ناروغ په حرکت یا ملاتړ کې مرسته وکړي او د اوږدو وختونو په اوږدو کې د ذهني فشار سره مقابله وکړي.

6. د همدردۍ او هوساینې وړتیا:

مرستې کوونکی باید د ناروغ یا ټپي کس لپاره همدردي او احساس ښکاره کړي. دا مرسته هغه ته ډاډ ورکوي او د دې احتمال زیاتوي چې ناروغ په رواني توګه هم ښه شي.

7. د ګډ کار کولو وړتیا:

د بېرنيو مرستو په حالت کې، مرستې کوونکی باید د نورو سره همغږۍ او ګډ کار کولو وړتیا ولري. په ځانګړې توګه د مسلکي روغتیايي ټیم یا نورو امدادي کسانو سره.

8. د ستونزو حلولو وړتیا:

مرستې کوونکى بايد د ستونزو حلولو وړتيا ولري او د بېرني حالتونو په وړاندې د مناسبې لارې چارې غوره کړي. دا مهارت د بېلابېلو حالاتونو او پېښو لپاره اړين دى.

9. د فشار لاندې ښه کار کولو وړتيا:

مرستې کوونکى بايد د فشار لاندې ښه تصميم ونيسي او د عصبي حالتونو سره مقابله وکړي. هغه بايد د خپلې مرستې پر مهال خپل احساسې او فکري ځواکونه استعمال کړي.

په ټوله کې، مرستې کوونکى بايد يو پوه او مسوول شخص وي چې د نورو خلکو د ژوند ساتنې لپاره د لوړ مسئوليت احساس او فني پوهه ولري.

د دوهم درس پای استاد داکتر مجيب الرحمن (رحمانى)

کله چې له يو پېښې سره مخ شو بايد څه وکړو؟

کله چې له يوه بېرني حالت يا پېښې سره مخ کېږو، نو په لومړي گام کې دا مهمه ده چې ارام واوسو او له لاندې گامونه په پوره احتياط واخلو او په پوره ترتيب عمل وکړو:

1. خپل او د نورو خونديتوب يقيني کول: لومړى بايد وگورو چې آیا موږ په خوندي ځای کې يو که نه. د ځان او نورو خلکو خونديتوب لومړيتوب لری که پېښه په خطرناک ځای کې وی (لکه اور، موټر پېښه يا برېښنايي شات) کې وي، نو ځان او نورته لومړى خونديتوب برابر کړئ.

2. د وضعیت ارزونه: د ناروغ يا ټپي کس حالت او ستونزه ارزونه وکړئ وگورئ چې ټپ څنگه دی، تنفس لری کنه، زړه ضربان او د درد حالت څنگه دی. هڅه وکړئ وضعیت په سمه توگه درک کړئ ترڅو په سمه توگه اقدام وکولای شئ.

3. مرسته غوښتل (په چغو يا زنگ وهلو سره): که وضعیت جدي وي او مسلکي مرستې ته اړتيا وي، ژر تر ژره د عاجلې مرستې شمېرې ته زنگ ووهئ، دی پېښې ځای، حالت او د ناروغ وضعیت تشریح کړئ.

4. لومړنۍ مرستې ترسره کول: تر هغه چې مسلکي مرستې رارسېږي، لومړنۍ مرستې ترسره کړئ. دا کړنې په وضعیت پورې تړاو لري، لکه د وينې بهېدنې بندول، د زخم پاکول، د بې هوشۍ حالت تشييتول يا CPR که اړتيا وي.

5. ناروغ ته ډاډ ورکول: ناروغ يا ټپي ته ارام او ډاډ ورکړئ چې هغه ته به مرستې رسېږي. هڅه وکړئ هغه ته ډاډ ورکړئ چې وضعیت به کنټرول شي.

6. د وضعیت نظارت: د مسلکي مرستو په انتظار کې ناروغ وڅارئ او وگورئ چې وضعیت يې خرابېږي که نه، او د اړتيا په صورت کې ورته نورې لومړنۍ مرستې برابرې کړئ.

په یاد ولری چې هره لحظه اهمیت لري، نو په ارامۍ او ترتيب سره دا گامونه ترسره کړئ ترڅو ناروغ ته غوره مرسته برابرې کړئ.

په لومړنيو مرستو کې، لومړی باید لاندې درې مهم ټکي وڅېړو، چې په انگلیسي کې د "ABC" په نوم یادېږي:

A - هوا (Airway): لومړی باید وګورو چې د ناروغ د هوا لارې یا تنفسي مجرا خلاصه ده که نه. که ناروغ بې هوشه وي، ممکن د هغه ژبه یا کوم بل شی د هوا لار بند کړي. د ناروغ سر یو څه پورته کړئ او ژبه یې له خولې وباسئ، ترڅو د هوا تېرېدو لاره خلاصه شي.

B 2 - تنفس (Breathing): که هوا لار خلاصه وي، بیا وګورئ چې ناروغ تنفس کوي که نه. د ناروغ سینې حرکت، د هوا غږ او یا د نږدې کولو سره د هوا حس کول کولای شي د تنفس نښې معلومې کړي. که ناروغ تنفس نه کوي، د CPR یا د زړه او تنفس ژوندي کولو کړنې ته اړتیا پیدا کېږي.

C 3 - وینه (Circulation): که ناروغ تنفس کوي، نو بیا وګورئ چې د هغه وینه جریان لري که نه. په دې کې د نبض معاینه، د وینې بهېدنې کنټرول او د زخمونو ارزونه شامل دي. که شدید وینې بهېدنه موجوده وي، نو ژر تر ژره یې بندولو ته اقدام وکړئ.

که دا درې ټکي (ABC) کنټرول شوي وي، نو وروسته یې نورو اړوندو لومړنیو مرستو ته دوام ورکړئ. دا ارزونې د ناروغ د ژوند ژغورلو لپاره لومړني او مهم ګامونه دي.

په امبولانس کې، ناروغ ته د مرستې رسولو لپاره لاندې ګامونه پورته کول اړین دي:

1. هوا لار (Airway) خلاصه ساتل: ډاډ ترلاسه کړئ چې د ناروغ تنفسي مجرا خلاصه ده. که اړتیا وي، د ناروغ سر یو څه پورته کړئ یا د هغه ژبه له خولې لرې کړئ ترڅو تنفس اسانه شي.
2. تنفس څارل او تنظیمول: د ناروغ د تنفس حالت وڅارئ که ناروغ په ستونزمن ډول تنفس کوي، د اکسیجن ماسک یا نلکې له لارې اکسیجن ورکړئ (که چمتو وي). که ناروغ تنفس نه کوي، په عاجله توګه د CPR کړنې ته اړتیا ده.
3. د وینې جریان کنټرولول: که ناروغ وینه بهوي، نو د وینې بهېدنه ژر تر ژره بند کړئ. دا د فشار ورکولو، زخم تړلو یا د بندولو باندونو په کارولو سره ترسره کېدای شي.
4. د ناروغ حالت تثبیتول: که ناروغ هډوکي مات کړي یا د بدن نور ټپونه ولري، نو هغه برخې تثبیت کړئ او حرکت یې محدود کړئ، ترڅو نور زیان ونه رسېږي.
5. ناروغ ته ډاډ او ارام ورکول: ناروغ ته ډاډ ورکړئ او هڅه وکړئ هغه ارام وساتئ. دا د ناروغ لپاره ذهني آرامتیا راوړي او د ناروغ حالت ښه ساتي.

6. د ژوند اساسي نښې (Vital Signs) څارل: که ممکن وي، د ناروغ د نبض، د وینې فشار، تنفس او د بدن تودوخې څارنه وکړئ او یادداشت یې کړئ ترڅو روغتیايي ټیم ته دقیق معلومات برابر شي.

7. د ناروغ معلومات ثبتول: د ناروغ د ناروغۍ یا ټپونو په اړه ټول اړین معلومات ثبت کړئ، لکه د پېښې وخت، نوعیت، لومړنۍ مرستې او حالت کې بدلونونه. دا معلومات په روغتون کې ډاکټرانو سره مرسته کوي.

لومړی طبی مرستی لیکوال: داکټر ————— رجب الرحمان (رحمانی)

8. روغتون ته د پیغام استول: امبولانس کې د روغتیايي ټیم لپاره مناسبه ده چې د روغتون اړوند ټیم ته د ناروغ د حالت په اړه معلومات ورکړي ترڅو دوی مخکې له مخکې چمتو وي.

په عموم کې، په امبولانس کې د ناروغ سره مرسته هغه بنسټیز ګامونه دي چې د ژوند ژغورنې او د حالت د خرابېدو د مخنیوي لپاره اړین دي.

د دریم درس پای استاد داکتر مجیب الرحمن (رحمانی) ۰۷۳۱۵۷۲۴۶۹

د ناروغ د ژوند تهدید کوونکي فکتورونه کوم دي؟

1. د تنفس ستونزې:

د هوا لار تېرل: که د ناروغ هوا لار (تنفسي مجرا) بندې شي، لکه د ژبې ډوبیدل یا بل شی خولې ته ورغلی، دا کولی شي د تنفس او اکسیجن رسولو لپاره جدي ګواښ رامنځته کړي.

د تنفس بندیدل: که ناروغ خپل تنفس له لاسه ورکړي (د بې هوشۍ حالت کې) او په سمه توګه تنفس نه کوي، دا د ژوند ته لوی ګواښ دی.

2. د زړه ستونزې:

زړه بندیدل (Cardiac Arrest): که د زړه فعالیت ودرېږي، نو د وینې جریان به ودرېږي او ټول بدن ته اکسیجن او مواد نه رسېږي، چې ژوند ته جدي ګواښ دی.

د زړه تیز وهل یا کم وهل: که د زړه ضربان غیر طبیعي شي، نو د وینې د جریان کمیدو یا زیادولو په صورت کې کولای شي د اژوند ته تهدید پېښ کړي.

3. د وینې بهېدنه:

شدید وینې بهېدنه: که یو کس په جدي توګه ټپي شي او د وینې ډیرې کچې وبهېږي، دا کولای شي د شوک (shock) یا د وینې کمښت (hypovolemia) سبب شي چې ژوند ته یی لوی ګواښ پېښ کړي.

4. د دماغي فعالیت اختلال:

بې هوشي: که ناروغ بې هوشه شي او د دماغ فعالیت سم نه وي، ممکن د هغه د ژوند لپاره جدي تهدید رامنځته شي.

د دماغي ټپونو یا سکته: د دماغي ټپونه یا سکته چې د مغز جریان خون یا اکسیجن کموي، د ژوند ته لوی ګواښ دي.

5. د زهرجن مواد واغېږې:

زهرجن مواد یا موادو زهرجنول: که ناروغ زهري مواد (لکه زهري ګازونه، درمل یا کیمیاوي مواد) وخوري یا تنفس کړي، دا کولی شي د تنفس، د زړه ضربان، او نورو بدن فعالیتونو لپاره جدي خطر رامنځته کړي.

6. د سوځېدنې يا د حرارت لوړوالی:

سوځېدنې: که ناروغ په پراخه کچه سوځېدلی وي (لکه په اور کې)، دا د ژوند ته ګواښ دی. ډیرې تودوخې يا یخنۍ: که د بدن تودوخه ډېر لوړه يا ټيټه شي (لکه د شدید ګرمۍ يا یخنۍ)، دا د ژوند لپاره خطرناک کیدای شي.

7. د هډوکو ماتې او داخلي ټپونه:

د هډوکو ماتې: که هډوکي په جدي ډول ماتېږي، خاصه که د بدن مهمه برخه وي (لکه د ریښتیني او زړه)، دا کولای شي د داخلي وینې رګونو يا ارګانو ته زیان ورسوي چې د ژوند ته ګواښ لري. داخلي ټپونه: لکه د ارګانو ټپول (جګړه، ټرافیک پېښې) کولی شي د داخلي وینې رګونو پاره خطر پیدا کړي.

8. شوک

شوک (Shock): که بدن د اړینو مایعاتو، اکسیجن یا وینې جریان کم کړي، د حیاتي ارګانو فعالیت له منځه تللی شي، چې د ژوند ته تهدید رامنځته کوي.

9. د شدید درد اغیزې

شدید درد: که درد د ناروغ د ژوند لپاره جدي ګواښ وي (لکه د زړه د حملې یا ټپونو له امله)، دا کولی شي د شوک، بې هوښۍ یا د نورو حیاتي ستونزو سبب شي.

هر یو له دې فکتورونو سره باید په چټکۍ سره معامله وشي، ځکه چې د وخت په تېرېدو سره د ناروغ حالت خرابېدلی شي. د لومړنیو مرستو ترسره کول او د مسلکي مرستې غوښتل د دې تهدیدونو د کمولو لپاره اړین دي.

د څلورم درس پای استاد داکتر مجیب الرحمن رحمانی

علايم حیاتی

حیاتي علايم د بدن اساسي فزیولوژیکی فعالیتونه ښيي چې د ناروغ روغتیا وضعیت باندې د کنټرول او څارنې لپاره خورا مهم دي. دا علايم د بدن د هر ډول تغییراتو، ناروغيو او ټپونو په صورت کې بدلون کوي. حیاتي علايم په لاندې ډول دي:

۱. د بدن حرارت (Body Temperature)

د بدن حرارت د انسان د حرارت درجه ده او معمولاً په فارنهایت یا سیلسیس کې اندازه کیږي. د بدن نورمال حرارت ۳۶.۵ څخه تر ۳۷.۵ درجې سیلسیس پورې دی. په بدن کې د حرارت لوړیدل د تودوخې ناروغۍ (تبه) نښه ده چې کیدای شي د انتان یا التهابي حالت له کبله وي.

۲. د زړه ضربان (Pulse Rate)

د زړه ضربان د یو دقیقې په دوران کې د زړه د ټکانونو شمیر دی، چې معمولاً په نبض کې اندازه کېږي. د بالغ انسان لپاره، د زړه عادي ضربان ۶۰ څخه تر ۱۰۰ ضربو په دقیقه کې وي. د زړه ضربان زیاتیدل (ټاکیکارډیا) یا کمیدل (برادیکارډیا) کیدای شي د مختلفو فکتورونو له امله وي، لکه فزیکي فعالیت، احساساتي حالت، ناروغۍ او داروگان.

۳. د تنفس درجه (Respiration Rate)

د تنفس درجه د یو دقیقې په دوران کې د ساه اخیستو او باسي پروسې شمیر دی. د بالغو لپاره نورمال تنفس د ۱۲ څخه تر ۲۰ ساه اخیستو پورې دی. د تنفس درجه زیاتیدل (ټاکیپنیا) یا کمیدل (برادیپنیا) د مختلفو حالاتو نښه ده، لکه د سږو ناروغۍ، اضطراب، تبې یا عضوي ناروغۍ.

۴. د وینې فشار (Blood Pressure)

د وینې فشار د وینې هغه فشار دی چې په شریانونو کې موجود وي. عموماً په دوه شمېرو کې اندازه کېږي: سیسټولیک فشار (د زړه د ټکان پر وخت) او ډایسټولیک فشار (د زړه د آرام پر وخت). د بالغ انسان لپاره عادي فشار ۸۰/۱۲۰ mmHg دی. د وینې لوړ فشار (هایپرټینشن) او ټیټ فشار (هایپوټینشن) کیدای شي د زړه یا د بدن نورو برخو روغتیايي ستونزې ونیسي.

۵. د اکسیجن سچوریشن (Oxygen Saturation)

د اکسیجن سچوریشن د وینې د اکسیجن د سطحې اندازه ده او معمولاً په فیصدي ډول بیانېږي. د بالغ انسان لپاره عادي اکسیجن سچوریشن د ۹۵٪ څخه تر ۱۰۰٪ پورې دی. که دا سطحه له ۹۰٪ څخه کمه وي، نو کیدای شي د سږو یا د زړه ناروغۍ په نښه وي او عاجل طبي توجه ته اړتیا لري.

نور حیاتي علایم

ځینې وختونه نور اضافي علایم هم شاملوي لکه د شوگر سطحه (Blood Glucose Level) چې په ځانګړي ډول د شکر ناروغانو لپاره ارزښت لري، او د پوستکي رنگ، حرارت، او د هډوکو د حالت معاینه چې په خاصو حالتونو کې اهمیت لري. حیاتي علایم د ناروغانو په څارنه، تشخیص او درملنه کې اساسي رول لري، ځکه چې د علایمو هر بدلون د ناروغ روغتیا حالت کې د بدلون نښه ګڼل کېږي.

د پنځم درس پای (داکتر مجیب الرحمن رحمانی ۰۷۳۱۵۷۲۴۶۹)

علایم حیاتۍ درته په دقیق ډول تشریح کول چی په لاندی ډول دی

د وینې فشار (Blood Pressure) هغه ځواک دی چې د زړه پمپ شویو وینو لخوا د رګونو په دیوالونو باندې واردېږي. د وینې فشار دوی برخې لري

1. سیسټولیک فشار (Systolic Pressure): دا هغه فشار دی چې کله زړه د وینې پمپ کولو لپاره contract کوي، په دې حالت کې د وینې فشار لوړ تر ټولو حد ته رسېږي. دا د وینې فشار لوړه برخه ګڼل کېږي.

2. دياسټوليك فشار (Diastolic Pressure): دا هغه فشار دی چې کله زړه استراحت کوي او وينه بېرته د زړه په برخو کې راځي. دا د وينې فشار ټيټه برخه ده.

د وينې فشار اندازه:

نورمال وينې فشار: د وينې فشار د 80/120 mmHg په حدود کې گڼل کېږي. دې کې 120 د سيستوليك فشار او 80 د دياسټوليك فشار اندازه ده.

لوړ وينې فشار (Hypertension):

لومړۍ درجې لوړ وينې فشار: 130-139 mmHg / 80-89 mmHg.

دویمې درجې لوړ وينې فشار: 140/90 mmHg يا ډير.

کتګورۍ د وينې فشار له زیاتوالي سره: د وينې فشار د 180/120 mmHg يا زیات نه وی

د وينې فشار لوړوالی (Hypertension):

لوړ وينې فشار چې د "silent killer" په نوم هم يادېږي، هغه حالت دی چې ډيری وختونه هيڅ نښې نه لري، مګر که درملنه ونه شي، ممکن جدي روغتيايي مشكلات رامنځته کړي. دا کيدای شي د زړه ناروغۍ، د ستروک، گردې ناروغۍ، او د سترگو په رګونو کې د ستونزو سبب شي.

د وينې فشار ټيټوالی (Hypotension):

د وينې فشار ټيټوالی هغه حالت دی چې د بدن په سيستم کې د وينې جريان کم وي. دا ممکن د سردرد، خستګي، او غشي لګولو سبب شي. د وينې فشار د 90/60 mmHg څخه کم ټيټ فشار گڼل کېږي.

د وينې فشار لوړولو يا ټيټولو عوامل:

لوړ فشار: زیات وزن، د مالګې زیات مصرف، بې خوبۍ، فشار، سګرټ څکول، او د الکولو زیات استعمال.

ټيټ فشار: د اوبو کمښت، د زړه ناروغۍ، د هورمونونو اختلالات، د وينې لږوالی (anemia)، او د درملو ځينې اړخونه. درملنه او مدیریت:

لوړ فشار: د خوراک د رژیم بدلون، ورزش، د مالګې کمول، او درملو لکه ACE inhibitors، beta-blockers، يا ديوريټيکونه.

ټيټ فشار: کافي اوبه څښل، نمک زیاتول، د رګونو قوي کول، او د ځينو درملو لکه فلودروکورتيزون کارول.

که تاسو د وينې فشار په اړه نور معلومات غواړئ يا د کومې ځانګړې نښې په اړه سوال لرئ، مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.

د پنځم درس پای: استاد داکتر مجیب الرحمن الرحمانی ۰۷۳۱۵۷۲۴۶۹

د تنفس (Breathing) هغه پروسه ده چې له لارې یې بدن اکسیجن ترلاسه کوي او کاربن ډای اکساید (CO₂) له بدن څخه ویاسي. دا یو حیاتي عمل دی چې د ژوند لپاره اړین دی. تنفس دوه اصلي برخې لري: انتحال (Inhalation) او استحال (Exhalation). دغه عمل د تنفسي سیستم له لارې ترسره کېږي، چې د هوايي لارې، ریه، او نورو برخو څخه تشکیل شوی دی.

د تنفسي سیستم اجزاء:

1. د تنفسي لارې: دا هغه لارې دي چې هوا د بهر څخه د ریوی یا سږو (Lungs) ته رسوي. دې کې لاندې اجزاء شامل دي:

پوزه یا خوله (Nose or Mouth): د هوا لومړۍ لار.

لارنگس (Larynx): د غږ تولیدولو برخه ده او د هوا لار ترهغې پورې چې ترنخ (Trachea) ته ننوځي.

ترنخ (Trachea): د سږو ته د هوا رسول.

برونکي (Bronchi): د ترنخ څخه هواړې لارې چې د هوا جریان ریوی ته ویشي.

برونشیولونه (Bronchioles): کوچني لاره چې هوا یې ریوی ته رسوي.

ریه (Lungs): د اکسیجن جذب او کاربن ډای اکساید بیرون کولو لپاره اصلي غړي.

2. د سږو پورتنۍ او لاندې برخه: ریوی له میلیونونو کوچنیو کیسه ونو (Alveoli) څخه جوړېږي چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله پکې ترسره کېږي.

د تنفس پروسه:

1. انتحال (Inhalation):

د هوا ډیره برخه چې اکسیجن لري، د پوزې یا خولې له لارې بدن ته داخلېږي.

د ډایفرگم (Diaphragm) یا سینې د عضلاتو کشش د هوا د سږو ته داخلیدو سبب کیږي.

د ریوی د هوا لرونکو برخو ته هوا داخلېږي چې پکې اکسیجن د وینې له لارې د بدن نورو برخو ته لیږل کیږي.

2. استحال (Exhalation):

کله چې ډایفرگم او عضلات آرام شي، ریوی کمېږي او هوا چې د کاربن ډای اکساید لري، د پوزې یا خولې له لارې د بدن نه وځي.

د دې پروسې په ترڅ کې، کاربن ډای اکساید د وینې نه ریوی ته انتقالیږي او وروسته له بدن څخه ویاسي.

لومړۍ طبۍ مرستی لیکوال: داکتر مجیب الرحمن (رحمانی)

د تنفس فیزیولوژیکي اساسات:

اکسیجن: کله چې هوا سږو ته داخلېږي، اکسیجن د آلوپولونو څخه وینې ته انتقالېږي او په ټوله بدن کې د انرژۍ تولید لپاره کارول کېږي.

کاربن ډای اکساید: کله چې بدن د انرژۍ تولید لپاره گلوکوز مصرفوي، کاربن ډای اکساید تولیدوي. دا گاز د وینې له لارې ریوی ته انتقالېږي او بیا د تنفس په جریان کې له بدن څخه وځي.

د تنفس نور اړوند پروسې:

د تنفسي کچه (Respiratory Rate): دا د تنفس کولو تعداد دی چې په یوه دقیقه کې ترسره کېږي. په اوسط ډول، د یوه بالغ شخص د تنفس کچه شاوخوا ۱۲ تر ۲۰ تنفسونو پورې په دقیقه کې وي.

د اکسیجن وړتیا (Oxygen Uptake): په جریان کې چې اکسیجن د ریوی له لارې وینې ته داخلېږي، بدن د هغې اکسیجن ته اړتیا لري چې د هرې عضلې د فعالیت لپاره کار وکړي.

د CO2 تنظیم (CO2 Regulation): د بدن د pH توازن ساتلو لپاره، د CO2 کچه هم تنظیمېږي. لوړ CO2 د تنفس سرعت زیاتوي.

د تنفس اختلالات:

1. آسم (Asthma): یو ناروغي ده چې د تنفسي لارو خنډ سبب کېږي او د ساه اخیستلو ستونزې رامنځته کوي.

2. د سږو انفیکشن (Pneumonia): د سږو انفیکشن چې کولی شي د تنفس ستونزې رامنځته کړي.

3. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease): یوه اوږدمهاله ناروغي چې د ریوی د کار کولو د وړتیا کموي.

4. سږه شوې ناروغۍ (Cold) او انفلونزا: دا ناروغۍ هم د تنفس اختلالاتو سبب کېږي.

د تنفس اهمیت:

د اکسیجن رسونه: اکسیجن د بدن د انرژۍ تولید لپاره حیاتي دی. دا پروسه د تنفسي سیستم د سالم فعالیت پورې تړلې ده.

د pH توازن ساتل: د CO2 خارج کول د بدن د pH ساتلو لپاره ضروري دي، ځکه چې زیاتې CO2 د تیزابیت کچه لوړوي.

حساسیت او ځواب: بدن د تنفس له لارې د کوم ډول فزیکي یا رواني فشار څخه ځواب ورکوي.

که غواړئ د تنفس په اړه نوره مشخصه پوښتنه یا کومه ځانګړې برخه باندې معلومات ترلاسه کړئ، لطفاً ووايست!

د شپږم درس پای استاد داکتر مجیب الرحمن (رحمانی)

د سوالونو او پوښتنو له پاره زموږ د واتساپ نمبر: ۰۷۲۱۵۷۲۴۶۹

لومړۍ طبـــــــی مـــــــرستۍ لیکوال: داکتر مجیب الرحمن (رحمانی)

نبض (Pulse)

هغه حرکت دی چې د زړه د پمپ کولو په ترڅ کې د وینې فشار له لارې د رگونو دیوالونو ته لیږدول کېږي. د نبض اندازه د زړه د کړنې ښکارندويي کوي او د وینې جریان وضعیت په اړه معلومات ورکوي. نبض د بدن په مختلفو برخو کې د رگونو لاندې د فشار له لارې محسوسېږي، او د دې له مخې د زړه د ضربانونو (heartbeat) کچه اندازه کول کېدای شي. د نبض فزیولوژي:

کله چې زړه پمپ کوي، خونده د زړه له کمره (Ventricles) څخه بهر راوتلې او رگونو ته لیږدول کېږي. دا د فشار یوه خپه رامنځته کوي چې رگونو ته خپریږي او په سطحه محسوسېږي.

د زړه ضربان: هر ځل چې زړه د وینې پمپ کولو لپاره تقویه کیږي، یو ضربان یا نبض رامنځته کیږي. د نبض تیزوالی (Pulse Rate) د زړه د ضربان کچې سره سمون لري.

د نبض اندازه

نبض د ځانګړو رگونو لاندې د لاس، پښو او یا د بدن په نورو برخو کې اخیستل کېدای شي. په ځینو برخو کې، لکه د غاښونو په سر، نبض په آسانی سره محسوسېږي.

1. د نبض معمول کچه:

د یو بالغ شخص نبض عموماً د هرې دقیقه کې 60 تر 100 ضربې ترمنځ وي.

ټیټ نبض (Bradycardia): که نبض د 60 ضربې په دقیقه کې کمه وي.

لوړ نبض (Tachycardia): که نبض د 100 ضربې په دقیقه کې زیاته وي.

2. د نبض اندازه کولو ځایونه:

ریډیال رګ (Radial Pulse): د لاس د مټ له مخې اخیستل کېږي.

کارتوټید رګ (Carotid Pulse): د غاښ د لاندې برخه کې (د غاښ د خط لاندې) اخیستل کېږي.

فمورال رګ (Femoral Pulse): په پاو کې د کشاله په برخه کې.

پوپلیټیل رګ (Popliteal Pulse): په ښکانه کې.

برکلی رګ (Brachial Pulse): د پوزې په دننه برخه کې.

د نبض اهمیت:

نبض د زړه د فعالیت ښکارندويي کوي او کولی شي د زړه ضربان، د وینې جریان، او د صحت په اړه ډیر اړین معلومات ورکړي. د نبض چک کولو سره، د لاندې معلوماتو په اړه پوهه ترلاسه کولی شو:

1. د زړه ضربان: نبض د زړه د ضربان کچه ښيي، چې د فشار او درملو اغېزې په تن بدن کې ښه احساس کوي.
2. د زړه د روغتیا حالت: د نبض سرعت او ریتم د زړه د سالمې کارکردګۍ ښکارندويي کوي.
3. د وینې جریان: که چېرته نبض ضعیف یا غیر معمولی وي، دا ممکن د وینې جریان ستونزې یا د زړه نورو ناروغيو ته اشاره وکړي.

د نبض نښې او بدلونونه:

1. د نبض سرعت زیاتوالی (Tachycardia):
دا کله رامنځته کیږي چې نبض د 100 ضربې په دقیقه کې زیاته وي.
عوامل لکه: د بدن فشار، اضطراب، د بدن تودوخه، ځینې درمل یا ناروغۍ لکه ګرمۍ یا د زړه ناروغۍ سبب ګرځي.
2. د نبض سرعت کمی (Bradycardia):
د 60 ضربې څخه ټیټ نبض کله چې د زړه د فعالیت کمښت یا د نیند او آرام وضعیت کې وي.
ځینې درمل لکه beta-blockers او ځینې طبیعي حالات لکه د ورزشکارانو دراز آرامه نبض لامل ګرځي.
3. غیر معمولی نبض:
د نبض غیر ثابت یا غیر عادي ریتم (Arrhythmia): کله چې نبض بې نظمۍ سره وي، لکه د زړه ضربان بې ځایه یا تیز/وړوکه ننوځي.
- د نبض ضعیفوالی (Weak Pulse): چې کله نبض ضعیف او یا ورک شي، دا د وینې فشار یا د زړه جدي ستونزې ښکارندويي کوي.

د نبض د قوت زیاتوالی: کله چې نبض زیات، سخت او د فشار له امله زیات حساس وي.

د نبض د شدت اغېزې:

1. جسماني فعالیت: ورزش کول او تمرین کول د نبض سرعت زیاتوي، ځکه چې د بدن لپاره وینې ته زیات اکسیجن ته اړتیا وي.
2. ذهني فشار: خپګان، اضطراب یا فشار هم د نبض سرعت زیاتوي.
3. د وینې فشار: لوړ وینې فشار یا فشار لرونکې ناروغۍ د نبض او زړه فعالیت باندې تاثیر کوي.

د نبض په اړه نورې مهمې معلومات:

نبض کې تغیر: د نبض بدلون د روغتیا د حالت او د زړه د کړنې نښه ده.

د نبض اندازه کولو اهمیت: نبض د زړه د روغتیا او د وینې جریان د وضعیت په اړه معلومات ورکوي، چې د ځینو خطرناکو شرایطو لکه د ستروک یا زړه حمله مخنیوی کې مرسته کولای شي.

که تاسو د نبض په اړه کومه ځانګړې پوښتنه لرئ یا غواړئ د کومې ځانګړې ناروغۍ په اړه پوه شئ، مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.

د حرارت درجه (Body Temperature)

د حرارت درجه (Body Temperature) هغه د بدن داخلي تودوخه ده چې د مختلفو فزیولوژیکي پروسو او میتابولیزم په اساس کنټرول کیږي. د بدن حرارت درجه د بدن د سالم فعالیت لپاره یو اساسي فاکتور دی. د انسان بدن معمولاً یو ثابت تودوخه ساتي چې په هغه کې د مختلفو عضوي سیستمونو کار کول ممکن وي.

د بدن د حرارت درجې اندازه:

د بدن د حرارت درجه په مختلفو ځایونو اندازه کیږي، او هر ځای د حرارت درجه یوه ځانګړې اندازه نښي. لاندې هغه ځایونه دي چې د بدن حرارت اندازه کولو لپاره کارول کیږي:

1. د خولې تودوخه (Oral Temperature): دا د بدن د حرارت د اندازې لپاره تر ټولو عامه لاره ده. د معمول اندازه یې د 36.5°C څخه تر 37.5°C پورې ده.

2. د پوزې (Rectal Temperature): پوزې کې د حرارت درجه عموماً د 0.5°C تر 1°C پورې د خولې څخه لوړه وي. دا د دقیقې اندازه کولو لپاره خورا ګټوره طریقه ده.

3. د ګوتو لاندې (Axillary Temperature): دا د ترقې لاندې د بدن تودوخه اندازه کوي او معمولاً د خولې تودوخې په پرتله لږه وي. دا عموماً شاوخوا 0.5°C ټیټه وي.

4. د غوږ تودوخه (Tympanic Temperature): د غوږ له لارې حرارت اندازه کول هم د بدن د حرارت د اندازه کولو یوه اسانه لاره ده. دا د پوزې اندازه ته نږدې وي.

د بدن د حرارت درجه تنظیم:

د بدن د حرارت درجه د یوې برخې په توګه د مغز، د هیپوتالامس په نامه برخې لخوا تنظیم کیږي. هیپوتالامس د بدن داخلي تودوخه څاري او د مناسبې تودوخې ساتلو لپاره مختلف سیستمونه لکه د وینې جریان او د عرق جوړښت سموي. د بدن د حرارت درجه معمول ډول:

معمولي حرارت درجه: د بالغ انسان لپاره د بدن معمولي حرارت درجه شاوخوا 36.5°C تر 37°C پورې ده.

د حرارت درجه تغيرات:

د ورځني وخت سره بدن د حرارت درجې کې ځينې تغيرات تجربه کوي.

د ماښام په وخت کې بدن اکثراً تودوخه زياته کوي، په ځانگړې توگه د ورزش يا بدني فعاليت وروسته.

د بشځو د حيض د دورې په اړه هم د حرارت درجه تغير کوي.

د بدن د حرارت درجه د لوړوالي يا ټيټوالي نښې:

1. د بدن حرارت زياتوالی (Fever):

د حرارت درجه د 37.5°C څخه تر 38°C پورې: دا يو سبک د لږې تودوخې (Low-grade fever) په نوم ياديږي.

د 38°C نه پورته: دا د لوړې تودوخې (Fever) په نوم پيژندل کېږي.

لوړ حرارت ممکن د انفيکشن، التهاب، يا ځينو نورو ناروغيو نښه وي. د حرارت درجه که د 40°C نه زياته شي، نو دا خطرناک حالت گڼل کېږي.

2. د بدن د حرارت درجه ټيټوالی (Hypothermia):

د بدن حرارت درجه که له 35°C کم شي، دا د هپوترميا (Hypothermia) حالت دی چې د بدن د ډيرې يخنۍ له کبله رامنځته کېږي.

دا معمولاً د شديد يخنۍ يا د بدن د حرارت د ساتلو په اړوند ستونزو په پايله کې پېښېږي.

3. د بدن د حرارت درجه ټيټوالی (Hypothermia):

د 35°C څخه کم حرارت د بدن په اندامونو کې د نورو کړنو د تداخل سبب گرځي.

د هپوترميا د نښو په اړه: يخنۍ، د ستړيا احساس، تذبذب، او په آخر کې د زړه او تنفس د ودې خطر.

د حرارت درجه اغېزې:

د فعاليت يا ورزش په بدني فعاليتونو کې د حرارت درجه لوړېږي. ورزشکاران يا کسان چې سخت فزيکي فعاليت ترسره کوي د بدن تودوخه لوړوي.

د هوا تودوخه: په گرم يا يخ موسم کې د بدن حرارت تغير کوي. د بدن د حرارت د ساتلو لپاره، د ځينو خلکو لپاره سختۍ رامنځته کېږي.

د درملو اغېزې: ځينې درمل ممکن د بدن د حرارت درجه تنظيمولو باندې اغېزه وکړي.

د حرارت درجه په اړه اضافي معلومات:

د بدن د حرارت کچې بدلونونه: د بدن د حرارت کچه د بدن د کړنو او ورځني فعالیتونو سره بدلېږي.

د بدن د تودوخې سایکل: د بدن تودوخه د ورځې په مختلفو ساعتونو کې تغیر کوي.

د حرارت د درجه زیاتوالی یا کموالی: د یو شخص لپاره د دې کچې یو څه بدلون معمولاً طبیعي دی.

د حرارت درجه اندازه کولو لارو:

ترمامیترونه: د بدن د حرارت درجه اندازه کولو لپاره ترمامیترونه کارول کېږي چې مختلف ډوله لري:

1. د جیولوژیک ترمامیتر (Mercury Thermometer): دا ډول ترمامیترونه د مېرکوري مایع لخوا کار کوي.

2. ډیجیټل ترمامیتر: د دې ډول ترمامیترونو په مرسته د حرارت درجه په آسانی سره معلومه کېږي.

3. انفراریډ ترمامیتر: د غوږ یا د پوستکي د سطحې څخه د حرارت اندازه کولو لپاره.

د حرارت د درجه ټیټوالي او زیاتوالي اغېزې:

د زیات حرارت اغېزې: ممکن د جدي روغتيايي ستونزو لکه د دماغ د فعالیت کمښت، د زړه د حملې خطر، یا د ستړیا او اوبه ورکولو ستونزې رامنځته کړي.

د ټیټ حرارت اغېزې: د یو شخص د سیستم د فزیولوژیکي فعالیتونو کمزوري کول، د زړه او تنفس د کارونو په کمزوري کې بدلون راتلل.

که تاسو د بدن د حرارت درجه په اړه نورو ځانګړو شرایطو کې معلومات غواړئ، لکه د ناروغیو په اړه، نو مهرباني وکړئ سوال وکړئ.

اکسین (Oxygen)

اکسین (Oxygen) یو رنگین، بې بویه او بې طعمه گاز دی چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. دا د هوا یوه اساسي برخه ده چې د تنفس په جریان کې د انسانانو او نورو ژوو بدن ته اړین اکسیجن ورکوي. اکسیجن په فضا کې د نایتروجن (N_2) او نورو گازونو سره ګډ دی، او په ټوله ځمکه کې د ژوند د ملاتړ لپاره خورا ضروري دی.

د اکسیجن فزیولوژیکي رول:

اکسیجن د بدن لپاره د انرژۍ تولید او د سیلولر متابولیزم لپاره اړین دی. د هر انسان د بدن سلولونه د اکسیجن په مرسته د انرژۍ (ATP) تولیدوي، چې د بدن د ټولو بیولوژیکي فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره اړین دی.

1. د تنفس پروسه:

کله چې موږ هوا تنفس کوو، اکسیجن زموږ په ریه کې جذب او وینه کې انتقالیږي.

اکسیجن د وینې له لارې د زړه او شریانونو په مرسته د بدن نورو برخو ته لیږدول کېږي.

د وینې سره تړلی اکسیجن د میتوکندریا په توګه د انرژۍ د تولید لپاره کارول کېږي.

د سلولونو په سطحه د اکسیجن شتون د دوی د فعالیت او د ژوند لپاره اړین دی.

2. د انرژۍ تولید (Cellular Respiration):

د اکسیجن یوه مهمه دنده د انرژۍ تولید لپاره ده. د سیلولر تنفس پروسه کې، اکسیجن د ګلوکوز سره یوځای کیږي ترڅو ATP تولید کړي، چې د بدن د هر فعالیت لپاره انرژي برابرېږي.

دا پروسه د اوکسیجن پرېکړه په نامه یادېږي او د وینې د ګلبولونو له لارې د بدن په مختلفو برخو کې ترسره کېږي.

د اکسیجن طبعي سرچینې:

د نباتاتو له لارې تولید: نباتات د فتو سنتیز د پروسې له لارې اکسیجن تولیدوي. دا پروسه د نباتاتو په پانو کې ترسره کېږي چې د لمر انرژي څخه استفاده کوي او د کاربن ډای اکساید (CO_2) او اوبو (H_2O) سره اکسیجن تولیدوي.

د سمندر اکسیجن: سمندري بوټي او پلانکټونونه د سمندر په سطحه اکسیجن تولیدوي، چې د ځمکې د اکسیجن د منابعو یوه مهمه برخه ده.

د اکسیجن خوندي کچه:

په هوا کې د اکسیجن مقدار: د ځمکې په فضاء کې د اکسیجن کچه شاوخوا 21% ده. دا مقدار د انسانانو لپاره کافي دی ترڅو تنفس وکړي او د ژوند د نورو اړتیاوو لپاره کافي انرژي تولید کړي.

د اکسیجن د پیاوړتیا اړتیا: کله چې بدن اکسیجن کموي (په لوړ ځایونو کې یا د تنفسي ستونزو له امله)، د اکسیجن سطحه باید د ځانګړو وسیلو لکه اکسیجن ماسک یا د اکسیجن ټنکونو له لارې لوړ شي.

د اکسیجن د کموالي ستونزې:

که د بدن اکسیجن کچه د اړتیا وړ کچې څخه ټیټه شي، دا کولای شي مختلف روغتیايي ستونزې رامنځته کړي. ځینې یې لاندې دي:

1. هایپوکسیه (Hypoxia):

دا هغه حالت دی چې په کې بدن یا د بدن یو څه برخه د کافي اکسیجن څخه محروم شي. دا ممکن د زړه، دماغ، یا نورو اندامونو د کار کولو ستونزې رامنځته کړي. هایپوکسیه په لاندې ډول ممکن پېښ شي:

په لوړ لوړتیا کې پاتې کېدل، چیرې چې د اکسیجن کچه ټیټه وي.

د تنفس د ستونزو لکه د ریه ناروغیو (COPD)، د زړه ناروغیو، یا د انفیکشن په صورت کې.

2. هایپوکسمیا (Hypoxemia):

دا هغه حالت دی چې د وینې اکسیجن کچه ټیټه وي. دا کولای شي د تنفسي یا قلبي ناروغیو له امله پېښ شي.

3. هایپرکسیه (Hyperoxia):

د اکسیجن کچه ډیر زیات والی هم ستونزې رامنځته کولی شي. که ډیر زیات اکسیجن د اوږدې مودې لپاره وکارول شي، دا کولای شي د ریه، عصبي سیستم او نورو ارګانونو ته زیان ورسوي.

د اکسیجن د کموالي نښې:

تنفس تېز یا سخت کیدل.

د بدن سترګې او کمزوري احساس.

د ذهني روحي فشار زیاتوالی.

د پوستکي یا نهایت آبي کیدل یا نیلي کیدل.

د زړه ضربان او د فشار لوړوالی.

د اکسیجن کارول:

1. په درملنه کې:

اکسیجن د تنفسي ناروغیو لکه د آسم، د ریه د مزمن ناروغیو، او د COVID-19 لپاره د درملنې په توګه کارول کېږي. د اکسیجن ماسک، نازوګ او حتی د اکسیجن ټنکونه د هغه خلکو لپاره کارول کېږي چې د تنفس ستونزې لري.

2. په لوړ ځایونو کې:

په لوړ ځایونو کې، لکه د کوه قاف او د ټاپوګانو، د هوا اکسیجن کچه کمه وي. د دې لپاره، په دې ځایونو کې د اکسیجن استعمال لپاره د اکسیجن ټنکونه او ماسکونه اړین دي.

د اکسیجن لپاره د بدن اړتیا:

د اکسیجن اړتیا: د بالغ انسان بدن هره دقیقه شاوخوا 250 ml اکسیجن ته اړتیا لري ترڅو د انرژۍ تولید او د بدن نور بیولوژیکي پروسې ترسره شي.

د ځوانانو او ورزشکارانو اړتیا: د فعالو ورزشکارانو بدن ممکن د اکسیجن کچه لوړوي، ځکه چې د فزیکي فعالیت په ترڅ کې د انرژۍ زیاتوالی ته اړتیا وي.

اکسیجن او د چاپیریال اغېزې:

د اکسیجن د کموالي حالتونه لکه د ځمکې د فضا د زهرجن گازونو او د ځمکې د ډوبولو ستونزې د نړیوالې تودوخې سبب کیدلای شي. دا هم د اکسیجن سرچینو ته خطر پېښوي، په ځانګړې توګه د ځنګلونو پرېکولو او د چاپیریال ککړتیا له امله.

د اکسیجن ډېروالی

د اکسیجن ډېروالی (Hyperoxia) په ځینو طبي شرایطو کې اړین کیدی شي، لکه د عملیاتو، د ناروغانو د اکسیجن د کموالي لپاره، یا د ځینو روغتیايي حالاتو لکه د دماغي تپونو لپاره.

که تاسو د اکسیجن په اړه ځانګړې پوښتنې لرئ، نو مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.

زخم Wound

زخم یا تپ هغه حالت دی چې د بدن یوه برخه د خارجي یا داخلي عواملو له کبله د پوستکي او یا د نسجونو د تخریب سره مخ شي. زخمونه په بیلابیلو ډولونو وېشل کېږي، او هر ډول یې ځانګړې درملنه او پاملرنه ته اړتیا لري. دلته د زخمونو په اړه یو لړ مهم معلومات وړاندې کوم:

زخمونه په دوه عمومي ډولونو وېشل کېږي:

1. بند یا داخلي زخم (Closed Wounds):

دا هغه زخمونه دي چې په کې د پوستکي سطحه نه وي مات شوې. د دې زخمونو مثالونه کېدای شي د شریانو یا نسجونو تپونه او کېږیدل وي. په دې ډول زخمونو کې پوستکي سالم پاتې وي، خو د لاندې نسجونه زیانمن کېږي، او د کېږیدلو یا ویروځنې شکل نیسي.

2. پرانیستی یا خارجي زخم (Open Wounds):

په دې ډول زخمونو کې د پوستکي سطحه مات شوې او د بدن داخلي نسجونه ښکار کېږي. دا زخمونه معمولاً د خپرلو، چرې، توغندی، یا نورو تیزو شیانو له کبله رامنځته کېږي. دا ډول زخمونه لاندې ډولونه لري:

خراش یا سکرېچ: لږ ژور او معمولي زخمونه دي چې د پوستکي سطحه یې خرايېږي.

په غوڅ ډول زخم: دا ډول زخمونه د تېز شیانو لکه چرې یا شیشې له کبله رامنځته کېږي.

سورۍ یا پنیچر: چې د نوک، ستنې یا بل تیز شی په ژوروالي سره رامنځته کېږي.

منقطع زخم: په دې حالت کې د پوستکي او نسجونه ژور ټوټې شوې وي، لکه په موټر کې د ټکرو وروسته زخم.

سوځیدلی زخم: د تودوخې، بریښنا، کیمیاوي موادو یا لمر له کبله رامنځته کېږي.

د مرمۍ په زخم

د مرمۍ په زخم کې مرستې کول یو حساس او عاجل کار دی چې د مرستې په وخت کې باید د مکروبوونو مخنیوي، د وینې بهیدنې کنترول، او ناروغ ته د آرام او ډاډ ورکولو په اصولو باندې تمرکز وشي. دلته ځینې اساسي گامونه دي چې د مرمۍ زخم په وخت کې یې په پام کې نیول اړین دي:

۱. خوندي ځای ته وړل

که چیرې پېښه د جگړې په سیمه یا خطرناکه ځای کې شوې وي، لومړی باید ناروغ خوندي ځای ته انتقال شي.

۲. د مرمۍ په زخم باندې فشار اچول

د وینې بهیدنې د کنترول لپاره، په زخم باندې پاکه ټوټه یا گازه کېږدئ او په نرمه توګه فشار ورکړئ که چیرې پاکه ټوټه موجوده نه وي، هڅه وکړئ له هر پاک او نسبتاً ستړلايز مواد څخه کار واخلئ.

۳. د زخم پاکوالی او مکروب ضد درمل

د ژورې پاکۍ او مکروب ضد درملو کارول معمولاً د ډاکټر لخوا ترسره کېږي، خو که روغتیايي امکانات نه وي، هڅه وکړئ د زخم شاوخوا سیمه د امکان تر حده پاکه وساتئ او مکروب ضد محلول که موجود وي، په احتیاط سره وکاروئ.

۴. د زخم پانسمان او تړل

د وینې بندولو او د زخم ساتلو لپاره، په پاکه ټوټه یا پانسمان زخم وتړئ. که چیرې مرمۍ ژوره وي، ډیر فشار مه اچوئ او ناروغ کوښښ وکړي چې په ثابت حالت کې پاتې شي.

۵. د ناروغ آرام ساتل

ناروغ ته ډاډ ورکړئ او هڅه وکړئ چې ناروغ آرام او ثابت وساتئ ترڅو د شوک یا ډار مخه ونیول شي.

۶. د طبي مرستې غوښتنه

تر هر څه مهم، ژر تر ژره د مرستندویه روغتیايي ډلې سره اړیکه ونیسئ او ناروغ ته روغتیايي مرکز ته د بیولو هڅه وکړئ. که چیرې مرمۍ حساس ځای، لکه سینې، نس، یا سر ته لګیدلې وي، عاجله درملنه ورته ډېره ضروري ده.

۷. د شوک یا شاګ مخنیوی

د شوک مخنیوي لپاره د ناروغ سر لږ لوړ وساتئ، که امکان ولري، او د بدن حرارت ساتلو لپاره یې پوښ ورکړئ.

۸. د مرمۍ د ځنډولو یا ایستلو هڅه مه کوئ

د مرمۍ د ایستلو هڅه باید ونه شي؛ ځکه دا کولی شي د وینې بهیدنه زیاته کړي. یوازې ډاکټر او روغتیايي کسان کولای شي دا کار په احتیاط سره ترسره کړي.

مهم ټکي

ناروغ له اضافي حرکت څخه منع کړئ ترڅو د زخم خرابوالی ونه شي.

هڅه وکړئ چې د ناروغ ذهني آرامتيا وساتئ، ځکه دار او اضطراب کولی شي حالت خراب کړي.

د دې گامونو په عملي کولو سره، تر راتلونکې روغتيايي مرستې پورې د ناروغ حالت يو څه کنټرول کېدای شي، خو په هر حالت کې د ډاکټر او روغتيايي ټيم مداخله ډېره ضروري ده.

د سر په زخم کې مرستې کول

د سر په زخم کې مرستې کول خورا مهم او حساس کار دی، ځکه چې د سر زخمونه ممکن مغز يا حياتي برخو ته زيان ورسوي. دلته هغه گامونه دي چې بايد د سر د زخم په صورت کې يې وکارول شي:

۱. د خونديتوب اطمینان کول

لومړی بايد ډاډ ترلاسه شي چې پېښه د يو خوندي ځای کې ده او د ناروغ ژوند ته بل خطر نشته. که ناروغ په خطرناکه سيمه کې وي، هڅه وکړئ په احتياط سره يې خوندي ځای ته انتقال کړئ.

۲. د وينې بهېدنې کنټرول

که چيرې د سر په زخم کې وينه بهېږي، په نرمه ټوټه يا پاک پانسمان باندې په احتياط سره فشار ورکړئ، خو ډېر کلک فشار مه اچوئ. د سر زخمونو کې سخت فشار د نورو ستونزو لامل کېدلی شي. هڅه وکړئ د نرم او سپک فشار له لارې وينه کنټرول کړئ.

۳. د زخم پاکوالی او مکروب ضد درمل

که زخم ته کثافات ننوتلي وي، د پاکو او مکروب ضد موادو له لارې زخم په احتياط سره پاک کړئ، خو د دې څخه ډډه وکړئ چې ژور زخم ته لاس وروړئ. د سر زخم په صورت کې يوازې شاوخوا سيمه پاک کړئ او ژر تر ژره د طبي مرستې غوښتنه وکړئ.

۴. د ناروغ آرام ساتل

ناروغ بايد په ارامه توگه او ثابت وضعيت کې وساتل شي، ځکه حرکت کولی شي د سر زخم خراب کړي. هڅه وکړئ ناروغ آرام وساتئ او ډاډ ورکړئ چې ټولې مرستې يې په لاس کې دي.

۵. د طبي مرستې عاجله غوښتنه

د سر زخم معمولاً عاجلې طبي درملنې ته اړتيا لري، نو ژر تر ژره د بېرني طبي ټيم سره اړيکه ونيسئ او ناروغ ته نږدې روغتون ته د بېولو هڅه وکړئ. د مغز هر ډول زيان، کانکاشن، يا داخلي خونريزي د پېچلو ستونزو لامل کېدلی شي.

۶. د شوک مخنيوی

که ناروغ په شوک کې وي، هڅه وکړئ هغه ته د آرام احساس ورکړئ. د ناروغ سر لږ لوړ وساتئ که ممکن وي، او د بدن حرارت ساتلو لپاره يې پوښ ورکړئ.

۷. د مغزي ټکان نښې نښانې تعقیب کړئ

په سر کې زخم یا ټکان سره، د مغزي ټکان نښې نښانې لکه: سردرد، سرگرځېدل، زړه بدوالی، د حافظې کمښت، یا بې هوشي څارل پکار دي. که دا نښې شتون ولري، ژر تر ژره د طبي ټیم څخه مرسته وغواړئ.

۸. ناروغ له بې ځايه حرکت څخه منع کړئ

هڅه وکړئ چې ناروغ پرته له ضرورت څخه حرکت ونه کړي. په ځانگړې توگه که په نخاع کې د زیان امکان وي، باید ناروغ په بشپړ ډول ارام وساتل شي ترڅو د زیان شدت ونه شي.

د مهمو ټکو یادونه

د سر زخمونه باید جدي وگڼل شي، او یوازې په لومړنیو مرستو باندې بسنه ونه شي.

هېڅکله د سر په ژور زخم فشار مه راوړئ او د مغز یا ملا شاوخوا برخې مه لمس کوئ.

په دې اصولو عمل کول کولی شي د ناروغ د حالت د خرابېدو مخه ونیسي، خو په هر صورت کې ژر تر ژره د بیړنۍ طبي مرستې غوښتنه باید وشي، ځکه چې د سر زخمونه او مغزي ټکانونه جدي روغتیايي خطرونه رامنځته کوي.

د زخمونو لومړنۍ درملنه

د زخمونو درملنه د دې لپاره مهمه ده چې د انفیکشن مخنیوی وشي او د زخم ژر رغیدنه یقیني شي. لاندې ځینې لومړنۍ مرحلې یادې کوو:

1. زخم پاکول:

د هر ډول زخم درملنې لپاره لومړی گام د زخم پاکول دي. د پاکو اوبو یا نرمو صابوني محلولونو سره زخم پاک کړئ. که زخم ډېره غټه وي، نو د درملنې لپاره یې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړئ.

2. زخم ته فشار ورکول:

د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره پاک ټوکر یا پټۍ په زخم کېږدئ او لږ فشار ورکړئ. دا کار د وینې بهیدنه کنټرولوي.

3. ضد عفوني مواد کارول:

د زخم پاکولو وروسته په هغه ځای کې ضد عفوني مواد وکاروئ چې د باکټریا مخه ونیسي. د بیلگې په توگه، بیټاډین یا نور ضد عفوني مایعات کارول کېدای شي.

4. پټۍ تړل:

په زخم باندې پټۍ واچوئ ترڅو د چاپيريال له ککړتيا څخه خوندي پاتې شي. پټۍ بايد پاکه او وچه وي او په منظم ډول بدل شي.

د زخمونو لپاره احتياطي تدابير

د زخم پاک ساتل: هڅه وکړئ زخم هره ورځ پاک کړئ او په هغه کې نوي ضد عفوني مواد واچوئ.

د تيتانوس ضد واکسين: که زخم ژور او په ځانگړې توگه د زنگ وهلي شيانو له کبله وي، نو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د تيتانوس واکسين ترلاسه کړئ.

د زخم څارنه: که زخم سوروالی، پړسوب، درد يا انفېکشن ښې ولري، نو دا به د جدي پاملرنې اړتيا ولري. په دې حالت کې د روغتيايي کارپوهانو سره مشوره وکړئ.

د زخم د ژر رغيدو لپاره گټورې لارښوونې

په غذايي توکو کې ویتامين سي، زينک، او پروتين لرونکي خواړه زيات کړئ، چې د نسجونو په رغولو کې مرسته کوي.

د الکولو او تنباکو څخه ډډه وکړئ، ځکه چې دا مواد د زخم د رغيدو پروسه ورو کوي.

د زخم د پټولو لپاره ورپټۍ او پاکو موادو کارول، ترڅو د نورو عفونتونو څخه خوندي پاتې شئ.

د زخمو لپاره لاس احتياطي تدابير (داکتر مجيب الرحمن)

د زخم د درملنې او د نورو ناروغيو د مخنيوي لپاره لاندې لاس احتياطي تدابير غوره دي:

1. لاسونه پاکول: د زخم د درملنې يا پټۍ بدلولو دمخه خپل لاسونه په صابون او اوبو ښه پاک کړئ. دا کار د انفېکشن د مخنيوي لپاره اړين دی.
2. زخم پاک ساتل: زخم بايد په منظمه توگه په پاکو اوبو يا نرمو ضد عفوني موادو (لکه بيټاډين) سره پاک شي. دا کار د باکټريا د خپرېدو مخنيوی کوي.
3. پټۍ تړل: زخم ته بايد پاکه پټۍ وټړل شي ترڅو د چاپيريال له ککړتيا څخه خوندي پاتې شي. پټۍ بايد هره ورځ يا هر ځل د چټلۍ کيدو په صورت کې بدله شي.
4. د زخم وچه ساتل: په ځانگړي ډول په لومړيو ورځو کې، زخم بايد وچ وساتل شي ترڅو ژر رغيدنه وکړي.
5. ضد عفوني مواد کارول: د زخم په ناحیه کې د ضد عفوني موادو کارول لکه انټي سيپټيک کريمونه د باکټريا مخنيوي لپاره گټور دي.
6. د زيانمنو شيانو نه کار اخيستل: د زنگ وهلي شيانو يا بې کيفيته توکو کارولو څخه ډډه وکړئ چې د تيتانوس خطر کم شي.

لومړۍ طبي مرستې لیکوال: داکتر مجيب الرحمن (رحمانی)

7. د تیتانوس واکسین اخیستل: که زخم ژور او د ښک وهلي شیانو سره د تماس له امله وي، نو ژر تر ژره د تیتانوس واکسین واخلي.

8. زخم ته لاس مه وروړئ: د زخم په ناحیه کې غیر ضروري لمس او خارش باید ونه کړئ ترڅو د میکروب خطر کم شي.

9. روغتیايي کارپوه ته مراجعه: که زخم پړسوب، درد، سوروالی، یا د پېپ تولید ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړئ دا نښې د انفیکشن ښودونکي کیدي شي.

10. صحي تغذیه: د پروټین، ویتامین سي، او زینک لرونکي خواړه وخورئ، ځکه دا غذايي توکي د زخم د ژر رغیدو کې مرسته کوي.

پانسمان یا پټی (Dressing)

پانسمان یا پټی هغه مواد دي چې د زخم په پوښلو او ساتلو کې کارول کېږي، او د زخم د ژر رغیدو، پاک ساتلو، او د عفونت د مخنیوي لپاره ګټور دي. پانسمانونه په بېلابېلو ډولونو وېشل کېږي، چې د زخم نوعیت، موقعیت، او د روغتیايي حالت په اساس غوره کېږي. دلته د پانسمانونو مهم ډولونه او د هغوی ځانګړتیاوې وړاندې شوي دي:

۱. ګاز پانسمان (Gauze Dressing)

دا په طبي برخه کې تر ټولو عام ډول پانسمان دی او د زخم پاک ساتلو لپاره کارول کېږي. د ګاز پانسمان په مختلفو اندازو او کثافتونو کې موندل کېږي او دا د زخم د پاک ساتلو او د اضافي مایعاتو جذبولو لپاره ګټور دی. دا پانسمانونه د سطحې زخمونو لپاره غوره دي، ځکه چې دا په اسانۍ سره بدلېدلی شي او د زخم له سطحې اضافي مایعات راټولوي.

۲. غیر چسپونکی پانسمان (Non-Adherent Dressing)

دا ډول پانسمان په هغو زخمونو کې کارول کېږي چې په اسانۍ سره ماتېدونکي وي. دا پټی د زخم سره نه نښلي او په اسانه بدلېږي، نو د زخم پاک ساتلو او بیا بیا نه زخمی کولو لپاره ښه دی.

دا عموماً په سوځیدلو، جراحي زخمونو، او د ناروغانو په حساسو پوستکي کې کارول کېږي.

۳. فوم پانسمان (Foam Dressing)

فوم پانسمان د نرمو او اسفنجي موادو څخه جوړ وي او د زخم د مایعاتو د ښه جذب توان لري. دا پانسمان د ژورو او منځنیو زخمونو لپاره کارول کېږي، ځکه چې اضافي مایعات راټولوي او زخم وچ ساتي.

فوم پانسمان د سوځیدلي او ژورو زخمونو لپاره غوره دی او د درد د کموالي سبب کېږي.

۴. هایډروکولوئډ پانسمان (Hydrocolloid Dressing)

دا ډول پانسيمان يو جيل جوړوي چې د زخم له مایعاتو سره په تماس کې شو. دا جیل زخم پاک او لوند ساتي، چې د ژر رغیدو لپاره اړین دی.

هایدروکولوئید پانسيمانونه د سطحي زخمونو، تپونو، او د وینې بهیدنې کمولو لپاره ډېر ګټور دي. دا پانسيمان د اوږدې مودې لپاره پر زخم پاتې کېدای شي او په ځانګړې توګه د هغو ناروغانو لپاره مناسب دی چې د پانسيمان په بدلو کې ستونزه لري.

۵. هایډروجيل پانسيمان (Hydrogel Dressing)

هایډروجيل پانسيمان د اوبو پر بنسټ جوړ شوی دی، چې زخم نرم او لوند ساتي. دا د هغو زخمونو لپاره کارول کېږي چې وچ وي او رطوبت ته اړتیا لري.

دا پانسيمان د سطحي سوځیدلو، وچو زخمونو، او د سرطان ځینو زخمونو لپاره ګټور دی.

۶. شفاف پانسيمان (Transparent Dressing)

شفاف پانسيمان د پلاستيکي موادو څخه جوړوي چې د زخم پر ځای کښيښي او شفافه سطحه جوړوي. دا زخم ساتي او ناروغ ته اجازه ورکوي چې زخم په ښکاره توګه وګوري.

دا پانسيمانونه په ځانګړې توګه د هغو زخمونو لپاره مناسب دي چې وینه نه بهوي، لکه کوچني تپونه یا د وینې د نلونو د ځایونو ساتنه.

۷. الګینیټ پانسيمان (Alginate Dressing)

الګینیټ پانسيمان د سمندري بوټو د موادو څخه جوړ دی او د مایعاتو جذبولو قوي ظرفیت لري. دا پانسيمان د هغو زخمونو لپاره غوره دی چې ډېرې رطوبت او وینه ولري.

دا په ځانګړې توګه په هغو زخمونو کې کارول کېږي چې د ګاز پانسيمان په کچه ډېر مایعات جذب کړي.

۸. کولاجن پانسيمان (Collagen Dressing)

کولاجن پانسيمان د زخم په رغولو کې مرسته کوي او د زخم په سطحه نوې حجرې جوړوي. دا په ژورو زخمونو، سوځیدلو او نورو مزمنو زخمونو کې کارول کېږي.

دا پانسيمان د زخم د روغتیايي حجرو په تولید کې مرسته کوي او ژر رغیدنه راولي.

د پانسيمان د کارولو مهم ټکي او ضروري وسايل

د زخم نوعیت، ځای او اندازه په نظر کې ونیسی ترڅو سم پانسيمان وټاکل شي.

پانسيمان په منظم ډول بدل کړئ ترڅو زخم پاک پاتې شي او د عفونت مخنیوی وشي.

د هر ډول پانسيمان بدلولو پر مهال د لاسونو پاک ساتل او د زخم په پاکولو کې احتیاط وکړئ.

هر ډول زخم ځانګړي ډول پانسمان ته اړتیا لري، او د زخم نوعیت ته په کتو باید مناسب پانسمان وکارول شي.

د پانسمان لپاره یو لږ مهم وسایل او مواد و ته اړتیا وي چې د زخم پاک ساتلو، د انفیکشن مخنیوي او د زخم د ژر رغیدو لپاره اړین دي. لاندې د پانسمان لپاره ضروري وسایل او مواد په تفصیل سره بیان شوي دي:

۱. لاسونو د پاکولو مواد

د لاسونو پاکولو صابون یا ضد عفوني محلول: د لاسونو پاک ساتل د پانسمان په پیل کې خورا مهم دی. د صابون او اوبو یا الکولي ضد عفوني محلول سره لاسونه پاک کړئ ترڅو د انفیکشن مخه ونیول شي.

دستکشې (Sterile Gloves): دستکشې د لاسونو د میکروبونو څخه د زخم د ساتنې لپاره کارول کېږي، او د پانسمان پر وخت د میکروبونو مخنیوی کوي.

۲. زخم پاکوونکي مواد

پاکې یا سټرایل شوې اوبه (Sterile Water): زخم د اضافي وینو او ککړتیاوو څخه د پاکولو لپاره پاکو اوبو ته اړتیا وي.

1: نرمه اوبه یا سالین محلول (Saline Solution): دا محلول د زخم په نرم او خوندي توګه پاکولو لپاره کارول کېږي.

2: ضد عفوني مواد (Antiseptic Solutions): بیتاډین، هایډروجن پراکساید یا الکل د زخم د باکټریا د مخنیوي لپاره کارول کېږي. دا مواد د زخم پاک ساتلو لپاره مهم دي، خو په ځینو حساسو زخمونو کې احتیاط پکار دی.

۳. د پانسمان پټې او د زخم پوښونکي مواد

ګاز پټې (Gauze Pads): د زخم پوښلو او د اضافي مایعاتو جذبولو لپاره کارول کېږي. دا پټې په بېلابېلو اندازو او شکلونو کې موندل کېږي.

غیر چسپونکي پټې (Non-Adherent Pads): دا پټې د زخم سره نه نښلې او په اسانه بدلېدلی شي، په ځانګړي ډول د هغو زخمونو لپاره چې د تکراري پانسمان ته اړتیا لري.

فوم پانسمان (Foam Dressing): د اضافي مایعاتو جذبولو لپاره ګټور دي او د زخم په ناحیه کې فشار کموي.

شفاف پانسمان (Transparent Dressing): دا مواد شفاف دي او ناروغ ته اجازه ورکوي چې زخم په ښکاره توګه وګوري. د کوچنیو زخمونو او سطحي ټپونو لپاره کارول کېږي.

۴. چسب (Tape) او کلیپونه

طبي چسب (Medical Tape): د پانسمان پټې د زخم په ځای کې د محکم ساتلو لپاره کارول کېږي. طبی چسب د بېلابېلو شکلونو او کثافتونو سره موندل کېږي.

پانسماڼي بند (Clips يا Bandage Fasteners): د ځانگړو پانسماڼونو لپاره کليپونه کارول کېږي، لکه د فوم يا غټو پټو لپاره، چې اضافي پوښښ ته اړتيا لري.

۵. قیچی او پلستر پرېکونکی

طبي قیچی (Medical Scissors): د پانسماڼ پرې کولو، پټیو ترتیبولو او د زخم لپاره مناسب اندازه کولو لپاره کارول کېږي.

پلستر پرېکونکی (Bandage Scissors): د چسپونو يا فوم پانسماڼ په پرې کولو کې مرسته کوي او د زخم په نږدې برخه کې اسانه کارول کېږي.

۶. د زخم اضافي مایعات راټولولوونکی

سرنج يا پیپټ (Syringe or Dropper): د زخم پاکولو لپاره د سالین محلول يا ضد عفوني موادو اچولو کې مرسته کوي.

سکشن پیپټ يا تیوب (Suction Pipette or Tube): که زخم ډېر ژور او پرسیدلی وي، نو اضافي مایعات راټولولو لپاره سکشن تیوب کارول کېږي.

۷. اضافي حفاظتي مواد

ډرېپ يا سټرایل ماسک (Sterile Drapes or Face Masks): د زخم د چاپیریال ساتنې لپاره کارول کېږي، په ځانگړې توگه د جراحي پانسماڼونو په وخت کې د میکروبونو مخنیوی کې مرسته کوي.

۸. د ځخلو ځانگړې بستې (Biohazard Bags)

د زخم د پانسماڼ پر وخت پاتې شوي مواد، ککړ پټې، او د استعمال شوې دستکشې په ځانگړو پلاستيکي بستو کې اچول کېږي ترڅو نورو ته د میکروبونو د انتقال مخنیوی وشي.

۹. د درد کمولو مواد

درد کمونکي سپرې يا کريمونه (Pain Relief Spray or Cream): ځینې وختونه د پانسماڼ پر مهال درد شتون لري، چې د درد کمولو مواد مرسته کوي.

د پانسماڼ پر وخت د احتیاطي تدابیرو مراعاتول

د زخم پاک ساتل، په منظمه توگه د پانسماڼ بدلول، او د زخم په هره معاینه کې د لاسونو پاک ساتل.

که زخم د انفیکشن نښې وښيي لکه سوروالی، پرسوب يا شدید درد، نور وختیایي متخصص ته مراجعه وکړي.

د دې وسایلو درلودل د زخم د ښه درملنې او ژر رغیدنې لپاره گټور او اړین دي.

هغه انتی سپټیک چی د زخمونو په پاکولو کی کارول کیږی

د زخم د پاکولو او د باکټريا د مخنيوي لپاره بېلابېل انټي سيپټيک مواد کارول کېږي. د انټي سيپټيک موادو ډول او انتخاب د زخم نوعيت او حساسيت ته په کتو سره ټاکل کېږي. دلته د ځينو عامو انټي سيپټيک موادو په اړه معلومات وړاندې شوي دي:

۱. بېټاډين (Betadine يا Povidone-Iodine)

بېټاډين يو خورا عام انټي سيپټيک دی چې د يودين په بنسټ جوړ شوی دی. دا د زخم په ناحیه کې د مکروبونو او باکټريا د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي.

د کوچنيو ټپونو، جراحي زخمونو او د پوستکي د سطحو لپاره گټور دی.

ځينې وختونه د حساسو کسانو په پوستکي کې خاړښت يا حساسيت رامنځته کولی شي، نو احتياط پکار دی.

۲. هايډروجن پراکسايډ (Hydrogen Peroxide)

هايډروجن پراکسايډ يو له هغو موادو څخه دی چې د زخم د پاکولو او د باکټريا له منځه وړلو لپاره کارول کېږي.

دا د اکسيجن بلبونه جوړوي چې د زخم سطحه پاکوي.

په ورځني يا عادي زخمونو کې د ډېر استعمال څخه ډډه وکړئ، ځکه چې د پوستکي حجري زيانمنولی شي.

۳. الکول (Alcohol - Ethyl يا Isopropyl Alcohol)

الکول د مکروبونو او باکټريا د له منځه وړلو لپاره کارول کېږي او په ځانگړې توگه د کوچنيو زخمونو لپاره گټور دی.

دا د زخم په پاکولو کې مرسته کوي، خو د ځينې خلکو لپاره سوځونکی او دردوونکی وي.

د خلاصو او حساسو زخمونو لپاره ډېر نه توصيه کېږي، ځکه چې د زخم په رغيدنه کې ستونزه رامنځته کولی شي.

۴. کلورهايډرکسن (Chlorhexidine)

کلورهايډرکسن يو انټي سيپټيک دی چې د زخم د پاکولو، د پوستکي ضد عفوني کولو او د جراحي وسايلو په پاکولو کې کارول کېږي.

د اوږدمهاله زخمونو او د حساسو ناروغانو لپاره مناسب دی، ځکه چې ډېر خاړښت رامنځته کوي.

د جراحي زخمونو لپاره يو ښه انتخاب گڼل کېږي.

۵. سوډيم هايپوکلورايټ (Sodium Hypochlorite Solution)

دا د ژورو يا سختو زخمونو لپاره کارول کېږي او د مکروبونو او باکټريا له منځه وړلو کې اغېزمن دی.

دا محلول د اوږدمهاله زخمونو، سوځيدلو او د وينې زياتيدو په حالتونو کې کارول کېږي.

٦. سلاين محلول (Normal Saline Solution)

که څه هم سلاين يو ريښتینی انتي سپيټيک نه دی، خو د زخم د پاکولو لپاره خورا نرم او خوندي محلول دی. دا د ککړتیا له منځه وړلو او د زخم د پاک ساتلو لپاره کارول کېږي.

د هغو کسانو لپاره چې حساس پوستکی لري یا ماشومان وي، یو ښه انتخاب دی.

٧. انتي سپيټيک کریمونه او سپري

په ځينو حالتونو کې د انتي سپيټيک کریمونه یا سپري کارول کېږي چې په اسانۍ سره زخم ته لگول کېږي.

د کوچنیو ټپونو، د سوځیدلو او د پوستکي د ککړتیاو د لری کولو لپاره

سوځیدنه (burn)

سوځیدنه (burn) هغه حالت دی چې په کې د بدن پوستکي یا داخلي انساج د تودوخې، کیمیاوي موادو، برقي جریان یا شعاعو له امله زیانمن کیږي. سوځیدنه په ډیرو مواردو کې خطرناکه وي او د ځینو شدیدو سوځیدنو لپاره بیړنۍ طبي مرستې ته اړتیا وي. سوځیدنه د شدت او ژورتیا له مخې څو ډوله ده:

١. د سوځیدنې ډوله درجې:

لمړۍ درجه سوځیدنه: په دې کې یوازې د پوستکي بهرنۍ برخه (epidermis) زیانمنه شوې وي. پوستکی سره او وچ ښکاري او معمولاً په دې کې تاوول نه وي. درد هم لري او د څو ورځو په اوږدو کې شفا مومي. د لمر سوځیدنه یو عام مثال دی.

دوهمه درجه سوځیدنه: په دې حالت کې د پوستکي منځنۍ طبقه (dermis) زیانمنه وي. دا ډول سوځیدنه د پوستکي سوروالی، تاوولونه، شدید درد او د پوستکي نرمښت یا د پوستکي ټوکېدو سبب ګرځي. د شفا موده یې د څو اونیو څخه تر څو میاشتو پورې ده او کله هم ممکن داغ پاتې شي.

درېمه درجه سوځیدنه: په دې کې ټول پوستکی زیانمن شوی وي، او حتی د پوستکي لاندې انساج (subcutaneous tissue) هم زیانمن کېدای شي. پوستکی سوخته او څر یا تور ښکاري. په دې ډول سوځیدنه کې معمولاً درد کم وي ځکه چې د پوستکي اعصاب زیانمن شوي وي. دا ډول سوځیدنه جدي طبي مداخلې او جراحي ته اړتیا لري.

څلورمه درجه سوځیدنه: دا حالت د شدیدو سوځیدنو وروستی درجه ده، چې په کې هډوکي، عضلات او نسجونه زیانمن شوي وي. دا ډول سوځیدنه ډیره خطرناکه ده او د فوري جراحي او طبي پاملرنې ته اړتیا لري.

د سوځیدنې اسباب

حرارتي سوځیدنه: د اور، ګرمو مایعاتو یا ګرمو شيانو له امله رامنځته کیږي.

کیمیاوي سوځیدنه: د اسیدونو یا الکلیونو په څیر کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي.

برقي سوځیدنه: د برقي جریان په تماس کې راټلو له امله منځته راځي.

شعاعي سوځيدنه: د لمر، الترا وايوليت شعاعو يا د شعاعي وسيلو په واسطه رامنځته كيږي.

د سوځيدنې لومړنۍ مرستې

د سوځيدنې لومړنۍ مرستې د سوځيدنې په شدت او نوعيت پورې اړه لري:

د لومړۍ او دوهمې درجې سوځيدنو لپاره:

1. ساره اوبه: سوځيدلی ځای په سرو اوبو ووينځئ يا په اوبو کې ډوب کړئ. خو د يخ کارول مه کوئ ځکه چې ممکنه ده د پوستکي نسجونه نور هم زيانمن شي.

2. پاکه غاز يا کلينکس: د سوځيدلي ځای د پاک ساتلو لپاره پاکه غاز يا کلينکس استعمال کړئ.

3. درد ضد درمل: د درد کمولو لپاره پاراستامول يا بروفين کارولی شئ.

4. پټېدل: سوځيدلی ځای په پاکه پټه پټ کړئ ترڅو د مکررو بونو له داخلیدو مخنيوی وشي.

د دریمې او څلورمې درجې سوځيدنو لپاره:

1. بېرني حالت: دا ډول سوځيدنې فوري طبي مرستې ته اړتيا لري. ژر تر ژره بېرني روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړئ.

2. پټېدل: د سوځيدلي ځای په پاکه پټه يا ټوټه پټ کړئ، خو د پټۍ نه ټينګول ضروري دي.

3. د سوځيدلي ځای ته هيڅکله غوړي يا د کور کريمو نه مه استعمالوئ، ځکه چې دا ممکن د پوټکي په نسجونو کې خنډونه جوړ کړي او شفا راتګ ورو کړي.

د سوځيدنې مخنيوي لارې

احتياط د اور يا گرمو شيانو سره د کار کولو پر مهال.

د ماشومانو ساتنه له گرمو او اور اخیستونکو توکو څخه.

د کيمياوي موادو کارولو پر مهال دستکشې او د ساتنې وسايل اغوستل.

د برقي وسيلو څخه ليرې پاتې کيدل په نم ځايونو کې.

سوځيدنه يو داسې جدي حالت دی چې بايد په احتياط سره ورته پاملرنه وشي. که سوځيدنه شديد وي، د بېرنيو مرستو غوښتنه وکړئ او له خپل ډاکټر سره سلا وکړئ.

د سوځيدنې په وخت کې له ناروغ سره مرسته کول

د سوځيدنې په وخت کې له ناروغ سره مرسته کول ډير مهم دي، ځکه چې مناسبه لومړنۍ مرسته کولای شي د سوځيدنې شدت راکم کړي او د ناروغ وضعیت ښه کړي. دلته د سوځيدنې په وخت کې د ناروغ سره د مرستې گامونه په تفصيل سره ذکر شوي دي:

لومړۍ طبي مرستې لیکوال: داکټر ————— رحیب الرحمان (رحمانی)

۱. سمدستي حالت ارزول

د ناروغ سوځيدنې درجه و ارزئ كه چيرې پوستكې سور، تاول لرونكې يا ټوټه شوى وي (لمړۍ يا دوهمه درجه)، يا كه سوځيدنه ژوره وي او پوستكې خړ يا تور وي (درېمه يا څلورمه درجه).

۲. د سوځيدنې سيمه يځه كول

كه سوځيدنه لمړۍ يا دوهمه درجه وي، سړې اوبه وکاروئ: د سوځيدلي ځای لپاره ۱۰-۱۵ دقيقې سړې اوبه استعمال کړئ. دا به د درد کمولو او د سوځيدنې له زياتيدو څخه مخنيوى وکړي.

د يځ استعمال مه کوئ. يځ ممکنه ده چې د پوستکي نسجونه زيانمن کړي، نو د يځ استعمال څخه ډډه وکړئ.

۳. پاک او نرم پوښ استعمالول

د سوځيدلي ځای د مکرويونو څخه د ساتلو لپاره، پاکه او نرمه پټه يا کلينکس په اغيزمنه ساحه باندې ولگوئ. د سخت پټۍ يا ټينگولو څخه ډډه وکړئ، ځکه چې دا ممکنه ده د پوستکي حساس ځای ته نور زيان ورسوي.

۴. د درد کمول

د درد کمولو لپاره پاراستامول يا بروفين ورکول کيدای شي (البته د ناروغ عمر او د وزن له مخې په مناسب اندازه).

۵. د مايعاتو ورکول

كه سوځيدنه پراخه وي، د ناروغ بدن ډير مايعات له لاسه ورکوي. ناروغ ته کافي اوبه، جوس يا نور مايعات ورکړئ تر څو د بدن د مايعاتو کچه متوازنه وساتي.

۶. بېرني حالت ته چمتو کيدل

كه سوځيدنه جدي او ژوره وي (درېمه يا څلورمه درجه)، نو بېرنيو خدماتو ته اړتيا ده:

ناروغ روغتون ته ژر تر ژره انتقال کړئ.

د امکان په صورت کې د ناروغ د وضعیت په اړه بېرني روغتيايي خدماتو ته معلومات ورکړئ.

۷. له ممنوعو شيانو څخه ډډه كول

هيڅکله د کور کريمونه، غوړي، د غوښې يا پياز ټوټې، او يا بله داسې ماده مه استعمالوئ، ځکه چې دا شيان ممکن د مکرويونو د انتقال سبب شي او د سوځيدنې شفا راتگ ورو کړي.

۸. د سوځيدلي ځای موقعيت لوړول

كه سوځيدنه په لاس يا پښه وي، هڅه وکړئ چې سوځيدلى غړى د زړه په کچه يا د هغې نه لوړ ځای کې وساتئ. دا به د وينې جريان کنټرول او د پړسوب کمولو کې مرسته وکړي.

۹. ناروغ ته ارام ورکول

د سوځيدنې سره مل درد او اضطراب د ناروغ لپاره ډير ستونزمن وي، نو ناروغ ته د ارام ورکولو هڅه وکړئ او د وضعیت په اړه هغه ته ډاډ ورکړئ.

۱۰. د طبي متخصص مشوره

د هر ډول سوځيدنې لپاره، په ځانگړي ډول دوهمې، درېمې، او څلورمې درجې سوځيدنو کې، طبي مشورې ته ژر مراجعه وکړئ دا به د ناروغ د ژر شفا او د نورو عوارضو مخنيوي کې مرسته وکړي.

دا گامونه کولای شي د سوځيدنې په حالت کې د ناروغ سره د پام وړ مرسته وکړي، خو که سوځيدنه پراخه وي يا د ماشوم يا بوډا کس سره وي، نو بېرنيو خدماتو ته په فوري توگه اړتيا ده.

د سوي ناروغ ته لارښوونې او هدايات ورکول

د سوي ناروغ ته لارښوونې او هدايات ورکول د هغه د روغتيا په ښه کيدو کې لويه مرسته کوي. دا لارښوونې ناروغ ته د سوځيدنې د خرابيدو مخنيوی کوي او د ژر رغيدو کې ورسره مرسته کوي. دلته ځينې لازم هدايتونه ذکر شوي دي

۱. د پوستکي پاکوالی او ساتنه

د سوځيدلي ځای پاکوالی: د سوځيدلي ځای پاک ساتل مهم دي. دا به د مکروبونو د داخليدو مخنيوی وکړي. که سوځيدنه په نرمه پټه يا کلينکس پونښل شوې وي، هغه به په منظم ډول بدلوي. له ککړو شيانو څخه ډډه کول: ناروغ بايد د سوځيدلي ځای سره د لاس يا ککړو شيانو د تماس څخه ډډه وکړي.

۲. د پوستکي څخه خارش مه کوئ

ناروغ ته ووايئ چې سوځيدلي ځای مه خارښوي، که چيرې خارش وي، ځکه چې دا ممکنه ده تاوولونه يا زخموڼه وڅوځي او مکروبونه داخل شي.

۳. له روغتيايي کريمونو يا درملو پرته نور درملو له کارولو څخه ډډه

ناروغ ته لارښوونه وکړئ چې هيڅ غير طبي کريم، غوړي، يا طبيعي مواد لکه پياز، بادرنګ يا بل څه په سوځيدلي ځای مه استعمالوي. د دې پر ځای د ډاکټر لخوا تجویز شوی کريم يا درمل وکاروي.

۴. د مستقيم لمر يا گرمو ځايونو څخه لرې پاتې کيدل

ناروغ بايد له مستقيم لمر او گرمو ځايونو څخه لرې وي، ځکه چې د لمر تودوخه او د حرارت زیاتوالی د سوځيدلي ځای لپاره زیانمن کيدای شي.

۵. د آرام او خوب په اهميت تاکيد کول

ناروغ ته ووايئ چې ارام واخيري او کافي خوب وکړي. ارام او خوب د بدن د رغيدو په بهير کې مهم رول لوبوي.

٦. د مناسب لباس اغوستل

ناروغ باید نرم، پاک او پراخه کالي واغوندي چې د سوځيدلي ځای سره تماس نه لري او نه يې خارشوي.

٧. مایعات او صحي غذا

ناروغ ته د کافي مایعاتو څښلو او غذايي موادو خوړلو توصیه وکړئ، لکه پروټين لرونکي خواړه، تازه میوې او سبزیجات. دا به د بدن مقاومت پیاوړی کړي او د رغیدو بهیر چټک کړي.

٨. د درملو او کریمونو منظم استعمال

ناروغ ته یادونه وکړئ چې د ډاکټر لخوا تجویز شوي درمل یا کریمونه په ټاکلي وخت او ډول استعمال کړي.

٩. د زخم د ژوریدو نښې

ناروغ ته لارښوونه وکړئ که لاندې کومه نښه ولیدل شوه، ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي:

د پوستکي سوروالی زیات شي.

سوځیدلی ځای پړسوب وکړي.

د زخم څخه پیپ یا بوی خپور شي.

تبه یا شدید درد محسوس کړي.

١٠. د ډاکټر سره منظم تعقیب

ناروغ ته توصیه وکړئ چې د ډاکټر سره په منظمه توګه د معایناتو لپاره مراجعه وکړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې سوځیدنه په سمه توګه رغیږي.

دا هدایتونه به ناروغ سره مرسته وکړي چې د سوځیدنې په وخت کې مناسب اقدامات ترسره کړي او د ژر رغیدو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي.

د سوځیدنې پانسما (Bandaging)

د سوځیدنې پانسما (Bandaging) یا پټېدل د دې لپاره ترسره کیږي چې سوځیدلی ځای پاک او محفوظ وساتل شي، د مکروبونو او نورو ککړتیاوو مخه ونیسي، او د شفا بهیر ګړندی کړي. د سوځیدنې د پانسما په اړه ځینې اساسي معلومات په لاندې ډول دي:

١. د پانسما د انتخاب لپاره لارښوونې

پاکې او استریل (بې میکروبې) پټې: د سوځیدنې لپاره همیشه پاکې او بې میکروبې پټې وکاروئ، چې د زخم څخه د مکروبونو مخنیوی وشي.

غير چپکې پټې: غير چپکې پټې استعمال کړئ، چې د زخم سره ونه نښلي. دا پټې د زخم د رغيدو پر مهال کم درد او تکليف رامنځته کوي.

د تنفس وړ پانسمان: ځينې پانسمانونه د زخم لپاره د هوا تګ راتګ ته اجازه ورکوي چې دا د شفا لپاره ګټور وي.

۲. د پانسمان کولو اصول

د زخم پاکوالی: لومړی د سوځيدلي ځای پاکوالی ډاډمن کړئ. که چيرې لمړۍ يا دوهمه درجه سوځيدنه وي، سوځيدلی ځای په سرو اوبو ووينځئ.

د پټې ايښودنه: د پټې ايښودلو پر وخت، هڅه وکړئ چې پټه نه ډير ټينګه او نه هم ډيره خلاصه وي. پټه بايد په داسې ډول ولګول شي چې هوا کولی شي زخم ته ننوځي او زخم پرته له تکليف څخه پوښلي وساتي.

پټۍ بدلول: د سوځيدنې پانسمان بايد په منظم ډول بدل شي، عموماً هره ورځ يا د ډاکټر د مشورې مطابق، ترڅو د مکروبونو د وده مخنيوی وشي.

۳. د پانسمان ګټې

د مکروبونو مخنيوی: پانسمان د مکروبونو او بهرني ککړتياوو له داخلیدو څخه زخم ساتي.

د درد او خارش کنټرول: پانسمان د زخم د مستقیم تماس مخه نیسي، چې د درد او خارش کمولو کې مرسته کوي.

د پوستکي ساتنه: د سوځيدلي ځای حساس پوستکي د خارش او مستقیم لمر له زیان څخه خوندي ساتي.

۴. د مختلفو درجې سوځيدنو لپاره پانسمان

لمړۍ درجه سوځيدنه: عموماً پانسمان ته اړتیا نه لري، خو که اړينه وي، د نرمو او پاکو پټو څخه کار واخلي.

دوهمه درجه سوځيدنه: غير چپکې، استريل پټې وکاروئ او په منظم ډول پانسمان بدل کړئ. که تاو لونه وي، هڅه وکړئ چې تاو لونه مه ټوک کړئ.

دریمه او څلورمه درجه سوځيدنه: دا ډول سوځيدنې شديدې دي او پانسمان کولو لپاره د روغتيايي متخصص مشوره اړينه ده. دا ډول سوځيدنې ممکنه ده جراحي پانسمان ته اړتیا ولري.

۵. د پانسمان په اړه مهم احتياطي تدابير

د ناستعمال شويو کريمونو او درملو څخه ډډه: هيڅ غير طبي کريم يا درمل مه استعمالوئ؛ يوازې هغه مواد وکاروئ چې ډاکټريې وړانديز کړی وي.

له سختو پټو څخه ډډه: د سختو يا چپکو پټو استعمالولو څخه ډډه وکړئ، ځکه چې د زخم نښليدو سبب ګرځي او د پټې ايستلو پر مهال دردناک کيدای شي.

پانسمان نه ډیر ټینګ او نه هم ډیر خلاص ولګول شي: که پانسمان ډیر ټینګ وي، د وینې جریان ته ستونزه رامنځته کوي؛ او که ډیر خلاص وي، ککړتیا ننوتلی شي.

۶. د پانسمان د بدلولو ګامونه

۱. پاک لاسونه: مخکې له دې چې پانسمان بدل کړئ، لاسونه په صابون او اوبو ښه پاک کړئ.
 ۲. پخوانی پانسمان احتیاط سره لرې کول: پخوانی پانسمان په احتیاط لرې کړئ، او که د زخم سره نښتی وي، لږ اوبه پرې واچوئ ترڅو پټه نرم او د زخم څخه اسانه جلا شي.
 ۳. د زخم بیا پاکوالی: زخم په سپرو اوبو یا د ډاکټر لخوا وړاندیز شوي محلول سره پاک کړئ.
 ۴. نوې پټه ایښودل: نوې او پاکه پټه په سوځیدلي ځای په مناسب ډول ولګوئ.
- د سوځیدنې پانسمان یو مهم او اساسي کار دی چې د ناروغ روغتیا او شفا بهیر په چټکتیا کې مهم رول لري. د روغتیايي متخصص لارښوونې تل تعقیب کړئ ترڅو د زخم شفا په سمه توګه ترسره شي.

د سوځیدلي ناروغ لپاره مناسب درمل او مایعات ورکول

د سوځیدلي ناروغ لپاره مناسب درمل او مایعات ورکول ډیر مهم دي، ځکه چې دا د ناروغ درد، مکررونو مخنیوی، او د بدن د مایعاتو کچه تنظیمولو کې مرسته کوي. لاندې د سوی ناروغ لپاره یو شمېر لازمي درمل او مایعات ذکر شوي دي:

۱. درد کمونکي درمل (Analgesics)

پاراستامول (Paracetamol): د خفیف او منځني درد لپاره ښه انتخاب دی. د ناروغ عمر او وزن په پام کې ونیسئ او د ډاکټر لخوا وړاندیز شوې اندازه استعمال کړئ.

ایبوبروفین (Ibuprofen): دا درمل د درد او پړسوب کمولو کې مرسته کوي، خو باید د ډاکټر له مشورې سره سم وکارول شي. د معدې لپاره حساس ناروغانو ته یې ورکول مناسبه نه ده.

۲. انټي بیوټیک کریمونه او درمل

سلور سلفادایازین کریم (Silver Sulfadiazine Cream): دا کریم د دوهمې او درېمې درجې سوځیدنو لپاره کارول کیږي او د مکررونو د وده مخنیوی کوي. د سوځیدنې ځای پاکولو وروسته په نرمه طبقه کې پلي کیږي.

موپیروسین کریم (Mupirocin Cream): که چېرې د زخم څخه پیپ اوبه کیږي، نو موپیروسین کریم د مکررونو د ختمولو لپاره کارول کیږي. ډاکټر دې پدې برخه کې لارښوونې ورکړي.

۳. د میکروب ضد درمل (Antibiotics)

که سوځیدنه پراخه او جدي وي یا د زخم څخه پیپ خارج کیږي، نو ډاکټر ممکن د میکروب ضد درمل تجویز کړي. د دې درملو استعمال باید یوازې د ډاکټر د لارښوونې سره سم ترسره شي.

٤. د خاربست ضد درمل

اينټي هسټامين درمل: که ناروغ خاربست لري، نوانتي هسټامين درمل لکه ډايفين هايډرامين (Diphenhydramine) د خاربست کمولو کې مرسته کوي. البته، د ډاکټر له مشورې پرته مه کاروئ.

٥. د مايعاتو ورکول

د سوځيدني پر مهال، بدن زيات مايعات له لاسه ورکوي، نو ناروغ ته کافي مايعات ورکول مهم دي.

اوبه: د بدن د اوبو کچه متوازنه ساتي او د مايعاتو اړتيا پوره کوي.

الکترولايت محلولونه: لکه (ORS (Oral Rehydration Solution، چې د سوديم، پوټاشيم او نور املاح لري او د بدن مايعات بيرته تنظيموي.

طبي سوپونه يا شوروا: سوپونه او شورواگانې د بدن مايعات او تغذيه تامينوي او د ناروغ حالت ښه کولو کې مرسته کوي.

تازه جوسونه: لکه مالټي، ليمو، او منې جوس، چې بدن ته ویتامين سي او نور اړين مواد برابروي او د بدن دفاعي سيستم تقويه کوي.

٦. پروټين او ویتامينونه

ویتامين سي (Vitamin C): ویتامين سي د پوستکي د رغيدو او د بدن د دفاعي سيستم پياوړي کولو لپاره مهم دی. تازه ميوې لکه مالټي او ليمو وکاروئ.

پروټيني خواړه: د پروټين اندازه زياتول د زخم د رغيدو لپاره گټور وي، لکه شيدې، مستې، غوښه او هگۍ.

٧. ځانگړي پاملرنې درمل

که ناروغ د سوځيدني له وجې د معدې ستونزې يا بل جانبي تاثير ولري، د ډاکټر لخوا مخصوص درمل لکه انتي اسيد درمل يا ډايجسټيو انزايمونه ورکول کيدای شي.

مهم ټکي:

درملو او مايعاتو اندازه: ټول درمل د ډاکټر د مشورې سره سم وکاروئ. په ځان سره درملو يا کريمونو استعمال څخه ډډه وکړئ.

دوامداره څارنه: که ناروغ په دوامداره توگه شديد درد، خاربست، يا د زخم خرابيدل حس کړي، ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړئ.

دغه درمل او مايعات د سوځيدني د ناروغ لپاره مناسب گڼل کيږي، خو د درملو په کارولو کې احتياط او د ډاکټر مشوره خورا مهمه ده.

د سوی ناروغ ته پرهيز او استراحت

لومړۍ طبي مرستې لیکوال: ډاکټر ————— رجب الرحمان (رحمانی)

د سوځيدلي ناروغ لپاره پرهيز او استراحت د شفا بهير گړندي کولو او د بدن د انرژۍ ساتلو کې خورا مهم رول لري. لاندې لارښوونې د پرهيز او استراحت په اړه دي چې ناروغ بايد ورته پام وکړي:

۱. د استراحت لارښوونې

کافي آرام: د بدن لپاره کافي خوب او استراحت مهم دی، ځکه چې استراحت بدن ته د روغيدو لپاره انرژي ورکوي. ناروغ ته د ورځې او شپې په اوږدو کې کافي خوب کول سپارښتنه کېږي.

د بدن آرام حالت: که سوځيدنه په لاس، پښه، يا بدن کې وي، هڅه وکړئ چې هغه برخه په آرامه حالت کې وساتئ. که امکان ولري، سوځيدلې برخه لږ لوړه وساتئ، ترڅو د وينې جريان ښه شي او پړسوب کم کړي.

مناسب لباس اغوستل: ناروغ بايد نرم، پاک، او پراخ لباس واغوندي چې د سوځيدلي ځای سره تماس نه لري او د زخم د خاړښت او خرابيدو مخنيوی وکړي.

۲. د خوراکي پرهيز لارښوونې

له مسالې لرونکو خواړو څخه ډډه کول: مساله لرونکي خواړه، لکه چټک مساله، مړچ او نور، د بدن لپاره حساسيت رامنځته کولی شي او د سوځيدلي ناروغ لپاره ښه نه گڼل کېږي.

له ډير خوړو او بوړه لرونکو خوراکونو څخه ډډه کول: بوړه لرونکي خواړه، لکه خوړې مشروبات، کينډي او کيک، د بدن لپاره ښه نه دي، ځکه چې د زخم شفا بهير ورو کوي او د التهابي حالتونو زياتيدو سبب گرځي.

له باده لرونکو او ککړو خوراکونو څخه ډډه کول: هر ډول بد بوی لرونکي او ککړ خواړه، چې ممکنه ده مکروبونه ولري، بايد نه وخورل شي، ترڅو د ناروغۍ نورې ستونزې رامنځته نشي.

۳. د تغذيې لارښوونې

پروټين لرونکي خواړه: پروټين د بدن د نسجونو د رغيدو لپاره خورا مهم دی. ناروغ ته د پروټين منابع لکه غوښه، هگۍ، شيدې، مستې او دال ورکول په زړه پورې دي.

ويټامينونه او منرالونه: ويټامين سي، اي، اوزينک د پوستکي د رغيدو او د بدن د دفاعي سيستم د پياوړي کولو لپاره گټور دي. د تازه ميوو لکه مالټي، ليمو، منې، او سبزیجاتو استعمال ورته مفيد دي.

د اوبو او مايعاتو زيات استعمال: سوځيدنې په وخت کې بدن ډير مايعات له لاسه ورکوي. ناروغ ته د اوبو، تازه ميوو جوس، سوپ، او الکترولايتونو زيات استعمال توصيه کېږي.

۴. د خاړښت ضد لارښوونې

که ناروغ خاړښت احساس کړي، له هر ډول خاړښت څخه ډډه وکړي، ځکه چې خاړښت د سوځيدنې ځای زيانمن کولی شي او مکروبونه داخلولی شي. که چيرې خاړښت ډير وي، ډاکټر ممکن د خاړښت ضد درمل تجويز کړي.

۵. د لمر او حرارت څخه ځان ساتل

د لمر يا حرارت مستقيم تماس د سوځيدلي ځای لپاره ښه نه دی. ناروغ ته بايد لارښوونه وشي چې د سوځيدني ځای د لمر له مستقيم شعاعاتو څخه وساتي او په ارام چاپيريال کې پاتې شي.

٦. رواني استراحت

د سوځيدنې له امله ناروغان کله ناکله رواني فشار او تشويش سره مخ کېږي. ناروغ ته بايد په ارامه فضا کې د استراحت او د ملګرو يا کورنۍ د ملاتړ څخه ډاډ ورکړل شي، چې ذهني ارام ترلاسه کړي.

د دې پرهيز او استراحت اصولو مراعات کول به ناروغ سره مرسته وکړي چې په ښه او ګړندۍ توګه روغ شي.

په موټر ټکر کې د لومړنيو طبي مرستو (فرسټ ايډ) وړاندې کول

په موټر ټکر کې د لومړنيو طبي مرستو (فرسټ ايډ) وړاندې کول د قربانيانو د ژوند ژغورلو او حالت د لا خرابېدو مخنيوي لپاره خورا مهم دي. دلته ځينې لومړني ګامونه دي چې په دې حالت کې اخيستل کېدای شي:

1. **خوندي ځای ته ځان او نور انتقالول:** لومړی ډاډ ترلاسه کړئ چې ټکر شوی موټر او ټپيان په داسې ځای کې دي چې هلته بل ګواښ شتون نه لري، لکه اور يا بل موټر ټکر.

2. **سمدستي امبولانس ته زنگ ووهئ:** د ټپيانو وضعیت ته په کتو ژر تر ژره د مرستې غوښتنه وکړئ او اړوندې ادارې ته خبر ورکړئ.

3. **ټپيانو ته د ځان د خبرولو هڅه وکړئ:** ټپيان هڅه وکړئ چې خبرې ورته وکړئ او وګورئ چې ايا دوی هوشيار دي. که دوی غږ ته ځواب نه ورکوي، دا په ښه کوي چې د بې هوشۍ حالت کې دي.

4. **تنفس او د زړه ضربان وګورئ:** د ټپيانو تنفس او د زړه ضربان چيک کړئ. که تنفس نه وي، د مصنوعي تنفس (د خولې څخه خولې تنفس) او د سينې فشار (CPR) ورکولو ته اړتيا وي. يواځې هغه څوک دې دا وکړي چې په دې اړه روزنه لري.

5. **وينه بهيدنه کنټرول کړئ:** که کوم ټپي کس له بدن څخه وينه بهوي، د خون بهيدنې د درولو هڅه وکړئ. يوه پاکه ټوټه يا جامه په ټپي ځای باندې کېږدئ او په نرمۍ فشار ورکړئ. که امکان ولري، ټپي برخه د زړه له سطحې څخه پورته کړئ.

6. **د هډوکو ماتېدنه يا د ملا تېر کنټرول:** ټپيانو ته مه اجازه ورکړئ چې حرکت وکړي، ځکه په ټکر کې د ملا يا هډوکو ماتېدنه کيدی شي. که تاسو تجربه لرئ، بدن په ثابت حالت کې وساتئ او هڅه وکړئ ترروغتيايي مرستې رسيدو پورې حرکت ونکړي.

7. **د ناروغ پوښل او ګرم ساتل:** ټپيان اکثره د صدمې له امله له سرېدو سره مخ کېږي. يوه چادر يا بله کومه پوښاک ورته وکاروئ ترڅو د بدن حرارت کنټرول کړي.

8. **ټپونه او زخمو په پاک کړئ:** د سطحې ټپونه په پاکو ټوټو پاک کړئ او که امکان ولري، بانداز يا ټوټه پرې وتړئ. ترڅو له ککړتيا خوندي وي.

9. **ټپي کس ته د خوړو او اوبو نه ورکول:** په ټپي حالت کې، ټپيانو ته خواړه او اوبه مه ورکوي، ځکه په ځينو حالتونو کې دوی د بې هوښۍ، ځينې داخلي ټپونو يا بهرنۍ جراحي ته اړتيا لري.

10. **حوصله او ډاډ ورکول:** ټپيانو ته په نرمۍ خبرې وکړئ او ډاډ ورکړئ دا به د دوی ويږه او صدمه راکمه کړي او د حالت سره د مقابلې کې مرسته وکړي.

يادونه: دا ټول گامونه بايد په احتياط او د خونديتوب په پام کې نيولو سره ترسره شي.

د لومړنيو طبي مرستو لپاره لاندې ضروري وسايل درلودل اړين دي

د لومړنيو طبي مرستو لپاره لاندې ضروري وسايل درلودل اړين دي، ترڅو په بهرنيو حالاتو کې سم او چټک عکس العمل وښودل شي:

1. **بانداز:** د ټپونو پوښلو لپاره، باندازونه په بېلابېلو اندازو کې ولري دا د وينې بهيدنې د کنټرول او د ټپ له ککړتيا څخه د مخنيوي لپاره اړين دي.

2. **گاز يا جاذب ټوټه:** د زخمونو د پاکولو او په ټپي ځای باندې د وينې جذبولو لپاره، جاذب ټوټې اړينې دي.

3. **الکول يا انټي سيپټيک سيرم:** د ټپونو د پاکولو او د انفېکشن مخنيوي لپاره الکول، انټي سيپټيک سيرم، يا د انټي بيټيک کريم کارول کېږي.

4. **چادر يا د تودوخې بلکېټ:** د ټپي کس د بدن حرارت ساتلو لپاره چادر يا د اضطراري بلکېټ (فولادي يا مالومينيم بلکېټ) وکاروئ.

5. **اسټيټوسکوپ او بي بي اپارات:** د زړه ضربان او د وينې فشار اندازه کولو لپاره اسټيټوسکوپ او بي بي اپارات درلودل گټور دي.

6. **قيچي:** د جامو يا بانداز پرې کولو لپاره کوچنۍ قيچي وکاروئ.

7. **چسپکي پټۍ (سټيکي بانداز):** د کوچنيو زخمونو لپاره چې اړتيا به بانداز ته ونه لري، چسپکي پټۍ يا اډهيسف باندې شتون ولري.

8. **لاسونه پوښونکي دستکشې:** د ټپيانو سره په تعامل کې د ځان او هغوی خوندي کولو لپاره طبي دستکشې وکاروئ.

9. **د خولې څخه خولې تنفس ورکولو ماسک:** د CPR ورکولو لپاره د خولې څخه خولې ماسک ولري، چې د ساري ناروغيو مخنيوی وشي.

10. **ملتي ټول (کومبينيشن اوزار):** يو څو کاره وسيله چې د مختلفو وسايلو ځای نيولی شي، لکه پلاير، قينچي، او نور.

11. **د ټپ ډکولو څادر (ټراينگلر بانداز):** د لاسونو او پښو په ټپي حالت کې د بيلگې په توگه د لاس د ځورندولو لپاره د ټراينگلر بانداز کارول کيږي.

لومړۍ طبي مرستې لیکوال: داکټر مجيب الرحمان (رحمانی)

12. **ټوټه (کوټن):** د ټپ د پاکولو او د وینې جذبولو لپاره د کتنې ټوټې یا کاتن وکاروی.

13. **د سرېدو یا گرمو لپاره کڅوړې (آیس او هیت پېک):** د درد کمولو او پرسوب راکمولو لپاره یخ کڅوړه یا گرمه پېک کارول کېږي.

14. **تېز خراغ یا ټارچ:** په تیاره کې د ټپونو د چک کولو او د ساحې روښانه کولو لپاره یو قوي خراغ.

15. **د لومړنیو مرستو لارښود کتابچه:** د بیرنیو حالاتو په اړه لارښود او د مرستې لپاره معلوماتي کتابچه درلودل گټور وي.

د دې وسایلو په مرسته، په هر وخت کې د عاجل حالت لپاره چمتو کیدی شئ او لومړني طبي مرستې په سمه توګه وړاندې کولی شئ.

کسر د هډوکي ماتېدل

کسر د هډوکي ماتېدلو ته ویل کېږي، چې د فزیکي ځواک یا فشار له امله رامنځته کېږي. کسرونه د مختلفو پېښو لکه ټکر، سقوط، یا ناڅاپي ضربې له امله رامنځته کېدای شي او د کسر ډولونه مختلف دي، لکه ساده (بند) کسر چې هډوکي په دننه کې مات شوی وي، او یا پیچلی (پرانیستی) کسر چې هډوکي د پوستکي څخه بهر راغلی وي.

د کسرونو ډولونه

1. **بند کسر (Simple or Closed Fracture):** په دې حالت کې، هډوکي مات شوی خو پوستکي نه دی سوري شوی.

2. **پرانیستی کسر (Compound or Open Fracture):** د پوستکي ماتېدل او هډوکي بهر ته راتلل. دا ډول کسر د انفیکشن یا میکروبونو خطر لري.

3. **چورلک شوی کسر (Comminuted Fracture):** په دې ډول کې هډوکي په څو ټوټو وېشل شوی وي.

4. **چپه شوی کسر (Greenstick Fracture):** په ماشومانو کې عام دی، هډوکي جزوي چپه کېږي خو په بشپړ ډول نه ماتېږي.

5. **لور شوی کسر (Spiral Fracture):** په دې حالت کې، هډوکي په چرخشي ډول ماتېږي، چې د خرخشي حرکاتو له امله رامنځته کېږي.

د کسرونو د لومړنیو مرستو ګامونه

1. **د ټپي ځای ثابتول (Immobilization):** د کسر ځای حرکت مه ورکوی، ترڅو کسر زیات خراب نه شي. د ثابتولو لپاره لرګی، تختې یا نورې مناسبې وسیلې کاروی.

2. **د درد کمولو لپاره یخ ایښودل:** د پرسوب او درد کمولو لپاره د کسر په ځای باندې یخ کېږدئ. یخ په مستقیم ډول پوستکي باندې مه ایږدئ؛ یو ټوکر یا کڅوړه ورسره وکاروی.

3. د وینې بهیدنې مخنیوی: که کسر پرانیستی وي او وینه بهیري، پاکه ټوټه د ټپي ځای باندې کېږدئ او په نرمۍ سره فشار ورکړئ.

4. د کسر ځای پورته کول: که امکان وي، د ټپي برخه د زړه له سطحې څخه پورته وساتئ ترڅو د وینې بهیدنه او پړسوب راکم شي.

5. د درملو کارونه: که درد ډېر وي او درمل درسره وي، د درد ضد درمل لکه پاراستامول یا ایبوپروفن وکاروئ، خو دا د ډاکټر په لارښود سره وي.

6. د طبي مرستې ترلاسه کول: په بېړنۍ توګه د طبي متخصص یا روغتون سره اړیکه ونیسئ، ترڅو د کسر درملنه وشي او هډوکۍ په سمه توګه بیا جوړ شي.

د کسرونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر

1. د فزیکي فعالیتونو پر وخت پاملرنه: د سپورټونو، ورزشونو، او نورو فعالیتونو پر وخت احتیاط وکړئ او مناسبې جامې او کالي واغوندئ.

2. کافي کلسیم او ویتامین D ترلاسه کول: د هډوکو د ځواکمنتیا لپاره د کلسیم او ویتامین D درلودونکي خواړه وخورئ.

3. د ښو پښو درلودل: په ښه کیفیت بوتان واغوندئ. په ځانګړي ډول د سفر یا سپورت پر مهال، ترڅو د پرانیستو یا خویدلو خطر کم شي.

4. د احتیاطي کڅوړې درلودل: په کور او موټر کې د لومړنیو مرستو کڅوړه ولرئ، چې د ټپ یا کسر په وخت کې چټک عکس العمل وښودل شي.

5. د خونديتوب وسایل کارول: په سفر یا کار کې د خونديتوب پټکۍ (سیت بیلټ) او محافظتي وسایل وکاروئ ترڅو د حادثې په صورت کې د کسرونو خطر کم شي.

په دې ډول احتیاطي تدابیرو او لومړنیو مرستو سره د کسر په صورت کې اغیزمن ګامونه اخیستلای شئ

د کسرونو ډولونه

د کسرونو ډولونه مختلف دي او د ټپ د ځای او د هډوکي د ماتېدلو ډول ته په کتو سره وېشل شوي دي. دلته د کسرونو یو شمېر عام ډولونه دي:

1. بند کسر (Simple or Closed Fracture): په دې ډول کسر کې هډوکۍ مات شوی وي، خو پوستکۍ نه وي سوري شوی. دا ډول کسر د ککړتیا او انفیکشن خطر نه لري.

2. **پړانیستی کسر (Compound or Open Fracture):** په دې حالت کې هډوکی د پوستکي څخه بهر راوتلی وي. د پړانیستي کسر په حالت کې د انفیکشن یا میکروب خطر ډېر وي، ځکه چې زخم له هوا او ککړتیا سره په تماس کې وي.

3. **چورلک شوی کسر (Comminuted Fracture):** په دې حالت کې هډوکی په څو ټوټو مات شوی وي. دا ډول کسر معمولاً د سختو ټپونو یا حادثو په پایله کې رامنځته کېږي.

4. **چپه شوی کسر (Greenstick Fracture):** دا ډول کسر معمولاً په ماشومانو کې رامنځته کېږي، چیرته چې هډوکی جزوي چپه شوی وي، خو په بشپړ ډول مات شوی نه وي. د ماشومانو هډوکی نرم وي او له همدې امله د چپوالي په حالت کې پاتې کېږي.

5. **لور شوی کسر (Spiral Fracture):** په دې حالت کې هډوکی د چرخشي یا پیچلې فشار له امله په سپیرالي ډول مات شوی وي. دا ډول کسر معمولاً د څرخشي حرکاتو په پایله کې، لکه ورزشونو کې، رامنځته کېږي.

6. **انتقالي کسر (Transverse Fracture):** په دې ډول کې هډوکی په افقي یا مستقیم ډول مات شوی وي. د دې ماتېدلو کرښه هډوکی ته په عرض کې وي.

7. **مورال (Oblique Fracture):** دا ډول کسر په هډوکی کې د کږو یا مایل کرښې په بڼه وي. دا معمولاً د خالص یا مایل فشار له امله رامنځته کېږي.

8. **فشار کسر (Compression Fracture):** په دې حالت کې هډوکی د فشار له امله فشارېږي یا ماتېږي. دا ډول کسر عموماً د ملا په مهره کې رامنځته کېږي او په ځانګړي ډول په هغو کسانو کې لیدل کېږي چې هډوکی یې ضعیف شوي وي (لکه د پوځ عمر خلک).

9. **سګمنټل کسر (Segmental Fracture):** په دې ډول کې هډوکی په دوه یا څو جلا برخو کې ماتېږي. دا ډول کسر معمولاً د شدید ټپونو په پایله کې رامنځته کېږي.

10. **ډبر کسر (Avulsion Fracture):** په دې حالت کې د هډوکی یوه کوچنۍ برخه د فشار له امله جلا کېږي. دا کسر اکثر د هغو عضلو یا تاندونو له امله رامنځته کېږي چې په شدت سره پرې فشار راوړي.

11. **مخفی یا غلی کسر (Hairline Fracture):** دا یو کوچنی او باریکه کسر دی، چې هډوکی په یو نری کرښه کې ماتېږي. دا ډول کسر معمولاً د زیاتې ستړیا یا فشار له امله رامنځته کېږي.

12. **د ودې په پلیټونو کې کسر (Growth Plate Fracture):** په ماشومانو کې هغه کسر چې د هډوکو د ودې په ځایونو کې رامنځته کېږي، دا کسر ممکن د هډوکی په ودې منفي اغېز وکړي.

هر ډول کسر ځانګړې درملنې او پاملرنې ته اړتیا لري. ډاکټران د کسر ډول، د هډوکی حالت، او د ټپي کیدو شدت په نظر کې نیسي ترڅو مناسبه درملنه ترسره کړي.

مسمومیت

مسمومیت یا زهری کپدل هغه حالت ته ویل کېږي چې کله یو شخص زهرجن مواد وځوري، تنفس یې کېږي، یا په نورو لارو یې بدن ته ننوځي. مسمومیتونه مختلف ډولونه لري، او هر یو یې په بدن کې ځانګړې اغېزې کوي. دلته به د مسمومیتونو مهمو ډولونو او نښو نښانو په اړه توضیحات وړاندې کړو:

۱. د مسمومیتونو ډولونه

الف) د خوراكي مسمومیت

د خوړو، اوبو یا مایعاتو له لارې مسمومیتونه چې په کې زهرجن خواړه، خراب شوي خواړه، او یا د بکتريا او ویروس له کبله مسمومیتونه شامل دي. د خوراكي مسمومیت عمده نښې کېدای شي د معدې درد، کانګې، اسهال او تبه وي.

ب) د تنفسي مسمومیت

دا ډول مسمومیت د زهرجنو ګازونو یا کیمیاوي موادو د تنفس له لارې منځته راځي، لکه کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، او امونیا ګازونه. نښې یې کېدای شي تنفسي ستونزې، تبه، سر درد، د سینې درد او حتی د بې هوشۍ حالتونه وي.

ج) د درملو او الکولو مسمومیت

د درملو یا الکولو زیات استعمال هم مسمومیت رامنځته کولی شي. ځینې خلک ممکن په ناپوهۍ یا قصداً ډیرې درمل وځوري، یا ناسمې درملنې له کبله مسموم شي. نښې یې د غبرګونې، سر درد، بې هوشۍ، زړه بدوالي او تنفسي ستونزو په ډول ښکاره کېږي.

د) د کیمیاوي موادو مسمومیت

دا ډول مسمومیتونه د کیمیاوي موادو (لکه اسیدونه، کلورین، او د کور صفا کولو موادو) په کارولو کې د احتیاط نه کولو له امله رامنځته کېږي. د نښو په توګه یې د پوستکي زیانمنېدل، سترګو سوځېدل، د خولې او ستوني سوخت، او د معدې دردونه شامل دي.

۲. د مسمومیت نښې نښانې

د مسمومیت نښې او شدت د موادو ډول او د مسموم شوي شخص روغتيايي حالت پورې اړه لري، خو عمومي نښې یې په لاندې ډول دي:

د معدې درد او کانګې

نفس تنګي او توحۍ

سر درد او د مغزو ګډوډي

پوستکي او سترګو سورښت یا سوځښت

بې هوشي يا د زړه ضربان غيرعادي كيدل

تبه ، شونډې او ژبه شينوالی (په شديدو حالتونو كې)

۳. د مسموميتونو لومړنۍ مرستې

الف) د خوراكي مسموميتونو لپاره

مسموم كس ته بايد ډيرې اوبه ورکړل شي.

كه نښې دوام وكړي ، ژر تر ژره بايد روغتون ته يووړل شي.

ب) د تنفسي مسموميت لپاره

مسموم كس بايد پاكي هوا ته يووړل شي.

د اكسيجن ماسك يا تازه هوا ورورسول شي.

ج) د درملو او الكولو مسموميت

كه امكان ولري ، مسموم كس ته د كانگې هڅه وشي (مگريوازې د ډاكټر په لارښود).

روغتون ته يې وړل اړين دي ، ځكه چې درمل يې بايد ژر تر ژره له وجوده لرې شي.

د) د كيمياوي مسموميت لپاره

كه كيمياوي مواد په پوستكي وي ، سمد لاسه يې په زياتې اوبو ومينځئ.

كه سترگو ته ورغلي وي ، سترگې په پاكو اوبو ووينځئ.

۴. د مسموميتونو مخنيوی

د خوړو حفظ الصحة مراعت كړئ ، او خراب خواړه مه خورئ.

د درملو او كيمياوي موادو كارول په احتياط او د لارښوونې مطابق وكړئ.

كور او كاري ځای كې خطرناك مواد له ماشومانو او نورو بې احتياطه كسانو لرې وساتئ.

د مسموميتونو په وخت كې لومړنۍ مرستې او د ژر عكس العمل ښودل خورا مهم دي . كه چيرې د مسموميت شديدې نښې

ووينئ ، بايد ډاكټر يا طبي مرسته وغواړئ.

د مسموميتونو د مخنيوي لپاره لاندې احتياطي تدابير مهم دي:

۱. د خوړو او اوبو پاكوالي

تل پاکې او تازه شوې اوبه وڅښي. د مشکو کو اوبو څخه ډډه وکړئ یا يې وایشوئ. خواړه په پاک ځای کې ذخیره او په مناسب تودوخې کې وساتئ ترڅو خراب نه شي

میوې او سبزیجات د خوړلو مخکې ښه ومینځئ، او زړې او خرابې شوې برخې یې مه خورئ.

۲. د درملو د استعمال احتیاط

درمل یوازې د ډاکټر په مشوره او ټاکل شوې اندازې سره استعمال کړئ.

د درملو بوتلونه د ماشومانو له لاسرسۍ لرې وساتئ.

د درملو تاریخ د پای ته رسیدو نیټه چک کړئ او زړې درمل مه کاروئ.

۳. کیمیاوي موادو ته لاسرسی محدود کړئ

د کور صفا کولو مواد، آفت وژونکي، اسیدونه او نور زهرجن کیمیاوي مواد په ځانګړي او خوندي ځای کې وساتئ.

د کیمیاوي موادو د استعمال پر وخت د دستکشو او ماسک کارول ضروري دي.

د کیمیاوي موادو بوتلونه کلک تړلي او د ماشومانو له لاسرسۍ لرې وساتئ.

۴. د خطرناک ګازونو مخنیوی

په هغه ځایونو کې چې د کاربن مونو اکساید خطر شته، د هوا ته د وتلو مناسب ځای پرېږدئ.

د کور او د کار ځای کې د کاربن مونو اکساید یا نورو ګازونو د کشف کولو لپاره کشفونه نصب کړئ.

د ګازو او اوږد وسایلو ناسم کارول مه کوئ، او دا وسایل تل د مسلکي کسانو له خوا معاینه کړئ.

۵. د زراعتي موادو کارولو احتیاط

د آفت وژونکو، کیمیاوي سرې او نورو زراعتي موادو استعمال په احتیاط سره وکړئ، او لارښوونې ورته ولولئ.

د استعمال پر وخت یې د ماسک او دستکشو څخه کار واخلي، او د څښاک او خوړو ځایونو ته یې مه نږدې کوئ.

۶. د ماشومانو لپاره ځانګړې ساتنه

د کورنۍ ټول زهرجن توکي، درمل، صفا کوونکي، او کیمیاوي مواد د ماشومانو له لاسرسۍ لرې وساتئ.

ماشومان باید د خوړو او درملو څخه د احتیاط په اړه وپوهوئ.

۷. د شخصي نظافت او لاس وینځل

د خوړو مخکې او وروسته لاسونه په صابون ومینځئ، او د شخصي نظافت نور اصول مراعت کړئ.

په ځانګړې توګه د خواړو جوړولو پر وخت د لاس پاکوالی ډېر اړین دی.

۸. عاجله مرستې او معلومات درلودل

د لومړنيو مرستو اړوند معلومات او د اړوند طبي مراکزو شميرې په لاس کې وساتئ.

په کور کې د لومړنيو مرستو سامان او ضروري درمل ذخيره کړئ.

د دې احتياطي تدابيرو په مراعتولو سره، د مسموميت د پېښو خطر ډېر کمېدې شي. د مسموميت په حالت کې، ژر تر ژره لومړنۍ مرستې او طبي مرسته اړينه ده ترڅو وضعيت کنټرول شي او د ناروغ روغتيا خوندي پاتې شي.

د مسموميتونو په وخت کې د لومړنيو مرستو لپاره دقيق او مشخص وسايل دا دي چې بايد په هر کوريا د لومړنيو مرستو بکس کې موجود وي. دا وسايل د مسموميت مختلفو حالتونو لپاره کارول کېږي او د ژردرملنې يا ژغورنې کې مرسته کوي:

۱. د لومړنيو مرستو بکس

د باندازو مختلف سايزونه (Dressing Pads): د زخمونو د بندولو لپاره بايد نرم او غير زهرجن وي.

چسپکي بانداژ (Adhesive Bandages): د کوچنيو زخمونو او بریدونو لپاره.

گاز پټۍ (Sterile Gauze): د زخمونو د پاکولو او خون بندولو لپاره.

د پټۍ ټيپ (Medical Tape): د بانداژ او گاز پټۍ د ځای په ځای کولو لپاره.

د اوبو سره مخلوط کيدونکې پاکوونکې محلول (Saline Solution): د سترگو د پاکولو لپاره.

۲. د سترگو پاکولو مواد

Eye Wash Solution: که د سترگو کې ککړتيا يا کيمياوي مواد ورشي، د سترگو پاکولو لپاره ضروري دي.

د سترگو شيندل (Eye Shield): د سترگو د ساتنې لپاره، خصوصاً که د کيمياوي يا زهرجن موادو سره اړيکه پيدا شي.

۳. د تنفس ماسک

N95 ماسک يا د تنفسي گازونو ماسک: د زهرجن گازونو، لکه کاربن مونواکسايډ يا نورو کيمياوي گازونو سره د تماس پر مهال بايد ماسک وکارول شي.

د روغتيايي اورژانس ماسک: د مسموم کس سره د تماس پر مهال د جرايمو او ويروسونو د خپریدو څخه د خوندي کولو لپاره.

۴. فعال چارکول (Activated Charcoal)

د ځينو کيمياوي او د خوراکي مسموميتونو په صورت کې کارول کيږي. دا مواد د مسموميت درملنې لپاره د ډاکټر په مشوره او لارښوونه اخيستل کيږي.

لومړۍ طبي مرستې لیکوال: داکټر محمد جيب الرحمان (رحمانی)

۵. د درملو د استعمال لپاره لارښود

د مسمومیت نښو ته د خواب ورکولو لپاره اړینې درملې: مثلاً، د درد کمولو یا د بدن د حالت لپاره ځانګړې درمل پرازیټیک درمل (Antidotes): د ځینو زهرجنو موادو لپاره ځانګړې درملې چې په خپل وخت کې باید ورکړل شي، لکه نالوکسون (Naloxone) چې د هیروئین او نورو اپیوایډ مسمومیت لپاره کارول کېږي.

۶. د حرارت اندازه کولو وسیله

ترمامیټر: د بدن د تودوخې د اندازه کولو لپاره دا د تودوخې زیاتوالی د مسمومیت نښې ښيي.

۷. د فشار اندازه کولو وسیله (Blood Pressure Cuff)

د فشار اندازه کولو وسیله د مسمومیت پر مهال د زړه د فعالیت معلومولو او د فشار د بدلون په اړه دقیقې اندازې ورکوي.

۸. د اوبو ذخیره او د بدن هیدریتولو وسایل

اوبې بوتل یا د اوبو کڅوړه: د مسموم کس لپاره د مناسبې اوبو ورکولو لپاره، ترڅو بدن له ډیهایډریشن څخه بچ شي.
Electrolyte Solutions (ORS): د بدن د مالګې او اوبو توازن د بیا جوړولو لپاره.

۹. د زیانمنو شویو موادو د پاکولو وسایل

د پوستکي پاکولو د موادو (Soap and Water): که کیمیاوي مواد د پوستکي سره تماس ونیسي، باید په فوراً سره پوست پاک شي.

د زهرجن موادو ضد محلول (Antidote Solution): ځینې زهرجن مواد لکه ترياک، د اوبو څخه ګرم ټیپونه باید وکارول شي ترڅو ټیکنیکل حالت سم شي.

۱۰. د بې هوشۍ پر مهال د ژغورنې وسایل

د مصنوعي تنفس وسیله (CPR Mask): که چیرې مسموم کس بې هوشه شي، د مصنوعي تنفس لپاره مهمه وسیله ده.

د زړه د درزولو وسیله (AED - Automated External Defibrillator): که د زړه درزول (Arrhythmia) پېښ شي، د دې وسیلې په مرسته د زړه ضربان بیا راژوندی کول ممکن دی.

۱۱. د نورو مرستو لپاره اړین وسایل

د بیرني روغتیايي اړیکو معلومات: د اړوند روغتون یا اورژانس ټیمونو د اړیکو معلومات.

د مسمومیت کتابچه یا لارښود: د مسمومیت د علاج لپاره لارښود چې په کې د بېلابېلو زهرجنو موادو لپاره معلومات شامل وي.

پایله

لومړۍ طبي مرستې لیکوال: داکټر ————— جیب الرحمان (رحمانی)

د لومړنيو مرستو دقيق وسايل بايد د هر کور يا دفتر د لومړنيو مرستو بکس کې موجود وي، ترڅو په اضطراري حالتونو کې ژر تر ژره د مسموميتونو مخنيوی او درملنه ترسره شي.

د مسموميتونو علاج او درملنه

د مسموميتونو علاج او درملنه د مسموميت ډول، د زهرجنو موادو نوعيت، او د زيانمن شوي کس د وضعيت پراساس توپير لري. درملنه ممکن د فوراً لومړنيو مرستو په توگه پيل شي او بيا په طبي مرکزونو کې دوام وکړي. لاندې د مختلفو مسموميتونو لپاره علاج او درملنه تشرېح شوي:

۱. د زهرجنو موادو څخه د بدن پاکول

د فعال چارکول (Activated Charcoal) استعمال: که مسموميت د ځينو کيمياوي موادو لکه د درملو يا زهرجنو خواړو له کبله وي، فعال چارکول د ځينو موادو جذبولو لپاره کارول کېږي. دا د زهرجنو موادو د بدن څخه د جذبېدو د مخنيوي لپاره مرسته کوي. خو بايد پوه شئ چې فعال چارکول يوازې د ځينو مسموميتونو لپاره گټور دی، او د ډاکټر په مشوره بايد وکارول شي.

۲. د مسموميت د تېکنیکي درملنې پروسې

د معدې غسل (Stomach Pumping): که مسموميت د خوړو يا کيمياوي موادو له لارې شوی وي، د معدې غسل ترسره کېږي ترڅو د زهرجن موادو له بدن څخه پاک شي. دا پروسه يوازې د مسموميت درملنې متخصصين يا ډاکټران کولی شي.

۳. د ځينې زهرجنو موادو لپاره ځانگړي انټيډوټس (Antidotes)

نالوکسون (Naloxone): که مسموميت د هيروئين يا نورو اړيواد دردونو درملو له کبله وي، نالوکسون د زهرجنو موادو د تاثيراتو مخنيوي لپاره کارول کېږي.

آتروپين (Atropine): که مسموميت د کيمياوي موادو لکه په کيمياوي اسحو يا گازونو کې وي، آتروپين د عضلاتو د حرکت د کمولو او د زړه د تنظيم لپاره کارول کېږي.

فوليت يا هيدروکسي کوبالامين (Folate or Hydroxocobalamin): د زهرجن گازونو لکه سيانايډ (Cyanide) مسموميت لپاره.

۴. د سترگو د مسموميت درملنه

د سترگو په فوري ډول پاکول: که د کيمياوي موادو يا زهرجنو مايعاتو سره سترگې متاثر شي، د سترگو د پاکولو محلول سره د سترگو مينځل اړين دي. د پاکولو لپاره بايد سترگې په اوبو يا ځانگړي محلول سره پاکې شي.

۵. د پوستکي مسموميت درملنه

د پوستکي د پاکولو لپاره شاور اخیستل: که د کیمیاوي موادو سره د پوستکي تماس ونیول شي، باید پوستکي په سره اوبه ښه وښخول شي.

د پوستکي د سوځیدنې درملنې لپاره د سوځیدلو کریم یا انټي سپټیک درمل: که سوځیدل پېښ شي، د انټي سپټیک کریم یا جیلونه د پوستکي د درملنې لپاره کارول کېږي.

۶. د تنفسي مسمومیت درملنه

د تنفسي لار د هوا ته خلاصول: د تنفسي مسمومیتونو لکه د کاربن مونو اکساید (CO) څخه د بچ کېدو لپاره باید د مسموم کس ته پاکه هوا ورکړل شي.

د تنفسي ماسک یا اکسیجن سره مرسته: که د کاربن مونو اکساید یا نورو تنفسي زهرجنو موادو سره تماس نیول شوی وي، د اکسیجن ماسک یا تهویه (Ventilation) مرسته کول.

۷. د جسماني وضعیت سمولو لپاره درملنه

د بدن د تودوخې تنظیم: د مسمومیت پر مهال که د بدن تودوخه زیاته شي یا ټیټه شي، باید د تودوخې تنظیم کولو لپاره درمل وکارول شي.

د فشار او ضربان تنظیمول: که فشار یا ضربان گډوډ وي، اړین درمل او مراقبت باید وشي.

۸. د اوبو توازن او هایدريټولو درملنه

د اوبو او مالګې توازن سمول: که مسمومیت د ډیهایدريشن (Hydration) یا د اوبو د فقدان له کبله وي، باید د اوبو او مالګې محلول (ORS) وکارول شي.

۹. د اوږدمهاله درملنې او مرستې اړتیا

د مسموم کس دوامداره څارنه: وروسته له دې چې لومړنۍ مرستې او درملنه ترسره شي، مسموم کس باید په روغتون کې د مسلکي ډاکټرانو تر څارنې لاندې وي.

د رواني او جسماني بیا رغونې ته اړتیا: ځینې مسمومیتونه ممکن د اوږدې مودې لپاره د رواني او جسماني ستونزو لامل شي، لکه د حافظې له منځه تلل یا د عضلاتو او اعصابو زیان.

د مسمومیت درملنه باید ژر تر ژره پیل شي او د ډاکټر یا روغتيايي متخصصینو لخوا ترسره شي. لومړنۍ مرستې، لکه د معدې شستلو، فعال چارکول، او د انټیډوټس کارول، د مسمومیت د شدت کمولو او د ژوند ژغورلو کې مرسته کولی شي. مهمه ده چې د مسمومیت د ډول او شدت پراساس سم درملنه او د اورژانس خدماتو ته لاسرسی ولری.

فهرست

شماره	موضوع	صفحه
1	د لومړۍ طبي مرستې تعريف	۱
2	په لومړنيو طبي مرستو کې لاندې مهمې کړنې شاملې دي	۱
3	د لومړنۍ طبي مرستې هدفونه په لاندې ډول دي:	۱
4	لومړۍ طبي مرستې بايد څوک وړاندې کړي	۲
5	د مرستې کوونکي شخص لپاره ځينې ځانگړنې	۳
6	کله چې له يو پيښې سره مخ شو بايد څه وکړو؟	۴
7	"په نوم يادېږي ABC په لومړنيو مرستو کې، لومړی بايد لاندې درې مهم ټکي وڅېړو، چې په انگليسي کې د "	۵
8	په امبولانس کې، ناروغ ته د مرستې رسولو لپاره لاندې گامونه پورته کول اړين دي:	۵
9	د ناروغ د ژوند تهديد کوونکي فکتورونه	۶
10	علايم حياتي	۷
11	علايم حياتي درته په دقيق ډول تشرېح کول چې لاندې دی	۹
12	د وينې فشار (Blood Pressure)	۹
13	د تنفس (Breathing)	۱۱
14	نبض (Pulse)	۱۲
15	د حرارت درجه (Body Temperature)	۱۴
16	اکسين (Oxygen)	۱۷
17	زخم Wound	۱۹
18	زخمونه په دوه عمومي ډولونو وېشل کېږي:	۱۹
19	د مرمۍ په زخم	۲۰
20	د سر په زخم کې مرستې کول	۲۱
21	د زخمونو لومړنۍ درملنه	۲۴
22	د زخمو لپاره لـــــــس احتياطي تدابيـــــــر (داکتر مجيب الرحمن) ويديوبي	۲۵
23	پانسمان يا پټۍ (Dressing) او ډولونه يې	۲۶
24	د پانسمان د کارولو مهم ټکي او ضروري وسايل	۲۶
25	۲. زخم پاکوونکي مواد سره له ټول تشرېح	۲۷
26	هـــــــغه انتي سپټيک چې د زخمونو په پاکولو کې کارول کيږي	۲۸
27	سوځيدنه (burn)	۲۹
28	۱. د سوځيدنې ډوله درجې: د سوځيدنې لومړنۍ مرستې	۳۰

۳۱	د سوځيدنې په وخت کې له ناروغ سره مرسته کول	29
۳۳	د سوي ناروغ ته لارښوونې او هدايات ورکول	30
۳۵	د سوځيدنې پانسمان (Bandaging)	31
۳۶	د سوځيدلي ناروغ لپاره مناسب درمل او مايعات ورکول	32
۳۸	د سوي ناروغ ته پرهيز او استراحت	33
۴۰	په موټر ټکر کې د لومړنيو طبي مرستو (فرسټ ايډ) وړاندې کول	34
۴۱	د لومړنيو طبي مرستو لپاره لاندې ضروري وسايل درلودل اړين دي	35
۴۲	کسر د هډوکي ماتېدل	36
۴۲	د کسرونو ډولونه	37
۴۲	د کسرونو د لومړنيو مرستو ګامونه	38
۴۴	د کسرونو د مخنيوي لپاره احتياطي تدابير	39
۴۴	د کسرونو ډولونه	40
۴۵	مسموميت	41
۴۵	. د مسموميتونو ډولونه	42
۴۶	. د مسموميت نښې نښانې	43
۴۷	د مسموميتونو د مخنيوي لپاره لاندې احتياطي تدابير مهم دي:	44

ډالۍ زما ګران او محترم پلار جان حاجی عبدالرحمن رحمانی اوزما ګرانی مور جانی ته

همدارنگه د طبابت د ډګر ټول کارمندانو ته

مننه ستاسی ورور ډاکټر مجیب الرحمن رحمانی

په اجتماعی شبکو کی زموږ ادرس

فیسبوک: روغتیا د ژوند شتمنی ده

واتساپ چینل: طبی معلومات



۰۷۷۱۲۴۴۸۶۱

يادونه: په دوهم ټوک باندې هم کار روان دی چی په لنډ وخت کی به نشر شی

Thank you for reading

Find more e-books and articles on Ketabton - your multilingual digital library.

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English