



ٽوکسیکولوژی

Ketabton.com

ژباړن:

عبدالکریم توتاخیل

۱۳۹۴ لمریز کال

ٲوكسيكولوژي

اثر:

Hans Marquardt

Siegfried G. Schafer

Roger O. McClellan

Frank Welsch

ژباړن:

عبدالکريم توناخېل

۱۳۹۴ ل کال



د کتاب پېژندنه:

د کتاب نوم: ټوکسیکولوژي

ژباړن: عبدالکریم توتاخېل

خپړوندى: د افغانستان ملي تحریک، فرهنگي څانګه

وېبپاڼه: www.melitahrik.com

ډیزاینګر: ضیاء ساپی

پښتۍ ډیزاین: فیاض حمید

چاپشمېر: ۱۰۰۰ ټوکه

چاپکال: ۱۳۹۴ ل کال / ۲۰۱۵ م

د تحریک د خپرونو لړ: (۶۱)

یادونه: د چاپ حقوق له ملي تحریک سره خوندي دي او د کتاب د محتوا مسوولیت لیکوال پورې اړه لري.

فهرست

عنوان	مخ
مخکنۍ خبرې.....	الف
د ژباړن سريزه.....	ب
لمړۍ فصل (کيمياوي او بيولوژيکي عاملين).....	۱
کيمياوي عاملين.....	۱
بيولوژيکي عاملين.....	۲۲
دويم فصل (طبعي مرکبات).....	۸۵
پېژندنه.....	۸۵
د حيواناتو زهر (وينوم) او وينوم.....	۸۲
د پروتوزوا او الجيانو توکسينونه.....	۱۲۷
مايکو توکسينونه.....	۱۳۳
نباتي توکسينونه.....	۱۶۳
دريم فصل.....	۲۲۵
پېژندنه.....	۲۲۵
هغه سموم چې د ميکروبونو په واسطه جوړېږي.....	۲۲۵

- د سمي خوړو جوړوونکي مرکبات..... ۲۲۹
- غذايي اډيټيوونه..... ۲۳۲
- د خوړو ککړونکي..... ۲۳۶
- د خوړو سره تماس لرونکي مواد..... ۲۴۱
- د خوړو سره چلند او د تيارولو طرز العمل..... ۲۴۴
- د سمي موادو سره د خوړو غلطول او تقلب..... ۲۴۸
- په خوړو کې سرطان توليدوونکي مواد..... ۲۵۰
- د اصطلاحاتو توضيخنامه..... ۲۵۲

د تحريك يادښت

د افغانستان ملي تحريك د (۱۳۹۳ ل) كال په پيل كې له خپلو گرانو هېوادوالو سره ژمنه كړې وه چې د دې كال په بهير كې به (شل عنوانونه) بېلا بېل ديني، علمي، ادبي او ټولنيز اثار خپلې ټولنې ته وړاندې كوي. ملي تحريك دا ژمنه د ياد كابل د كب پر (۲۸) مه نېټه پوره او د يوې پرتمينې غونډې په ترڅ كې يې شل عنوانونه علمي اثار هېوادوالو ته وړاندې كړل. ملي تحريك په ياده غونډه كې ژمنه وكړه چې د (۱۳۹۴ ل) كال په بهير كې به انشاء الله د خداى (ج) په نصرت ټول ټال سل (۱۰۰) عنوانه بېلابېل علمي اثار ټولنې ته وړاندې كوي. طبيعي خبره ده چې دا اسانه كار نه دى، ډېر زيات زيار او زحمت ته اړتيا لري، خو ملي تحريك ټينگ هوډ كړى چې خپله دا ژمنه به هم د تېرې ژمنې په څېر عملى كوي. دا اثر چې ستاسو په لاس كې دى د همدې (سل عنوانونو) ژمنه كړو اثارو له جملې څخه دى، چې د چاپ جامه اغوندي. ملي تحريك هيله لري چې له دې اثر څخه به زموږ هېوادوال په زړه پورې گټه پورته كړي. ملي تحريك له ټولو هغو ليكوالو، ژباړونكو، سمونچارو، مالي او معنوي مرستندويانو او چاپ چارو څخه چې ددې اثارو د چاپ په دې ټول بهير كې يې يو بل سره مرسته او ملگرتيا كړې او دا فرهنگي بهير يې بريالى كړى، د زړه له كومې مننه كوي او كور وداني ورته وايي.

د هېواد د فرهنگ د ښېرازۍ په هيله

د افغانستان ملي تحريك فرهنگي خانگه

مخکینى خبرې

د توکسیکولوژۍ د مضمون څخه ګټه اخیستل او اړتیا په ځانګړې ډول د فارمسي په برخه کې په پوره ډول روښانه ده. په اوسني مهال کې انسانان د صنعت، کرنې، روغتیا، چاپیریال او نورو برخو کې له ګڼ شمېر زهرناکو موادو سره مخامخ دي. په نړۍ کې د صنعت د پراختیا، د روغتیا او درملنې د سیستم د لاس ته کېدو او د کرهڼیزو محصولاتو د کچې د لوړتیا په موخه هره ورځ نوي کیمیاوي موادو لاسته راوړلو ته اړتیا ده، او له دې څخه انکار نه شي کېدای چې نوموړي مواد پر انسان او چاپیریال بدې اغېزې ولري. په ځینو حالاتو کې په ډله ایز ډول سمیت مینځ ته راځي، خواړه او اوبه ککړېږي نو په همدې موخه د توکسیکولوژي مضمون باید د طب، فارمسي، زراعت او ویترنري په برخه کې په هراړخیز ډول ولوستل شي. هغه ناوړه اعراض چې مینځ ته راځي، درملنه یې وشي او له راتلونکو پېښو څخه یې مخه ونیول شي.

د توکسیکولوژي کتاب چې د Roger ، Siegfried G. Schafer ، Marquardt ، O. McClellan او Frank Welsch اثر دی او په ۱۹۹۹ کې لیکل شوی دی، د توکسیکولوژي یو معتبر او له هراړخه یو کامل کتاب دی او د سمو مو په هکله د نوو پرمختګونو څخه په هراړخیز ډول بحث کوي. له دې نه مخکې داسې یو با ارزښته اثر کوم چې په ملي ژبه ژباړل شوی وي، زموږ په لاس رسي کې نه وو، نو ځکه د پیاوړتیا لپاره د ټولنیزو ټولنو د توکسیکولوژي د څانګې د اړتیا پر بنسټ د دې کتاب ۳۵ فصل (Chemical and biological agents)، ۴۰ فصل (Natural compound) او ۴۷ فصل (Food: Compound related aspects) وژباړم. په دې اثر کې تر وروستۍ کچې دا زیار ایستل شوی دی، ترڅو ژباړه د اصل سره مطابقت ولري او وتوانېږي ترڅو د مسلک د خاوندانو لپاره ګټور ثابت شي. په پای کې دلارښود استاد محترم الحاج پوهاند دوکتور رمضان پاینده، د توکسیکولوژي د څانګې او د فارمسي پوهنځي د ټولو استادانو له ارزښتناکو لارښوونو څخه یوه نړۍ مننه کوم، چې د دې اثر په ژباړلو او تنظیمولو کې یې له ماسره نه ستړې کیدونکې مرستې کړيدي.

د ژباړونکي سریزه

توکسیکولوژي داسې یوه موضوع ده چې په ژوندانه باندې د هراړخیزه مخامخ کیدونکو کیمیاوي او بیولوژیکي ګواښونو اغېزې مطالعه او څېړنې، نوله همدې کبله رازراز برخې لري او مختلفې موضوع ګانې تر پوښښ لاندې نیسي. دهغه موادو توکسیکولوژي چې له پخوا د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په څېر کارول کېدل (اوس یی کارونه منع کړل شوې ده)، دهغه طبعي زهرجنو موادو توکسیکولوژي چې په نباتاتو او حیواناتو کې پیدا کیږي او د غذایی موادو اړونده توکسیکولوژي داسې موضوعات دي، چې د صحي لحاظه ډېر د اهمیت وړ ګڼل کیږي. انسان هره ورځ خوړو ته اړتیا لري، او زیات خواړه تیار نه موندل کیږي. د خوړو د تیارولو، ساتلو، وړلو او نورو مراحلو په ترڅ کې کیدای شي تغیر را مینځ ته شي. له دې هم انکار نه شي کېدلای چې ځینی کیمیاوي او بیولوژیکي موادو ګواښ اوس هم په نړۍ کې شتون لري. په لمړۍ او دویمه نړیواله جګړه کې او همدارنګه په عراق کې مختلفې کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې کارول شوې دي.

انسان دطبعي موادو له ګواښ لکه په مځیو، کبانو او غلوندو کې د ځینی خطرناکو مواد دشتون سره مخامخ دی. په دې هکله د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې ځانته قوانین شتون لري چې باید هر څوک یی په ځان پلي کړي.

نو د پاسنیو دریو موضوع ګانو د اهمیت له کبله، خوښ یم چې د توکسیکولوژي د څانګې د غړي په توګه د فارمکولوژي-توکسیکولوژي ډیپارټمنټ او د پوهنځي د علمي شورا د فیصلې پر بنسټ د توکسیکولوژي له یوه معتبر کتاب څخه چې د Hans Marquardt، Roger O. McClellan، Siegfried G. Schafer او Frank Welsch اثر دی او په ۱۹۹۹ کې لیکل شوی دی، د درسي پروګرام مطابق دی، وژباړم او د محصلینو او دمسلك د خاوندانو په چوپړ کې یی وړاندې کړم.

د نوموړي کتاب موضوع ګانې د فارمسي پوهنځي د توکسیکولوژي د څانګې د درسي مفرداتو سره په زاته اندازه سمون لري.

موضوع ګانې یې د سمو مو د فزیکوشیمیک خواصو، منابعو، واقعاتو، کارونې، جذب، توزیع، استقلال او اطراح، دتسمم میکانیزم، دتسمم اعراضو او درملنې څخه عبارت دي.

لمړۍ فصل

کیمیاوي اوبیولوژیکي عاملین

کیمیاوي عاملین

پېژندنه:

د کیمیاوي سمې جنګي وسلو او د هغو د بندولو کوښښونه له پخوانیو وختونو سره اړه لري. د Hague کنوانسیون (۱۸۹۹-۱۹۰۷) او د جنیوا پروتوکول (۱۹۲۵) د شتون سره سره کیمیاوي وسلې په لمړۍ نړیواله جګړه، دوهمه نړیواله جګړه او نورو جنګي پېښو کې وکاریدې، او د خلیج د لمړۍ جګړې (د عراق او ایران ترمنځ ۱۹۸۰-۱۹۸۸) او دوهمې جګړې (د اعتلافي ځواکونو او عراق ترمنځ ۱۹۹۱) پورې عسکرو او ملکي خلکو ته د یو پام وړ ګواښ په بڼه پاته شو.

د موجوده پروتوکول (پاریس ۱۹۹۳) پر بنسټ چې ۱۲۰ هیوادونو لاسلیک او ۲۵ لاسلیک کوونکو هیوادونو تصویب کړي دي (هنګري، نومبر ۱۹۹۲)، د کیمیاوي وسلو کنوانسیون (CWC) د ۱۹۹۷ میلادي کال د اپریل په ۲۹ نافذ کړل شو.

د کیمیاوي وسلو پر تولید بندیز، ذخیره کولو، کارونه او خپرول به پر کیمیاوي وسلو د بندیز د تنظیم لخوا چې د هالنډ په هاګ کې موقیعت لري، کنټرولېږي. سره له دې هم ځینې هیوادونو نوموړی تړون ندی لاسلیک کړی او په ذخیره کولو کې د شته موادو له مینځه وړل به څه وخت ونسي.

په هغو یرغلونو کې چې په جاپان کې د کیمیاوي وسلو لکه Sarine (۱۹۹۴) ماتسوماتو او Sarin+Cyanide (ټوکیو ۱۹۹۵) پواسطه سرته ورسیدل، په

گوته کوي چي ترهگري ډلې شايد ډېر زهرجن مواد په لويه پيمانه توليد او په لوړه کچه د وگړو د مسمومولو لامل وگرځي.

The state-of-the-art، د کيمياوي عاملينو څخه د خطر زده کړه، د دوي په مقابل کې وقايع اود مسموميت درملنه نه يواځې د نظامي پلوه بلکه د ترهگريزو حملو په مقابل کي د ساتنې او د اغيزناکې بې وسلې کولو او کنترول لپاره ډېر مهم دي.

تاريخچه: په سمې موادو باندې د خوړو او د اوسيدو د ځاي ککړېدل پرځمکه د ژوند د تکامل پورې اړه لري. د انسانانو پواسطه د سمې موادو بڼه او بده کارونه د تاريخ څخه پخوانيو وختونو ته ورگرځي. د پخواني يونان او روم په تاريخ کي داسي نسخې شته چې په جگړو کې د سمې موادو پرکارونه دلالت کوي. په ۱۹ او ۲۰ پيړۍ کې د کيميا د علم او ټکنالوژي خپانده پرمختگ (او همدارنگه د يو لړ ويرجنو پيښو له کبله) د نويو ډېرو کيمياوي سمې موادو او په لوړه کچه د دوي د توليد پوهه مينځته راوړله. د لمړۍ نړيوالې جگړې په درشل کې د ۱۹۱۵ د اپريل په ۲۲، د جرمني د ځواکونو لخوا په فلنډرز کې د کلورين ګاز د کارونې ورځ د عصري کيمياوي وسلو د زيږون ورځ ګڼل کيږي، که څه هم ځينې ترکيبي سمې مواد (مخرش مواد) له دې پخوا هم کارول شوي وو. Sulfur Mustard په لمړۍ نړيوالې جگړه کې وکاريدل. د G لړۍ کيمياوي عصبي عاملين (جدول ۱) د ۱۹۳۷-۱۹۴۳ تر مېنځ اود ۷ عاملين په ۱۹۵۰ کال کشف شول.

جدول ۱: د بدن پر غړيو داغيزې پر بنسټ د کيمياوي عاملينو تصنيف			
گروپ	کيمياوي نوم	عمومي نوم	سمبول
۱	Ethyl-N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate	Tuban	GA

GB	Sarin	Isiropyl methyl phosonoflouridate	
GF	Cyclosarin	Cyclohexyl methyl phosphanoflouridate	
GD	Soman	Pinacolyl methyl phosphanoflouridate	
VX	--	O-Ethyl-S-(۲-diisopropylamino- methyl phosphonothiolate	
H,HD	Sulful Mustard Yperite ,S-Lost	Bis(۲-chloroethyl)Sulfide	تھا کہ تولید ورنکی عاملین
HN-۳	Nitrogen Mustard	Tris(۲-chloroethyl)amine	
L	Lewisite	۲-Chlorovinyl dichloroarsine	
AC	-	Hydrogen Cyanide	
CK	-	Cyanogen chloride	
SA	-	Arsine	
CG	Phosgen	Carbonyl Chloride	سری خراب ورنکی
DP	Diphosgen	Trichloromethyl Chloroformate	
BZ	-	۳-Quinuclidinyl benxilate	درمانی مواد شنید ورنکی کیمیای
CN	-	۲-Chloroacetophenone	اوبنکی بهر ورنکی
CS	-	۲-Chlorobenzalmalononitrile	

DA	Clark I	Diphenylchloroarsine	کیمیای جنگی جنگی مواد
DC	Clark II	Diphenylcyanoarsine	
DM	Adamsite	۱-۱-Chloro-۵,۱-dihydrophenarsazine	
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت سمبولونه (a)			

د دویمې نړیوالې جګړې په درشل کې په اروپا کې کیمیاوي وسلې ونه کاریدلې لیکن صرف پر Third Reich کمپ باندې د زهرجنو کیمیاوي موادو له کارونې څخه باید یادونه وشي. د خلیج په لمړۍ جګړه کې او همدارنګه د عراقي رژیم لخوا د کردانو پر ضد د کیمیاوي وسلو کارونه (۱۹۸۸) تر ټولو تازه هغې یې دي. د خلیج دویمه جګړه یې وروستی مثال دی چې په لوړه کچه د کیمیاوي وسلو ګواښ ورسره مل وو نو د همدې لپاره اعتلافي ځواکونو پراخ محافظوي تدابیر ونيول او خپل عسکري مخکې له مخکې د Pyridostigmine پواسطه تداوي کړل د جګړې په پای کې د ملګرو ملتونو د پلټونکو لخوا په لوړه کچه Sarine ، Cyclosarine (د Sarine دویم مشتق) او Sulfur Mustard د عراق په ګودامونو کې وموندل.

ترمینولوژي:

کیمیاوي عاملین عبارت له کیمیاوي ترکیبي موادو څخه دي چې په جګړه کې کارول کېږي. نوموړي مواد په تیار ډول په جنګي مهماتو، بمونو، راکټونو او نورو وړونکو سیستمونو کې کارول کېږي. د طبي توکسیکولوژي له نقطه نظره د کیمیاوي وسلو تصنیف د اغیزمنو غړو پر بنسټ صورت نیسي (جدول ۱). د

نوموړي تصنيف د ناچوړي د بيلگي په توگه سيانيد وړاندي کولاي شو ځکه چې نوموړي عامل د وينې د عامل په ډله کي راځي که څه هم په وينه او د وينې په اجزاؤ ځانگړې اغيزه نلري.

ځينې هېوادونه د دوي خپل سمبولونه او ځينې غربي هېوادونه د امريکا د متحده ايالاتو د دفاع د وزارت سمبول کاروي. کوم چې په جدول کي ښودل شوی دی. په لمړۍ نړيواله جگړه کې جرمني پرکيمياوي جنگي مهماتو رنگه سمبول لکه د بيلگي په توگه سپين رنگ د سترگو د تخريش کوونکو لپاره، آسماني رنگ د تنفسي او هضمي لارو د تخريش کوونکو لپاره، شين رنگ د ساه بندوونکو لپاره او ژيړ رنگ د سوزوونکو يا د تياکه توليدوونکو لپاره کاراوه.

د پيشقدمه موادو کارونه کوم چې د جگړي په مهال په خپل مينځ کې گډيږي او اصلي ماده توليدوي د انتقال کوونکو لپاره ډېره محفوظه لاره ده ځکه چې نوموړي مواد خطرناک ندي. مثلاً دوه گوني د انتقال سيستم د عصبي عاملينو لکه SARINE او VX لپاره وضع کيږي. د پيشقدمه موادو کارونه که له يوخوا د ډېرو غيرثابتو کيمياوي عاملينو کارونه اسانوي خو له بلې خوا پر کيمياوي بې وسله کولو، کنترول پيچلی کوي.

هغه کيمياوي عاملين چې دلته يادونه ځينې کيږي د نظامي گواښونو، د غيرنظامي کولو او بې وسلي کولو، د زړو عاملينو چې په ناوړه توگه ساتل کيدل له منځه وړل او د هغو خطراتو چې په امنيتي شرايطو کي د ځان د دفاع او د اله گولو د کنترول لپاره د مخرشه موادو د کاروني څخه مينځته راځي، په نظر کې نيولو سره ټاکل شويدي.

د امريکا د متحده ايالاتو د کيمياوي بې وسله کولو د پروگرام د ترسره کولو پرمهال ډېرې هڅې وشوې ترڅو د نوموړي موادو په هکله خپل توکسيکولوژيک

معلومات زیات او په پایله کې داسي معیارونه را منځته کړي چي نوموړي مواد په خوندي ډول له مینځه یوسي. (جدول ۲)

جدول ۲: د کیمیاوي عاملینو لپاره د کنټرول حد (mg/m ³)			
عامل	عمومي نفوس	کارکوونکي	لوړمجاز غلظت
GA, GB	۰,۰۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۱	۰,۰۰۰۳
VX	۰,۰۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	۰,۰۰۰۳
H, HD, HT	۰,۰۰۰۱	۰,۰۰۰۳	۰,۰۰۳
L	۰,۰۰۰۳	۰,۰۰۰۳	۰,۰۰۳
اوسط وخت	۷۲ ساعته	۸ ساعته	---

سیانایډونه په پراخه کچه کاریدونکي صنعتي کیمیاوي مواد دي د دوي چټک عمل او ډېر لنډ شتون، ساتونکي وسایل غیر ضروري ثابتوي چي همدا ځانگړتیاوې د حمله کوونکي لپاره په زړه پورې دي. د سیانایډو نوڅخه د مخنیوي لپاره Aerosol-carcoal فلترونه اغیزناک ندي نوڅکه یو ځانگړی اهتمام ضروري دی. په هر حال د سیانایډونو سمیت د عصبي عاملینو د انشافي سمیت په پرتله ډېر ټیټ دی نوڅکه سیانایډونه له کم جنگي اهمیت څخه برخمن دي. د سیانایډونو توکسیکولوژي، میکانیزم، درملنه او وقایه د گازونو په برخه کي په مفصل ډول وجود لري. نسبت د سیانایډونو چټک عمل ته باید د جنگ په میدان کي وقایوي او چټک معالجوي تدابیر شتون ولري. وقایوي تدابیري د هغه انتي دوت پر بنسټ چې په هغه کې د ملاریا ضد مت هیموگلوبین جوړوونکي مواد کارول کیږي د پلټنې لاندې دي خوتر اوسه لاس رسي کي ندي. همدارنگه داسي انتي دوت چې پر ځان او یا نورو تطبیق شي هم شتون نلري.

فوسجن او نور انالوگونه يې د لمړۍ نړيوالې جگړې په ترڅ کې ، ۸۰٪ د کيمياوي وسلو له کبله د مرگ مسؤل گڼل کيږي. فوسجن او اړوند انالوگونه يې مصنوعي کيمياوي مواد دي لکه د نورو تنفسي مخرش کوونکو په څېر د سږو د کڅوړو په له مينځه وړلو سره د سږو اذيما رامینځته کوي. مشابه اغېز لرونکي عاملين ځکه ډېر څيرل کيږي چې د کار کول د فلټرونو څخه په اسانۍ تيريري خصوصا کله چې Poly fluorinated Hydrocarbon لکه Penflouroisobutene او انالوگونه يې سوزول کيږي.

په ۱۹۹۲ کال کې د رواني عاملينو له کارونې څخه په بوسنيا کې راپور ورکړل شو. او اړونده اغيزې يې د مرکزي عصبي سيستم ناتواني چې په پايله کې د حافظې، د تمرکز د وړتيا او د کار د ترسره کولو د گټو ډيو سبب کيږي. د دي عاملينو ډېر مهم نماينده گان عبارت له مرکزي انتهي کولينرجيک - ۳ quinulidinybenzilate(BZ)، سمپاتوممټيک Agonist، ۵-HT_۲ او Lysergic acid diethylamide(LSD) څخه دي.

نور کيمياوي مواد چې په جگړو کې کارول کيدل عبارت له هرزه وژونکو (Herbicides) څخه دي. مرکبات لکه ۲،۴-dichlorophenoxyacetic acid (۲،۴-D)، ۲،۴،۵-trichlorophenoxyacetic acid (۲،۴،۵-T)، Picloran او cacodylic acid هغه هرزه وژونکي دي چې په عام ډول په پراخه کچه او په غيرنظامي ډول کارول کيږي. يو ځانگړی توکسيکولوژيک مشکل چې په ويتنام کې رامینځته شو علت يې د توليد په مهال پر ډايوکسين باندې د فنوکسي استيک اسيد ککړتوب وو.

فزيكوشيميك خواص:

اکثر ۱ مهم کيمياوي عاملين په مايع ډول شتون لري. تر ټولو لوړ سميت يې د بخاراتو او ايروزول د انشاق پواسطه را مينځته کيږي ليکن په شحمو کې د انحلال پربنسټ کيمياوي مواد په اسانۍ سره له پوستکي تيريږي چيري چې ميتابوليزم، عبورمتاثرکوي.

تر موخې لاندي غړو کې د کيمياوي عاملينو شتون د دوي په فزيکوشيميك خواصو او د سيمي په اقليم او محيطي شرايطو پورې اړه لري چې له ساعتونو څخه تر ورځو پوري وخت نيسي (جدول ۳). ککړ ژوندي يامره مواد کيداي شي د ثانوي ککړيدو سرچينه وگرځي. اساسي پارامتر چې په هدف لاندي غړو کې د کيمياوي عاملينو شتون اغيزمن کوي عبارت له تبخير او هيدرولايزس څخه دي.

په ځمکه کې خنس شوي او اوبو کې ډوب شوي کيمياوي عاملين، د هايډرولاييزس او تبخير لپاره ډېر کم مساعد دي نوځکه کيداي شي د لسيزو لپاره فعاله پاته شي. مثلاً د پوستکي تخریب په هغو کب نيونوکو کې راپور وکړل شوي ده کومو چې د بالتيک د سمندريه ممنوعه سيمو کې کبان نيول او دوي په خپلو جالونو کې د دويمې نړيوالې جگړې څخه پاتې وراسته د سلفر خردل مواد رانېول.

د ځان ساتني اصول:

د تماس څخه ډډه کول، د ککړو شيانو زړ پاکول، طبي وقايوي محاسبه او پر وخت دا نتي دوت کارونې سره سره د حياتي علايمو اساسي او پرمختللي شکل سره د دوي حمايه، د ساتني او درملنې اساسي ټکي گڼل کيږي.

فزيکي ساتنه:

ساتندويه ماسک چې د مناسب فلټر لرونکي وي، غير قابل نفوذ رېر، پلاستيک، يا نيمه قابل نفوذ کارکول لرونکي جامې چې غير قابل نفوذ پوښاک اولاس ماغوان ولري د ټاکلي وخت لپاره انسان له تماس څخه ساتي ولي د ډېرو وخت د ساتنې لپاره د فلټر شوې هوا توليد کوونکي ته اړتيا ليدل کيږي.

د ککړتيا له مينځه وړل:

د پوستکي د ټاکلي ساحې د تماس کوونکو د مخنيوي لپاره وچ پاکوونکي جاذب موادو (fuller's earth) په شمول د هيوکلورايټ، Dutch پوډر چې مگنيزيم اکسايډ او کلسيم هيوکلورايټ لري ډېر گټور دي. همدارنگه د کورنيو اوږو تطبيق چې وروسته د مرطوب کاغذ پواسطه پاک کړل شي ښه د پاکولو خاصيت لري.

جدول ۳: د کيمياوي موادو دوام			
محيطي شرايط			
عامل لمریز، روښانه		باد او باران 10°C کرار،	
واوړه په ميدان - 10°C		باد لرونکی 15°C	
HD	۲-۷ ورځې	۵-۲ ورځې	۲-۸ ورځې
GA	۱-۴ ورځې	۵-۲ ساعته	۱-۱۴ ورځې
GB	۲۵-۴ ساعته	۲۵-۱۰ ساعته	۱-۲ ورځې
GD	۵-۲، ۵ ورځې	۳-۳۲ ورځې	۱-۲ اونۍ
VX	۳-۲۱ ورځې	۱-۱۲ ساعته	۱-۱۲ هفته

جاذب مواد باید پرمخاطي غشا (سترگووغيره) او ټپونو کينښودل شي ځکه چې کوم شي جذبولاي هم نه شي او د گرانولوما لامل گرځي. غليظ هيپوکلورايټ ډېر څارښتي خاصيت لري نو ځکه د سترگو او مخاطي غشا د تخريب سبب کيږي. ککړ کالي باید له مسموم څخه وباسل شي. د سترگو د پاکولو لپاره د عادي اوبو او د ضعيغه القلي د محلول (NaHCO_3 ۵-۲٪) څخه کار اخيستل کيږي.

ټپونه او مخاط باید د کلسيم هيپوکلورايټ د ضعيغه محلول (۱-۲٪) پواسطه ومينځل شي. نوموړی محلول باید په بطني، صدري او د کوپړۍ په تشو کي ونه کارول شي او د ډي په عوض د خوړو د مالگې ايزوتونیک ۰.۹٪ محلول په ډي ځاي کي ډېر مناسب گڼل کيږي.

ارگانوفاسفورس مرکبونه

د عضوي کولين استراز فاسفورس عمومي فورمول په لمرې ځل لپاره په ۱۹۵۲ کال د G.Schrader لخوا ورکړل شو (شکل ۱). Soman, Cyclosarin, Sarin, Tuban او VX هغه ځانگړي عاملين دي چې له نظامي پلوه ډېر په زړه پورې دي (جدول ۱، شکل ۳-۲).

له هغه ځايه چې مصنوعي توليدات ممکن يو ضعيف او څرگند بوي ولري نو ځکه د دوي اهميت په لوړ خالصيت کي کموي. نوموړي عاملين مایع او ډبريدونکي سريښناک (لزجي) خاصيت لري لکه دغه خاصيت چې د گاسولينو او د ډيزلو د درنو تېلو ترمينځ په ډبريدونکي حالت شتون لري (جدول ۴).

څو نور ډېر رسمي انتي کولين استرازونه [$\text{dialkyl aminoalkyl-bis (dialylamido)-fluoro-phosphates}$] يعني (G compounds) او

quaternary Carbamates] هم دممکنه عصبي عاملينو په گروپ کي صنف
بندی شوي وو.


د روسیې په دولتي ځمکه کي novichok(newcomer) کوډلرونکي دنوي V-
type عاملينو پراختیا تربحث لاندې ده اما تراوسه یې کیمیاوي جوړښت
خپورشوي نه دي او هیڅ یوددي عاملینوڅخه دکیمیاوي وسلې په توگه ندي
پیژندل شوی.

R = الکیل- ، الکوکسی- ، دای الکیل امیدو گروپ
X = هلوجن ، سیاناید ، تیوسیانات ، الکیل /ارایل-اوکسي، الکیل- /ارایل- نیو ،
پایرو فاسفات ، څلورمي د امونیم مرکبونه

شکل ۱: دارگانوفاسفورس انتی کولین استرازونو عمومی فارمول ؛ د Scharder (۱۹۵۲) پریښت

سمیت ، توکسیکوکنیتیک او میتابولیزم

عصبي عاملین د دوي د لیپوفیلیک خاصیت په لرلوسره کولاي شي په بیرپه د
انشاق، خوړلو او جلدې جذب پواسطه، جریان ته داخل شي، چې مرکزي عصبي
سیستم ته د زر ننوتو ښکارندویه ده.




ارگانوفاسفورس مرکبونه په خپل سر په پلازما او نورو اوبلنو محلولونو کې هیدرولایز کېږي او انزایماتیک هیدرولایز د α -esterases او Phosphoryl Carboxyl phosphatase پواسطه صورت نیسي. پر β -esterases لکه Carboxyl esterase او cholinesterases باندې نښلیدل چې وروستي یې د سمیت هدف هم دي، د ارگانوفاسفورسونو د اطراح سره کمک کوي. د تناظر نشتوالي د ارگانوفاسفورسونو په جوړښت کې په عام ډول شتون لري. نوموړي ایزومیرونه مختلف بیولوژیکي فعالیتونه، د تجزیه کیدو مختلف سرعت او ډول او په تداوي کې د انتي ډوت په مقابل کې مختلف عکس العمل له ځانه ښيي. تجاربو ښودلي ده چې د Soman او Sarin ، $P(+)$ ایزومیرونه چې کله انسټیزي شوي او اتروپین تطبیق شوي موډکانو او هندي خوگانو ته زرق کېږي، ډېر زړ تجزیه کېږي پداسې حال کې چې د هغوې ډېر سمې $P(-)$ ایزومیرونه نسبتاً ثابت دي او کیداي

شي تر يوه ساعته پورې د ويني په دوران کي محاسبه کړل شي. د P(-) ايزومرونو اطراح تر ډېره له β -esterases سره د دوي د اشتراکي رابطو تشکیل پوري اړه لري. سره له دې تجارب راپه گوته کوي چې H Sarin او Soman کله چې پر مورکانونو او سويانو تطبيق کيږي، په سږو کي نسبتاً يو لوړه سويه راډيواکتيويتي تراکم ښيي او تنها ۳٪ په زفيري هوا کي پيدا کيږي.

آزاد H-isopropylmethylphosphonic acid او H-

pinacolylmethylphosphonic acid په ترتيب سره د هغو مورکانونو او سويانو په ادرار کي وپيژندل شو، کومو ته چې H ليبل شوي سارين او سومان تطبيق شوي وو. د سارين په مقايسه ډېر کم مقدار VX په پوستکي کي تجزيه کيږي. په پنځم جدول کي د مختلفو عصبي عاملينو د سميت په باره کي ارقام شتون لري.



جدول ۴: دڅو کیمیاوی عاملینو فزیکوشیمیک خواص														
C S	C N	D M	D C	D A	L	H N- ۳	H T	H D	V X	G D	G F	G B	G A	فزیکو کیمیاو ی خواص
۱ ۸ ۸ ۵	۱ ۵ ۴ ۶	۲۷ ۷ ۵ ۷	۲ ۵ ۵	۲ ۶ ۴ ۵	۲۰ ۷ ۳ ۵	۲۰ ۴ ۵	۲ ۶ ۳ ۲	۱ ۵ ۹ ۱	۲ ۶ ۷ ۴	۱ ۸ ۲ ۲	۱ ۸ ۰ ۱	۱ ۴ ۰ ۱	۱۷۲, ۳	مالیه کولی وزن
-	۱, ۳ ۲	۱, ۶ ۵	۱, ۴ ۵	۱, ۴ ۲	۱, ۸ ۹	۱,۲ ۳	۱, ۲ ۳	۱, ۲ ۷	۱, ۰ ۸ ۸	۱, ۰ ۲ ۲	۱, ۱ ۳ ۳	۱, ۰ ۸ ۹	۱,۰۷ ۳	مخص وصه کشاف ت g/cm ^۳ ;۲۵°C
۳ ۱۰ - ۳ ۱ ۵	۲ ۴ ۵	۴۹ ۰	۲ ۹ ۰	۳ ۰ ۷	۱ ۹ ۰	۲۳ -۰ ۲۳ ۵	۱ ۷ ۴	۲ ۲ ۸ ۸	۲ ۹ ۸	۱ ۲ ۷	-	۱ ۴ ۷ ۳	۲۴۶	دجو ش ټکی C°;۷۶ mm Hg

[illegible]

د تاثیر میکانیزم

عصبي عاملين ، Acetylcholinesterase انزایم نهی کوي متعاقباً Acetylcholine تراکم کوي او په نتیجه کي یې هغه غړي او نسجونه چې د کولینرجیک اعصابو پواسطه تعصیب شوي دي غیر قابل کنترول تنبیه او وظیفوي ګډوډۍ په کې رامینځته کیږي او بالاخره د مرګ لامل ګرځي. شپږم جدول

د بدن د تودوخي درجې ټیټوالی، په حرکي فعالیتونو کي کموالی او په مغزو کې د ډوپامین د کچې لوړوالي په هغو موډکانو کي ولیدل شوې کومو ته چې د سومان Sublethal ډوز ورکړل شوي وو. د اتروپین، میتایل اتروپین یا اوکسیم HI۲ یا HLO-۷ پواسطه د پورتنیو اعراضو راګرځیدل د اغېز لپاره یو کولینرجیک اصل په نښه کوي. ناڅاپه عصبي حملې چي په تعقیب یې مورفولوژیک عصبي تخریب هم رامینځته کیږي چې نوموړي تخریب کیدای شي د Antimuscarinic، GABA، د NMDA انتاګونیست پواسطه اصلاح کړل شي، د ابتدایي کولینرجیک (مسکارینیک) بوختیا او په نتیجه کي یې د نهی د کنترول له لاسه ورکول او په تعقیب یې د هڅوونکو ټرانسمیټرونو فعالیتدل، د دوامداره اختلاجونو پیداکیدل او مغزو د تخریب مینځته راتلل په ګوته کوي. په احتمالي ډول د زړه سمیت او د اسکلیټي عضلاتو نکروز د Acetylcholinesterase نهی کېدو په پایله کي مینځته راځي.

جدول ۵: د عصبي عاملینو سمیت		
پارامتر	GA	GB
وریدی LD _{۵۰} (mg/kg)		
موډک	۰.۳۱	۰.۱

مېړه	۰,۰۷	۰,۰۴۵
د خولې له لارې LD _{۵۰} (mg/kg)		
مېړه	۳,۷	۱,۰۶
انسان (اټکلي)	۵	۰,۱۴
د پوستکي له لارې LD _{۵۰} (mg/kg)		
مېړه	۱۲,۶	۲,۵
انسان (اټکلي)	۲۱-۱۴	۲۴
د انشافي لارې LC _{۵۰} (mgXmin/m ^۲)		
موږک	-	۲۴۰
مېړه	۴۵۰	۲۲۰
انسان (اټکلي)	۴۰۰-۲۰۰	۱۰۰
ترټولو کم اغېز لرونکی غلظت (mgXmin/m ^۲) انسان لپاره		
ميوزس	۰,۹	۴-۲
لېزه	-	۴
بی له اغیزې	-	۰,۵
LC _{۵۰} : هغه وخت په گوته کوي چې په هغه کې پنځوس سلنه وژونکی غلظت تولیدیږي		

د Neuropathy target esterase يا NTE انزایم نهې کول
 د Organophosphate-induced delayed polyneuropathy يا
 (OPIDN) لامل ګرځي. لیکن د وژونکي ډوز څخه لس چنده باید ډېر واخیستل
 شي ترڅو نوموړي انزایم د عصبي عامل پواسطه نهې کړل شي. د بیولوژیکو

فعالو پېتايډونو په سنتيزيا تجزيه کي د Acetylcholinesterase د مداخلې رول څرگند دی ولي پرسميت يې تراوسه راجمع شوي معلومات روښانه ندي.

د تسمم اعراض

په عمومي توگه د عصبي عاملينو او د اړونده پستيسيدونو تاثيرات سره ورته دي. د عصبي عاملينو سره د تماس په لمړيو کي اعراض موضعي وي او متعاقباً د سيستمیک سميت په اعراضو اوږي. په ډېرو ټيټو غلظتونو او مقدارونو سره موضعي اغيزې (پرسترگو، سږو، پوستکي او کولمو) باندې کيداي شي پرمختگ وکړي. کلينيکي اعراض يې اساساً د محيطي مسکاريڼيک تنبهاټو ډېرېدل په نښه کيږي. مرگ تر ډېره د خفق کيدلو، په اعصابو کې د تنفسي مرکز انحطاط، د عصب او عضلې ترمينځ د برقي هدايت نهې کيدل او په تنفسي عضلاتو کې گډوډي، د قصباتو د افرازاتو ډېرېدل او د قصباتو د تقبض په نتيجه کي مينځته راځي. جدول ۲

قلبي دوراني پارامترونه د سختې هيپوکسيا تر کچې تر ډېره ثابت پاته کيږي ليکن په کمو او اوږدمهاله تماس سره، شونې ده چې دوراني انحطاط تنفسي تشوشات نور هم پېچلي کړي.

جدول ۲: د عصبي عاملينو د سميت فزيوپتالوژي او کلينيکي اعراض	
نښې او اعراض	ترمرخې لاندې آخذه، غړی، نسج

مرکزی عصبي سیستم

تنفس	د تنفس حرکاتو او حجم کمیدل، سیانوز، گډوډي، مرکزی تنفسی فلج
دوینی جریان	دوینی د فشار ټیټیدل او بیا جگیدل
فعالیتونه	ناکراري، لږزه، نامنظم حرکات، ضعف، قوي اختلاجونه
عادات	اضطراب، سرچرخي، هیجاني کېدل، خراب خوبونه لیدل، بی خوبي،
عدم	

تمرکز، دوه زړي کېدل

محيطي عصبي سیستم

- مسکارینیک عصب

سترگه

+نبویه عضله

عنبیه د حدقي کوچنی کېدل، په لیدکی گډوډي او تیاره

وېسته لرونکې عضله د تطابق پاته راتلل او دسراو ټنډې خوړېدل

+اکزوکراین غدې د اوښکو بهېدل (په لوړ تماس سره)

تنفسي تیوب

+نبوی عضلات د قصباتو تقبض، نفس تنگی، تنفسي گډوډی

+اکزوکراین غدې د پوزې بهېدل، لارې بهېدل، بلغم راتلل، تنفسي گډوډی

معدې معایي تیوب

نبوی عضلات/ اکزوکراین غدې بې اشتهايي، کانگې، دخيتي درد، دستوني، غیرارادي تغوط

کلیوي تیوب

+نبوی عضلې دادرار کولو دشمبری ډیریدل، دادرار غیرارادي کېدل

دزړه د ضربان کمېدل	زړه
	پوستکی
خوله کېدل	+اکزوکراین غدې
	- نیکوټینیک عصب
ضعف، د عضلوراتولېدل، د تنفسي عضلو ضعف، محیطي تنفسي	اسکلېتي عضلې
	فلج
خاسف کېدل، لوې فشار او د زړه د ضربان ډېرېدل	اتونوميک ګانګلیا

لابراتواري موندنې


د Acetylcholinesterase يا (AChE د سرو کړيو اتو Cholinesterase) او د Butylcholinesterase يا (BuChE د پلازما Cholinesterase) فعاليت د تشخيصي موخولپاره کارول کېږي. د AChE د فعاليت په هکله فکر کېږي چې د محيطي او مرکزي ساينسې انزايمونو ښه دقيق انځور رانښيي. د دې انزايمو پواسطه د اتروپين معالجوي اغيز او د توافق کونکو آخزو بدلون نشي منعکس کېدلای. د AChE بياجوړېدل ډېر په ورو (۱٪ په ورځ کې) د de novo synthesis پواسطه مخکې ځي. BuChE په ښه (جگر) کې ډېر په چټکۍ سره جوړېږي ولې په پلازما کې بياجوړونه له يوڅه تر دريو او نيو پوري بشپړېږي. د BuChE په فعاليت کې زياتوالي په وينه کې د عصبي عاملينو د توکسيکولوژيک غلظت پر نشتوالي دلالت کوي.

د ۳-۵ ورځو په دوران کې د BuChE په فعاليت کې له ۱۵-۲۰٪ زياتوالی پخوانی تماس په ښه کوي. دا حالت بايد د انزايم د ټاکلې محاسبې پواسطه

تصديق كړل شي ترڅو د انزايم د فعاليت د شروع ارزښت (baseline value) وټاكي. كه چيرې په كارگرانو كې د baseline value (د سميت د حدودو ارزښت) كچه له ۷۵٪ څخه ټيټه وه بايد له انتي كولين استرازونو سره د كار اجازه ورنه كړل شي.

اوږد مهاله اغيزې :

ځيني ارگانو فاسفورسونه د اوږد مهاله عصبي رواني تغيراتو لکه د پاملرني گډوډۍ، د تمرکز کموالي، د معلوماتو د پروسس کمبود، د رواني حرکاتو ډېرښت، د حافظې نیمګړتوب، په خبرو کولو کې گډوډوي، انحطاط، اضطرابات او زر قهریدلو لامل ګرځي. پداسې حال کې چې شته ارقام دا نه په نښه کوي چې asymptomatic (پرتله له اعراضو) یا ټيټ ډوز سره تماس، د تاخیري دایمي عصبي رواني پتالوژیکو تغيراتو د خطر د ډېریدو سره تړلی دی. وروسته له یو کال څخه چې ټيټ ډوز Sarin سره تماس یې د کلینکي اعراضو سره بې پیونده باله یوڅه نازک بدلون د هغو بیزوگانو د زړه په ګراف کې ترسترګو شول کومو ته چې ټيټ ډوز Sarin ورکړل شوي وو.



د عضلاتو د کمزوري کیدو او فلج کیدلو سندروم چې د غاړې او تنفسي سیستم په عضلاتو یې اغیز درلود (intermediate syndrome)، روښانه شو کوم چې د تنفسي عضلاتو د فلج لامل ګرځي. ګوندې دغه حالت د AChE د دوامداره نهي کیدلو له کبله مینځته راځي کوم چې د تسمم د حادثې مرحلي د ناکافي درملني په اثر په نکرور اوږي (لکه په لږمقدار او کم وخت لپاره د Oxime پواسطه درملنه یا غیرکافي تنفس او تهویه)

په سپیو کې یو سندروم چې د intermediate syndrome (متوسط سندروم) ته ورته دی د سومان په تسمم کې ولیدل شو. پداسي حال کې چې د غاړې د عضلاتو د کمزوري له کبله سپي سر نشو خوځولای لیکن د تنفسي عضلاتو فلج په کې نه لیدل کیده.

ځانگړې توکسيکولوژي:

په *invitro* او *invivo* شکل سره د Sarin، Soman او د VX په هکله داسې شواهد وجود نلري چې د میوتاجنیستي لامل وگرځي. لیکن کمزوري میوتاجنیستي د Tuban په هکله راپور ورکړل شوي ده. د Tuban په شمول د عصبي عاملینو په هکله داسې شواهد وجود نلري چې پر Teratogenicity او Carcinogenicity دلالت وکړي.

د درملنې کچه

اتروپین:

اتروپین په مسکارینیک اخذو کې د استایل کولین یو رقابتي انټاګونیست دی. په مرکزي عصب کې د تنفس د مرکز انحطاط، د افرازاتو زیاتوالی، د بنویه عضلاتو د فعالیت زیاتوالی، برادې کارډیا او نور مسکارینیک اعراض ورسره اصلاح کیږي. نیکوټینیکې نښې نښانې لکه د خط لرونکو عضلاتو راتولیدل او عصبي-عضلي بلاک د اتروپین په مقابل کې عکس العمل نه ښيي. صرع یا Seizure ابتدا ځواب ورکوي ولي وروسته بیا د GABA اګونیستونو علاوه کول ضروري گڼل کیږي.

د ۲mg بیاځلي وریدي زرق او یا د ټاکلې تنفسي انحطاط په صورت کې ۴-۲mg وریدي زرق (کوچنیان ۰.۰۵-۰.۱۵mg/kg) او همدارنګه د مسکارینیکو اغیزو ټینګ کنټرول ضروري گڼل کیږي (په *invivo* ډول د اغیزو تتریشن، زیاتره افرازات). په سترگو کې د عصبي عاملینو د موضعي جذب له کبله د سترگو د کسی کوچنیوالي د مسکارینیک تنبیه د ډېروالي درجه نه شي منعکسه کولای د

دې لپاره چې د اريتميا څخه مخنيوي وشي بايد د زړه ضربان په يوه دقيقه کې له ۹۰-۱۰۰ څخه ډېر نشي. لوړ اتروپينايزيشن ممکن د حرارتي کشش، قبضيت، د مثاني د فعاليت مختل کيدلو، د کولمو د بنديدو او د نتيجې د خرابېدو لکه د حشره وژونکيو په شديد تسمم کې چې له سترگو کېږي، لامل وگرځي


د اتروپين د ډېر لوړ ډوز کارول لکه چې تر اوسه د حشره وژونکيو په ځان وژونکي فمي mega dose يا لوړ ډوز تسمم کې ضروري راپور ورکول شوی دی، په احتمالي توګه د هغو عصبي عاملينو په هکله رېنتوني نه ښکاري کوم چې په ساحه کې وجود لري. د ۲-۳ ساعتو په مهال کې د ۱۰-۲۰mg تراکمي ډوز کافي تجويز شوی دی.

اوکسيمونه:

په ډېرو هيوادونو کې د Pralidoxim مالګې او Obidoxime د ارګاؤفسفورس مرکبونو د تسمم د درملنې لپاره تصويب شوي دي. HI۲ او HLÖ-۷ تر ټولو اغيزمن او نوي اوکسيمونه دي چې د I.Hagedorn پواسطه کشف شوي دي تر څو د سومان د تسمم درملنه اصلاح کړي (جدول ۴)

اوکسيمونه په انزايم کې په فسفيل بقیې باندې د نښلېدو له لارې عمل کوي. د دې دوه ماليکوله تعامل په نتيجه کې د phosphyl-enzyme-oxime کامپلکس مينځته راځي چې د Michaelis کامپلکس ته ورته دي. دويمه مرحله د نوموړي کامپلکس د تجزيې څخه عبارت ده تر څو يو آزاد انزايم او فسفيل اوکسيم (د بيا فعاليدو پروسه) لاسته راشي (شکل ۵). دغه کامپلکس لمړۍ درجه کينيتيک تعقيبوي او د نيم عمر د پارامتر د استعمال په بنسټ محاسبه کيدلای شي.

د اوکسیمونو مکرر او بې خطرې متوسط (معالجوي) غلظت $4\mu\text{g/ml}$ دي چې د Sundwall (۱۹۶۱) څخه اقتباس کیږي، پرته له دې چې د اوکسیم ډول او نوع په نظر کې ونیول شي. په عمومي توګه Obidoxime په $20\text{--}100\mu\text{mol/Lit}$ غلظت لرلو سره د ډېرو پستیسیدونو (Pesticides) لکه سارین او سایکلو سارین پواسطه د غیرفعال شوي AChE په مقابل کې یو چټک او اغیزناک فعال کوونکي بلل کیږي او همدارنګه د Tuban پواسطه د غیرفعال شوي AChE په بیا فعاله کولو کې له HI۲ او Pralidoxime څخه ډېر اغیزناک دی. HI۲ د $30\mu\text{mol/lit}$ په غلظت سره د Pralidoxime او Obidoxime په پرتله د سارین، سومان، سایکلو سارین او VX پواسطه د غیرفعال شوي انزایم په بیا فعاله کولو کې له ځانه لوړ اغیزناکتوب ښیي، که څه هم Obidoxime د VX په سمیت کې ډېر مؤثریت درلود. په ټولو حالتونو کې Pralidoxime له ځانه لږ اغېز ښوودلی دی چې دا را په ګوته کوي چې اغیزې ته د رسیدو لپاره لوړ ډوز ضروري دی.



شکل ۵: د سومان په واسطه د استایل کولین استراز نهی کیدل، د HI۲ په واسطه د انزایم بیا فعالیدل او د انزایم-سومان د کمپلکس اجنگ (aging). سومان د استایل کولین استراز د استراتیک برخې د سیرین په هایدروکسیل لکه دارگانو فاسفورسونو او کاربامات انټي کولین استرازونو په څېر نښلي. د سومان-استایل کولین استراز کمپلکس په انسان کې د الکایل د بقیې (دبټی-برخې څخه) له بایللو څخه وروسته ډېر ژر د اجنگ مرحلې ته رسېږي (نیمه عمر یې ۲ دقیقې). نوموړی نهی کاملاً غیر رجعي ده او د اکسیمونو په واسطه لکه HI۲ نشي تجزیه کیدلای. په هغه کمپلکسونو کې چې اجنگ ته نه وي رسیدلي، د نوموړو موادو فاسفورس د اکسیمونو په واسطه لکه HI۲ نیو کلو فیلیک حملې ته ډېر ښه برابر وي. یو فاسفونیل اکسیم کمپلکس جوړېږي او بیا تجزیه کېږي او انزایم بیرته رغول کېږي (کین اړخ)

د اوکسیمونو اغېز د AChE-agent د کامپلکسونو، د موجوده عامل پواسطه د AChE دوباره نهی کیدلو او فاسفایل اوکسیم پواسطه محدودېږي. نیم عمر یې د انسان په AChE کې د سومان لپاره دوه دقیقې، د سارین لپاره ۵ ساعته، د VX لپاره ۴۸ ساعته او د توبان لپاره ۱۳ ساعته دی. فاسفوریلېټ شوی ۴- pyridinium aldoximes ډېر زیات ثابت مرکب دی او له همدې کبله د ۲- oxime د انالوگونو په پرتله مناسب نهی کوونکي گڼل کېږي.

اوکسیمونه نسبت د دوي دکوارترنیر امونیم خاصیت ته، په محیطي کچه عصبي-عضلي هدایت زیاتوي چې په نتیجه کې یې د تنفسي عضلاتو د فعالیت کچه لوړېږي. که څه هم په څرگند ډول دغه مرکبات په خپله د ارگانو فاسفورس د مرکباتو په سمیت کې اغېزناک دي او د اتروپین درملنېزو اغیزو ته قوت وربخښي.

نور اقدامات

په خطرناکو حالاتو کې مصنوعي تنفس ضروري دی. د ډیازپام د عضلي او وریدي تطبیق په نتیجه کې د عصبي سمیت څخه مخنیوی کېږي او ناڅاپي حملې کنټرولوي، که څه هم دوباره احیا مشکوکه وي. د پوره اغېز لپاره باید پورتنۍ اقدامات په پیل کې ترسره شي.

لمړنۍ درملنه:

Pyridostigmine او کاربامات د AChE انزایم په رجعي ډول سره نهې کوي او د عصبي عاملینو پواسطه د فاسفیلیشن څخه مخنیوی کوي. کله چې عصبي عامل او Pyridostigmine اطراح شي نو کاربامایل شوی (Carbamylated) انزایم به پخپل سر د Decarbamylation د عمليې په ترڅ کې د فزیولوژیک فعالیت لپاره ازاد کړل شي. په *invivo* ډول د انسان په پلازما کې د Pyridostigmine نیم عمر چې د خولې له لارې اخیستل شوي وي ۴ ساعته او د انسان په سروکړیواتو کې د dimethylcarbamyl-AChE پخپل سر د بیا فعالېدو نیمه عمر ۳۰ دقیقې دی. په پیل کې دغه دوه انتي کولین استراز مرکبات د AChE نهې کېدل ډېروي او اعراض کړکېچن او سختوي. چارج لرونکي Pyridostigmine په محیطي ډول عمل کوي ترڅو عصبي-عضلي هدایت ته ښه والی ور وبخښي. د عصبي عاملینو د تسمم ابتدایي درملنه همیش اتروپین او اوکسیمونو ته اړتیا لري. د Pyridostigmine پواسطه ابتدایي درملنه صرف د سومان د تسمم په درملنه کې سپارښتنه کېږي، ځکه چې په څو لابراتواري حیواناتو کې چې د سارین، کاربامات او VX پواسطه مسموم شوي وو د اتروپین او اوکسیمونو سره د درملنې په پایله کې هیڅ ډول تداوي ښه والي له سترگو نه شو. د Decarbamylation سرعت د Pyridostigmine پواسطه لږاکمېږي، د HI۲ پواسطه ډېرېږي او د Obidoxime پواسطه بې توپیره پاته کېږي. د خط

لرونکو عضلو پر نیکوتیني آخزو باندې د Pyridostigmine او Physostigmine مستقیم اغېز هم څرګند شوي دي لیکن په معمولي ډوز سره نه.

د AChE د ۸۰-۶۰٪ فعالیت د برقراره پاتې کیدلو لپاره، هر ۸ ساعته وروسته د خولې له لارې د ۳۰mg Pyridostigmine سپارښتنه کیږي. په دې ډوز کې پرته له سپک محیطي کولینرجیک تنبېه څخه، هیڅ ډول خطرناکه او حاده ګډوډي نه تصور کیږي. د Pyridostigmine هیڅ ډول مزمني او بعدي اغیزې تر اوسه ندي پېژندل شوي، که څه هم د Myasthenia gravis په درملنه کې په اوږدمهال ډول په ډېرلو ډوز سره تطبیق کیږي.


Physostigmine چې د یو مرکزي کاربامات انتي کولین استراز په توګه عمل کوي، د Pyridostigmine په پرتله د سومان او سارین عصبي عاملینو له کبله د مړینې او ناورټیا په مخنیوي کې ډېر اغیزناک ګڼل کیږي. او تر ډېره د نورو انتي کولینرجیک دواګانو لکه Scopolamine او Aprophen سره یوځای کارول کیږي ترڅو د کاربامات له جانبي اغېزو څخه مخنیوی وشي. پاته شوي انزایمونه همدارنګه د عصبي عاملینو پر ضد د تجربوي وقایوي اقداماتو پورې اړه لري.

الکایل نصبوونکي عاملین (Alkylating Agents)


د لوړ جنګي ځانګړتیاوو لرونکی مرکب، bis(۲-chloro ethyl)sulfide چې د Levinstein د پروسې پواسطه جوړ شوي مرکب لپاره یې سمبول، H او د تقطیر شوي مرکب لپاره یې سمبول، HD دی. دغه مرکب ته د هغه د بوي پر بنسټ مستیارد (خردل) ګاز هم وایي، په فرانسه او روسیه کې، Yprite (نظریه لمړۍ نړیواله جګړه کې په ypres، بلجیم کې کاریدلي وو ۱۹۱۷، ۱۱ July) او په جرمني کې Lost (نظرهغو عالمانو ته لکه Lommel او Steinkopf چې څیړنې یې پرې کړي دي) ورته وایي. د نایتروجن یو انالوګ یعنې Tris(۲-

(۳-۳)chloroethyl)amine(HN-۳) څخه په دويمه نړيواله جگړه کي د جرمني لښکرو لخوا زيرمه شوي وو.


د HD او ده ته ورته عمل کوونکي bis(۲-chloroethyl-thioethyl)ether يا HT(شکل ۲) او همدارنگه د ارگانوارسنيک (Lewisite) سره مخلوط ښه پيژندل شوی دی. د سلفرخردل بوي د اوري، اوږې، خوسا کرم او سلفرلرونکو مرکباتو د بوی په خپردي. د نايتروجن خردل بوي د ماهي بوی ته ورته دی. د نوموړو عاملينو فزيکوشيميک خواص په څلورم جدول کي ښودل شوي دي.




دای کلورو دای ایتایل سلفایډ
(S-Lost) (HD)




دای کلورو دای ایتایل دای تیو
دای ایتایل ایتر (HT)



ایتایل دای کلور دای
ایتایل امین (HN-۱)



میتایل دای کلورو دای ایتایل
امین (HN-۲)



ترای کلورو ترای ایتایل امین (HN-۳)

شکل ۲: د سلفرو نايتروجن مستطاردونو کيمياوی جوړښت

سمیت ، توکسیکوکنیتیک او میتابولیزم:

خردل یو ډبرلیپوفیل او فعاله عامل دي او د څرگنده موضعي تخریب او سیستمیک سمیت وړتیا لري، ارقام یې په جدول ۷ کې د لنډیز په ډول ښودل شويدي. د نایتروجن او سلفر خردل د څو دقیقو په لړ کې له جریان څخه ورکېږي. په اوبلن محلول کې، سلفر خردل په چټکۍ سره هیدرولایز کېږي او په نیمه خردل او Thiodiglycol اوږي. سلفر خردل د هغو ایرانیانو په مختلفو نسجونو کې پیدا شول کومو چې د نوموړې مادې سره د تماس څخه خوورځې وروسته چې د دوي په مغز او شحمي نسجونو کې یې لوړ غلظت مینځته راوړي وو، ژوند له لاسه ورکړي وو. نږدې ۷۰٪ رادیواکتیو ³⁵S لیبل شوي سلفر خردل چې له وریدي لارې موبکانونو ته ورکړل شوي وو په ۱۲ ساعتو کې د ادرار له لارې اطرأ شول (۸۰٪ یې په ۲۴ ساعته کې اطرأ شول). د دې په پرتله په انسانانو کې صرف ۱۷٪ په عین وخت کې اطرأ شول (۲۲٪ په ۲۴ ساعتو کې اطرأ شول) او یوه لویه برخه یې تر ډېره وخته په بدن کې پاته شوه. اساساً هغه میتابولیتونه چې د ژوونکو او انسانانو په ادرار کې وموندل شول، یو ډول وو، کوم چې د گلوکوتایون او سیستمین له کانبوگیتونو او د دوي د تجزیې څخه د لاسته راغلي موادو څخه عبارت دي. هیڅ ډول رادیواکتیو مواد په زفیری هوا او غایطه موادو کې ونه موندل شول.


جدول ۷: د الکایل نصبوونکو عاملینو سمیت		
پارامتر	HD	HT

				وریدی LD _{۵۰} (mg/kg)
-	۳,۳			موږک
				دخولې له لارې LD _{۵۰} (mg/kg)
-	۱۷			مږه
-	-			انسان (اټکلي)
				د پوستکي له لارې LD _{۵۰} (mg/kg)
-	۱۸-۹			مږه
-		۶۰-۴۰		انسان (اټکلي)
				د انشافي لارې LC _{۵۰} (mgXmin/m ^۲)
-		۱۱۰۰-۲۲۰	۱۳۲۰-۸۲۰	موږک
-	-		۱۵۱۲-۸۰۰	مږه
-			۱۵۰۰	انسان (اټکلي)
			۴۰۰	
				ترټولو کم اغېز لرونکی غلظت (mgXmin/m ^۲) انسان لپاره
-		۰,۰۱		د پوستکي سوروالی (mg/cm ^۲)
-		۰,۱۵-۰,۱		تنډاکه کیدل (mg/cm ^۲)
-	۰,۰۰۱۲ (۳۰ دقیقې)			د سترګې د ملتحمې التهاب
			۰,۰۰۷ (۱۵ دقیقې)	
-	۲			بې اغېزې
LC _{۵۰} : هغه وخت په گوته کوي چې په هغه کې پنځوس سلنه وژونکی غلظت تولیدیږي				

له تطبيق خخه وروسته ۸۰٪ مایع سلفر خردل څاڅکې تبخیر، ۲٪ یې پر پوستکي د اوږدمهال لپاره نښلي او ۱۸٪ یې د وینې جریان ته رسیږي. په سویانو کې ۸۰٪ انشاق شوي سلفر خردل او ۹۰٪ نایتروجن خردل د پوزې د مخاط پواسطه له مینځه ځي.

د عمل میکانیزم:

په آبی محلول کې د mechloroethamine د جنبي ځنځیر یعنی ۲-chloroethyl خخه د کلورین د ازادیدو په پایله کې لمړۍ درجه (S_N1) د مالیکول د کړۍ کیدو تعامل ترسره کیږي او په یو ډېر فعاله منځني مرکب Ethyl emeiminium بدلیږي. نوموړی مرکب په خپل وارسره د کاربونیم د ایون په جوړولو او یا د مینځني کامپلکس د انتقال په اساس په پراخ ډول د عضوی راپیکلونو او یا عضوی آیونونو لکه فاسفیت، امین، تیول، هایډروکسیل، کاربوکسیل او امیدازول سره دویمې درجې ته ورته نیوکلوفیلیک تعامل ترسره کوي. ترټولو په زړه پورې تعامل د DNA د گوانین په اووم نایتروجن کې ترسره کیږي. د Chloroethyl د دواړو گروپونو د تعامل په نتیجه کې هستوی اسیدونه د نورو نیکلوفیلیک موادو سره Cross link کیږي د خردل په باره کې حساسیت د حجرو د ډېرښت د صحت له کبله ډېر دی په کوم کې چې د حجرې د DNA د بیا جوړولو د سیستم ثمره قطعی معلومیږي. د خردل د سلفر د تعامل په نتیجه کې د Ethylenesulfonium په نوم یو کره بیز منځنی ایون مینځته راځي (شکل ۷). او د نایتروجن د خردل په پرتله یی له نیوکلوفیلونو سره تعامل ډېر گړندی دی. شونې ده چې mechloroethamine هغه حجرو ته چې د کولین د اخیستلو سیستم ولری، په اسانۍ سره ننوزي.



شکل ۷: د سلفرد مستار په واسطه د نیوکلو فیلک گروپونو (Y) الکالییشن

هغه څیړنې چې د تهاکو د را پیدا کیدو پر میکانیزم ترسره شوی د خردل پواسطه د حجرو د تخریب یا Papirmiester د نظریې سره سرخوړي. د DNA بیا جوړیدل د polymerase (polyadenosine diphosphate ribose) کروموزومی انزایم فعالوي چې په نتیجه کی د نوموړي انزایم سبسترات (NAD) تجزیه او بالاخره د گلایکولایزس د عملیې د نهی، د انرژۍ د میتابولیزم د گډوډیدو، د Hexose monophate shunt د فعالیدو، د پروتياز د آزادیدو او حجروې مرگ لامل گرځي.

په همدې ډول د خردل پواسطه د گلو تاتیون تجزیه او په قسمی ډول د کلسیم ا دینوزین ترای فاسفتاز د تیول د گروپونو د الکالییشن په نتیجه کې له حجرې څخه د کلسیم وتل ناشوني کیږي او په حجره کی د کلسیم د تراکم په پایله کې د حجرې اړونده غشاگانې تخریبیږي. پر کولینرجیک عصبي سیستم باندی بعضی تاثیرات لکه بی اشتهايي او کانگې هم خردل ته نسبت ورکول کیږي.

د تسمم نښې نښانې:

د سلفرخردل او نایتروجن خردل د تسمم نښې نښانې ډېرې سره ورته دی. د لمړي نړیوال جنگ پر نسبت د خلیج په لمړي جنگ کې ډېر ایرانی قربانیان، ککې راپور ورکړل شوی وو او پرته له دې یوهوډه لرونکی بوی، یو تند احساس او په سترگو او ستوني کی درد او سوزش چې جنگی هدف ته په نږدی سیمه کی د چاودنې له

کبله پینښېرې، راپور ورکړل شوی وو. تر اوسه دا معلومه نده چې د تولید ضایعات هم دغه مشکلات مینځته راوړي که نه. په هرصورت بیوشیمیکی تخریب د د قیقو، ساعتونو او یاڅو ورځو په دوران کې مخکې د لمړني عرض د راڅرگندیدو څخه، مینځ ته راځي. په عمومي ډول اعراض په کراره او د لږو لمړنیو نښو په لرلو پرمختګ مومي او د اعظمی تاثیراتو لپاره ډېر وخت ته اړتیا لري. د انتاناتو په مقابل کې د لوړ حساسیت سره د معافیتي سیستم نهی کیدل او په ځنډ تخریب یی ځانګړی نښې دي.

پوستکی:

له تماس څخه څو ساعته وروسته خاړښت، سوروالی او له لږ درد سره قسماً تناکې پرمختګ کوي. سرخلاصې تناکې او لوڅې نکروزي ساحې ډېرې دردناکې وي. د پوستکي سوروالی څو هفتې وروسته تیاره نسواری ته ورته او بیا تیاره نسواری رنگ غوره کوی چې د کلونو لپاره پر پوستکي پاته کیږي. ژور ټپونه تر ډېره بې رنگه او سخت پاته کیږي. په عین وخت کې د بې رنگه، سوزیدلي، او نامتضرره ساحې شتوالی د یوې جغرافیوی نقشی په څیر ښکاري. د ټپونو تصنیف لکه سوروالی، برسېرنو تناکو، ژورو تناکو او ټپونو په شکل په موضعی ډول پاته کیږي او ټول یو بل پسې مینځ ته راځي. وروستنی یې یو موضعی شکل لري او شونې ده چې د خردل له تماس څخه څو هفتې وروسته مینځته راشي. د تناکو لمړني او وروستني مایعات فعال مواد نلري. د پوستکي حساسیت د خولو او د غوړو د غدو د کثافت د ډېریدو سره او برعلاوه په سختو انساجو کې د لنډوالی او پنډوالي د زیاتیدو سره ډېرېږي. په تخریګونو او د جنسی آلو شاوخوا برخو کې د حرکت، تبخیر، رطوبت او د ککې لباس په اساس ټپ نور هم خرابیږي. په تېز رنگ

لرونکو کسانو کی لکه ایرانی قربانیان، قهوه یی رنگ او د اپیدرم تخریب له وړاندې لیدل کیږي.

سترګې:

د پوستکي په پرتله سترګې د خردل د سمی تاثیراتو لپاره ډېرې مساعدې دي. بې له ساتنې څخه، سترګې تر ډېره زړه سمیت اخته کیږي. په عمومي ډول د بخاراتو د تماس څخه یو تر څو ساعته وروسته په سترګو کې د ریګ ریګ کیدو احساس، د لمر څخه تېښته، سوروالی، اوښکې او د سترګو د ټپو شاوخوا سپازم پرمختګ مومي. وروسته د ډېر قوی تماس څخه د سترګو د منظمې التهاب چي اول سیروم لرونکی اوبیا نو (قیح) لرونکی وي، قرنيه یو روڼ او شفاف شکل غوره کوي او بالاخره د سترګو ټپ ښکاره کیږي. په لیدلو کې د ټپو د شاوخوا د التهاب او د قرنيې د روڼ کیدو په اساس ګډوډي په غیر رجعي ډول پاته کیږي. په مایع ډول تماس د څو دقیقو په دوران کې په قوي او غیر رجعي ډول پورتنی اعراض، قوي نسجی تخریب او د لید ناوړتیا رامینځته کوي.

تنفسي سیستم:

د یو بې له نښو نښانو پر یو د په تعقیب لمړني اعراض، عبارت له پرنجی، دردناکه توخی، د ډېریدونکي خاښت سره د پوزې او ستوني څخه د مخاط د جدا کېدو او بالاخره د خوند او بوی په مقابل کې د احساس د بایللو څخه دي. ډېر غښتلی تماس یې د ستوني او حنجري د التهاب، د غږېدو د وړتیا بایلل، د خوړو د تېرېدو د وړتیا بایلل او بالاخره د قصباتو التهاب رامینځته کیږي. د افرازاو په

پایله کی په ستونی او قصباتو کې د یوې کاذبې پردې د پیداکیدو او د خپل اصلی شکل د له لاسه ورکولو سره تنفسی لاره په مزمن ډول بندېږي او مرګوني پایلې رامینځته کوي. د غښتلی تماس په نتیجه کې د ستونی او حنجرې د تپونو او د قصباتو نګروز رامینځته کېږي او د دویمې قصباتې نمونیا لامل ګرځي. د خردل په سمیت کې د سږو پر سوب په وصفی ډول نه پیژندل کېږي.

معدی معایي تیوب:

د تماس خځه وروسته د لمړي ساعت په دوران کې بی اشتهايي، کانګې او فوق المعدوی تشوشات پرمختیا مومي. وروسته له ۱ تر ۳ ورځو پورې شونې ده اوبه لرونکې، الکترولیت لرونکې او وینه لرونکې نس ناستی ولیدل شي.

سیستمیک سمیت :

نوموړي اعراض په هغو مریضانو کې چی د نایتروجن او سلفرد خردل د تماس په پایله کی په سرطان اخته شوي وو، د کیموتراپی او رادیوتراپی په واسطه د درملنې په جریان کی پیژندل شوی دي.

بې اشتهايي، زړه بدوالی، کانګې، فوق المعدوی تشوشات، سستي او انحطاط د کم ډوز لپاره ځانګړي شوی اعراض دي. په لوړ ډوز کې عمومي ناآرامي، اسهالات، د وینې تینګوالی، تبه، سرخوږی، د وزن بایلل، د سپینوکرپواتو د تولید انحطاط (لیکوپنیا)، د تنبهاټو زیاتوالی، اختلاجات او مرګ ورسره علاوه کېږي.

لبراتورۍ موندنې:

په ادارار کې د تيودای گلايکول، سيستين او گلوتاتيون اضافی ترکیبات لېدل کېږي. په ابتدایي ډول د سپینو کړيواتو زیاتوالی او تبه باید د عفونت سره مغالطه نشي. وروستی عرض د حجراتو د انتقال، د سپینو کړيواتو د کمبود، د دمویه صفحاتو د کمبود او بالاخره د سرو کړيواتو په کمبود پورې اړه لري.

وروستنی اغیزې:

د پوستکي سطحې تخریب، اونیو او ژور تخریب، میاشتو ته ضرورت لري ترڅو جوړ شي. د خلیج د لمړۍ جگړې په دوران کې نږدې د ۱۰۰۰۰۰ کیمیاوی قربانیانو راپور ورکړل شوی وو، چیرې چې ۱۰٪ یې د تماس څخه وروسته زرمه شول د ۳۰۰۰۰ کسانو له ډلې څخه چې سروې پرې شوی وه ۵۵٪ یې یو څه اندازه معیوبیت لري. په ټولو اخته کسانو کې ۷۸٪ یې له تنفسي اعراضو رنځ وړي چې د قصباتو د التهاب له کبله نفس تنګي (۹،۵٪)، د قصباتو مزمن او تقشع لرونکی التهاب چې د قصباتو آزادېدل هم ورسره مله وی (۸،۸٪)، د گرانولونو (غوټیو) د جوړېدو په پایله کې د تنفسي لارې بندیدل (۴،۸٪) او غیر ریوي تنفسي گډوډي (۵٪) څخه عبارت دي. هغه سروې چې د بلالې له خوا د خلیج د لمړۍ جگړې پر قربانیانو ترسره شوې، ۷۰٪ یې د تنفسي لارې د مشکلاتو (تر ډېره مزمن نفس تنګۍ ته ورته د قصباتو التهاب) ۴۱٪ یې د پوستکي د مشکلاتو (تر ډېره د پوستکي په اغیزمنو ځایو کې د غیر نارمل رنګه موادو تولید)، ۳۲٪ د سترگو د مشکلاتو (تر ډېره د منضمې مزمن التهاب) او ۴۵٪ یې له عصبي نارامیو لکه خفقان او حتی د شخصیت له تغیر څخه کړیږي. اصلاً دغه وروستني یاد شوی مشکلات د لمړۍ نړیوالې جگړې له موندنو سره سرخوړي. د معدوی مزمن التهاب او عصبي نارامیو د را مینځته کیدو شونتیا هم شته. ځینې حالتونه چې

د منظمې د بيارا گرځيدونکې التهاب او د قرنيې قرحات ورسره مله وو او يا تر لسو کلونو پورې د پوستکي جروحات راپور ورکړل شوی دی. د سلفر خردل په مقابل کې لوړ حساسيت هم پېژندل شوی دی.

ځانگړې توکسيکولوژي:

د متحده ايالاتو د روغتيا اداره د سلفر خردل په هکله داسې فکر کوي چې ميوتاجن او د انسان لپاره سرطاني خاصيت لري خو بيا هم د تمباکو، رادون او کرومات په پرتله لږ خطرناک دی. په زړه پورې ډول هيڅ داسې ثبوت شتون نلري چې په ژوو کې د سلفر مستازې سرطاني اغيزې په گوته کړي. په انگليسي زړو عسکرو کې چې په لمړۍ نړيواله جگړه کې يې له سلفر خردل سره تماس درلود، د قصباتي التهاب ځانگړې فريکونسي، په هغو گروپونو کې چې تماس يې درلود او په هغه گروپونو کې چې تماس يې نه درلود ترسترگو شوی ده، کوم چې د هغه کسانو په پرتله دوه ځله ډېره وه چې لاس يا پښه يې پری شوې وه. په همدې ډول په لمړۍ نړيواله جگړه کې پر شاملو امريکايي عسکرو ترسره شوی مطالعې هم عين نتايج درلودل.

پر انسان د سرطاني اغيزو تر ټولو قوي شواهد پر هغه کارگرو د مطالعې پر بنسټ لاسته راغلي دي چې د سلفر خردل د توليد په فابريکو کې يې کار کاوه. د ستوني د کار سينوما يوه ډبريدونکې فريکونسي په انگليسي فابريکو کې (۷ کسان مشاهده شوی پر ۰،۷۵ مشکوک وو)، په جرمني فابريکو کې د قصباتو کار سينوما (۱۱ پر ۵) پداسې حال کې چې دغه قيمت په جاپاني فابريکو کې چې په اوکونوجيما کې يې موقيعت درلود ۳۳ پر ۰،۹ وو. په همدې ډول په هغو

کارگرانو کی چې د جاپان د اوکونوجیما په فابریکه کی یې کارکاوه او په هغه کسانو کې چې په جرمني (Heeresmunitionsanstalt St Georgen) کې یې د زهری موادو د تولید یوه فابریکه ترله د بوون مریضی، د مکعبی حجراتو کارسینوما او باسالیوما راپور ورکړل شوی وو.

په هغه کیموتراپی کې چې نایتروجن خردل په کې شتون درلود د سپینو کریواتو د سرطان د ډېریدونکي فیکونسي سره بنودل شوې وه. په همدې ډول د فنگسي مایکوزس او د ټی حجراتو لیمفوما چې د نایتروجن د خردل پواسطه یی درملنه کیده، پایله یې د مکعبی حجراتو کارسینوما او د پوستکي باسالیوما وپیژندل شوه.

د نایتروجن خردل سره تراتو جنیسیټي، امبریوتوکسیسیټي او فیتوتو کسیسیټي پداسې دوزونو سره مشاهده شوې وه چې د مورلپاره سمی نه وو. دې په پرتله په هغه مطالعاتو کې چې پر مورگانو، مېرو او سویانو ترسره شوي دي داسې نښې چې په هغه دوز چې د مورلپاره سمی وی تراتو جن تاثیرات لري د جاپان د اوکونوجیما د کارکوونکو په اولادو کی هېڅ ډول غیر نارمل موندنې ندي تر سترگو شوي، ولې په جرمني کې د هلکانو په پرتله د ډېرو جینکیانو د پیداکیدو راپور ورکړل شوی وو، چیرې چې په غیر نارمل ډول د سپرم تولید او د سپرم تخریب وموندل شو، کوم چې په نارینه جنین کی د جنسي جینی میوتیشن ته نسبت ورکړل شو. د یادولو وړ ده چې په نوموړې فابریکه کې د سلفر او نایتروجن خردل (۳-HN) لاسته راتلل.

درملنه

انتی دوت

سودیم تیوسلفایټ له فعاله خردل سره په خارج الحجروي برخه کی ښیلي. د دی لپاره چی خردل په وینه کې د ډېرلږوخت لپاره پاته کیږي نو یو لوړ وریډي ډوز (۵۰۰mg/kg) باید تطبیق کړل شي. چارج شوي مالیکولونه د غشا څخه په ټیټه کچه تېریږي نوځکه وریډی تطبیق د موضعي تخریب توان نلري. په موضعي ډول د دای مرکپرول (BAL) کارونه (د مستارډ لیویزیت د تخریب د مخنیوی لپاره) اغیزناکه ده، که چیرې په وخت ترسره شي لیکن د بال په مقابل کې حساسیت زیاتوي.


نور فعالیتونه:

یخوونکي نرم لوشنونه لکه کلامین خاربنت له مینځه وړي. په سیستماتیک ډول باید انتی هستامینونه او انلجریک ورکړل شي. خراب شوی پوستکی باید په معقمو شرایطو کې په پاکو اوبو و مینځل شی او بیا وپوښل شي، باید چې معقم واسلین لرونکی گاز وکارول شي چی پر ټپ د ښلیدو مخنیوی وشي. که چیری د عفونت شواهد شتون ولري باید سلفاسلازین کریم وکارول شي. سترگی هم باید و مینځل شي او د دې لپاره چې د سترگو لیمه ونه ښیلي باید معقم واسلین وکارول شي. د دې لپاره چی د عینېې او عدسیې د ښلیدو او د عینېې د تشنج څخه مخنیوی وشي باید میډریاتیک لرونکی د سترگو څاڅکي (هوماتروپین) وکارول شي. د سترگو د میکروب ضد څاڅکو کارونه هم ضروري ده. توري عینکې د لمړیه مقابل کې ټینسته کموي. د ټوخي آراموونکې کوډین هم ضروري دي. تنفس کېدونکې هوا باید لنډه وی. د تنفسي لارې څخه منظمه څارنه او قصبی

لواژ د دې لپاره چې د کاذبه پردو پواسطه د تنفسي لارې د بندېدو څخه مخنیوی وشي ډېره مرسته کوي. اسهالات داسې حالت رامینځته کوي چې د الکترولیتونو تعویض ته، ضرورت پیدا کېږي.

د ارسنیک عضوی مرکبات

کیمیاوي عاملین صرف د ارسنیک درې ولانسه مرکبات دي کوم چې کیدای شي یو یا دوه فعاله ګروپونه لري چې تر ډېره د یو هلو جن سره تعویض کېږي (شکل ۸ او ۱۴). دواړه ډولونه د تیول سره تعامل کوي. د ارسنیک دوه فعاله ګروپ لرونکي مرکبات په اصلي ډول د مجاور Sulfhydryl ګروپ تراغیزې لاندې راځي ترڅو د ثابت جوړښت لرونکې کړي، چې بالاخره د انزایمونو د قوي نهی کیدو او حجروي سمیت لامل ګرځي. پداسې حال کې چې د ارسنیک یو فعاله ګروپ لرونکي مرکبات په رجعي ډول د تنفسي جهاز د پاسنۍ برخې لپاره مخرش




X = Halو جن

شکل ۸: د پوستکي تخریبوونکو فعاله ارسینیکي موادو عمومي فارمول


دي

پوستکی خرابوونکی ارسینیکلونه


په لمړي نړيواله جگړه کې (MD) Methylchloroarsine او Ethylchloroarsine(ED) په لمړي ځل د جرمني لښکرو له خوا وکارول شول. د لیویزیټ د سنتیز نسبت W.L.Lewis ته کیږي. نوموړي مواد په لمړۍ نړيواله جگړه کې ونه کارول شول، لیکن د دویمې نړيوالې جگړې په ترڅ کې د جاپان لخوا په چین کې وکارول شول. د پخواني شوروي په ذخیرو کې د دې لپاره چي د ویلي کیدو ټکی یې ښکته شي او په کراره تخریب شي د سلفرد خردل سره په مخلوط ډول شتون لري. تخنیکي لیویزیټ توربخن بنفش یا شین رنگ، د مفره مایع په شکل او جرانیم ته ورته بوی لري. خالص مرکب یې بې رنگه، تقریباً بې بویه اوبې خونده دی. (جدول ۴)



کلورو وینایل ارسین دای کلوراید (لیویزیټ ؛ L)



میتایل ارسین دای کلوراید (MD)




ایتایل ارسین دای کلوراید (ED)

شکل ۹: دځینو پوستکي تخریبوونکو ارسینیکي موادو کیمیاوي جوړښت

توکسیکوکنتیک:

لیویزیت په انساجو کې نفوذ کوی، تخریبوي یې، په چټکۍ سره ځان سیستمیک جریان ته رسوي او په پایله کې د سیستمیک سمیت لامل ګرځي. لیویزیت په آبی محیط کې په چټکۍ سره دای هایدروکساید ته تجزیه کیږي او وروسته بیا په یو ډبر لیپوفیلک او سمی اکساید باندې بدلېږي (شکل ۱۰).




د سلفرخردل په پرتله (۲۰-۳۰ دقیقې)، د لیویزیت یو څاڅکی له ۳ څخه تر ۵ دقیقو پورې د انسان پر مټ پاته کیږي. د تبخیر د عمليې پواسطه یی ورکیدل (<۱۰٪) نسبت سلفرخردل ته (۸۰٪) ډېر کم دی. د انسان په پوستکي کې د نښه شوی لیویزیت د نصبولوپه نتیجه کې As^{3+} په اپیدرمس کې نسبت درمس ته زیات پیداشو او تر ډېره په وېښتو او د وېښتانو په پیاز کې تقسیم شوی وو. نوکان نسبت د دوی کراتیني جوړښت ته په زیاته پیمانه د ارسنیک د ذخیره کولو څرګندوی وو.

په سویانو کې د لیویزیت تحت الجلدی زرق څخه ۴ ساعته وروسته په سږو، ینه او پښتورگو کې د ارسنیک د غلظت ګراف تولیدیږي. نوموړی غلظت نسبت

وینې، نخاع، خصیو او پوستکي ته ۵ تر ۱۰ ځله لوړ وو. په هغو غړو کې چې د وینې د جریان په مقابل کې ممانعت کوي، لکه عصبي مرکزي سیستم او خصیې د ارسنیک لوړ غلظت په کراره په کې مینځ ته راځي (له زرق څخه ۱۲ تر ۲۴ ساعته وروسته). د لیویزیت د ارسنیک تصفیه د $2.4 \text{ mg/kg (LD}_0\text{)}$ د زرق څخه وروسته 112 ml/min/kg اود $3.5 \text{ mg/kg (LD}_0\text{)}$ د زرق څخه وروسته 129 mg/min/kg ټاکل شوې ده، په ترتیب سره د توزیع حجم بې ۷،۷ او 12.7 L/kg او نیم عمر یې ۵۴،۷ او ۷۵ ساعته دی.

سمیت او د عمل میکانیزم

د لیویزیت داغېز د میکانیزم په هکله بنسټیز معلومات په (جدول ۸) کې ښودل شوی دی. د جلدی لارې د سلفرڅردل په نسبت د لیویزیت مرګونی سمیت قوي دی. لیویزیت او غیرعضوی درې ولانسه ارسنیک له ارجاع شوی لیپوټیک اسید سره چې د اکسیدیتو میتابولیزم د دوو انزایمونو Pyruvate dehydrogenase (PDH) او α -dehydrogenase (KGDH) ketoglutarate د فعالیت لپاره ضروري دی، یوه ثابته شپږضلعي کړۍ جوړوي (شکل ۱۱). په وینه کې د پیرووات د لوړې کچې له کبله، د ارجاع شوی پیریدین نیوکلوتاید او اډینوزین ترای فاسفیت د تولید د کمښت له کبله او د ګلوکونیوجنیزس د عملیې د نهې کېدو له کبله په سیتریک اسید سایکل کې د کاربوهایدریتو له ننوتلو څخه مخنیوی کېږي. لیویزیت یو شعریوي زهر دی چې د اندوتلیل تخریب او اډیما، په انساجو کې په لوړه کچه د وزیکلونو مینځته راتلل چې مایعات او پروتین ولری، د وینې د ټینګېدو، ضعف او بالاخره د لیویزیت شاک لامل ګرځي.



د تسمم اعراض

د سلفر خردل په پرتله که چیرې د لیویزیت یو څاڅکی پر پوستکي ولویږي د ۱۵ څخه د ۳۰ دقیقو په ترڅ کې قوي خارښت، غښتلی سوروالی او د ۱۲ ساعتو په ترڅ کې تناکې رامینځته کوي. په سوروالي، پرسوب، ناآرامی او د تناکو په اندازه کې ډېروالی ترڅلورمې ورځې رامینځته کیږي او وروسته د دریو راتلونکو ورځو په ترڅ کې بی له کوم توپیره پاته کیږي. په یو نواخت ډول ښه والی د پوره جوړیدنې وروسته د څلورو اونیو په ترڅ کې مینځ ته راځي. ډېرې تناکې د ۱ څخه تر ۳ ورځو په ترڅ کې چووي. په تناکو کې شته مواد روښانه، پاک او ژیره ارسنیک لرونکې مایع ده. د سلفر د خردل په پرتله په پوستکي کې غیرنارمل رنګ نه ترسترگو کیږي.

جدول ۸: د لیویزیت سمیت
پارامتر

وریدی LD _{۵۰} (mg/kg)	
سوی یا خرگوش	
د خولې له لارې LD _{۵۰} (mg/kg)	
مړه	
د پوستکي له لارې LD _{۵۰} (mg/kg)	
مړه	
انسان (اټکلي)	
د ائشاقي لارې LC _{۵۰} (mgXmin/m ^۲)	
موږک	
مړه	۱۲۰۰-۱۴۰۰
انسان (اټکلي)	
تر ټولو کم اغېز لرونکی غلظت (mgXmin/m ^۲) انسان لپاره	
د پوستکي سوروالی (mg/cm ^۲)	
تټاکه کیدل (mg/cm ^۲)	
	۰،۲
د سترګې د ملتحمې التهاب	۰،۰۱ (۱۵ دقیقې)
تر ټولو کم وژونکی دوز (د ائشاقي لارې ؛ mg/m ^۲ ؛ ۳۰ دقیقې)	
LC _{۵۰} : هغه وخت په گوته کوي چې په هغه کې پنځوس سلنه وژونکی غلظت تولیدیږي	

سترګې

د لیویزیت سره تماس په بیرې بې له دې چې د اعراضو کوم انټروال ولري، د سترگو خارښت رامینځته کوي. نتیجتاً په بیرې د لمړنیو مرستو هڅه د دې لامل ګرځي چې د خردل په پرتله یې خطر کم شي. بیا هم د تخریب او د جوړیدو دوران یې ګرځندۍ او پتالوژي یې د خردل پواسطه د تخریب سره ډېره ورته ده.

تنفسي لاره

وروسته له انشاق کولو څخه ډېر زړز تخریش، پرنجی، ټوخی، سرخوږی، زړه بدۍ او کانګې رامینځته کیږي. کمزوري او په ملا کې درد شو ورځې پاته کیږي. د شدید تماس څخه وروسته د قصابو د کاذبه پردې جوړیدل، سینه بغل او د قصابو د لمړۍ طبقې نګروز را مینځ ته کیږي. په سږو کې د شته شعریه رګونو داندو تلیا طبقه هم په غښتلی تسمم کې اخته کیږي.

سیستمیک سمیت

حيوانی تجارب داسې ښیي چې وروسته له تماس څخه د فشار تیتوالی، شاک، د زړه د فعالیتونو کموالی، معدي معایې ګډوډي، زړه بدۍ، کانګې، نس ناستی او د ښې او د پښتورګو ګډوډي را مینځته کیږي. په حیواناتو کې په سیستمیک ډول د لیویزیت د اخیستلو وروسته په سمیت کې د قصابو اخته کیدل او د سږو پړسیدل ترسترګو شوي دي.

د میتایل ډای کلوروآرسین له سمیت وروسته ناآرامی، پریشاني، د نهایتو بی حسی، د یادښت (حافظې) له لاسه تلل، د شعور بایلل او بالاخره ګیچي او کوما رامینځته کیږي. په ۱۹۹۲ کال کې چی یو سړي د پوستکي له لارې فینایل ډای کلوروآرسین اخیستی وو، وروسته له څو ساعتو یې په تماس لرونکي ښي لاس کې ټپاکې او وروسته له دوو ورځو څخه سختې کانګې، دستونې او سپک زیږي

راپور ورکول شو. نوموړې کانګې تريوې اونۍ، دستونې تر دوه اونيو او زيرې تر دريو اونيو پورې دوام پيدا کوي. د پوستکي تخريب د لسو ورځو وروسته جوړېږي. د فينايل دای کلوروارسين په جلدي تسمم کې، مسموم د دريو کلونو لپاره له بيا راگرځيدونکې د ستونو څخه رنځ وړي. د پوستکي له لارې دوه ملی ليتره ليويزيت، د وژونکي سستمیک سميت لامل راپور ورکړل شوی ده.

ځانګړي توکسيکولوژي


هغه مطالعات چې پرميو تاجنيسټي، تراتوجنيسټي او کارسينوجنيسټي ترسره شوی دی منفي پایلې يې درلودلې. او په پرتله يې غير عضوی ارسينیکلونه د انسان لپاره سرطاني (د سږو او پوستکي د اپيدرم د مکعبی او مسطح قاعده لرونکو حجراتو کارسينوما او د ښې مظنون سرطان) ګڼل کيږي. په هغه کارګرانو کې چې د جاپان د اوکونوجيما په فابريکه کې چې د نورو کيمياوی عاملينو په مينځ کې يې ليويزيت هم توليد او، وروسته په لويه کچه د تنفسي او هضمي لارې د سرطان او د پوستکي د نيوپلازيا له کبله په کېنې مرګ ژوبله وليدل شوه. په ۱۹۸۸ کال کې د امريکا د متحده ايالتونو د روغتيا ادارې د ځينو شواهدو پر بنسټ داسې ښوودلې ده چې ليويزيت کيدای شي سرطاني اغيزې ولري.

د درملنې کچه

فارمکوتراپي (د درملو په واسطه درملنه)


د دوه فعاله ګروپونو لرونکی د ارسنيک له مرکباتو سره، ۲،۳ دای مرکپتوپروپانول (دای مرکپرول يا بال) پنځه کره بيز مرکبات جوړوي. دغه کرې د

لیپو بیک اسید سره شپړ کړه ییز مرکب په پرتله ډېره ثابته ده. په نتیجه کې یې د سمی موادو خوځښت، د اطراح ډېرښت او د انزایم د نهی کیدو څخه مخنیوی مینځته راځي (شکل ۱۲). په قوي تسمم کې د گډېدې د اړونده اعراضو تر ورکیدو پورې 3mg/kg عضلي زرق هر څلور ساعته بعد ورکړل شي په دویمه او دریمه ورځ باید $200-300\text{mg/day}$ او له څلورمې تر دوولسمې ورځې ورته $100-200\text{mg/day}$ ورکړل شي. د سترگو د کرارېدو لپاره $5-3\%$ ملهم او د پوستکي تخریب د جوړېدا لپاره $10-5\%$ ملهم کارول کیږي.



د وریدي او فمي مستحضراتو د نه لرلو، نسبتاً لوړ سمیت او په دماغ کې د ارسنیک د لوړې کچې د تولیدېدو له کبله داسې څیړنې روانې دي ترڅو د بال لپاره بدیل ومومي. تر ټولو پیاوړی بدیل یې چی د بال په پرتله 10 تر 20 ځله کم سمی او ډېرمنحل دي عبارت له $2,3\text{Di mercaptopropane}$ او $2,3\text{dimercaptosuccinic acid (DMSA)}$ څخه دی. دواړه انتي دوتونه د خولې او وریدي لارې تطبیق کیدلای شي، دواړه په حیواناتو کې پرته له دې چې په دماغ کې تراکم وکړي، د لیو بیټ په تسمم کې اغیزمن دي. د بال په شمول ټول دای تیولونه په سیستمیک ډول د بال د موضعی سمیت په

تداوي کې بې اغيزې دي. موضعي درملنه داسې بڼې چې دای تيولونو لکه بال په ليوپفيل کيدو سره بې اغيزې زياتيږي.



نورې درملنې


د گلوکوکورتيکويډونو پواسطه د مخرش کونکو د سمیت له کبله د ریوي اذیما درملنه مبهمه ده. د گلوکوکورتيکويډونو سره درملنه یوازې په هغه صورت کې اغېزناکه ده چې د تماس څخه وروسته زرتزره په لوړ ډوز پرته له کوم څرنگوالي څخه ورکړل شي. د تنفسي څارښت کوونکیو پر ضد درملنه د خلاصې تنفسي لارې او زرقې لارې صورت نیسي. او باید د فزیکي فشار د واردولو څخه ډډه وشي. په هغه فضا کې چې ۶۰٪ اکسیجن ولري، په فشار سره تنفس د اکسیجن پواسطه د انساجو له ارواء سره مرسته کوي. د تنفسي لارې پاکول ضروري دی او د ټوخي د کنټرول لپاره باید کوډین وکارول شي.

دارسنيک مخرش مواد


دای فیناییل کلوروآرسین (DA, Clarck I) (۱۹۱۷) او دای فیناییل سیانوارسین (DC, Clarck II) (۱۹۱۸) په لمړي ځل د جرمني عسکرو لخوا وکارول شول (شکل ۱۴). د تودوخې پواسطه آزادیږي او بخارات یې په ډېر نازک ایروزول کې متراکم کیدل نو ځکه د وخت د ګازی ماسکونو څخه تیریدل.

د کلارک نوم له Chlor-arsen-kampfstoff او یا کلورین ارسنیک څخه اخیستل شوی ده. دای فیناییل امین کلوروآرسین (DM) چې د Adamsite یا د هغه عالم په نوم چې د نوموړي مرکب د کشف مسئول وو هم نومول شوی دی. نوموړی مرکب د امریکا په متحده ایالتونو کې سنتیز شو ولې تر لمړۍ نړیوالې جګړې ونه کارول شو.


رنگ یې په خالصیت پورې اړه لري DA سپین څخه تر نسواري رنگ توپیر کوي، DC له سپین څخه تر ګلابي او DM له زړه څخه تر شنه رنګه پوږو په ډول شتون لري. د DC بوی لکه هوږه یا ترخو بادامو ته ورته دی او نور دوه یې بې بویه دي (جدول ۴).



دای فینایل کلورو ارسین
(Clark I ; DA)



دای فینایل سیانو ارسین
(Clark II ; DC)



۱۰-کلورو-۵، ۱۰-دای هایدرو فینارسازین
(Adamsite; DM)

شکل ۱۴: دځینو مخرشو ارسنیکي موادو کیمیاوي جوړښت

توکسیکوکنیتیک

نوموړي مواد د پوستکي او مخاطي غشا پواسطه په چټکۍ سره اخیستل کیږي، اعراض یې له ثانیو څخه نیولې تر دقیقو پورې وخت کې څرگندیږي. د توزیع او استقلال په باره کې یې شمیرې وجود نلري.

سمیت د عمل میکانیزم او د تسمم نښې نښانې

نوموړی مواد د دې لپاره چې خاړښت رامینځته کړي د ایریزول په ډول کارېږي. د انساجو تخریب او مرګ د مخړش غلظت په ۵۰۰ ځله لوړ غلظت کې رامینځته کېږي او په آزاده فضا کې ډېر کم دی. د عمل میکانیزم یی معلوم ندی. ولی د حجروي موادو د تیول له ګروپ سره پر تعامل یې ګمان کېږي. په پخواني مؤخزونو کې د درد د آخزو هڅونه هم وړاندیز شوې ده. له تماس نه وروسته په ثانیو او دقیقو کې شدید پرنجی، په پوزه اوستوني کې سواى، سخت سرخوږی چې د پوزې له پاسه تشو کې د مخاطی غشاء د احتقان له کبله مینځ ته راځي، د غاښونو، ژامې او غوږونو کې درد، زړه بدی او کانګې لیدل کېږي. سترګې لږ حساسې دي وروسته د تماس له پرې کیدو څخه اعراض له ۳۰ دقیقو څخه نیولې تر څو ساعتونو پورې شتون لري. په لوړه کچه انشاق یې په سینه کې تنګوالی، اضطرابات، د سترنوم شاته درد چې کله کله ځنګلو او ملا ته هم سرایت کوي او د سږو اذیما ورسره علاوه کوي. په سیستمیک ډول یې تسمم د عمومي کمزوري، وزن بایللو، ناکراري، ټیټ فشار، د غړو سخت درد، پر حرکت نه کنترول، په نهایتو کې بې حسي، فلج، د شعور له لاسه ورکولو او د پښتورګو د تخریب پربنسټ پیژندل کېږي. د غلیظه موادو سره تماس په بېره موضعي سوروالی، اذیما، ټناکې او درد تولیدوي. د پوستکي تخریب د څومیاشتو وروسته بدتر کېږي. په لوړه کچه حساسیت شتون لري او د منظمې مزمن التهاب هم راپور ورکول شوی ده.

جدول ۹: د ځینو ارسنیکي مخړش موادو سمیت		
پارامتر	DA	DC

	۱۵۰۰	(mgXmin/m ^۲) LCt _{۵۰}
	۱۰۰۰۰	
	۱۵۰۰۰	
۲۰	۱۲ (۱۵ دقیق)	(mg/m ^۳) ICt _{۵۰}
	۸ (۲۰ دقیق)	(۱۵ دقیق)
۳۰		
		۰.۵ دقیق ۲۲ (یو دقیقه)
	۱.۰	د تحمل وړ اعظمي ډوز (mg/m ^۳)
۰.۴	۰.۲۵	
	۰.۱	تر ټولو کم مخرش ډوز (mg/m ^۳)
۰.۱	۰.۰۵	
LCt _{۵۰} : هغه وخت په گوته کوي چې په هغه کې پنځوس سلنه وژونکی غلظت تولیدیږي		
ICt _{۵۰} : هغه وخت په گوته کوي چې په هغه کې پنځوس سلنه ناتوانونکی غلظت تولیدیږي		


درملنه

خارښت، زړه بدې او کانګې بیا راګرځیدونکي دي. ځانګړې انتی دوت نلري. دای تیولونه د سږو د اذیما په تداوی کې رول نلري (د لیویزیت د تسمم تداوی وګوري)

اوبنګی بهوونکې

کلورواستوفینون (CN) د امریکا په متحده ایالتونو کې جوړ شو ولې په لمړۍ نړیواله جګړه کې ونه کاریده. په ۱۹۲۸ کی کارسون او ستاکتون، ۲- دای کلوروبنزال مالونو نایتریل (CS) سنتیز او د دوی خواص یی تشریح کړل. د

نوموړي مرکب تولید د انگلیسانو د هغو هڅو پایله ده چې غوښتل یې په ۱۹۵۰ کې CN تعویض کړي (شکل ۱۵). د CN لاسي سپرې په مختلفو هیوادونو کې بازار ته را وتلي دی او د شخصي ساتنې لپاره کارول کېږي. په ویتنام کې CS په لوړه کچه د امریکایي عسکرو لخوا وکارول شو.



توکسیکوکینیتیک

CN او CS دواړه سپین پوډر دي او په ترتیب سره لمړۍ بې منې ته ورته او دویم بې مرچ ته ورته سوزوونکی بوی لري (جدول ۴). غالباً د تنفسی لارې بدن ته داخلېږي ولی بیا هم ځینې مرکبات یې د مخاطي افرازاتو سره تیرېږي. CN ډبرلیپوفیل او هیدرولایزس ته تیار دی.

وروسته له تماس څخه د هندي خوږ په وینه کې ډېر ژر بې له کوم تغیره پیدا کېږي. د CS اصلي میتابولیت اورتوکلوروبنزایل مالونونایتریل (CBM) او اورتوکلوروبنزالدهاید (CBA) دي، چې وروستنی یې په ادرار کې د اورتوکلورهیپوریک اسید په شکل پیدا کېږي. د CS ، CBA او CBM نیمه

عمر له یوې دقیقې څخه کم دی. وروسته له تطبیق څخه %۷۵، CS له هیدرولایز وروسته په CBA او %۱۵ یې د ارجاع په نتیجه کې په CBM بدلېږي او میتابولیزم یې تر ډېره په یښې پورې تړلی دی. د هیدرولایز په نتیجه کې لاسته راغلی مالونونایتريل وروسته په کاربن دای اکساید او سیاناید تجزیه کېږي. د CS له انشاق څخه وروسته د سیاناید غلظت په غیر مرتبط ډول پاته کېږي لیکن په سویانو کې د زرقي تطبیق څخه وروسته لوړ غلظت سیاناید راپور ورکړل شوی ده.

سمیت او د عمل میکانیزم

په ټوله کې د CN په نسبت د CS مخړش ډوز تر سمې ډوز لوړ دی (جدول ۱۰). CS او CN د S_N2 شکل له اکایل نسلوونکي عاملین دي. د حجرې زیات شمیر فعاله محتویات، تیولونه یا امینونه دي. CS د برادۍ کینین د آزادیدو لامل ګرځي او ځکه د درد او خارښت لامل ګرځي. د اوبنکو بهوونکو په باره کې داسې فکر کېږي چې د ارجاع کیدو په اساس عمل کوي او خپله NADH تحمض کوي. د NADH قوي اکسیدیشن د حجروي اکسیدو-ریدوکتاز فعالیت او د انرژي میتابولیزم قطع کوي. CS له ګلوتاتیون، سیستیین او دای تیوتریتول سره ډېر په اشتیاق او له لیپوئیک اسید سره په چټکۍ تعامل کوي.

جدول ۱۰: د ځینو اوبنکې بهوونکو سمیت	
پارامتر	CS

وريدي LD ₅₀ (mg/kg)	
۳۵-۴۱	مېرۍ
دخولې له لارې LD ₅₀ (mg/kg)	
۱۲۴۸ (نارینه)	۱۲۷ مېرۍ
۱۳۳۲ (ښځينه)	
د پريتوان له لارې LD ₅₀ (mg/kg)	
۳۵-۳۲	موږک
۴۸	
د انشافي لارې LC ₅₀ (mgXmin/m ^۲)	
۳۲۰۰۰-۶۷۰۰۰	موږک
۷۳۵۰-۱۸۲۰۰	
۲۳۳۳۰-۳۷۰۰ مېرۍ	۸۸۸۴۸-۲۲۰۰۰ اغيز لرونکی
غلظتونه ؛ انسان	
۰.۴-۰.۱۵ (mg/m ^۳)	تر ټولو کم مخرش
۰.۰۰۴	
۱.۵-۰.۴ (mg/m ^۳)	تر ټولو ډېر د تحمل وړ
۵-۱	
۸۰ ^b (mgXmin/m ^۳)	LC ₅₀
۲۰۰	LC ₅₀ (mgXmin/m ^۳) (تخمیني)
۲۵۰	LC ₅₀ (mgXmin/m ^۳) ^a (تخمیني)
۱۱۰۰-۴۰۰۰	
a: LC ₅₀ : هغه وخت په گوته کوي چې په هغه کې پنځوس سلنه وژونکی غلظت تولیدیږي.	
b: LC ₅₀ : هغه وخت په گوته کوي چې په هغه کې پنځوس سلنه ناتوانونکی غلظت تولیدیږي.	

کلینيکي اعراض

د سترگو او د تنفسي سيستم د پاسنۍ برخې خاړښت د تماس نه ۳۰-۱۰ ثانيې وروسته څرگندېږي. ډېرېدونکې ډوز په سترگو، پوزه او خوله کې سوزوونکې او چيچونکې درد مينځته راوړي، او له دې د پاسه د منظمې التهاب، د لمبو تشنج او په ليد کې گډوډي، اوښکې، پرنجې او د پوزې بهيدل رامینځته کوي. ټوخی، په وچه غاړه او قصباتو کې د افرازاتو ډېرښت، زړه بدوالی، کانگې او سينه بندۍ هم پرمختگ کوي. بې تجربې کسان شايد له ځانه د غبرگون په ډول اضطراب او هيجان ونښي. ډېر اعراض د تماس د پرې کېدو څخه صرف څو دقيقې وروسته شتون لري. هغه نښې نښانې چې په سترگو کې پيدا کېږي تر ۳۰ دقيقو پورې پاته کېږي.

په انسان کې د CS په وړاندې په لنډ ډول (۴۵ دقيقې) تحمل راپور ورکړل شوی ده. په پوستکي کې د يوه سوزوونکې حساسيت او په اغيزمنو برخو کې د يو چيچونکي درد د پرمختگ راپور ورکړل شويده. په لوړ ډوز سره په پوستکي کې سوروالی او تناکې رامینځ ته کېږي چې په لمدو او گرمه هوا کې ډېر غښتلی وي. په لوړ ډوز سره يې انشاق شونې ده چې د سږو د اذيما لامل شي. له نږدې واټن څخه يې سپری کول او يا له هغه کار ترېج څخه يې راوتل چې CS او يا CN ولري، په سترگو کې د قرنيې د ټپونو، د ټولې سترگې د سخت زخمي کيدو او کېدای شي دايمي پوندوالی رامینځته کړي چې دغه سميت د CN په صورت کې ډېر غښتلی وي. دواړه يې د دوامدار تماس په نتيجه کې د الرژيک غبرگون سره تړلی حساسيت او د پوستکي د التهاب لامل گرځي.

ځانگړې توکسيکولوژي

Ames په تست او يا د چينايي مږو د تخمدان په حجرو ترسره شوي لابراتواري هڅو کې داسې شواهد چې د CN او CS پر ميوتاجنيکو او جينوتوکسيکو

اغیزو دلالت وکړي ندی لیدل شوي البته د حجرې وژونکي ډوز څخه پرته همدارنگه په مورکانونو او مېرو کې د CN سرطان تولیدوونکې شواهد هم ندي ترسترگو شوي. ولې د تیونو د غدو په ادینوما کې یو ځانگړی ډېرښت ولیدل شو. لیکن د دې په پرتله د عین نژاد دنورو حیواناتو د کنترول په ډله کې نوموړی قیمت په غیر معمولي ډول ټیټ وو. په هغه مورکانونو کې چې په موضعي ډول د CN پواسطه تداوي شوي وو، د دای میتایل بنزانتراسین له امله په کې د پوستکي د پورتنۍ برخې د پاپیلوما ډېروالی پیداشوی وو. د CN په ۰.۳-۳mmol/lit غلظت کې د مورک د جنین ساتل، د عصب گډوډتیا د پرمختگ لامل شول.

هیڅ داسې شواهد چې پر DNA د CS د نښلیدلو څرگندوی وي ندي پیداشوي، لیکن په لوړ ډوز سره د ۷۷۹ چینایی مېرو په حجراتو، د چینایی مېرو د تخمدان په حجراتو او د مورک د لمفوما په حجراتو کې میوتا جنیستي ولیدل شوه. همدارنگه د حجرې د Spindle په دستگاه پورې یې نښلیدل هم تر بحث لاندې ونیول شول.

د CS د انشاق له کبله په مورکانونو، مېرو او هندي خوگانو کې د سرطان هیڅ ډول شواهد ندي ترلاسه شوي. په مورکانونو او مېرو کې د تراتوجنیسیتی کوم معلومات لاسته راغلل.

همدارنگه په هغه خلکو کې چې د CS سره یې دوامداره تماس درلود د اولاد د سقط، بی مودې ولادت او د ولادي سوء تشکلاتو لوړه کچه نده لیدل شوي.

د درملنې امکانات

د تماس د پرې کیدو څخه وروسته خاړښت هم له مینځه ځي (د تهوویی پواسطه). وروسته له غښتلي تماس څخه د سترگو مینځل اړین دي. هغه مواد چې په سترگو

لیدل کیږي باید په کافي مقدار اوبو سره پاک کړل شي. هېڅوکلورایت نوموړي حالت نور هم پیچلی کوي. د ټول ځان مینځل بدن ته د نوموړو موادو داخلیدل نور هم زیاتوي او شونې ده چې د قوي خارش او سوزوونکي حساسیت لامل شي. د سږو اذیما داسې باید تداوي شي لکه د لیویزیت د سمیت په درملنه کې چې څنگه لارښوونه شویده.

بیولوژیکی عاملین

عمومی توکسیکولوژی

ترتیلو لمړي مواد چی د ښکارلپاره کارېدل او د کوم قراداد پر بنسټ منع شوی هم نه وو عبارت له هغه موادو څخه دي چی بیولوژیکی منبع لري د دوی کارونه د تاریخ څخه پخوانیو وختونو سره سرخوري. په ۱۹۷۲ کال ډېرو هیوادونو د بیولوژیکو وسلو کنوانسیون یا (BWC) چی د بکتریولوژیکو موادو او زهري وسلو د انکشاف، تولید، ذخیره کول یې منع او د دوی د ویجاړتیا غوښتنه یې کوله لاسلیک کړ. د نوموړی تړون پر بنسټ د جگړه ایزو موخو لپاره د بیولوژیکی موادو ذخیره کول او همدارنگه د همدې موخو لپاره پرې څیړنې هم منع شويدي. بیا هم د دغه تاریخي تړون د شتون سره سره د بیولوژیکی موادو په برخه کي د پرمختیا په موخه په ډېرو هیوادونو کې څیړنې روانې دي. په ۱۹۷۹ کال په Sverdlovsk کی د انتراکس تصادفی خپریدل او د عراق د جگړه ایز بیولوژیک پروگرام څخه معلومات په ۱۹۹۵ کال کې ملگرو ملتونو ته په لاس ورغلل، چی دواړه یی په هغو هیوادونو کې چی BWC یې لاسلیک کړی وو، ښه مثالونه دي. پرته له دې وروسته له هغه چی په توکیو کې سارین او سیاناید وکارول شول، دا معلومه شوه چی بیولوژیکی مواد د Aum Shinrikyo پواسطه هم تولیدیږي. دا څرگندوي چی د بیولوژیکی موادو د کنترول او بې وسلې کولو لپاره د دوی د اغیزو، ساتنې، وقایې، پیژندنې او درملنې په هکله معلومات او زده کړې ډېرې اړینې دي.

تاریخچه

لمړنۍ راپور چې د نوموړو موادو یادونه کوي، په سوریه کې د څه گانو د سمیت لپاره د غنمو د ارگوت کارونه او د سولن لخوا په شپږمه پیړۍ کې د کریسا د محاصرې په خاطر د یو مسهله بوتي کارونه ده. په ۱۳۴۲ کال د تاتار د فوځ په هکله داسې راپور ورکړل شویده چې د کافا (د کریمیا په فیوډوزیا) د محاصرې په ترڅ کې یې داسې مړې چې ټپونه یې لرل د ښار په دېوالونو راځوړند شوی وو. د نوموړي طاعون شکله اپیدیمي تر ډېره خپره شوه او هغه خلک چې دفاع یې کوله تسلیمیدو ته یې مجبورول. هغه اغیزمنو خلکو چې کافا یې پرېښوده کیدای شي چې د تور مرگ پانډمي یې ټولې اروپاته غزولې وي. جیفری امهرست د فرانسې او هندوستان د جنگ (۱۷۲۷-۱۷۵۴) په دوران کې امریکایی اصله وفاداره عسکر سره له هغو کمپلو چې له smallpox ډکې وې فرانسې ته اماده کړل. امریکایی الاصله عسکرو ځانونه د کاریلون د کلا د اپیدمۍ د قربانیانو مرستې ته ټاکلي وو چې په نتیجه کې یې کلا د انگلیسانو لاسته وراغله.

په ۱۹۴۰ کال کې یو اپیدیمیک افت د جاپانی الوتکو په واسطه په چین او مانچوریا کې مینځته راغی چې لامل یې په افت ککړو ورگو شتون وو. په ۱۹۴۵ کال کې د یو جاپانی پرواګرام په ترڅ کې ۴۰۰ کلوګرامه انتراکس د دې لپاره ذخیره شول ترڅو په یوه ځانګړي بم کې یې و کاروي. په ۱۹۴۳ کې متحده ایالتونو د بیولوژیکي موادو په جګړه ایزه کارونه څیړنې پیل کړې. نوموړی پروګرام په ۱۹۲۳ د جمهور رئیس نیکسن لخوا ودرول شو او د انتراکس د باسیل د سپور، بوتلین توکسین، فرانسیسلا تولرانسیس، کوکسیلا بورنیتی، ونزیلیان اکوین انسفالیتیس ویروس، بروسیلا سویس اوستافیلوکوکل انترتوکسین یې په شمول ټولې ذخیرې په ۱۹۷۲-۱۹۷۱ کې له مینځه لاړې.

له ۱۹۹۱ څخه تر ۱۹۹۵ کلونو کې د ملګرو ملتو د ګمان پر بنسټ دا معلومه شوه چې عراق په ټوله کې ۱۹۰۰۰ لیتره د بوتلین غلیظ توکسین، ۸۵۰۰ لیتره د انتراکس غلیظ توکسین او ۲۲۰۰۰ لیتره افلاتوکسین تولید کړي دي.

ترمینالوژي

ډېرې باکټریاوې، فنجیان، ویروسونه، د رکتسیا عاملین او توکسینونه د بیولوژیکي جنګي وسلو په ادبیاتو کې راغلي دي. په نوموړې یاد شویو کې تر ډېره د انتراکس د باسیل سپورونه (انتراکس)، بوتلین توکسین (بوتلیزم)، یرسینیا پستیس (طاعون)، ریسین، ستافیلوکوکل انټروتوکسین بی او ونزویلیان اکوین انسفالیتیس ویروس شامل دي (جدول ۱۱، ۱۲).

جدول ۱۱: په لابرانوارې مورګانو کې د انتخابي سمومو پرتله ایزه وژنه		
عامل	LD ₅₀ (μg/kg ip)	مالیکولی وزن
منبع		

١٥٠٠٠		٠,٠٠١	بو تلي نوم توکسين
٥٥٠٠		٠,٠٠٢	شيگاتوکسين
١٥٠٠٠		٠,٠٠٢	تيتانوس توکسين
٦٥٠٠	بوتي (rosary pea)	٠,٠٤	ا برين
٥٢٠٠		٠,١	ديفترياتوکسين
٣٤٠٠	بحري ډاينوفلاجيل	٠,١	مايتو توکسين
٢٧٠٠		٠,١٥	پالي توکسين
١٠٠٠		٠,٤	سيگواتوکسين
٨٠٠٠		٠,٢	تکستيلو توکسين
٤٠٠٠-٣٥٠٠		٠,٥-٠,١	C.perfingen توکسين
			بکټريوم
٥٣٩		٢,٠	بتراکو توکسين
٢٤٠٠		٣,٠	ريسين
١٥٠٠		٥,٠	اوميگا کونو توکسين
٤٢٠٠		٥,٠	تايپوکسين
٣١٩		٨,٠	تترادو توکسين
٨٠٠٠		٩,٠	الفا-تيتيوس توکسين
٢٩٩	بحري (انشاقی لاری ۲)	١٠	ساکسی توکسين
			ډاينوفلاجيل
٢٨٤٩٤		٢٧	ستافيلو کوكس انټرو توکسين
	(LD ₅₀ ډيپيکوگرام په شاوخوا کې)		ريزوس/ايروزول
٥٠٠	شنه آبي الجيان	٥٠	اناتوکسين A(S)

مايكروسيستين	۵۰	۹۹۴	شنه آبي الجيان
اكونيتين	۱۰۰	۲۴۷	
T۲توكسين	۱۲۱۰	۴۲۲	فنگسي
مايكوتوكسينونه			

جدول ۱۲: د مختلفو ویولویزیکي عاملینو ځانګړتیاوې							
عامل/مرض	د خپرېدو لار	له انسان غځه	منتن کوونکې ډوز	د تفریح دوره	د ناروغۍ دوام	وژنه	ثبات
د انټراکس باسیل / انشاقې انټراکس	هوا کې سپوږنه	نه (په استثنا د جلدې)	۸-۱۰۰۰۰ سپوږنه	۱-۵ ورځې	۳-۵ ورځې	لوړه	ډېر ثابت
ویبریو کولرا / ولرا	د خوړو او اوبو خرابیدل او هوا	کم	۱۵۰ ارګانیزم ه	۱۲ ساعته تر ۶ ورځو	یوه اونۍ	تیته	په هوا او تازه اوبو کې غیر ثابت او په مالکینو اوبو کې ثابت
یرسینیا پستس / طاعون	هوا	ډېر	۱۰۰۰ ارګانیزم ه	۱-۳ ورځې	۱-۶ ورځو	لوړه که تر ۱۲-۲۴ ساعته تداوی نه شي	یو کال خاوره کې ۲۷۰ ورځې جسم کې ۱۱۸ LD _{۵۰} دفاع نکوي
فرانسېسلاتو لارنسېس / تولارېمیا	هوا	نه	۵۰-۱۰۰ ارګانیزم ه	۱-۱۰ ورځې	دوه اونۍ	بې له درملنې متوسطه	په لمدوځایو کې تر میاشتو وړاندې ۸۰ سلنه مقاومت
کوکزیلا بورنیټی / fever	د خوړو او اوبو خرابیدل او هوا	کم	۱۰ ارګانیزم ه	۱۴-۲۶ ورځې	څو اونۍ	ډېره تیته	په لرګیو او شګوکې میاشتې وړاندې ۹۴ سلنه مقاومت
ایپولا وایروس / ایپولا تبه	مستقیم تماس	متوسط	۱-۱۰ طاعون جوړونکې ی واحد	۴-۱۶ ورځې	۷-۱۶ ورځو ترمینځ مړینه	د زایړنوعۍ لوړه او د سوډان تیته	نسبتاً غیر ثابت
وایروس / وایروس	هوا	ډېر	لږ فکریکې ی	۱۰-۱۲ ورځې	۴ اونۍ	لوړه-متوسطه	ډېر ثابت

Venezuelan equine encephalitis virus/VEE	هوا او منتن ناقل	تیت	ډېر لږ فکر کېږي	۶-۱ ورځې	ورځې-اونۍ	تیت	نسبتا غیر ثابت	۵۰۰-۳۰ TC50 ډله وړاندې مقاومت لري
یوتلینوم توکسین/پوټ لیزم	دخوړو او اوبو خرابیدل او هوا	نه	LD۵۰ دانسان لپاره 1ng/kg	ساعتونه- ورځو	۷۲-۲۴ ساعتوکی مړینه ؛ که نه میاشتی ادامه مومي	بې له تنفس څخه لوړ	په لرگیو او ولاړو اوبو کې په اونیو	په عالی حیواناتو کې ۳دوزه واکسین د ۲۲- LD۵۰۲۵۰ په وړاندې ۱۰۰ سلنه دفاع کوي
T-2 مایکوتوکسین ن	دخوړو او اوبو خرابیدل او هوا	نه	مینځنۍ ۴-۲ ساعتونو	ورځې- میاشتي	متوسط	دکوټې تودوخه کی کلونه	واکسین نلري	
ریسین	دخوړو او اوبو خرابیدل او هوا	نه	LD۵۰ دانسان لپاره 3- 5µg/kg	ساعتونه- ورځو	۱۲-۱۰ ورځو بعد مړینه	لوړ	ثابت	واکسین نلري
دستافیلو کوکس انټرو توکسین B	دخوړو ، اوبو خرابیدل او هوا	نه	ډیپیکوگر ام له کچې	۶-۱ ساعته	ساعتونه	%۱	دانجمادسره مقاوم	واکسین نلري

ځانگړتياوې

د دغو ارگانيزمونو، ويروسونو او توکسينونو د متفاوتو ځانگړتياوو له شتون سره سره بيوولوژيکي مواد يا عاملين په جنگونو کې کارېږي. نوموړي مواد ۱۰ څخه تر ۵ مايکرون په قطر د ايريزول په شکل جوړېږي او په مختلف قسم هوا کې تر څو ساعتونو پورې پاته کېږي او که چيرې انشاق کړل شي نوموړي زړې د مسموم تر لرې برانشيولونو او د الويلای ترمينلونو ته ځان رسوي (هغه زرات چې قطر يې له ۵ مايکرون څخه لوړ وي د تنفسی سيستم په پورتنۍ برخه کې فلترکېږي). ځکه نو بنسټيزه لاره يې تنفسی ده خو بيا هم شونې ده چې د ککړو خوړو او اوبو له لارې انتقال شي. د ترای کوتيسين مايکوتوکسين په موجوديت کې د جلدی زرق له لارې او د پوستکي د زخم له لارې هم بدن ته لار مومي. په اوسنۍ وخت کې تر ډېره پيژندل شوي بيوولوژيکي مواد له طبعی توليداتو څخه عبارت دي چې د پيژندل شوو ناروغيو د مينځته راتلو لامل گرځي. سره له دې، بدن ته د داخلیدو له لارې په بدلون سره نسبت طبعی مريضی ته غيرمنتظره اعراض او د بيمارۍ دوران رامینځته کېږي. که څه هم په حاضر وخت کې نه پيژندل کېږي ولی جنيتيکي اداره او مايکرو انکپسوليشن کولای شي چې د مايکروارگانيزم ځانگړتياوو او اغيزو کې تغير راولي.

له شخص څخه شخص ته خپرېدل چې د اپيدیمی لامل گرځي د ځينو عاملينو لپاره لکه smallpox او نمونيا يې طاعون ته مهم دي په داسې حال کې چې په محلي ډول د ناروغيو دوران په هغه صورت کې شونې ده چې په چاپيريال کې وړونکي شتون ولري (لکه د یرسنيا پستيس لپاره مورکان او مچان او د اربو وایرل انسفاليتيس لکه ونزوبيليان اکوين انسفاليتيس ويروس لپاره ځينې ماشي).

د ژغورنې بنسټونه

په ساتنه کې تر ټولو لوی مشکل مخکې له مخکې تشخیص او اخطار دی ځکه چې مایکروارگانیزمونه ناوخته حمله کوي. ساتونکي ماسک چې ایریزول ولري د نوموړو موادو له انشاق څخه مخنیوی کوي. د ترايکوتیسین مایکوتوکسین پر ضد محافظوي جامې ډېرې اړینې دي. ککړشوی پوستکی باید په صابون او پریمانه اوبو سره ومینځل شي. د میکروارگانیزمونو پر ضد مبارزه باید د ۵٪، سودیم هیپوکلورایت د محلول په واسطه د ضد عفونی کیدو سره باید تعقیب شي. د سودیم هیپوکلورایت ۵٪، محلول د ټپونو د اوبولو لپاره هم کارېږي لیکن باید چې د بدن په خالیگاوو کې وانه چول شي. نور شیان کیدای شي چې د هیپوکلورایت د ۵٪ محلول سره ومینځل شي، وچه تودوخه (۱۲۰ درجې سانتی گراد د ۴ ساعتونو لپاره) او یا د بخارپواسطه تودوخه (۱۲۱ درجې سانتی گراد له یو اتومسفر فشار سره ۲۰ دقیقې په اوتوکلاف کې) ورکړل شي. په عمومي توګه د بیولوژیکي عاملینو د وقایې لپاره واکسین او درملنه شونې ده. د ځینو کیمیاوي موادو سره د اکثرو بکتریايي عاملینو پرضد په درملنه کې کاراخیستل کېږي (جدول ۱۳). د بوتلینوم د توکسین لپاره انتی دوت د انکشاف په حالت کې دی ولی تر اوسه معرفی شوی ندی.

توکسینونه

ډېر توکسینونه یې پیژندل شوي دي په دې چپټر کې صرف د ډېر مطرح او اړونده توکسینونو څخه په تفصیل بحث کېږي او نور یې په ۱۱-۱۳ جدول کې ذکر شوي دي.

بوتلینوم توکسین (Botulinum Toxin)

د بوتلینوم توکسینونه د هغو توکسینو په مینځ کې چې انسان ته ډېر خطرناک دی پیژندل شوی دي (جدول ۱۱). دوی د اړونده ګروپ اووه نیورو توکسینونه دي چې د کلسټریدیم بوتلینوم د باسیل پواسطه تولیدیږي. دغه توکسینونه د A له ټایپ څخه نیولې تر G پورې د ایریزول په ډول جوړیږي. کله چې انشاق کرل شي غذایی تسمم ته ډېر ورته کلینیکي علایم څرګندوي په داسې حال کې چې فلج کوونکی علایم یې نسبت غذایی تسمم ته په ځنډ ښکاره کیږي او همدارنګه د توکسین له ټایپ او ډوز سره علایم توپیرکوي. هغه کلینیکي اعراض چې د بوتلینوم د یو یا څو توکسینو له کبله مینځ ته راځي د بوتلیزم په نوم یادېږي. بوتلینوم توکسین د عصبي-عضلي جنګشن او د اتونوميک کولینرجیک برخې په ماقبل ساینپټیک عصبي ترمینل کې نښلی یا داخلېږي. نوموړي توکسینونه په ماقبل ساینپسي برخه کې د استایل کولین له ازادېدو مخنیوی کوي او د سیالي د انتقال مخه نیسي. دغه عمل د قحفي عصب د ګډوډي او د اسکلیتي عضلو د کمزوري لامل ګرځي چې اکثره په کلینیکي بوتلیزم کې لیدل کیږي. د بوتلیزم د انشاقی تماس څخه وروسته اعراض له ۲۴ ساعتو څخه تر ۳۲ ساعتو توپیرکوي. د قحفي عصبو تشوشات په ابتدا کې ډېر غښتلي وي چې د سترګو له اعراضو لکه د حدقې د توسع له کبله تیاره لیدل، یوشی دوه لیدل، د لېمو راتیتیدل، د لمر څخه تینسته او نور لیدل کیږي او له دې څخه پرته نور اړونده اعراض په خبرو کولو او ډوډۍ خوړلو کې مشکل څخه عبارت دي. د اسکلیتي عضلاتو فلج په متناظر، نزولي او دوامدار ضعف سره ادامه مومي او شونې ده چې په تنفسي عدم کفایه کې خپل اوج ته ورسېږي. په غذایی تسمم کې اعراض د حملې له شروع څخه د تنفسي سیستم له عدم کفایې پورې ۲۴ ساعته وخت نیسي.

د تنفسی عضلاتو د فلج څخه وروسته تنفسی عدم کفایه تر ټولو خطرناک حالت ده او عموماً د مرګ لامل ګرځي. د ۱۹۵۰ کال نه مخکې د بوتلیزم په پېښو کې ۲۰٪ مرګ راپور ورکړل شويده. د حنجرې په پرې کولو، په حنجره کې د تیوب له نصبولو او د تنفسی عملیې د حمایه کولو په نتیجه کې د مرګ کچه له ۵٪ هم کمېږي. د جوړیدو په خاطر قوی او اوږدمهال نرسنګ اړین دی او کیدای شي چې څو هفتې او لا میاشتې ونیسي. وقایوی واکسین او اووه ولانسه انتی توکسین د ځانګړي درملنې په توګه شتون لري چې په تحقیقاتي ډول د نوې درمل په توګه کارېږي (جدول).

ریسین (Ricin)

ریسین یو قوي پروټینی توکسین دی چې د کاستر (Ricinus communis) په نوم د بوټي له دانو څخه لاسته راځي (جدول ۱۱). اصلاً نوموړې ماده له دوو Hemagglutinin او له دوو توکسینو څخه مینځته راغلې ده. د RCL III او RCL IV داسې دای میرونه دي چې مالیکولي وزن یې ۲۲۰۰۰ دالتن دی. نوموړي توکسینونه د A او B له دوو پولې پېتایډي ځنځیرو څخه جوړ شوي دي او په خپل مینځ کې د دای سلفایډ اړیکو په واسطه نښلیدلي دي. د کاستر دانې د نړۍ په هرځای کې پیدا کېږي او توکسین یې په ښه او اسانه ډول تولیدیږي. نو د دې لپاره ریسین په پراخه کچه لاسته راټلونکی توکسین دی.

ریسین د حجرو لپاره ډېر سمی دی. د B ځنځیر د حجرې پر سطحې آخزو نښلي او بیا د توکسین او آخذي کمپلکس حجرې ته داخلېږي. د A ځنځیر د اندونیوکلیاز فعالیت له ځانه څرګندوي او په ډېر کم غلظت سره د پروټینو له جوړیدو څخه مخنیوی کوي.

کله چې يې د ايروزول واړه زرات انشاق شي نوموړی توکسين د اتو ساعتو په ترڅ کې پتالوژيک بدلون او له ۳۲ څخه تر ۷۲ ساعتو په ترڅ کې د حادثې هيبوکسيکې تنفسی ناوړتيا پسې خطرناک تنفسی اعراض را مينځته کيږي. کله چې ريسين و خوړل شي، شديد معدي معايی اعراض او په تعقيب يې وعايی کولاپس او مرگ مينځ ته راځي. نوموړی توکسين په پراخه توگه داخل وعايی تحشر، په وړو رگونو کې د وينی د جريان ناوړتيا او د ډېرو غړو ناوړتيا (که چيری د داخل وريدی لارې واخيستل شي) رامينځ ته کوي، او نوموړی اعراض په لابر اتواری ژوو کې ليدل شوي دي.

په انسانانو کې يې د سميت لږ ارقام وجود لري. په ۱۹۴۰ کال کې په تصادفي ډول د ماتحت وژونکی ايروزول له تماس څخه ۸-۴ ساعته وروسته د لاندې اعراضو يرغل په وصفي ډول وليدل شو: تبه، سينه تنگي، ټوخی، تنفسي گډوډی، زړه بدی او په بندونو کې درد. وروسته له څو ساعتو څخه په لوړه پيمانه د خولو پيل په عمومي توگه د اعراضو پر ختميدو دلالت کوي. په ژوونکو حيواناتو کې د تنفسي لاری نکروزي وېجاړتيا د حنجرې، د قصباتو او د وړو قصباتو د التهاب او د الويلای او وعايی اذيما سره د داخل النسجی نمونيا لامل گرځي. که چيری له داخل وعايی لارې واخيستل شي د وعايی اندوتليل د ويجاړتيا له کبله ريوي وعايي اذيما مينځته راوړي. خوړل يې د دينې، د توري او د پښتورگو د نکروز سره يوځای معدي معايي خونريزی رامينځته کوي. د عضلې په داخل کې د تطبيق په پايله کې د عضلو او د محلي لمفاوي غوټو د ژور موضعي نکروز لامل گرځي چې د احشاء غړي هم په مينځنۍ کچه په کې اخته کيږي.

ځانگړې درملنه يی شتون نلري. يو واکسين چې د همدې موخې لپاره نوماند دی ترکار لاندې دی. اساساً درملنه يې حمايوي رول لري او تر ډېره د تماس په لارې پورې اړه لري.

تراى کوتيسين مايکوتوکسينونه (Trichothecene Mycotoxins)

د تراى کوتيسين مايکوتوکسينونه ټيټ ماليکولی وزن (۵۰۰-۲۵۰ دالتن) لرونکي، غيرمفره مواد دي چی د فايبرلرونکو فنجيانو (molds) لکه *Stachybotry*, *Trichoderma*, *Myrosectium* *Fusarium* او نورو نسلو څخه توليد يږي (جدول ۱۱).

د توکسيکولوژي په ترمينولوژي کې د نوموړي مايکوتوکسين نږدی ۱۵۰ مشتقونه تشریح شوي دي. نوموړي مواد په اوبو کې د حل کيدو وړتيا نلری ولې په ايتانول، ميتانول او پروپيلين گلايکول کې په لوړه کچه د حل کېدو وړتيا لري. ترايکوتيسين د هيپوکلورايت، تودوخې او د ماورای بنفش وړانگو د غيرفعال کولو په مقابل کې مقاوم دی ولی د سوديم هايډروکسايډ سره کم تماس د دوی سمی خاصيت ختموي. دغه توکسينونه د پروتينود جوړيدو د نهی کيدو له کبله د حجرو لپاره ډېرسمي دي. د پوستکي سره يې تماس د سوروالي او ټپونو لامل گرځي. د بيولوژيکي وسلې په توگه يی کارونه د دويم نړيوال جنگ څخه لږ وروسته هغه وخت وپيژندل شوه چې په سايبيريا کې د اوږو سره فساريم گډ شوي، پاخه شوي، او ملکي خلکو ورڅخه گټه اخيسته. ځينو په مسمومينو کې يوه اوږده وژونکې د *Alimentary toxic aleukia (ATA)* په نوم ناروغي چی ځانگړي اعراض يې عبارت د خيتې له درد، دستونې، کانگې، په ځمکه لويدل، تبه، ساړه کيدل، د عضلاتو درد او د گرانولوسايتوپينيا سره د هډوکو د مغز انحطاط او ورپسې عفونت څخه دي. له دې ټکو څخه د تېرېدو وروسته د غاړې او ستوني دردوونکې ټپونو، په پوستکي کې د وينې د نفوذ (*Petechia* او *Ecchymoses*)، وينه لرونکې دستونې، په ادرار کې د وينې شته والی، د پوزې نه د وينې بهيدل او مهبلی خونريزی مينځته راځي. د وينې د سروکرياتو،

سپینو کریواتو او دمویه صفحاتو له کموالي پرته معدي معائني ټپونه او تخریب، اساساً د هډوکو د مغز د سنتیز، د مخاطی پروټینو د جوړېدو او د DNA replication پواسطه د حجرو سیکل له مخنیوی څخه وروسته مینځته راځي. تر اوسه یې کومه ځانګړې درملنه نده پیژندل شوې. په لمړني ډول په ژوو کې د ډکسامیتازون کارونه اغیزمنه وه (جدول ۱۲ او ۱۳).

میکروبي عاملین

Microbial Agents

شونې ده چې له ډېرو میکروارګانیزمونو څخه د بیولوژیکي وسلو په توګه بده ګټه واخیستل شي. په دې چپټر کې صرف د انټراکس په هکله تشریحات ورکول کیږي. یو څو نور یې په ۱۲ او ۱۳ جدول کې ذکر شوي دي.

انټراکس (Anthrax)

Bacillus anthracis میلۀ ډوله، ګرام مثبت او سپور تولیدوونکي میکروارګانیزمونه دي او همدا سپور ده چی د نوموړي انتاني شکل جوړوي. انټراکس د غواوو، پسونو او اسانو یو زونوټیک مرض دی او په اهلی حیواناتو کې یې تر ټولو عمده کوربانه دي ولې نور حیوانات هم منتن کوي. نوموړې ناروغي د ککړو ویښتانو، وړیو، خامه خرمنو، غوښو، وینې او منتنو حیواناتو د افرازاتو او له مصنوعي تولیداتو لکه میده شوی هډوکي چی د سرې په توګه کارول کیږي، سره له تماس څخه او په پراخه کچه د سپورونو له خپریدا څخه مینځ ته راځي. انتقال یې د پوستکي د خاړښت او ګریدو، ټپونو، د سپورونو د انشاق، د هغو ککړو خوړو خوړل چې ښه پاخه شوي نه وي او حشراتو پواسطه صورت

نیسی. ټول انسانان یې په مقابل کې حساس دي. روغیدنه له تماس څخه نیولې تر مریضې پورې د یو معافیت په تعقیب صورت نیسی. سپورونه یې ډېر مقاوم او په اوبو او خاورو کې د اوږده مهال لپاره ژوندي پاته کیږي. شونې ده چې سپورونه د لمر په مقابل کې د مختلفو وختونو لپاره مقاومت وکړي.

کیدای شي چې انتراکس په انسان کې په درې ډوله یعنې جلدی، تنفسي او معدي معایي شکل څرګند شي. جلدی ډول یې (چې وړو قبیح یانو لرونکیو او خبیثو تناکو ته هم منسوب کیږي) تر ډېره د هغو کسانو په لاسونو او څنګلو کې لیدل کیږي چې په ککړه مالداري کې کار کوي. چې د انتان په سیمه کې د دانو او پرسوب پر بنسټ مشخص کیږي. هغه ګندوکی چې د ټپ له پاسه ځای نیسی تور لکه د ډبرو سکاره رنګ لري له همدې کبله یې نوم هم انتراکس ده چې په یوناني ژبه کې د ډبرو سکارو ته وايي. ځینی وختونه موضعی انتان په سیستمیک انتان اوږي. تنفسی ډوله بیماری یې چې د Woolster's disease په نوم هم یادېږي د سپورونو له انشاق څخه رامینځته کیږي او دغه شکل په هغو کارکوونکو کې پیدا کیږي چې له ککړو څرمنو، وږیو او وینستانو سره سروکار لري. معایي شکل یې چې په انسانانو کې کم دی د منتنو ژوو د غوښو له خوړلو سره چې ښې نه وي پخې شوی، اړه لري. په انسانانو کې د پوستکي د انتراکس چې درملنه یې نه وي شوې، د مړینې سلنه ۲۵ او په تنفسی او د کولمو په انتراکس کې نوموړې کچه ۱۰۰ ده. د تفریخ دوره له ۱ څخه تر ۲ ورځو پورې او غالباً د میکروارګانیزم په ډوز پورې اړه لري او د اعراضو حمله په تدریجي او نا معلوم شکل سره شروع کیږي. په پیل کې تبه، نا کراري او سستی څرګندیږي او ځینی وختونه بې بلغمه ټوخی او صدري نارامۍ هم ورسره مله وي. نوموړي لمړني اعراض د لنډ مهال (له ساعتونو څخه تر دوه یادری ورځو پورې) لپاره ښه والی مومي او وروسته نوموړي اعراض د دویم ځل لپاره د ټوپ په څیر پرمختګ کوي چې په ترڅ کې یې غښتلی تنفسي تشوشات، خوله کول، غږلرونکی تنفس او سیانوزس

رامینځته کيږي. شک او مرگ د تنفسی تشو شاتو له پیل څخه ۲۴ تر ۳۲ ساعته وروسته څرگندیږي. هغه څه چې د فزیکي معایناتو په ترڅ کې لاسته راځي ټاکلي ندي. ځینې وختونه د سینې ایکسره پراخ شوی Mediastinum (د دواړو سږو په مینځ کې واټن) چې په فلورا کې د مایعاتو راتولیدل هم ورسره مل وی لیدل کيږي. Bacillus anthracis د وینې د گرام د تلوین پواسطه او په معمول وسط کې د وینې د کښت سره تشخیص کيږي لیکن ډېر وختونه د درملنې په حالت کې نه شي تشخیص کیدلای. د انسان نه په غیر په نورو ژوو لکه د ریزوس بیزو کې، د انشاق څخه دوه یادری ورځې وروسته خپله باسیل یا بی توکسین په وینه کې پیدا کيږي. په وینه کې توکسین او باسیل په همزمان ډول راڅرگندیږي او داسې معاینې هم شته چې په وینه کې توکسین په چټک ډول توپیر مومي. داسې واکسینونه او کیمیاوی درمل پیژندل شوي دي چې د وقایې او درملنې لپاره کارېږي (جدول ۱۳).

جدول ۱۳: د مختلفو بیولوژیکی عاملینو په وړاندې وقایوې او
معالجوي سنجش

عامل	واکسين او وقایه	درمل	کیموتراپیو تیک رژیم یا حمایتي درملنه	کیمیاوی وقایوې رژیم	څرنگوالی
انتراکس	دمشیکن دعامه روغتیا دډیپارټمنټ واکسين ۰.۵ ملی لیتره صفر، ۲ او ۴ اونۍ او او بیا ۲، ۱۲ او ۱۸ میاشتي او بیا کلنی تقویه اي ډوز	سپروفلکسا سین ^a	دوریدی لاره ۴۰۰ ملی گرامه هر ۸ تر ۱۲ ساعتو	دخولی له ۴۰۰ لاري ملی گرامه په ورځ کي دوه ځله د څلورو اونيو لپاره تجویز کېږي او همدارنگه که واکسين شوی نه وي، دوه واکسينونه ددوه اونيو په مینځ کې ورکول کېږي	عوض يې سپروفلک سا سين ، کلینډوماي سين ، ايرتروماي سين او کلورامفيني کول دي
		ډوکسي سيکلین	۲۰۰ ملی گرامه او بیا ۱۰۰ ملی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته	دخولی له ۲۰۰ لاري ملی گرامه په ورځ کي دوه ځله د څلورو اونيو لپاره او بیا	
		پنسیلین	دوه میلیون واحدو وریدي	واکسين	دپنسیلین سره

د حساسو ارگانیزمونږ ولپاره		هر دوه ساعته وروسته			
په انډیمیک سیمو کې د عادي ژغورنې لپاره وکسین ندي وړاندیز شوی سویډني SBL واکسین اغیز لري ، لیکن په متحده ایالاتو کې نه پیدا کیږي	---	په لوړه کچه د مایعاتو د بایللو په وخت کې	د خولې له لارې ریهایدرېشن ۳،۵ گرامه سودیم کلوراید ، ۲،۵ گرامه سودیم بای کاربونیټ او ۲۰ گرامه گلوکوز په یوه لیتر اوبو کې (د روغتیا نړیوال سازمان)	Wyeth- Ayerst vaccin (دلته) چې مهال لپاره ۵۰ سله اغیزمن) ۰،۵ ملی لیتره عضلي له ۴۰ او نیو اوبیا هر شپږ میاشت تېر تقویه ای ډوز	کولرا توکسین
د ماشومانو په درملنه کې تتراسیکلین ' اریترومایس ین ، ترای میتوپریم- سلفامیتوک سازول اوفیورازول ډین شامل دي	//	هر ۶ ساعته بعد ۵۰۰ ملی گرامه د دریو ورځو لپاره	تتراسیکلین		
--	د تترا سکل ین او	۵۰۰ ملی گرامه هر ۱۲ ساعته بعد	سپروفلکسا		

	پوکسی سیکلین دمقاومه نوعولپاره	د ۳ ورځولپاره	سین		
--	د تتراسکلین پوکسی سیکلین دمقاومه نوعولپاره	۴۰۰ ملی گرامه هر ۱۲ ساعته بعد د ۳ ورځولپاره	نارفلکساسید ین		
په استرالیا کې واکسین ازمایي ترڅو مخکی له مجوز واکسین څخه د پوستکي د ازمایینست (تست) اړتیا په گوته کړي	دوقایې لپاره گټور دی؛ د تماس څخه له ۸ تر ۱۲ ورځو پیلېږي ، د ۵ ورځولپاره ادامه مومي	۵۰۰ ملی گرامه فمي هر ۲ ساعته بعد د ۵ څخه تر ۷ ورځولپاره	تتراسکلین ^b	۲۸۰ IND د ټولې حجرې غیر فعال شوی وکسین ، واحد ۰.۵ ملی لیتره تحت الجلدی زرقی ډوز CSL)Qvax parkvill , ltd VIC (استرالیا	Q fever
	دوقایې لپاره گټور دی؛ عین رژیم	۱۰۰ ملی گرامه فمي هر ۲ ساعته بعد د ۵ څخه تر ۷ ورځولپاره	پوکسی سیکلین ^b		

طاعون	Greer دلبراتور واکسين ۱ ملی لیتر عضلي، بيا ۰،۲ ملی لیتره عضلي له ۳-۱ او ۳- ۲ میاشتو کې او تقویه کونکی ډوز په ۲، ۱۲ او ۱۸ میاشتو او بيا ۲-۱ کلونو کې	ستريټومايډ سين	۳۰mg/kg ورځنی عضلي ویشل شوی ډوز ۱۰د ورځو لپاره	په حیواني مطالعاتو کې دطاعون واکسين دايروزول(ه) (وا) دگوانبونو په وړاندې ژغورنه نده ښوودلې
		ډوکسی سیکلین ^b	۲۰۰ ملی گرامه وریدی او بيا ۱۰۰ ملی گرامه هر ۱۲ ساعته د ۱۲-۱۰ ورځو لپاره	عوض یی ترامیتوپرید م-سلفا میتوکسازو ل یا سپروفلک ساسین
	کلورامفيني کول	۱ گرام وریدی هر ۲ ساعته بعد	۱۰۰ ملی گرامه هر ۱۲ ساعته د ۷ یا ډېرو ورځو لپاره	دسحایا دطاعوني التهاب لپاره
تولاریمیا	LVS ژوندی رقیق شوی واکسين) (IND	ستريټومايډ سين	۱ گرام عضلي هر ۱۲ ساعته ۱۴-۱۰د ورځو لپاره	

تترا سکلین b هم کاریدلی شی	۱۰۰ ملی گرامه دخولې له لارې هر ۱۲ ساعته د ۱۴ ورځو لپاره	۳-۵mg/kg ورځنی ډوز د ۱۴-۱۰ ورځو لپاره	جنتامایسین ن ډوکسی سیکلین ^b	د پوستکي له لارې یو ډوز	
۲۰ سلنه بې عکس العمل راپاروي او په ۲۰ سلنه په وینه کې تغییرات نه راولي ۸۴-C هغه کسانو ته ورکول کېږي چې TC-۳۸ په کې اغیزنلري		حمایه وی درملنه ، انلجزيکونه او ضد اختلاج درمل	ځانگړي انتی وایرل یا وایروس ضد بې نشته	TC-۳۸ ژوندی رقیق شوی واکسین) (IND ۰.۵ ملی لیتره تحت الجلدي (یوه وز) C-۸۴ (د فارملین په واسطه د TC-۳۸ څخه لاسته راځي) ۰.۵ ملی لیتره تحت الجلدي تر ۳ ډوزو پورې هرې دوې اونۍ بعد	Venezue lan equine encepha litis

ماربرگ/ Ebola virus	واکسين نلري	ځانگړې انتې وایرل نلري	حمایه وی درملنه، شاک , ټیټ فشار، او DIC یا خپور شوی داخل وعایي تحرار اداره	جلاتوب او ځانته نرس ته ضرورت دی
د شري وايروس	Wyeth واکسين: ۱۵وزد پوست کي له لاري او تقويه کوونکي ۵وز هر دری کاله بعد	ایمیونوگلو بولین واکسين) (VIG		مخکې او وروسته له تماس څخه وروسته د ۳ ورځو په دوران کې، توصیه کيږي ښه چیرې د په دوران کې ترټولو ښه (ده) ۰.۲ml/kg عضلي (د ټم اس څخه وروسته د ۳ ورځو په دوران کې، توصیه کيږي ښه چیرې د په دوران کې ترټولو ښه (ده) ۲۴ ساعتونو په دوران کې ترټولو ښه (ده) ۲۴ ساعتونو په دوران کې ترټولو ښه (ده) ۲۴ ساعتونو په دوران کې ترټولو ښه (ده)
بوتلینوم توکسين	IND اپنځه ولانسه توکسوئید) (A-E تحت الجلدي لاري صفر ، ۱۲ او ۱۲ هفتې	IND اپنځه ولانسه انتې توکسين (A- F) (د آس انتې سیرا)	۱ لس سی سی ویال دوریدي لارې هر ۲۰ دقیقې بعد ترڅوپی پرمختګ	دانتي توکسين له کارونې مخکې د پوستکي ټسټ اړین

دی		ودربري		بعد او بيا کلنی تقويه کونکی ډوز	
		دانشاقي تماس په لپاره تنفسي حمايه	ځانگړی انتي توکسين نلري	واکسين نلري	ستا فيلو کو کس توکسين B
		انشاقي: د سرو دحاد تخریب او ريو پرسوب لپاره حمایوي درملنه	ځانگړی انتي توکسين نلري	واکسين نلري	ريسين توکسين
	د جامو او پوستکي پاکول		ځانگړی انتي توکسين نلري	واکسين نلري	T- ۲ مايکو تو کسين
a سپروفلکساسين په هکله داسې ښوودل شوېده چې په يو ډول تازی سپيو کې د کارتليج د گډوډۍ لامل گرځي او د همدې لپاره د ماشومانو او اميدواره ښځو لپاره يې کارونه نده توصیه شوی. که څه هم په هغه ماشومانو کې چې د سپروفلکساسين په واسطه يې درملنه شوېده هيڅ ډول ناوړه پایلې نډې ليدل شوی، او د ژوند په گواښوونکو حالاتو کې کارول کيږي b د اتوکلو څخه په کمو ماشومانو او جنين کې د تتراسيکلين او ډوکسی سيکلين په واسطه د ۲ څخه په زياتو کم ترکمه ۲ ورځنۍ دورو کې د غاښونو تورېدل ثبت شوي دي. په اميدواره ميرمنو او ماشومانو کې ډوکسی سيکلين صرف هغه وخت بايد وکارول شي چې ژوند گواښوونکي حالات شتون ولري.					

دویم فصل

طبعي مرکبات

پېژندنه

د دفاع او یرغل په حالت کې د کیمیاوي مرکباتو کارونه په طبیعت کې عام او د تکامل یوه مهمه وسیله ده. نږدې د ارګانیزم په ټولو صنفونو کې له ابتدايي بکتريا څخه نیولې بیا تر عالي شمزي لرونکو حیواناتو پورې زهرجن مواد لري. د کیمیاوي جوړښت او بیولوژیکي فعالیت له مخې د طبیعي سمومو توپیر د پریزات دی. د سمی ارګانیزمونو لوړ غلظت په لوی نفوس لرونکو سیمو، لکه د گرمو باران لرونکو دښتو او د اوبو سره په هم سطحې برخو کې موقعیت لري. پر طبیعي مرکباتو د ډېرو مقالو او څیړنو له کبله په دې چپټر کې شونې نده چې ټول شیان وویل شي او دلته صرف ځینې ډېر مهمه عملي اصول او مثالونه ذکر کېږي.

د حیواني او نباتي سمومو څخه د انسان ګټه اخیستنې د تاریخ په اوږدو کې راپور ورکول شوی ده. داسې سمی مواد به د ښکار (د غشي زهر)، د موادو د پټولو په جشن (د بلاډونا، سیلوسیپ او تاریاک) د قربانیانو د محاکمې (*Conium maculatum*) لکه د سقط لپاره او په خایانه ډول د انسانانو د وژلو لپاره کاریدل. سره له دې په پخوا وختونو کې سموم د درملو په توګه کاریدل او پاراسلسز وو (۱۴۵۱-۱۴۹۳) چې په لمړي ځل یې د ډېرو سمومو دوه ډوله اغیزې یعنې سمی او تداوي اغیزې په نښه کې او ویې ویل چې: *dosis sola facit venenum* یعنې تنها ډوز دی چې زهر جوړوي. اوسنۍ فارمکولوژي د

هغې پوهې لاسته راوړنه ده چې له حیواناتو او نباتاتو څخه د لاسته راغلي مرکبونو د بیولوژیکي ځانګړي فعالیت پر بنسټ مینځ ته راغلي ده.

د حیواناتو زهر (وینوم) او سموم

Animal venoms and poisons

د یو قوی دښمن په مقابل کې حیوانات د خپلې دفاع او یا د ښکار د فلج یا وژنې په خاطر وینوم او سموم کاروي. په وروستني حالت کې وینوم په ځانګړو غوټیو کې موقعیت لري او د چپچلپه واسطه انتقال مومي. که چیرې وینوم صرف د دفاع په خاطر وي نو کیدای شي چې په پوستکي او داخلي غړو کې هم شتون ولري. د دغه حیواناتو سمیت تر ډېره د روښانه رنگ پواسطه حمایه کېږي (د مثال په ډول د ښږو بات دکورنۍ او سلمندرچنګښه) او خپلو دښمنانو ته اخطار ورکوي چې احتیاط کوی. زه سمې یم. ځینې حیوانات داسې سموم لري کوم چې له نورو ارګانیزمونو څخه لاسته راغلي دي. دغه حالت تر ډېره د اوبو په سیستم کې راپېښېږي چېرې چې ځینې ډاینوفلاجيلیتونه د سمې مرکبونو د منبع په توګه شتون لري او د یو ځای اوسېدنې او غذايي ځنځیر پواسطه لویو حیواناتو ته انتقال مومي.

له حیواناتو څخه د لاسته راغلو مرکباتو کیمیاوي جوړښت په ډېرو حالاتو کې ډېر مغلق دی او پروټینونه، پېتایدونه، ګلايکوزیدونه، الکلویډونه، نیوروترانسسمیټرونه، کیتونونه او حتی هایډروکاربنونه لري. دغه سموم تر ډېره لوړه ځانګړتیا لري او عصبي سیستم ډېر په اغیزمن ډول خپل هدف ګرځوي. د مخلوطو پروټینو مرکبات د دوي د ناوړه اغیزو په نظر کې نیولو سره تر ډېره

سینرجتیک دي د هایمینوپترا، مارانو، لړمانو او غڼو موضعي سموم آمینونه (هستامین، سیروتونین، اسیتیل کولین او کینینونه) دي، دغه مرکبات د التهابي عاملینو په څیر عمل کوي د درد لامل ګرځي او د وینې فشار راټیټوي.

انزایمونه: لکه هیالورونیداز (کوم چې ارتباطي نسجونه ضعیفوي) او فاسفولیپاز (د حجرې غشاء ویجاړوي او د التهابي مرکباتو سنتیز زیاتوي لکه پروستاګلانډین).

پولي پپتایدونه: دغه مواد د نیوروټوکسینو، مایکوټوکسینو او کارډیوټوکسینو په توګه فعالیت ترسره کوي.

په داسې مخلوط موادو کې پپتایدونه ترډېره عمده سمې مواد جوړوي او د مسموم د مرګ مسؤل ګڼل کیږي، په داسې حال کې چې نور مواد له پپتایدونو سره د مرسته کوونکو په توګه برخه اخلي ترڅو یې خپل هدف ته ور ورسوي (لکه د عصبي سیستم آخډې اوزړه). د دغه سمومو د بیاخلي تطبیق په پایله کې الرژیک غبرګون رامینځ ته کیږي کوم چې کیدای شي د وژونکي انافیلاکتیک شاک عکس العمل مینځ ته راوړي.

بحري حیوانات

بحري ایکو سیستم د لویې بیچلتیا لرونکي انواعو په واسطه پیژندل کیږي چې د دوی له ډلې څخه ډېری د ژوندي پاته کیدلو لپاره سمې مواد کاروي. د همدې له کبله د مختلفو او سمې انواعو ترټولو لوړ غلظت په ګرمو سیمو او د کورال په ټاپووزمه کې شتون لري. په دې ډول سیمو کې لامبو او غوپیډل، په ځانګړې ډول دهغو کسانو لپاره چې تجربه ونلري کیدای شي چې خطرناک وي. په نړیواله کچه د

هغو پېښوگڼه چې د سمې بحري حیواناتو له کبله پېښېږي د ۴۰۰۰۰ او ۵۰۰۰۰ ترمینځ قرار لري. نور ۲۰۰۰ سمیتونه د سمې کبانو یا نرم حلزونونو د خوړلو له کبله مینځ ته راغلی دي.

سولنتراتا (Coelenterata)

کیدای شي چې سمې مواد په هایدرا، جیلی فیش، بحري انیمون (یونوغ گل لرونکی بحري بوتی) او کورال کې وموندل شي چې ټول یې بحري اوسیدونکي دي چې د استوا د خط سره په ډیرشم موازی خط په سیمو او په گرمو اوبو کې اوسي. او د تود اتلانتیک خلیج په سیمه کې، کیدای شي دوی د شپیتم موازي خط په سیمه کې وموندل شي. په عمومي توګه د دغه حیواناتو توکسینونه پولي پیتایدونه دي کوم چې د ښکار په نیولو او یا د غښتلي او وړي دښمن په وړاندې د دفاع پرمهال کارول کېږي.

د دغه ژوو د حساسه وېښتو د تماس په پایله کې کوم چې د کنیدو بلاست (نیماتوسایتونو) د یوې پیچلې دستگاه (کنیدوسیل) په واسطه پوښل شویده، حمله کوي. یو ډول فلاجیل چې ډېر وینښته او اغزي لرونکی چنګونه لري له پوستکي څخه تیرېږي او زهر زرق کوي. ترټولو خطرناک نماینده یې د کورال په ټاپووزمه کې اوسیږي. د جیلی فیشونو (یو ډول کبانو) په مینځ کې ترټولو ډاروونکي یې عبارت له پرتګالي man-of-war یا Physalia physalis او بحري غونښې (Chironex fleckeri) څخه دي. د دغه حیواناتو سره تماس د هستامین، کینین او پروستاګلانډین پواسطه چې د سم ټول شته تشکیلوي له سخت درد سره تعقیبېږي. مسموم کیدای شي چې بیداري له لاسه ورکړي ځکه چې درد ډېر غښتلی او تباه کوونکی دی. مرګ هم کیدای شي خپله د سم پواسطه

رامينځ ته شي. د دغو سولنتراتاگانو سمې پېتايدونه د سوديم د چينل بلاک کونکي دي، کوم چې ساينپسونو او عصبي عضلي نهاياتو کې د پوتنشل په عمل کې يو قوي اوږدوالی مينځ ته راولي، چې د ډېر دردناک عضلي تقلص، فلج، د شاک د اعراضو او د تنفسي انحطاط لامل گرځي. انتی دوت يې شتون نلري او درملنه يې په عرضي ډول صورت نيسي. د شاک په حالت کې د وريدي لارې د کلسيم، گلوکوکورتيکويډونو او د پلازما ډېروونکو تطبيق اړين بلل کېږي. په موضعي ډول د بې حسه کونکو کارول گټور دي ځکه چې د نوموړو سمومو سره تماس ډېر دردناک دی. د سمې سولنتراتا سره د تماس په ډېرو پېښو کې هيڅ ډول طبي او چټک کمک ته لاس رسې شتون نلري. نوځکه د سيمي د حالاتو په اړه معلومات اوله داسې ژوو سره له تماس څخه د ځان ساتل ډېر مهم گڼل کېږي.

حلزونه (Mollusks(Mollusca)

د دوی په مينځ کې د صدفونو جنس (Lamellibranchiata) او حلزونونه (Gastropoda) شتون لري. په دې انواعو باندې تسمم په ډېرو حالاتو کې د خوړو له لارې رامينځ ته کېږي. ډاينوفلاجيلاتونه تر ډېره د دغه توکسينونو لمرنۍ سرچينې گڼل کېږي. نرم تنان د دوی توکسينونه د دغه ارگانيزمونود مصرف په وخت کې په خپل ځان کې ذخيره او متراکم کوي. د دغه سمومو پېژندنه کوم چې د کبانو په ځينو ډولونو کې هم شتون لري، د دې کتاب په نورو برخو کې څرگنده شوې ده.

د سمې فعاله نرم تنانويه مينځ کې کونيديا (Toxoglossa) هم دي چې دگرمو سيمو د حيواناتو په سيمه کې ژوند کوي. دغه حيوانات د زهرويو ډول پيچلې دستگاه لري کوم چې د خوړو د لاسته راوړلو لپاره يې د بريد کونکې وسلې په

څېر کاروي. اوپه کمه کچه يې د دفاعي وسلې په توگه هم کاروي. نوموړې دستگاه د نارینه پيازخه جوړه شويده، چې د زهرو يو تيوب، راديو لا په نامه ژبه اوراديو لرغابونه لري کوم چې د کوچني نيزې په څېر شکل اوله څخه تر ۱۰ ملی مترو پورې اوږدوالی لري. زهر د فشار د عمل تر اغيزې لاندې د زهرو له تيوب څخه راديو لا ته پيل وهل کيږي او بيا د راديو لرغابونو په واسطه اخيستل کيږي کوم چې وروسته بيا د ستوني له لارې څپم ته انتقالیږي. دغه حيوانات نوموړې جوړښت د ټوپک په توگه کاروي او د ښکار په لوري سمې تير واري. مختلف کونډيا گان د مختلفو ښکارونو (چينجيانو، حلزونو، کبانو) لپاره ځانگړي شويدي. صرف هغه انواع چې فقاريه حيوانات ښکار کوي، د انسانانو لپاره خطرناک دي. دغه وينوم بنسټيز پېتايدونه لري چې ځنځير يې له ۱۳ څخه تر ۲۹ امينو اسيدونو پورې رسيږي. درې عمده انواع يې د توپيوروډي α -Conotoxin يې په عصبي عضلي اتصالونو کې پر نيکوتينیک استايل کولين آخزو باندې کورار (Curar) ته ورته عمل کوي. μ -Conotoxin د عضلي حجراتو په غشا کې د سوډيم چينل بلاکوي. د مختلفو پېتايدونو فعاليت په لويه کچه د عصبي فعاليتونو د نهې کولو سره هم غړی دی. تر ډېره نارمل ښکار د کونډيا د حملې څخه وروسته په چټک ډول فلج کيږي. دا ډېره مهمه ده ځکه چې دغه حيوانات ډېره کراره حرکت کوي او شونې نده چې خپل ښکار تعقيب کړي. ځينې کونډيا کمالاً د دې وړتيا لري چې انسان ووژني (د مثال په توگه *Conus geographus* او *Conus tulipa*).

کونډيا تر ډېره د حاره ژوو د سيمو په کمو ژورو اوبو کې اوسي او اکثراً د يادگار په څير را ټولول کيږي ځکه چې ډېر ښايسته دي. دا کار بايد ډېره احتياط سره صورت ونيسي او صرف بايد مړه شوي پوستونه يې راټول کړل شي. د کبانو ښکار کوونکي کونډيا د چيچلو له امله موضعي شخي رامینځته کيږي چې بيا ټول بدن ته خپريږي، په تعقيب يې د عضلو فلج او د زړه د حرکتو دريدل مينځ

ته راځي. کوم ځانگړی انتي دوت نلري نو له همدې کبله درملنه يې په عرضي ډول صورت نیسي.


اکینودرم (Echinoderms(Echinodermata)

د Echinoderms جنس دوه گروپونه ، Pelmatozoan او Eleutherozoa لري. ډېر سمی نوعې يې په Eleutherozoa پورې اړه لري. د دوی په مینځ کې (Asteroidea(starfish) ، Ophioidea ، Echinoidea (بحري پیړی) او Halothurioidea (بحري بادرنګ) ځای لري. Echinoderms د بحريه ژورو کې ژوند کوي او په ټول سمندر کې خپاره دي. په هرحال ډېر سمی نوعې يې په گرمو سیمو کې ژوند کوي.

ستوري شکله کبان د نورو حیواناتو د ښکار لپاره تر ډېره خپل زهر کاروي. د دغې موخې لپاره هغه توکسين چې د دوي د پوستکي په غوټو کې ځای لري په اوبو کې خوشي کوي. نوموړي توکسينونه کولای شي چې صدفونه، حلزونونه او شرمپونه فلج کړي. د سمی ستوري شکله کبانوسره له یوه تماس څخه وروسته، نیښ له پوستکي تیريږي او د ډېر درد او موضعي التهاب لامل ګرځي. توکسينونه يې ستروئیدي ګلايکوزیدونه دي چې د ساپونینو په څېر چې په ډېرو بوټو کې شتون لري، د پاکوونکي په څیر عمل کوي. په لومړي نمبر شکل کې بنسټیز سمی ستوري شکله کب *Acanthaster planci* ښودل شوی ده. د دغه کب توکسين د زرقي تطبیق وروسته په حیواناتو کې د وینې د فشار د راټیټېدو لامل ګرځي. داسې باور کېږي چې د دغه کارمینځګړتوب د داخلي ارشیدونیک اسیدو د میتابولیت لکه پروستاګلین په واسطه صورت نیسي.

بحري پيري د دوي د نقطوي چيچلوپواسطه د دردناکو ټپونو لامل گرځي، کوم چې د سوري کولو څخه وروسته پوستکي څيري کوي. د ځينو ډولونو نښې يې وینوم لري چې د ډېر درد او التهاب باعث کيږي. کله کله عمومي غبرگونونه لکه د نهاياتو بې ځنځه کيدل، معدي معايبي اعراض، د سردرد او الرژيک عکس العملونه رامینځ ته کيږي. دغه زهر نه صرف يوازې په نښې کې شتون لري، بلکه تکثري غړي يې هم لري. نو د همدې کبله د دغه ژوو خوړل په ځانگړې ډول د هڅې-اچولوپه وخت کې نه توصيه کيږي. د بحري پيري کيميا تراوسه معلومه نده. احتمالاً د دغه ژوو د توکسينونو ماليکولونه لوړ ماليکولي وزن لري، کوم چې د جدا کيدو د پروسې پر مهال تجزيه کيږي.

د بحري بادرنگوپه مينځ کې ډېر شمېر سمې ډولونه ځای لري. ځينې توکسينونه يې د پوستکي په غوټيو کې شتون لري. په هرحال تر ټولو مهم او ځانگړی غړی يې چې Cuvierian tubule نومېږي، څخه عبارت دی. دغه تيوبولونه د خطر په وخت کې د مقعد له لارې راوړي او د زهري مرکبونو يو مخلوط خوشی کوي، کوم چې د ممکنه بنکار لپاره د يوې مانع په توگه عمل کوي. د بحري بادرنګ بنسټيزې سمې مادې د Lanosterin ټايپ ساپونينولکه Holothurin A (شکل ۱) څخه عبارت دي. د بحري بادرنګ سره جلدي تماس د درناکو اعراضو لامل گرځي، کوم چې په عادي ډول زړه مينځه ځي. په ځينو آسيابي هيوادونو کې بحري بادرنګ د خوړوپه څير کارول کيږي. چې ځينې وختونه د معدي معايبي سميت لکه دستونو (اسهلاتو) او کانګولامل گرځي. د Holothurin A د کافي کچې د جذب څخه وروسته کيدای شى چې هيمولاييزس (د وينې د سرو کرياتو تجزيه) او فلج مينځ ته راشي.



شکل ۱: داکینودرماتا ستروگلایکوزیدونه. تورناستروئید د *Acanthaster plani* په نوم بحري ستوري کې شتون لري، کوم چې په گرمو سیمو کې پیدا کیږي. هولوتورین A یو توکسين دی چې د بحري بادرنګ په تیوبولونو کې شتون لري.

کبان (Fishes or pisces)

ډېر زهري یا سمی کبان د مرجاني ساحل په گرمو سیمو کې ژوند کوي. دوی د فعاله (زهري) او غیر فعال نوعو په نوم سره جلا کیږي. ځینې سمی مواد دهغه مایکروارگانیزمونو په واسطه تولیدیږي چې له دوی سره په همزیستي ډول ژوند کوي. زهري کبان د زهر غوټې او نینښونه لري، کوم چې د دفاعي موخو لپاره کارول کیږي. په ډېرو حالاتو کې دغه کبان لټ او ثابت وي. د دوي سمی طبیعت د بنکارکوونکي څخه د تینښتې دعوض په توګه رول لوبوي. نږدې ۲۰۰ نوعو په مینځ کې چې د بحري حیواناتو په سیمه کې ژوند کوي، د *Stingrays (Dasyatidae)*


weevers(Trachinidae) ، scorpionfishes(Scorpeanidae) ، catfish(Siluroideae)، دغه توکسینونه د ډبرو غیر ثابتو پروتینو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. ځانګړې سمیت (په موږکانو کې LD_{۵۰}) یې د $200 \mu\text{g/kg}$ (په سنگي کب کې) او mg/kg ترمینځ پروت دی. د دغو کبانو پواسطه چیچل ځینې وختونه سخت درد لرونکي او د موضعي التهاب او نکروز لامل ګرځي چې د جوړیدلپاره بده وړاند وینه لري. تر ټولو زهري کب، یعنې سنگي ماهي (*Sunaceja horrid*) د ملايز د قوم په واسطه د ښکار په غشو کې کارېدل.

وروسته له زرقي تطبیق څخه دغه توکسین له ځانه مایو توکسیک (په عضلوسمي اغیزه) عمل ښیي. اغیزمن غړي عبارت له زړه، د وینې دوراني سیستم او اسکلیتي عضلو څخه دي. وژونکی ډوز یې د غړو د انجامونو د فلج او د دوراني کولایس لامل ګرځي. تر ټولو خطرناک یې د تیږو له ماهیانو (*Stonefish*) یعنې *Synaceja horrida* او *Synaceja trachinus* له جنس څخه عبارت دي. نوموړي حیوانات د کموژورو او بو د بحري ژوو په سیمه کې اوسېږي او ډېر وخت په ریګ کې ځان پټوي او د ښکار په انتظاروي. د دوي رنګ د شاوخوا چاپیریال سره ډېر ورته دی او که چیرې ځان په ریګ کې پټ هم نه کړي دوی تر ډېره په سترګو نه لیدل کېږي. تصادف اکثراً پر کبانو له پاسه د قدم وهلو په مهال پېښېږي. شاتنې تیغ د ښکار له پوستکي وزي او د ښکار د وزن د فشار په نتیجه کې زهريایونوم په تپ کې زرق کېږي. وژونکي حالتونه یې کم ندي. په نارمل ډول د زهروله داخلیدو ۸ تر ۲۴ ساعته وروسته مرګ واقع کېږي.

په درملنه کې لمړی باید د نښنې توتیه له پوستکي و باسل شي او تپ په احتیاط سره پاک کړل شي. اغیزمن شوي غړي باید کم له کمه تر ۳۰ دقیقو پورې په ګرمو اوبو و مینځل شي. کوم چې درد کموي او په قسمي ډول زهر مینځل کېږي.

تسمم په سختو حالاتو کې د داخل وړیدي انټي وینوم زرق هم توصیه شوی ده. که څه هم په ځینو حالاتو کې انټي وینوم ته لاس رسی نه کیږي نو باید چې عرضي درملنه صورت ونیسي. ترتیلولوبه لاره ، ترخوله د غومشکلاتو څخه مخنیوی وشي هغه له دغوکبانو څخه ځان لرې ساتل دي په هغو سیمو کې چې د Stonefish کبانو د اوسیدلو ځای وي باید د لامبو په وخت کې ځانگړي بوتونه پنبو کرل شي.

نور رسمي کبان خپل زهر د پوستکي له لارې اطراح کوي او دوی ته Crinotoxic کبان ویل کیږي چې یوه بیلگه یې له Boxfish (Ostracion lentiginosus) څخه عبارت ده، کوم چې د پاهو توکسین (Pahutoxin) په نامه یو سم تولیدوي. دغه توکسین د کولین سره د ۳-acetoxylhexadecanoic acid یو استر ده (شکل ۲). د دوی د امفوفیلېک خاصیت د لرلو له کبله نوموړي مواد پاکوونکي خاصیت لري. یوځل چې په اوبو کې خوشي شي، د کبانو، شارکونو او نورو بحري ژوو په مقابل کې دفاعي خاصیت لري که چیرې له توکسین څخه (په اکواریم کې) یې تینښته شونې نه وي نو د اغیزمن شخص په بدن کې د خوځښت کموالی، د تعادل او حرکت له لاسه ورکول، او بالاخره کله کله اختلاج او مرگ مینځ ته راځي. په تي لرونکو ژوو کې د زرقي تطبیق څخه وروسته، نوموړی توکسین لکه د نورو پاکوونکو په څېر د شدید هیمولایزامل گرځي. په موږکانو کې یې LD_{۵۰} د ۲۰۰mg/kg څخه عبارت ده.



شکل ۲: فاوتوکسین چې د (Osracion lentiginosus) Boxfish په نوم ماهي له پوستکي څخه لاسته راغلی ده. نوموړی مرکب د ۳-اسیتوکسی هکزاډیکانویک اسید یو کولین ایستر دی.

ځینې کبان سمی گوندونه (جنسي غوټې) لري په داسې حال کې چې نور غړي له زهرو څخه خالي دي. د غه کبان د Ichtyootoxic په نوم یادېږي. ډېرې په تازه اوبو او صرف خو دانې یې د بحري ژوو په شاوخوا کې ژوند کوي. د دوی له ډلې څخه یو Cabezón یا Scorpenichthys mamoratus دی، کوم چې د کلیفورنیا اوبرتانیو کولمبیا ترمینځ آرام سمندر د غاړې سیمو کې ژوند کوي. د نوموړي کب وزن تر شل پونډو رسېږي او د خوړولپاره قیمتي کب دی. د دغه کب دهگيو خوړل د عمده معدي معایي اعراضو سره مل سمیت مینځ ته راوړي. په ځینو شدیدو حالاتو کې شونې ده چې اریتمیا، د سینې درد، اختلاجات او کوما رامینځ ته شي. وژونکي پېښې یې کمې دي.


ځینې کبان صرف په وینه کې توکسین لري، نوله همدې کبله د Ichtyohematotoxic کبانو په نوم یادېږي. د دوی په مینځ کې Eel او Muraena قرار لري. سمیت هغه وخت واقع کېږي چې په لوړه کچه د کب وینه هضم شي. د توکسین د کیمیا په باره کې یې هېڅ معلومات وجود نلري، پرته له دې چې نوموړی توکسین د تودوخې په مقابل کې ناپایداره دی. نو د همدې کبله پاڅه شوي کبان یې مصؤون دي.

ځینې غیر فعاله (Passive) سمی کبان داسي توکسین لري چې اصلاً د ځینې میکروارگانیزمونو، لکه بکتریا، پروتوزوا او الجیانو پواسطه تولیدېږي. توکسینونه یې ځینې وخت ډېر قوي دي او کیدای شي چې په ټولو انساجو یا صرف په ځینو غړو کې شتون ولري.

د Ciguatera کلمه له هغه سمیت څخه بحث کوي چې د Grouper، Barracudas، شارک اونورو ښکارکوونکو کبانو د خوړلو له کبله چې په حاره اونیمه حاره سیمو د بحري حیواناتوپه سیمه، لکه د کورال د ساحل په اوسیدونکو، کې مینځ ته راځي. دغه پېښه په بیاځلي ډول د کارابین بحریه ځینو برخو او د مکسیکوپه خلیج کې پېښه شوې ده. د Ciguatera کلمه د هسپانوي ژبې څخه لاسته راغلې ده، او د هغه حلزون نوم ده چې د کیوبایه جزیره کې ژوند کوي، چې په غلطۍ سره د سمیت د لامل په څېر پیژندل کیږي. د توکسین لمړنۍ منبع یې Epiphytic Dinoflagellate څخه عبارت ده، کوم چې پر ماکروفايتیک الجي باندې ژوند کوي. نوموړی توکسین په غذايي ځنځیر کې ځای نیسي (له ډاینوفلاجيلیت څخه نبات خوړونکو کبانو ته اوبیا ښکارکوونکو کبانو ته). ترټولو لوړ غلظت په کولمو اوینه کې تولیدیږي، که څه هم په عضلاتو کې یولوړ ډوز چې وروسته د ککړو کبانو له خوړلو څخه د سمیت لامل ګرځي، تولیدیږي. اود اډېره مشکله ده چې په سیګواټیرا توکسین باندې د کبانو ککړتیا وارزول شي. نو د همدې په خاطر باید د هغو سیمو د کبانو ځینې ډولونه چې د سیګواټیرا د شتون تاریخچه ولري، باید ونه خوړل شي. د سیګواټیرا د سمیت اعراض په مفصل ډول په نورو ځایونو کې تر بحث لاندې نیول کیږي.

یو توکسین چې د بکټریاوو څخه لاسته راځي اود Pufferfish کب په جنسي غوټو اوینه کې ذخیره کیږي د تترادوتوکسین په نوم یادېږي (شکل ۳). Pufferfish چې Sphaeroides دی او په جاپان کې د Fugu په نوم پیژندل کیږي، د خوندورې غوښې د لرلو له کبله ډېر مشهور دی. دغه کب د ډېرو نړیو ټوټو په شکل پرې او خام خوړل کیږي. د Fugu دکب د پخولو لپاره د یوې ډېرې غښتلې تجربې لرلو ته اړتیا لیدل کیږي. مشکل د داخلي غړو د پرې کولو څخه ځان ساتل دي، کوم چې توکسین لري. سره له دې هرکال ځانته له جاپان څخه

د Fugu کب د خوړلو له کبله د ۷۵ وژونکو پېښو راپور ورکول کېږي. په نړيواله کچه دغه شمېره ۱۲۵ ته رسېږي. تترادوتوکسين صرف په Pufferfish کې شتون نلري بلکه په ځينو نورو کبانو لکه د Molidae, Diodontidae او Gobius په انواعو، په ځينو بحري ژوو لکه Starfish، چنگاښ، چينجيانو او آسماني رنگه کړې لرونکي اکتوپوس او بالاخره د وچې په ځينې ژوو کې لکه ذوحياتين (Taricha torosa) او د Atelopus په انواعو کې هم پيدا کېږي.



په دې کې شک نشته چې تترادوتوکسين د بکټريا په واسطه جوړېږي، که څه هم صحيح نوع يې معلومه نده. د Alteromonas يوې نوعې او د Pseudomonas او د Vibrio ځينو بحري انواعو په کښت کې د تترادوتوکسين، د ايپي تترادوتوکسين د انالوگونو او د انهايډروتترادو

توکسین د سنتیزنبودنه کړې ده. داسې فکر کېږي چې بکتريا د خوړو له لارې د کب معدي معایې تیوب ته ځان رسوي. توکسین د کب په کولمو کې د بکتريا په لاس جوړ او وروسته له جذب څخه یې او تخمدان ته انتقال مومي. د توکسین ترټولو لوړ غلظت د کب د هڅې اچولو سره په ډېر نږدې وخت کې لیدل کېږي. دغه معلومات هغه نظر ته لوړوالی وربخښي، چې د تراکم پروسه خپله د کب پواسطه ترکترول لاندې نیول کېږي. په قوي احتمال چې د نوموړي توکسین څخه د ښکار په مقابل کې د هڅیو په ساتلو کې کاراخیستل کېږي. اوداهم ښوودل شویده چې هغه Pufferfish چې په اکواریم کې دنیا ته راځي سمې نه وو. په طبیعي چاپیریال کې د کب د خوشي کولو څخه وروسته، دوی ډېر په بېره سمې شول.

تتراودتوکسین د اکزوپلازم له لارې د سودیم د آیون انتقال بې له دې چې د بل پلوه د پوتاشیم د آیون انتقال ته گواښ پېښ کړي، نهې کوي. د پوتنشل د عمل مینځ ته راتلل هم نهې کېږي. په مرکزي عصبي سیستم کې پربرقي هدایت ځانگړی عمل د نوموړي توکسین د غښتلو اغیزومسئول گڼل کېږي. په موږکانو کې یې د IP (داخل پریټوان زرق) تطبیق څخه وروسته LD_{50} د $10 \mu g/kg$ کچه ټاکل شوی ده. د خولې له لارې د تطبیق څخه وروسته دغه کچه له $322 \mu g/kg$ څخه عبارت ده، چې بیا هم ډېر ټیټ قیمت ده. که چیرې د انسان لخوا یې په توکسین ککړخواره وخورل شي وروسته له ۵ تر ۳۰ دقیقو یې په شونډو، ژبه اوستوني کې څارښت راڅرگندېږي او په تعقیب یې بې حسي رامینځ ته کېږي. نوموړي اعراض ترنهایاتو امتداد مومي. د دې په تعقیب نوراعراض عبارت د تودوخې درجې د ټیټوالي، د وینې ټیټ فشار، زړه بدی، په سینه کې درد او په غښتلي سمیت کې د عضلاتو درد، اختلاجات او تنفسي انحطاط رامینځ ته کېږي، کوم چې بالاخره په مړینه پای ته رسیږي. د ځانگړي انتي دوت د نه لرلو له کبله، صرف په عرضي ډول درملنه صورت نیسي. د معدې لواژ او د کانگو ایجادول هم تائیدشوي دي. د خولې له لارې د کاراکول د تطبیق په هکله فکر کېږي چې له توکسین سره نښلي که

څه هم په غټو کولمو کې هم وي اول جذب څخه يې مخنيوی کوي. جمعي درملنه يې له اکسيجنو تراپي، د وريدي لارې د مايعاتو اود اتروپين له تطبيق څخه عبارت ده. خولسيږې وړاندې اکثر قربانيان مړه کيدل. ولې د عصري جدي وقايوي تدابيرو له کبله اوس يې نيم ژوندي پاته کيږي.

ځمکني حيوانات يا د وچې حيوانات (Terrestrial Animals)

په دغه فايلم کې غڼې، لږمان (Archnoidea) او حشرات (Hexapoda) شتون لري. زهري انواع يې خپل زهر د نښن و هلو يا چيچلو پواسطه انتقالوي. نږدې ټولې غڼې سمې دي، ليکن صرف ځينې انواع يې، چې ډېرې يې په گرمو سيمو کې اوسي د انسان لپان له خطر ډکې دي. ډېر لږمان هم سمې دي، په داسې حال کې چې ډېر حشرات سمې ندي، سره له دې هم ځينې سمې انواع يې د يوشمېر وژونکو پېښو مسؤول گڼل کيږي، کوم چې د سمې غبرگون په نسبت ډېر د الرژيک غبرگون له کبله مينځ ته راځي.

غڼې Spiders (Araneae)

د ۲۵۰۰۰ په شاوخوا کې غڼې پيژندل شويدي، که څه هم ۱٪ يې اوږده او کافي غښتلي تيره غاښونه (chelizera) لري ترڅو د پوستکي څخه تير شي او په حقيقت کې سمې دي. ځينې خطرناکې نوعې يې د جنوبی اروپا په مديترانه اي

سیموکی پیدا کیږي، لیکن تر ډېره یې مرګوني پېښې په مرکزي او جنوبي امریکا، افریقا او استرالیا کې لیدل کیږي. د غڼو په خطرناک نسل کې د Atrax ssp, (Trapdoor spider), Trechona ssp, (Funnel-web spider), Phoneutria ssp spider یا hunting spider، Loxosceles ssp یا Brown or violin spider، Lycosa ssp یا wolf spider او Latrodectus ssp یا widow spider قرار لري.

Black widow spider یا Latrodectus mactans په خپل جنس کې ښه پیژندل شوېده او په اروپایي سیمو کې د غڼو یا عنکبوتونو د ډېرو پېښو مسوول ګڼل کیږي. دغه او د دغه ګروپ نور انواع نږدې په ټوله نړۍ کې پیدا کیږي. د widow یا کونډې نوم د هغه حقیقت له کبله دی، چې ښځینه جنس وروسته له جنسي عمل څخه نارینه جنس له مینځه وړي. د دوی د غټ جسامت (۱۰-۱۸ ملی متره) د لرلو په اساس صرف ښځینه جنس لوی او پوره قوي غاښونه لري ترڅو د انسان له پوستکي څخه د چیچلو په وخت ګټه واخلي. د Black widow spider زهر داسې ډول پیتایدونه لري، کوم چې په ځانګړي ډول د حشراتو لپاره سمی دي. هغه برخه یې چې د انسانانو لپاره سمی ده د α -Latrotoxin په نوم یادېږي او د داسې پیتاید لرونکی دي چې مالیکولي وزن یې ۱۳۰۰۰۰ ته رسیږي. نوموړی حیوان په مینځني ډول ۰.۲۲ ملی ګرامه توکسین په ځان کې لري. په موږکانو کې یې د وریدي زرقي لارې LD_{۵۰} ۰.۵۵mg/kg ده. د هغه حقیقت پر بنسټ چې کله کله په ځینو حالاتو (۳٪) کې د انسانانو د مړینې لامل ګرځي، داسې فکر کیږي چې انسانان د نوموړي توکسین په مقابل کې نسبت ژوونکو ته ډېر حساس دي. د چیچلو څخه وروسته یې اعراض عبارت له موضعي التهاب، د لمفاوي غوټو درد لرونکی پړسوب، په خپل سر د عضلو تقلص، د بدن د تودوخې د کچې لوړوالی، د وینې لوړ فشار، سردرد او زړه بدې څخه دي. ځینې وختونه مسموم دارېږي او چټیات وايي. په قلبي و عایي مشکلاتو اخته ناروغانو ته ځانګړی خطر

مخامخ دی. مرگ تر ډېره د زړه د حملې یا توقف له کبله په واقع کېږي. ترټولو ښه درملنه یې د کلسیم اود *Latrodectus mactans* د انتي وینوم له زرق څخه عبارت ده. د اعراضو پیل ډېر په ځنډ صورت نیسي نوله همدې کبله کافي وخت شتون لري ترڅو د انتي وینوم په واسطه درملنه شروع کړل شي. د ابايد په نظر کې ولرو چې کله کله خپله انتي وینوم د انا فلاکتیک شاک لامل گرځي. د همدې کبله د انتي وینوم کارونه په سپک او کمزوري سمیت کې ندی تضمین شوی.

Loxosceles د جنس وینوم د وځیم نکروتیک عمل لامل گرځي. خړنگه غڼه یا *Loxosceles recluse* نږدې ۷۰ میکروگرامه سمی پروټین لري، کوم چې له مختلفو برخو څخه جوړ شوی دی. د کوبای لپاره یې LD عبارت له ۰.۴۳mg/kg څخه ده. د *Loxosceles* پواسطه له چیچلو وروسته، شدیدې موضعي نکروز څرگندېږي چې په ډېرو حالاتو کې په انساجو کې غیر رجعي تخریب له ځان څخه پریږدي. په لوړه کچه د وینوم د سیستمیک توزیع څخه وروسته، غښتلی هیمولایزس مینځ ته راځي چې د پام وړ *Hematuria* (په ادار کې دوینی شتون) او کله کله د پښتورگو د عدم کفایې لامل گرځي. په لوړه کچه بدن ته د وینوم د ننوتلو وروسته اعراض په تبه، زړه بدې، کانگو، ژیرې، د توري غټوالي او د تحثري مشکلاتو پورې منحصر کېږي. په ورته ډول اعراض د *Lycosa ssp* په واسطه د چیچلو څخه وروسته هم مینځ ته راځي. د نوموړي وینوم د موادو د سایتوتوکسیکو اغیزو د درملنې لپاره، په موضعي اوسیسټمیک ډول د گلوکوکورټیکوئیدونو د کارونې لارښوونه شوې ده. سیسټیمیکې اغیزې باید چې په عرضي ډول تداوي کړل شي. د انتي وینوم کارونه همېش بریالې نه وي.

بله ډېره سمی غڼه له *Black Banana Spider* یا *Phoneutria nigriventer* څخه عبارت ده. درې نیوروټوکسیک پېتايدې برخې یې له خام وینوم څخه لاسته راغلي دي. د موډکانو لپاره یې LD د ۵۰µg/kg شاوخوا کې ده. د سمیت شدید

اعراض د تسمم څخه وروسته په بیره پیلېږي. وروسته له چیچلو څخه موبکان د خوثانیو په دوران کې فلج کیږي. په انسانانو کې اعراض وروسته له ۱۰ څخه تر ۱۲ دقیقو وروسته پیلېږي اود یو غښتلي درد سره راڅرگندیږي. مرکزي اعراض یې عبارت له تې، درنده خوله، ټکي کارډیا، اریتمیا، دروند اختلاج او بالاخره تنفسي توقف څخه دي. په بیره د عرضي درملنې سره د انتي وینوم تطبیق یوازینی کافي درملنه بلل کیږي.

لرمان (Scorpions or Scorpiones)

د لرمانو د ۸۰۰ نوعو له ډلې څخه نږدې ۷۵ نوعې یې انسان ته خطرناک دي. دوی ټول په حاره او نیمه حاره سیمو کې اوسیږي. ډېرې پېښې یې په کورونو کې رامینځته کیږي، په ځانګړي ډول په پخوانیو کورونو کې، چېرته چې د لرمانو لپاره ننوتل اسانه دي. دغه حیوانات د شپې له خوا غواړي چې په جامو او یا بوتونو کې ځان پټ کړي. د سهار لخوا کله چې څوک غواړي جامې واغوندي، لږم د حملې فکر کوي او چیچل کوي. ماشومان نسبت لویانو ته ډېر په خطر کې قرار لري، ځکه چې دوی له لږ پاملرنې څخه کار اخلي او بل دا چې وزن یې کم دی. په نړیواله کچه هر کال ۱۵۰۰۰۰ پېښې د لرمانو د چیچلوله کبله مینځ ته راځي، چې ډېرې یې په لاتینې امریکا او شمالي افریقا کې لیدل کیږي. په عمومي توګه ۲٪ مړینه لري، لیکن په ماشومانو کې دغه کچه ۲۰٪ ده. په طبي لحاظ د ځینو اړونده لرمانو په هکله شمېرې په جدول ۱ کې ښوودل شوي دي. د LD_{۵۰} په اړه یې معلومات پرموبکانو د تجربو څخه لاسته راغلي دي. د مقایسوي توکسیکولوژي له مخې، انسانان عموماً ډېر حساس دي.

جدول ۱: دسمي لږمانو څخه مينځته راتلونکې پيښې او ددوی داړونده زهرونو سميت		
جنس او نوع	موقعيت	په موږکانو کې د تحت الجلدې لارې د زهرو LD _{۵۰} (ملی گرام فی کلوگرام)
Androctomus ssp	شمالي افريقا او مينځنی ختيځ	
A.australis		
A.oeneas oeneas		
A.mauretanicus mauretanicus		
A.crassicauda		
A.amoreuxi		
Buthus ssp	فرانسه، هسپانيه، شمالي افريقا، مينځنی ختيځ	
B.occitanus tunectanus		
B. occitanus paris		
Bothotus ssp.	افريقا، مينځنی ختيځ، مرکزي اسيا	
B. judaicus		
B.minax		
Centruroides ssp	شمالي امريکا، مرکزي امريکا، جنوبي امريکا	
C.limpidus		
Leiurus ssp	شمالي امريکا، مينځنی ختيځ	

L.quiquestriatu

جنوبی امریکا

Parabuthus ssp.

P. transvaalicus

مرکزي اسيا ، جنوبی امریکا

Tityus ssp

T. serrulatus

T.bahiensis

T.trinitatis


د لږم زهرپه عمومي توگه د نيوروټوکسيک پېتايدونو څخه جوړ شويدي، چې د ۲۰ څخه تر ۷۰ پورې د امينواسيدونو اوږد ځنځيرلري. د ځينو انواعو په زهرو کې يې بايوجنیک امينونه ليدل شويدي. په نارمل ډول د لږم چيچل ډېر درد لري. کيدای شي وروسته له څه وخت څخه بې حسي رامېنځته شي. سيستمیکې اغيزې يې عبارت له اختلاجونو، ټکي کارډيا، اريتميا، زړه بدې، کانگو، په ليدلو کې له گډوډيو او تنفسي مشکلاتو څخه دي. په نارمل ډول مرگ د تنفسي سيستم د دريدلو له کبله مينځ ته راځي. که چيرې شخص په لومړيو ۲۴ ساعتو کې ژوندی پاته کېږي، نو د ناروغي څخه جوړيدل په نسبي ډول ښه دي. ښې پايلې د ځانگړي انتي وينوم د زرق څخه وروسته ترسترگو کېږي. دا مهمه ده چې د چيچلو څخه وروسته په کافي کچه انتي وينوم (تر ۳۰ ملی ليتروپورې) په لنډ ډول د وريدي لارې ورکړل شي. له هغه وخته چې ځانگړي انتي وينوم ته لاس رسى پيدا شوى ده، د لږم د چيچلو له امله مړينه بيا په خاص ډول په ماشومانو کې په ډراماتيکي ډول راتپته شوې ده.

حشرات (Insects or Hexapoda)

حشرې د ځمکې پرمخ د ژوو ترټولو بريالی صنف ده، چې د وچې پرمخ د ژوو ۹۰ سلنه حیاتي کتله یې نیولې ده. د څوگونو نوعو څخه ډېرې یې په فعال او یا غیر فعال ډول سمې دي. که څه هم په ځینو نوعو کې یې د زهر وکچه د انسان لپاره خطرناکه نده، ولې بیا هم د حشرو په واسطه له چیچلو وروسته ډېر مرګوني حالات رامنځته کېږي لکه د ګېڼو دموچۍ او نورو غومبسو په واسطه چیچل. نږدې په ټولو حالاتو کې دغه اعراض د سیستمیک الرژیک غبرګون په پایله کې پیښیږي او بالاخره د انا فلاکتیک شاک غبرګون رامنځ ته کېږي. ځینې انواع یې د کیمیاوي لحاظه ډېر داسې په زړه پورې توکسینونه لري، د دې په ځای چې له حیواني توکسینونو سره ورته والی ولري، د نباتي نړۍ د توکسینوسره ورته جوړښت لري. ځینې شوبلې (سل پښې لرونکې او زرپښې لرونکې) داسې دفاعي سیستم لري، کوم چې له هایډروسیانیک اسیدو، نایتریلونو، فینولونو، کینونونو او اروماتیک نایټرو مرکباتو څخه مینځ ته راغلی ده. همدارنګه د خسک (Hemiptera) په دفاعي سیستم کې مشبوع او غیر مشبوع هایدروکاربنونه، الکولونه، ایسترونه او شحمي اسیدونه ترسترګو شوي دي.

دهسپانوي میچ (Lytta vesicatoria) کوم چې په اصل کې ګونګټه (Bug) ده، د جنسي غریزې د مقوي په توګه پیژندل شوی ده. فعاله توکسین یې کانټاریډین دی، کوم چې د Tetrahydrophthalic acid anhydride یو داخلي ایتريډ (شکل ۴). دغه مرکب په پوستکي باندې مشخصې تهاکې راپیدا کوي او همدارنګه د مخاطي غشاء لپاره مخړش خاصیت لري. په انسانانو کې یې تسمم لږ لیدل کېږي او په ډېرو حالاتو کې سمیت د پوډرشوي حشرې د لوړ ډوز د

اخيستلوڅخه مينځ ته راځي. هڅوونکې اغيزې يې د انسان د تذکیر د آلي د مخاطبي غشاء د تخريش له امله دي، چې په پايله کې يې په خپل سري ډول کلکوالی مينځ ته راځي. د خولې له لارې د کانتاريډين د سمې کچې له اخيستلو وروسته د کولمو او اداري تناسلي تيوب په ټولو برخو کې خاربنت رامينځ ته کوي. اعراض يې په ژبه اوستوني کې د تياکو له راختلوڅخه چې د لارو(لعاب) جاري کيدل، زړه بدی، کانگې اوپه معده او کولمو کې د عضلاتو د تشنجي تقلصات ورسره مله وي، عبارت دی. د اداري او تناسلي تيوب مخاطبي غشاء له خاربنت او خونريزي سره مخامخ کېږي. ټکي کارډيا مينځ ته راځي او په تعقيب يې برادې کارډيا څرگندېږي. شونې ده چې تيتانيک اختلاجات، پرتې او کوما هم رامينځته شي. د معدې او کولمود اپيتليم د ويجاړتيا له امله د کولموپه داخل کې د مايعاتو تراکم رامينځ ته کېږي اوپه تعقيب يې هايپووليمیک شاک ترسترگو کېږي. د لويانو لپاره دهسپانوي پوډرشوي مچانو وژونکی ډوز، څوگرامه دی، ولې ۱۰ ملی گرامه خالص کانتاريډين کيدای شي وژونکي وي. داسې راپور هم ورکړل شوی ده چې په يو حالت کې يو کس د ۷۵ ملی گرامو د خوړلو وروسته هم ژوندی پاته شوی ده. د ځانگړي انټي دوت په نشتوالي کې درملنه په عرضي ډول صورت نيسي.



ځینې حشرات زهري مرکبات له بوټو څخه اخلي او بیا یې په خپل ځان کې ذخیره کوي. ځینې وختونه دغه اخیستنې په لاروایي مرحله کې صورت نیسي او نوموړي مواد د استحالې په دوران کې شتون لري. په دغه حالت کې ځوان حشرات پرته له دې څخه چې سمې بوټي مصرف کړي، سمې مواد لري. دغه مواد د پتنگانو په ځینو انواعو کې له سترگوشوي دي چې، کوم چې په لاروایي مرحله کې د نباتاتو پانې خوري او د بلوغ په دوران کې یې خوږه شیرې ځکي. سمې مرکبات ترډېره د نبات په پانېو کې شتون لري او په شیرې کې کم لیدل کیږي. دغه توکسینونه حشرات د ښکارکوونکو په مقابل کې ساتي. نور حشرات چې د نباتاتو سمې مواد په ځان کې ذخیره کوي عبارت له خسک او له نورو انواعو څخه یی عبارت دي. د دوي لپاره سمې غذايي بوټي عبارت له اولندر (Cardiac glycoside)، *Aristolochia clematitis* چې *Aristolochic acid* لري او *Senecio ssp* چې د غیر مشبوع پیرولیزیډین الکلویډونه لري، څخه دي.

Hymenoptera

په دغه جنس کې میږیان، د گبینو موچی، غومبسي او غټ غومبسان شامل دي. نوموړي حشرات یو ځانگړې زهري دستگاه لري، چې د زهروله یوې غوټې اوزرقې آلې یعنې نیښن څخه مینځ ته راغلې. د موچیو په واسطه هرسري یا ښځه په ټول عمر کې حتماً یو ځل چیچل کیږي. که څه هم چیچل یې ډېر دردناک وي، دوی په نارمل ډول بې ضرره دي، ولې په هغه صورت کې خطرناکې دي چې په عین وخت کې په سلگونو یې سړی وچیچي. سره له دې نور داسې حیوانات، لږمان اوماران په هغه گروپ کې ندي شامل شوي چې د دومره زیاتې کچې د مړینې مسؤل وي. علت یې دا دی چې ډېر انسانان د لومړي ځل چیچلو سره له ځان څخه الرژیک حساسیت ښيي. دغه الرژیک غبرگون له هر ځل چیچلو څخه وروسته پسې غښتلی کیږي اوبالاخره د انافلاکتیک شاک د مینځ ته راتلولامل گرځي. هغه کسان چې د موچیو او غومبسوپه وړاندې د حساسیت تاریخچه لري باید قویاً احتیاط وکړي اوله ځان سره د چیچلو په وخت او په جیب کې هغه کیت ولري چې د هستیامین ضد مواد او اپی نفرین ولري.

د Hymenoptera جنس وینوم، بایوجنیک امینونه، کینین، پیتایدونه او انزایمونه لکه فاسفولپاز او هیالورینیدازلري. نوموړي امینونه د درد د مینځ ته راتللو، په داسې حال کې چې نوموړي انزایمونه د انساجو د موضعي اړیکو د ویجاړتیا مسؤل دي. کینینونه یواځې د غومبسو او غټو غومبسو په وینوم کې شتون لري اود وینې د فشار د راټیټیدولامل گرځي.

د گبینو د موچیو زهر ښه څیړل شوي دي اود سمې پیتایدونو جوړښت یې ښه پیژندل شوی ده. اپامین (Apamin) د وچ وزن له مخې دوه سلنه جوړوي، کوم چې ۱۸ امینواسیدونه لري. په مرکزي عصبي سیستم باندې اغیزه کوي اود فرط

تحركيت لامل گرځي. د ۵۰ سلنه وچ وزن په لرلو سره ميليتين (Mellitin) د گڼنو د موجيو بنسټيز مرکب دی. دغه يو قوی قلوي (۱۰ Pka) پټايد دی چې ۲۲ امينو اسيدونه لري. په زړه پورې داده چې دغه پټايد، سلفرلرونکی (سيستين، ميتيونين)، اروماتيک (فينيل الانين، تايروزين) او هتروسکليک امينو اسيدونه (هستيدين) نه لري. دغه مواد د پاکوونکي يا ډيټرجنټ په توگه عمل کوي او له همدې کبله هيمولايتيک اغيزې لري. له دې نه علاوه دغه توکسين ماست سيلونه او دمويه صفحات تخريبيوي. همدارنگه ميليتين ښويو عضلاتو ته تقلص ورکوي کوم چې دوز يې زړه تنبيه کوي، کوم چې په لوړ دوز سره نهې کيږي. په موربانو کې يې له وريدي زرق څخه وروسته LD_{۵۰} له ۳.۵mg/kg څخه عبارت ده. د موجيو په وينوم کې دريم پټايد د ماست حجروي د بي دانه کولو يا [Mast cell degranulating peptide (MCDP)] پټايد دی. دغه ماده ۲۲ امينو اسيدونه لري او د موجيو د وينوم دوه سلنه جوړوي. په موربانو کې يې د وريدي زرق له لارې LD_{۵۰} د ۴۰mg/kg څخه عبارت ده. دغه پټايد د ماست حجروي تخريبيوي، کوم چې التهابي مواد لکه هستامين، سيروتونين او کينينونه آزادوي.

ميربان (Formicidae)

په دغه کورنۍ کې چيچونکي او خوړونکي نماينده گان شتون لري. وروستني يې خپل زهر د موجيو او غومبسو په څېر زرقوي. ميربان نږدې ۲۰۰۰ انواع لري، چې ډېر يې د انسان لپاره خطرناک نه دي. د اور په نوم ميربان (Fire ants) يا Solenopsis، کوم چې د امريکا د متحده ايالاتو د جنوبي برخو لپاره انډميک دي، ډېر خطرناک دي. په چيچلو پسې غبرگون کيدای شي چې د پوستکي له سوروالي څخه تر د پوستکي د وځيم التهاب، چې د موضعي التهاب او نکروز سره مل وي، پورې ورسېږي. د بياځلي چيچلو پسې کيدای شي چې انافلاکتيک


غبرگون ښکاره شي. د اور د مېړي له زهرو څخه د پېپيريډين مختلف اوسمي مشتقات تجريد شوي دي.

Amphibia

ډېر ذوحياتين سمې صنف بندي شويدي. د دوی د توکسينو په اړه داسې فکر کېږي چې له خپل کوربه څخه د ښکارکوونکو په مقابل کې او د میکروارگانيزمو په واسطه د دوی د پوستکي د ککړتيا څخه مخنيوی کوي. نوموړي توکسينونه د پوستکي په ځانگړيو غوټو کې توليديږي. د دغه حيواناتو اغيزمنتوب د دوی د زړه پورې کيمياوي جوړښت او په بيولوژيکي عمل کې د انحراف له کبله دی. ځينې ذوحياتين (Dendrobatidae) ډېر غښتلي توکسينونه توليدوي، چې په حيواناتو کې شتون لري.

د اندول مشتقات

د دغه گروپ د بې لکۍ انواع (Bufonidae)، سيروتونين پورې اړونده بايوجنیک امينونه لري. د دوی په مينځ کې بيوفوتينين (N, N-dimehtyl serotonin) او د دوی د ميتايل ايتري شتون لري. نور مرکبات يې له Bufotenidine، Bufotionine او dehydorbufotenine له درې کره ايزو مشتقاتو څخه عبارت دي (شکل ۵).



د N-alkylated indol مشتقات په مرکزي عصبي سیستم کې د سیروتونینرجیک (۵-HT) آخزو ته ډېر تمایل لري. چې د همدې کبله دغه حیوانات له ځانه رواني اغیزې نیسي. نوموړي مرکبات LSD ته ورته اغیزې لري، چې ډار او بیم اود لیدلو مشکلات هم ورسره ملګری وي. O-methylbufotenin په دې برخه کې د ۵۰ μg/kg اغیزناک ډوز په لرلو سره، ډېر فعاله دی. اوس داسې نښوول شوي ده چې د سیروتونین N-methylation د indolethylamin- په سیستم کې صورت نیسي. داسې څرګنده شوې ده چې لاسته راغلی Bufotenin په اکثره رواني ناروغیو کې رول لوبوي، لکه شیزوفرنیا.

د دغه حیواناتو څخه د لاسته راغلي خلاصې Hallucinogenic عمل، له پخوا زمانو څخه پیژندل شوی ده او د پری د جادوگری نسخې پرمه دې بنسټ کار کوي. په لاندې دوو متنونو کې د William Shakespear's Macbeth لخوا یو مثال ورکړل شوی ده.

دریم نمبر ماده:

..... د لوی دیګي د ننه ورځي، اوبیا زهر کولموته ځي. چونګې چې شپه او ورځ د سړو تیږو لاندې تیروي، یو دیرش ډوله زهر لري. که زړځله جوش ورکړل شي بیا به هم جادو ته ورته څواړه وي.

پنځمه ماده:


... د چونګېو شیر، دافعي مار تېل. دغه مواد به له یوه ارامه او صالح ځوان څخه لېونی جوړ کړي.

په روښانه ډول په هغه مهال هم دا ښه معلومه وه چې د چونګېو سرېښناکه ماده داسې مرکبات لري چې په مغزو اغېز کوي.


د دغه ډول چونګېو زهر د انسان لپاره په عادي شرایطو کې خطرناک نه دي ځکه چې د چونګېو سره له تماس وروسته د انسان له پوستکي څخه یې تیریدل کم دي. ژوونکي نسبت انسانانو ته د نوموړي توکسين د سیستمیک تطبیق په وړاندې لږ حساس دي. په مورګانو کې د Bufotenin او 5-methylbufotenin وژونکی ډوز په ترتیب سره ۲۹۰mg/kg او ۱۱۵mg/kg دی. ترټولو کم حساس په خپله ذو حیاتین دي. عادي چونګېو بې له کومو اعراضو څخه تر ۲۵۰۰mg/kg پورې زغملی شي، په داسې حال کې چې ۱mg/kg د پسونو لپاره وژونکی دی. مرګ له یو لږ تېرېدلو او اختلاجونو او بالاخره د تنفسي حرکاتو له دریدلو وروسته پیښیږي.

ستروئیدونه

په چونگنبوکې د ستروئید ته ورته توکسينونو کيمياوي جوړښت، قلبي گلايکوزيدونو ته چې په يو شمېر بوټو (Oleander , purple foxglove) کې شتون لري، ورته دي. توکسين د پاروتيس په غده کې جوړېږي او بيا د لارو له لارې اطراح کېږي. د جينين نماينده يعنې Bufotaline او گلايکوزيد يعنې Bufotoxin په شپږم شکل کې ښودل شوی ده. د بيولوژيکي اغيزو موخه يې ځانته زړه دی چې د $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$ د فعاليت د مخنيوي په اساس منفي کرونتروپيک او ايونوتروپيک خاصيت له ځان څخه ښيي. لوړ ډوز يې د زړه د درېدا لامل گرځي. پر زړه باندې له اغيزو پرته نوموړی توکسين د موضعي بې حسي کونکي خاصيت هم لري وژونکی ډوز يې ډېر په نوع پورې اړه لري اوله ۲۰۰ څخه تر $1000 \mu\text{g/kg}$ ډوز پورې د تفاوت په حال کې ده.



د ستروئیدونو یوه په زړه پورې ګروپ چې د اووه کاربنه کړۍ سیستم لري د سلماندرونو په ځینو ډولونو کې شتون لري. د حیوان لپاره یې ګټه تر ډېره د دوی د انتې بیوټیکي اغیزو د لرلو له کبله ده. ځکه چې د دوی په واسطه په روښانه د بکټریاوو او فنجیانو د ډبریدلو مخنیوی ترسترګوشوی دی. نوموړي مرکبات په همدې ډول د عالي حیواناتو لپاره هم سمې دي. د مورکانونو لپاره یې د LD₅₀ قیمت له ۱۰۰ mg/kg څخه کم دی. د عمل لپاره یې موخه عصبي مرکزي سیستم دی. د توکسین د تطبیق څخه وروسته د عضلاتو تقلص او د تنفس دریدل رامینځ ته کیږي.



الکلوئیدونه


تر ټولو سمې ذوحیاتین د جنوبي او مرکزي امریکا په باراني دښتو کې ژوند کوي او د *Dendrobatidae* او *Phyllobatidae* په کورنۍ پورې اړه لري. دوی وړې او ډېرې رنگه چونګښې دي، د ونې په ښاخونو (*Greek dendros*) او پاڼو (*Greek phyllos*) ته څیړي، چیرې چې دوی د حشراتو لپاره انتظار کاږي. د یو ښایسته رنگ د لرلو له کبله کوم چې د دوی د ممکنه ښکار کونکو لپاره د خطر د

زنگ په خیر عمل ترسره کوي ، دوی ته رنگه چونگنې هم ویل کیږي اوځکه د کولمبیا او پانامې هندوان دغه توکسین د ښکار پر غشواچوي. د چوکو په نامه خلک د چونگنې دغږ تقلید کوي، کوم چې حیوانات ځانته را جلبوي. د دې لپاره چې خپل د ورغوي پوستکي د سخت زهري سرینسناکه مادې څخه وساتي ، دوی مخکې له دې چې له چونگنې سره تماس وکړي ځان په پانیو کې نغاري. وروسته بیا چونگنې د څوکه لرونکي لرگي په واسطه وهل او د اور خواته کیښودل کیږي. دغه سخته هڅونه د دې لامل گرځي ترڅو چونگنې په لوړه کچه توکسین اطراح کړي. دغه سمی ماده د چونگنې د پوستکي سره د مستقیم تماس په واسطه، پرغشو خپرول کیږي.

د ۵۰ په شاوخوا کې غشي د یوې چونگنې په واسطه ککړیدلای شي. ترټولو سمی نوع (*Phyllobates terribilis*) په کافي کچه زهر لري او کولای شي چې ۲۰۰۰۰ مورکان او یا ۱۰ انسانان ووژني.

نوموړي توکسینونه چې په الکلوتیدونو پورې اړه لري په (*Batrachotoxins*) له (*Dendrobates Pumilitoxins*) څخه ، (*Phyllobates aurotaeni*) څخه او (*Histrionicotoxins*) له (*Dendrobates histrionicus*) څخه (پومیلو څخه) توکسینو باندې ویشل کیږي (شکل ۸). ټول نوموړي غښتلي عصبي او عضلي توکسینونه دي. د دوی په مینځ کې *Batrachotoxin* ترټولو غښتلی طبعي توکسین (په مورکانو کې یې د تحت الجلدی لارې LD_{50} ، $2\mu g/kg$ ده) دی، چې تراوسه پیژندل شوی ده. عمل یې په عصبي او عضلاتي حجراتو کې د سودیم د چینل د فعالیت د مخنیوي له کبله دی، کوم چې د پوتنشیل د عمل نه وروسته ناشوني ده چې کولاپس وکړي. او دا د یو دایمي *Depolarization* د مینځ ته راتلولامل گرځي. دغه عمل د *Tetradotoxin* د عمل مخالف ده چېرې چې د سودیم د چینل خلاصیدل نهی کیږي.

Pumilitoxin B د عضلاتي حجرو د داخلي ذخایرو څخه د کلسیم د آیون د آزادیدو لامل ګرځي او په اندوپلازمیک ریتیکولم کې یې له جذب څخه مخنیوی کوي. چې دا د اوږدمهال لپاره د عضلو د تقلص لامل ګرځي. سپازم تولیدوونکی عمل په عصبي حجرو کې د کلسیم د آیون د ننوتلو څخه نور هم ګړندی کیږي، چې په تعقیب یې د نیورو ترانسسمیټرونو په آزادیدو کې هم ډېروالی راکشي. Pumilitoxin C او Gephyrotoxin د حجروي پردو ترمینځ د Na^+ او K^+ د تیریدو مخنیوی کوي، کوم چې په عصبي-عضلي نقاطو کې د استایل کولین په واسطه پیلیږي، په پایله کې د اسکلیټي عضلو فلج مینځ ته راځي.



پیتایدونه

د ذوحیاتینو ډېر ډولونه دهغو پیتایدونو شکل لري چې له بایوجنیک امینونو سره اړه لري. د دوی په مینځ کې Physalein ، Caerulein او Ranatensin ځای لري. د نورو بایوجنیکو امینو په څېر، چې په ټی لرونکو کې شتون لري لکه براهی کینین، نوموړي مرکبات هم بنوی عضلو ته تقلص ورکوي، دویني فشار راتیټوي او د شعریه وي رگونو د دیوال د نفوذ وړتیا ډېروي.

خزنده گان (Reptiles)

چرمبنکی (Lizard)

د چرمبنکیو دوه سمي نوعې د امریکا د متحده ایالتونو په جنوبي برخو او شمالي مکسیکو کې د Heloderma suspectum او Heloderma horridum په نوم ژوند کوي. دغه ژوي خپل زهر د چیچلو په مهال زرقوي ، کوم چې عموماً سیروتونین او یو ډول انزایمونه لري. د دغو انزایمونو په مینځ کې Aminooxidase ، Hyaluronidase ، Phospholipase A ځای لري. د خام توکسین LD₅₀ (په موږکانو کې ، داخل پریټوان) ، ۱،۴mg/kg ده. وژونکي حالتونه یې ډېر کم دي. په ډېرو حالاتو کې مصدوم شخص له څو ورځو څخه نیولې بیاتر دوو هفتو پورې په خپله جوړېږي. که چیرې زهر په لوړه کچه زرق شوي وي د وینې فشار او جریاني مایع کمیږي ، په پایله کې یې په ځواب کې ټکي کارډیا مینځ ته راځي. مرگ کیدای شي چې په بطیني تقلصاتو کې د کموالي له کبله رامینځ ته شي. ځانگړي انتبي وینین یې شتون نلري.

ماران

مارانو ته د بشريت د پام وړ ګرځېدلو، د مارانو د ځينو نورو د وژونکو خطراتو د لرلو په نسبت د تاريخ په اوږدو کې صورت نيولی ده. د ۳۵۰۰ نوعو په مينځ کې ځانته ۳۷۵، نږدې ۱۰ فيصده يې زهري دي. دغه ماران په څلورو فرعي ټولګيو ويشل شوي دي.

۱. Elapidae چې عبارت له کورال مار، کراتيس، ممباس او کوبرا څخه دي.

۲. Viperidae چې بېلګه يې وايپر (Vipers) ماران دي.

۳. Crotalidae چې بېلګه يې رټل (اوزلرونکي) ماران (Rattlesnakes) دي.

۴. Hydrophiidae چې بېلګه يې بحري ماران (Seasnakes) دي.

زهري ماران د زهرو يوه دستګاه لري چې له زهري غوټو کوم چې له پاروتيس غدې سره ورته والی لري، له غاښونو کوم چې د پيچکارۍ د ستنې په څېر عمل کوي، څخه مينځ ته راغلې ده. په نړيواله کچه نږدې هر کال ۱,۷ ميليونه کسان د مارانو په واسطه چيچل کيږي چې ۴۰۰۰ يا ۲,۳۵% يې د مرګ ستوني ته لويږي. د مړينې کچه يې د مارانو په ډول پورې اړه لري.

اروپايی وايپر ۱%

هندي کوبرا ۳۲%

تور مامبا ۱۰۰%

د مارانو د زهرو په هکله یوه سروې په جدول ۲ کې ورکړل شوی ده. په یو ځل چیچلو کې د زرق شوي زهرو د کچې اوسمي قدرت یا پوتنشیل (lethality coefficient) ترمینځ نسبت، د هندي کوبرا او تور مامبا لپاره یوشان ده، که څه هم هغه مړینه چې تر سترگو شوې ده بل ډول ده. او دا د هغه حقیقت له کبله ده چې مامبا ګان ترجیحاً پر سر او اورمیر، په داسې حال کې چې کوبرا په متونو او لینګیو چیچلوته لومړیتوب ورکوي. په وروستني حالت کې، داشونې ده چې د زهرو وېش د اغیزمن شوي غړي په تړلوسره راکم کړو. د مړینې د ضریب په نظر کې نیولو له مخې، اروپایي مار د انسان لپاره په ټوله کې هیڅ خطرناک نه دی. یوڅو وژونکي حالتونو چې راپور ورکول شوي دي، کیدای شي چې له بده مرغه په لویو رګونو کې د مستقیم زرق له کبله او یا د مصدوم د زیات حساسیت له کبله رامینځ ته شوي وي. په بیاځلي ډول چیچل هم کیدای شي چې د انا فلاکتیک شک غبرګون رامینځ ته کړي.

جدول ۲: دیو شمېر مارانو د زهرو اصغري وژونکي ډوز		
نوع	په یوځل چیچلو کچه	د انسان لپاره وژونکي ډوز
Elapidae		
ملی ګرام	۱۵۰	۱۵۰
Naja bungarus (شاهی کوبرا)	۱۰۰ ملی ګرامه	۱۲ ملی ګرامه
Bungarus candidus (Malayan krait)	۵ ملی ګرامه	۱ ملی ګرام
Bungarus caeruleus (Indian krait)	۱۰ ملی ګرامه	۲ ملی ګرامه
Dendroaspis polylepis (black mamba)	۱۰۰۰ ملی ګرام	۱۲۰ ملی ګرام
Viperidae		

۴۲ ملی گرامه	۷۰ ملی گرامه	Vipera russeli(Russel's viper)
۵ ملی گرامه	۱۲ ملی گرامه	Viper carinatus
۷۵ ملی گرامه	۱۰ ملی گرامه	Vipera berus(European viper)
Crotalidae		
۲۰۰ ملی گرامه	۲۰۰ ملی گرامه	Bothrops neuwiedii(Urutu)
۱۰۰ ملی گرامه	۱۴ ملی گرامه	Trimeresurus gramineus
د(۱۹۹۴) Habermehl پرېنست		

د مار د زهرو کیمیاوي جوړښت ډېر پیچلی دی. ځینې مختلف ډوله مرکبات یې کله کله سینرجیتیک عمل سرته رسوي. فعاله سمی مرکبات یې پیتایدونه دي، چې د ځنځیر اوږدوالی یې له ۲۰ څخه تر ۷۰ امینواسیدونو پورې رسېږي. نوموړي پیتایدونه گڼ شمېر دوه سلفایدي پولونه لري، کوم چې د زهرو د مشخص دری بعدی جوړښت د مینځ ته راتلو مسؤول دي لکه د نورو ټولو ډېر زهري حیواناتو په څېر، د پیتایدونو سمی عمل ترجیحاً د محیطي او مرکزي عصبي سیستم په وړاندې صورت نیسي. چې همدا اغېزې په چټکۍ سره د ښکار او یا حمله کوونکي د فلج کیدو لامل گرځي.

د Elapid او Hydrophiids توکسينونه ترجیحاً په مابعد ساینپسي غشاء او عصبي عضلي بند کې د استایل کولین د آخزو په وړاندې عمل کوي. β -Bungarotoxin یا Bungarus multicinctus په ماقبل ساینپسي غشاء کې عمل کوي، په پایله کې یې په تدریجي ډول د استایل کولین د کموالي لامل

گرځي. د وایپر د نوعې د مارانو ځینې توکسینونه قلبی وعایي شاک مینځ ته راوړي. داسې فکر کېږي چې د دوي د عمل موخه په بصله یا Medulla oblongata کې قرار لري. دغه توکسینونه له نورو څخه توپیر لري او د ځنځیر اوږدوالی یې لنډ دی (له ۳۰ څخه تر ۴۰ امینواسیدونو پورې). د انزایمونو یو ډول چې په زهرو کې شتون لري، د چیچلو د ټکي په شاوخوا کې د نسجونو د تجزیې په اساس د زهرو ویش لوړوي. تراوسه پورې د مار له زهرو څخه د ۲۵ په شاوخوا کې مختلف انزایمونه لاسته راغلي دي. د دوي کتلستي عمل په څلورو گروپونو کې روښانه کیږي (جدول ۳).

جدول ۳: هغه انزایمونه چې د مار په زهرو کې شتون لري	
انزایم	
پروتيولایتيک انزایمونه	
پروتینازونه	Crotalidae , Viperidae
پوتیازونه	Crotalidae , Viperidae
پپتیدازونه	Crotalidae , Viperidae
اندوپپتیدازونه	Crotalidae , Viperidae
ارجنین استرهايدرولاز	Crotalidae , Viperidae
نيوکلوتیدازونه	Hydrophiidae
فاسفومونو/استراز	د Colubridae مارانو څخه پرته په ټولو کې شتون لري
فاسفو دای استراز	په ټولو زهری مارانو کې شتون لري
۵-نيوکلیداز	په ټولو زهری مارانو کې شتون لري

NAD-نیوکلئو تیداز	په ټولو زهری مارانو کې شتون لري
DNase	په ټولو زهری مارانو کې شتون لري
RNase	د <i>Naja oxiana</i> څخه پرته په نورو کې کم دي
د نسجونو-تخریب کوونکي انزایمونه	
کولاژناز	Crotalidae , Viperidae
هیالورونیداز	په ټولو زهری مارانو کې شتون لري
فاسفولیپازن	په ټولو زهری مارانو کې شتون لري
نور انزایمونه	
استایل کولین استراز	Elapidae , Viperidae
لاکتات دیهایدروجناز	Elapidae
L-امینو ساوړوکسیداز	په ټولو زهری مارانو کې شتون لري
ترومبین ته ورته انزایمونه	Crotalidae , Viperidae

پروټیولایټیک انزایمونه د پروټینو هایډرولایزس گړندی کوي. دغه انزایمونه په عمومي توګه د کروتالید په نوم مارانو کې شتون لري او د ریتل نوع مار له چیچلو وروسته د نسجونو د نکرز د عمل مسؤل ګڼل کیږي. د دغه انزایمونو له ډلې څخه خو بې د Viperides او Elapids په زهرو کې شتون لري، او Hydrophiids نږدې له دې څخه پاک دي. په ځانګړي ډول د بحري مار پواسطه د چیچلو څخه وروسته، هیڅ ډول نکروټیک غبرګون نده ترسترګوشوی.

د نیوکلوتاید تجزیه کوونکي انزایمونه نږدې د ټولو مارانو په زهرو کې شتون لري. دوي بنسټیز د انرژي تولیدوونکي مالیکولونه (ATP)، دویمي پیغام وړونکي یا مسنجرونه (cAMP) او د ارجاع او تجمض مسؤل کوانزایمونه (NAD, NADH, NADP, NADPH) له مینځه وړي. نو له همدې کبله دغه انزایمونه په ډېرو بنسټیزو بیوشیمیایي پروسو کې مداخله کوي، کوم چې له دوي څخه غښتلي سایتوتوکسیک مواد جوړوي. ځینې انزایمونه لکه استایل کولین استراز، L-aminooxidase او Lactatdehydrogenase د ځینو مارانو په زهرو کې موندل کیږي.

ځینې انزایمونه په ارتباطي نسج اغیزه کوي. د دوی په مینځ کې کولاجناز او هیالورینیداز ځای لري، کوم چې د چیچلو د ټکي شاوخوا نسجونه سره سستوي. فاسفولیپازونه پر حجروي غشاء له ځان څخه ویجاړوونکې اغیزې ښيي. چې همدا عمل سایتوتوکسیک انزایمونه د دې وړ گرځوي ترڅو حجرې ته ورننوزي. د دغو انزایمونو په واسطه د وینې د سرو کریواتو له مینځه تلل د شدید هیمولایزس لامل ګرځي. د Viperidae او Crotalidae زهر په خپل ترکیب کې ترومبین ته ورته انزایمونه لري، چې په *in vitro* ډول د پلازما او یا د فبرینوژن د خالص محلول د لخته کیدو لامل ګرځي.

د مار د چیچلو کلینیکي علایم د څو متنوع فکتورونو لکه عمر، د بدن وزن، د زهر ترکیب، او همدارنګه سمیت اود مار په کچه پورې اړه لري. د چیچلو د ټکي موقعیت هم مهم دی. سیستمیکې اغیزې لکه د قلبي وعایي سیستم او د مرکزي عصبي سیستم ګډوډی، وروسته له هغه په چټکۍ څرګندېږي چې د چیچلو په مهال د وینې کوم رګ ووهل شي. د Crotalidae او Viperidae پواسطه له چیچلو وروسته شديده نکروز چې ډېر درد هم ورسره مل وي لیدل کیږي. که چېرې

مصدوم د مارچيچلو پخوانۍ تاريخچه ولري كيدای شي چې انافلاكتيک شاک هم ورته پېښ شي.

نن ورځ اکثره مريضان د مار له چيچلو څخه ځانگړي انتبي وينين ته د لاس رسي له برکنه ژوندي پاته کيږي. ولې دا هم ډېره مهمه ده چې د درملنې د شروع څخه مخکې ډېر وخت بايد ضايع شوی نه وي. که چېرې د سميت اعراض زر شروع شول، د امکان په صورت کې بايد چې په اغېزمن غړي د فشار راوړل شروع کړل شي. دا مهمه ده چې پر اغېزمن شوي غړي د فشار واردول صرف د وريدونو او لمف جريان کمزوری کوي او په شريانونو اغېز نه لري. د چيچل شوي موقعيت څيرې کول مجاز ندي. چې دا د اوږد مهال لپاره د وينې بهيدل زياتوي او په وينه کې د زهرو خپريدل زياتوي. د آراموونکو درملو کارول د دې لپاره چې د مريض حساسيت راکم کړي، گټور دی. که چېرې ډېر درد شتون ولري بايد چې محيطي اويا مرکزي درد ضد درمل وکارول شي. د الرژيک غبرگون د شونتيا د شتون له کبله، دانتي وينين انفيوژن صرف بايد د envenomation په وځينو حالاتو (د مار د ټولو زهرو ۲۵%) کې تطبيق کړل شي. د انافيلاکتيک شاک غبرگونونه چې وژونکي نتايج لري په ۰.۳% پېښو کې ليدل کيږي.

د انتبي وينين ډوز، بدن ته د زرق شوي زهرو د کچې پورې اړه لري، نه د مريض د بدن په وزن پورې. دا کيدای شي چې د ۱۰ او ۳۰۰ ملي لېټرو ترمينځ تفاوت ولري. يو ولانسه او همدارنگه څو ولانسه انتبي وينين شتون لري. که شونې وي بايد چې يوولانسه انتبي وينين بايد وکارول شي.


د پروتوزوا او الجیانو توکسینونه

بحري فایتوپلانکټون گڼ شمېر ډولونه لري، کوم چې غښتلي توکسینونه تولیدوي. تر ټولو زیات یې په Dinoflagellates پورې اړه لري. په عمومي توګه توکسینونه د Pyrodinium ، Gonyaulax ، Protogonyaulax ، Gambierdiscus ، Gymnodinium او Ptychodiscus جنسونو کې له سترګو کیږي. د کال په څو ګونو وختونو کې دغه الجیان په لویه کچه تکثر کوي. چې دا په د ملاحظې وړه توګه په انډمیک ډول د ماهیانو د نړۍ د له مینځه تلو لامل ګرځي. د انسانانو مسموم کېدل دهغه غذايي ځنځیر په واسطه صورت نیسي چې له نرم تنانو څخه شرمپونو ته او بیا کبانو ته غزېږي.

ساکسین توکسین (Saxitoxin)


ډاینوفلاجاتونه لکه Gonyaulax catenella ، Gonyaulax tamarensis ، Ptychodiscus(Gymnodinium) breve ، Gonyaulax excavate او Ptychodiscus veneficum فوق العاده د ساکسین توکسین په نوم سمې مرکبات لري (شکل ۹). دغه مواد ممکن دهغه بکټریاوو په واسطه جوړېږي چې په همزیستي ډول له Dinoflagellates سره ژوند کوي. فایتوپلانکټون د صدفونو په واسطه چې نوموړي مواد لري په دام کې اچول کیږي خپله صدفونه د دغه توکسین د سمې اغیزو په وړاندې حساسیت نلري. په څو موسمونو په ځانګړي ډول د اوږي په موسم کې انسانان د صدفونو د مصرف څخه وروسته په دغه ډول سمیت اخته کیږي. اعراض یې په ژبه او شونډو کې د چاودلو سره پیل او په تعقیب یې د خولې د عضلاتو فلج راڅرګندیږي. وروسته بیا فلج له خولې

څخه ټول بدن ته خپريږي. کله چې نوموړی فلج پر حجاب حاجز اغيزه کوي د تنفسي مشکلاتو له وجې مرگ رامینځ ته کيږي




بروی توکسينونه (Brevetoxins)

د مکسيکوپه خليج کې ځينې وختونه داسې حادثه پېښيږي چې د Red tide په نوم ياديږي. دا حالت د Dinoflagellates يعنې Ptychodiscus(Gymnodinium) breve د غښتلي تکثيره نتيجه کې مينځ ته راځي، چې د زرگونو ميليونو کبانو مړينه هم ورسره مله وي. Ptychodiscus داسې ډله توکسينونه لري، کوم چې د کيمياوي جوړښت او سمې اغېزو له مخې د Saxitoxin سره توپير لري. Brevetoxins (شکل ۱۰) په غيرعادي توگه د څو کره ايزو ايترو خطي جوړښت لري.



دغه توکسینونه په ساینسپوښوونکي د سودیم د چینل په لیپوفیلیکه برخه پورې نښلي او د Depolarization لامل ګرځي. په پایله کې د عصبي عضلي بند په برخه کې د استایل کولین آزادیدل په دسته یي ډول د ریریدلو لامل ګرځي. که چېرې Depolarization دوام مومي، نو عصبي ریښې کاملاً خپل حساسیت له لاسه ورکوي او فلج پېښېږي. په زړه کې په لوړه کچه د نارادرنالین آزادېدل د بطیني اریتمیا او فبریلیشن لامل ګرځي. تترادوتوکسین او موضعي بې حسي کوونکي د بروی توکسین د ډیپولرایزکوونکو اغېزوسره انتاګونیستیک خاصیت لري. اړونده بروی توکسین کوم چې په Dinoflagellates کې هم

پیدا کیري، له *dinophysistoxins* او *Ocadaic acid* (شکل ۱۱) څخه عبارت دي.



سيگواتيراټوڪسين (*Ciguateratoxin*)


د خوړلو وړ کبانو لکه *Barracudas* ، *Snappers* او شارک څخه مسموميت د ځينو گرمو سيمو د بحري حيواناتو په شاوخوا کې پېښېږي. هغه توکسين چې د دغسې پېښو مسؤليت ورله غاړې دی عبارت له *Ciguateratoxin* څخه دی، چې په *Dinoflagellates* لکه *Gambierdiscus toxicus* کې پیدا کيږي، کوم چې په اپي فايټيک (پربوټوله پاسه زرغونيدل) ډول د ماکروفايټيک الجيانو له پاسه په ساحلونو کې ژوند کوي. نوموړي الجيان د وښو خوړونکو کبانو په واسطه په مصرف رسيږي، کوم چې بيا وروسته د ښکار کوونکو کبانو په لاس خوړل کيږي. دغه سم د غذايي ځنځير له لارې تراکم کوي او د دغه کبانو په پينه او جنسي غوټو کې ذخيره کيږي. د ملاحظې وړ کچه توکسين کيدای شي چې په عضلاتي نسجونو کې وموندل شي او وروسته د کب له خوړلو څخه د سميت لامل شي.

د *Ciguateratoxin* وژونکی ډوز ډېر ټيټ (په مورېکانو کې 45ng/kg ، داخل پريتوان) دی. د اوږده کش کړل شوي ځنځير جوړښت، کوم چې د اوکاډائيک اسيد يوه برخه ده په دوولسم شکل کې ښودل شوی ده. دغه عمل د سوديم چينل

ته لار پیدا کوي او د سودیم د آیون د نفوذ په وړتیا کې د ډېروالي لامل ګرځي. او د تنبهي غبرګون لامل ګرځي. د Ciguateratoxin عمل له تترادو توکسين او ساکسي توکسين سره اتاګونستیک دی، کوم چې د سودیم چینل نهې کوي.

د Ciguatera د سمیت اعراض په خوله اوستوني کې د مخاطي غشاء له خاړښت سره پیل او په تعقیب یې عمومي ناتواني، دستوني، شخي، تبه، اضافي حرکات، بې خوبي او په ساه کښلو کې لنډوالی رامینځ ته کیږي. که چیرې یې وژونکی ډوز مصرف کړل شي د تنفسي سیستم د توقف له کبله مرګ رامینځ ته کیږي. د وژونکي ډوز څخه د لږ ډوز اخیستل د میاشتو لپاره د نوموړو اعراضو د شتون لامل ګرځي. د سببي درملنې په نشتوالي کې باید عرضي درملنه صورت ونیسي. کیدای شي د مانیتول انفیوژن (په ۴۵ دقیقو کې ۱g/kg) ګټور وي. د دې حفاظتي میکانیزم اغېز، شونې ده چې په عصبي نسجونو کې د پړسوب د مینځته راتلو د مخنیوي پر بنسټ وي.

د مایتوتوکسين Maitotoxin په نوم بل توکسين همیش له Ciguateratoxin سره یو ځای پیدا کیږي. د Ciguateratoxin په پرتله Maitotoxin د کلسیم چینل ته لار مومي. دغه مرکب د عضلي او عصبي حجرو د نفوذ قابلیت د کلسیم د آیون په وړاندې ډېروي، په پایله کې د کلسیم کچه په نوموړو حجرو کې پورته ځي. دغه حالت په عصبي حجرو کې د نیورو ترانس میترونو د آزادېدو لامل ګرځي او د اوږدمهال لپاره د عضلو تقلص او د زړه بې نظمي رامینځ ته کوي.



(MYCOTOXINS) مایکوتوکسینونه

فنجیان په وړو (یو حجروي) یا Ascomycetae او لویو (خو حجروي) فنجیانو یا Basidiomycetae باندې ویشل شوي دي. تر اوسه ۳۰۰۰۰ ډوله فنجیان پیژندل شوي دي. ډېر یې په پراخه کچه دویمي میتابولیتونه تولیدوي. د دوي په مینځ کې تر ډېره سمې مرکبات شتون لري.

د اسکو مایستس توکسینونه

ځینې واړه فنجیان سمې میتابولیتونه تولیدوي، کوم چې په چاپیریال کې توزیع کیږي، ډېر احتمال لري چې د نورو مایکروارگانیزمونو د نشو نما څخه مخنیوی وکړي. په مایکوتوکسینو سره د مسمومیت موضوع عامه ده، ځکه چې د *Aspergillus*، *Penicillium* او *Fusarium* جنسونه ډېروخت خواړه ککړوي. په صنعتي هیوادونو کې په نارمل ډول داسې خواړه خپل ته اچول کیږي. په ډېرو پرمختګ په حال هیوادونو کې، چیرې چې خواړه لږ پیدا کیږي، خلک بې له دې څخه په مرخپړیو ککړتیا په نظر کې ونیسي خوري یې. په دغه هیوادونو کې د مرخپړیو نشو نما تر ډېره د ګرم او لوند اقلیم په واسطه حمایه کیږي.


د مایکوتوکسینو عمل له ضعیفه خارشیت څخه نېولې تر وخیمه تخریب پورې رسیږي. ځینې مرکبات یې تراټوجنیک او کارسینوجنیک دي. د یو لږ ډېرو قوي مایکوتوکسینونو خلاصه په څلورم جدول کې ورکول شوې ده. په لاندې ډول د مایکوتوکسینو پیژندنه تر ډېره په نباتي بنسټ صورت نېولی ده، ولې بیا هم ډېر ورته والی لري.

د اسپرجیلوس (*Aspergillus*) انواع

Aflatoxins


فنجیان لکه *Aspergillus flavus*، *Aspergillus parasiticus* او *Aspergillus oryzae* د هغه اړونده مایکوتوکسینونو ډول جوړوي چې د افلاتوکسین په نوم پیژندل کیږي (شکل ۱۳). دغه فنجیان همیش خواړه، لکه موم پلي، غنم، وریجې، جوار او سویا بېن ککړوي. افلاتوکسین M۱ او M۲ د هغو

غواوو په شیدو کې هم پیدا کیږي، چې د ککړو شوو وښو په واسطه تغذیه شوي وي. په ډېرو هیوادونو کې د افلاتوکسین لپاره د 50 ng/liter حد ټاکل شوی ده. په همدې ډول په انډمیک ډول افلاتوکسین په انسانانو کې هم د سمیت لامل ګرځي. د اکثره افلاتوکسینونو د هدف لاندې غړی د ښې څخه عبارت دی. د G_1 ، B_1 او M_1 افلاتوکسینونه د سائتوکروم $P450$ د کتلاستي عمل لاندې په ډېر فعاله ایپوکسید بدلېږي، کوم چې بیا د ښې د حجرو د نیوکلو فیلېک مالیکولونو سره اشتراکې اړیکه جوړوي. افلاتوکسین B_1 د DNA او RNA په نیمایي ګوانینو باندې په اووم کاربن کې ننډلي. مشبوع افلاتوکسین G_1 او M_1 ، لږ سمی دي او سرطاني اغیزې نلري. اما افلاتوکسین B_1 په قسمي ډول په ښه کې غیر مشبوع او ډېر سمی افلاتوکسین B_1 باندې اوږي.



په لوړ ډوز سره د افلاتوکسین د اخیستلو څخه وروسته، د ښې نکروز مینځ ته راځي او کیدای شي چې مصدوم د ښې د ناوړتیا له کبله ومري. د پښتورگو تیوبولونو ته هم ځینې وخت زیان رسیږي. د انسان لپاره یې وژونکی ډوز له ۱-۲

۱۰mg/kg افلاتوکسین B څخه عبارت دی. په مزمن ډول سره د کم ډوز اخیستل کیدای شي چې د یښې سیروزس یا تومورونه راپیدا کړي. د افلاتوکسین B ورځنۍ کچه چې په ماشومانو کې د یښې د سیروزس لامل ګرځي له ۹ څخه تر ۱۸ مایکروګرامه پورې رسېږي. تر ډېره د نوموړي توکسین سرچینه، ککړ شوي موم پلي جوړوي. د یښې ویجاړتیا په هغو ماشومانو کې هم ترسترګو شوې ده، د کومو چې شیدې ورکونکو مورګانو په افلاتوکسین ککړ خواړه کارول. په مورګانو کې افلاتوکسین B تر ټولو د یښې غښتلی سرطان (چنګاښ) تولیدوونکی دی. په انسانانو باندې له اپیدیميولوژیکي مطالعو څخه د افلاتوکسین B د سرطاني اغیزو پوره شواهد لاسته راغلي دي په ادرار کې د افلاتوکسین د اطراح او د یښې د سرطان د پېښو تر مینځ اړیکې ترسترګو شوې دي (شکل ۱۴).




جدول ۴: مایکوتوکسینونه			
توکسین	فنجی	LD _{۵۰}	د موخی غړی
افلاتوکسین B _۱	A.flavus	۱,۷ ملی ګرام فی کلوګرام (موږک)	هیپاتوتوکسیک ، نفروتوکسیک
افلاتوکسین B _۲	A.parasiticus	۸۴,۴ مایکروګرام فی ۵۰ ګرام (هیلی)	
افلاتوکسین G _۱	A.oryzae	۳۹,۲ مایکروګرام فی ۵۰ ګرام (هیلی)	هیپاتوکانسروجنیک
افلاتوکسین G _۲	P.puperulum	۱۷۲,۵ مایکروګرام فی ۵۰ ګرام (هیلی)	
افلاتوکسین M _۱	A.flavus	۱۲,۲ مایکروګرام فی هیلی (اورځنۍ هیلی دخولی له لاری)	هیپاتوتوکسیک ، هیپاتوکانسروجنیک
افلاتوکسین M _۲		۲۲ مایکروګرام فی هیلی (اورځنۍ هیلی دخولی له لاری)	
اسپریتوکسین	A.flavus ,A.versicolor	۰,۷ مایکروګرام فی هګۍ (هیلی)	
ستروویریډین	P.citr-viride	۳,۲ مایکروګرام فی کلوګرام (مږه ، تحت الجلدی)	
سیتیرینین	P.citrinum	۲۷ ملی ګرام فی کلوګرام (مږه ، تحت الجلدی)	هیپاتوتوکسیک ، نفروتوکسیک
سایکلوکلوړوتین	P.islandicum	۴۷۰ مایکروګرام فی کلوګرام	
(موږکان ، تحت الجلدی)		د تنفس او جریان توکسین، هیپاتوتوکسیک	
سایتوچلا سین A	Helminthosporium		
سایتوچلا سین B	dematioideum		
سایتوچلا سین C	Metarrhizium anisopliae		
سایتوچلا سین D	Zygosporium mansonii	۱,۹ ملی ګرام فی	
کلوګرام (موږکان ، پړیتوان)			
سایتوچلا سین E	A.clavatus	۲,۲ ملی ګرام فی	
کلوګرام (مږه ، پړیتوان)			
ایسلانډیتوکسین	P.islandicum	۳۳۸ مایکروګرام	
فی کلوګرام (موږکان ، وریډی)		هیپاتوتوکسیک ، هیپاتوکانسروجنیک	
لوتیوسکایرین		۱۴۵ ملی ګرام فی	

هپیاتو توکسیک ،	کلوگرام (موږکان ، پريتوان)
۳ ملي گرام فی	هپیاتو کانسروجنیک
	مالټوریزین
	کلوگرام (موږکان ، پريتوان)
۲۹ ملي گرام فی	A.oryzae
	هپیاتو توکسیک ، نفرو توکسیک
	مونیلیفورمین
	کلوگرام (موږکان ، پريتوان)
۲۰ ملي گرام فی	Fusarium ssp
نفرو توکسیک	موضعي تخريشکونکی
۳۰ ملي گرام فی	A.ochceus
موضعي	اوکراتو کسین
	کلوگرام (موږکان ، خولی له لاري)
	پاتولین
	کلوگرام (موږکان ، خولی له لاري)
	تخريشکونکی
۱۰۰ ملي گرام فی	Penicillium ssp
هپیاتو توکسیک	پنسیلینیک اسید
	کلوگرام (موږکان ، خولی له لاري)
	، سايټو توکسیک
۱۸ ملي گرام فی	P.roqueforti
	راکیفورټین
	کلوگرام (موږکان ، پريتوان)
۲،۲ ملي گرام فی	P.rubrum
	روبراتو کسین
	کلوگرام (موږکان ، پريتوان)
۳ ملي گرام فی	P.rubrum
	روبراتو کسین B
	کلوگرام (موږکان ، پريتوان)
۸۰۰ ملي گرام فی	A.nidulans , A.versicolor
هپیاتو توکسیک ،	ستریگماتوسیسټین
	کلوگرام (موږکان ، خولی له لاري)
	هپیاتو کانسروجنیک
	ترايکو تیسینونه
	Fusarium ssp
نیورو توکسیک	

ستیرگماتوسیستین (Sterigmatocystin)

د جوړښت له مخې Sterigmatocystin په افلاتوکسینو پورې اړه لري (شکل ۱۵) او په *Aspergillus nidulans* ، *Aspergillus versicolor* او *Aspergillus bipolaris* کې موندل کېږي، کوم چې د افلاتوکسین تولیدوونکو فنجیانو سره یوځای خواړه ککړوي. اگرکه د Sterigmatocystin سمې قدرت له افلاتوکسین څخه کم دی ولې Sterigmatocystin په ډېر لږ غلظت سره شتون لري. د عمل ډول یې د افلاتوکسینونو سره یو شان دی. نوموړی مرکب په عمومي توګه ینه تخریبوي او د هغې نه علاوه پښتورګي او د زړه عضلات هم اغیزمن کوي. په هغه مېړو کې چې د خولې له لارې او په اوږدمهال ډول له دغه مرکب څخه ورکول شوي وو، د ینې تومورونه ترسترګوشول. په میتابولیکي ډول (هایدروکسیلېشن) د Sterigmatocystin څخه Aspertoxin (شکل ۱۵) لاسته راځي، چې هغه هم سمې دی.




پاتولین (Patulin)

د مرخړیو ډولونه لکه *Aspergillus gigantus* ، *Aspergillus clavatus* ، *Penicillium patulinum* او *Penicillium expansum* ، *Patulin* نومېږي (شکل ۱۶). دغه ماده په *urticae* یو توکسین تولیدوي چې

اوږو، غوښه، اوپه ځانگړي ډول د منډې په جوس کې ترسترگو کيږي. نوموړی توکسين د تيول له گروپونو سره په لوړه کچه تمايل لري حجروي غشاء تخريبي اوپه ځانگړي ډول په غشاء پورې تړلي د ATPase انزايم نهی کيږي. له پوستکي سره يې تماس د څارښت لامل گرځي. د خولې له لارې د ککړو شوو خوړو له مصرف څخه وروسته د مخاطي غشاء د تخريش، زړه بدوالي، کانگو او دستونو لامل گرځي. په تجربوي حيواناتو کې د Patulin د فمي تطبيق څخه وروسته د سږو او مغزو اذيما او خونريزي ترسترگو شوې ده. هغه کچه چې انسانان يې له خوړو سره خوري، د دغه اغيزو د مينځ ته راتلو لپاره کافي نده.

په لابراتواري حيواناتو کې د خولي يا پريتوان له لارې د تطبيق څخه د Patulin سرطانې عمل نه شي څرگنديدلای. په مږو کې د Patulin د تحت الجلدي تطبيق څخه وروسته سارکوما ترسترگو شوه، کوم چې د دغه مرکب د سرطانې عمل په نسبت، ډېر د موضعي تخريش په پايله کې رامينځ ته شوې وه. يو تراتوجينېک خاصيت صرف د چرگې په جنين کې ليدل شويده نه په تي لرونکو کې. اما په چينايي لويو موږکانو کې د Patulin د مصرف څخه وروسته، د هډوکي په مغز کې کروموزمي انحراف ترسترگو شوی دی.




پاتولين

شکل ۱۲: د پاتولين کيمياوي جوړښت

اوکراتوکسین A (Ochratoxin A)

په مکرر ډول *Aspergillus ochraceus* ، حبوبات ، موم پلي او سبزیجات ککړوي. دغه مرخپړی یوه ډله توکسینونه چې ورته کیمیاوي جوړښت لري تولیدوي، چې د اوکراتوکسینونو په نوم یادېږي. ځانګړې سمې ماده یې کلورین لرونکي Ochratoxin A دی (شکل ۱۷).




د دغه مالیکول د Phenylalanine برخه د Phe-tyl-tRNA-synthetase پورې نښلې، کوم چې د پروتین په سنتیز کې مخنیوی مینځ ته راوړي. احتمالاً همدغه میکانیزم دی چې په موږکانو کې د ترسترگو شویو تراتوجنیکو اغیزو د مینځ ته راتلو ، مسؤل ګڼل کېږي. سوء تشکلات په عمومي ډول په مرکزي عصبي سیستم کې لیدل کېږي. په ځوانو چورګورو کې د وژونکي خڅه په کم ډوز سره د وینې جوړوونکي سیستم ویجاړتیا ترسترگو شوېده. په موږکانو کې د داخل پریټوان له لارې د Ochratoxin A $10 \mu\text{g/kg}$ د تطبیق په پایله کې د د فاعی سیستم ځپونکي (Immunosuppressive) اغېزې ترسترگو شوي دي.

په ځانگړي ډول هغه غړي چې د اوکراتوکسین په واسطه ځپل کېږي عبارت له پښتورگو څخه دي. د پښتورگو په پروکزیمال تیوبونو کې نکروزس مینځ ته راځي، چې په پایله کې یې د پښتورگو د فعالیت د سخت مخنیوي او بالاخره د Anuria په لوري مخه کوي. په هغو انسانانو او څارویو کې چې په مدیترانه اي هېوادونو (بوسنیا، کرواسیا) کې ژوند کوي یوه انډیمیکه نفروپاتي ترسترگو کېږي، چې په خوړو کې د Ochratoxin A په کچه پورې اړه لري. د ملاحظې وړ کچه توکسین د خوړګانو په غوښه کې هم ترسترگو شوې دي.

د خمیرمایې یا سلمونیلا لپاره Ochratoxin A جینوتوکسیک نده. اما په موږګانو کې چې د هغه خواړو په واسطه تغذي شوي ول چې ۴۰ppm توکسین یې درلود، تومورونه (Adenomas) ولیدل شول. په مږو کې صرف د پښتورگو تومورونه ولیدل شو او د ښې تومورونه په کې ترسترگو نه شول.

مالټوریزین او کوچیک اسید (Maltoryzin and Kojic Acid)

د *Aspergillus oryza* په ختیځه اسیا کې د خوړو او مسالو د خمیره کولو لپاره لکه د سویا روب، الکولي نوشابه، او د سویا د خمیرې لپاره کارېږي. نوموړی فنجي د Maltoryzin او Kojic Acid په نوم مایکوتوکسینونه جوړوي (شکل ۱۸). په خوړو کې د دغه مایکوتوکسینو غلظت له بحراني کچې څخه ټیټ پاته کېږي. د لویې اندېښنې خبره په دغه مایکوتوکسینونو باندې د حیواناتو د خوړو ککړېدل دي. حاد سمې ډوز د اختلاجاتو او د تنفسي سیستم د توقف لامل ګرځي، په داسې حال کې چې د وژونکي څخه په کم ډوز سره، نږدې د ټولو پارنشیمایي نسجونو او د مرکزي عصبي سیستم د تخریب لامل ګرځي. Kojic Acid د *Salmonella typhimurium* لپاره میوتاجنیک دی.



د پنسیلیم انواع

سیتیرینین (Citrinin)

ستیرینین چې یو فعاله انتي بیوتیکي مرکب دی (شکل ۱۹) د *P. citrinum* ، *P. citroviride* ، *P. notatum* ، *P. expansum* ، *P. viridicatum* او *P. chrysogenum* فنجیانو په واسطه تولیدیږي. دغه انواع متوسطه تودوخې ته لومړیتوب ورکوي. د همدې کبله دغه پېښې په متوسط اقلیم لرونکي زونونو کې مینځ ته راځي. په همدې ډول ستیرینین د اسپرجیلوس د ځینې نوعو (*A. flavipes* او *A. terreus* ، *A. niveus* ، *A. candidus*) په واسطه هم تولیدیږي. د دغه موادو د روښانه سمیت له کبله د دوی د انتي بیوتیکي عمل څخه معالجوي ګټه نه اخیستل کیږي. په مږو کې د حاد سمې ډوز پسې درګونو تقلص، د قصباتو تقلص او په دسته ای ډول د تقبضاتو لامل ګرځي. د وژونکي څخه کم ډوز په ځانګړي ډول په مزمن ډول، د پښتورګو د پروګریمال تیوبولونو د تخریب لامل ګرځي او په پایله کې یې ډېرېدونکې د پښتورګو ناوړتیا رامینځ ته کیږي. داسې فکر کیږي چې Citrinin د پښتورګوپه تیونوکې د تیزابو د انتقال د پروونکو (Acid Transport carrier) په واسطه تراکم کوي. احتمالاً

سایتوتوکسیک اغیزه یې د RNA Synthetase انزایم د فعالیت د مخنیوي په واسطه مخته وړي.

همدارنگه د Citrinin د اخیستلو څخه وروسته نورو غړو ته لکه ینه، توری او د هډوکي مغز ته هم تخریب رسېږي. تراټوجنیکي اغیزې یې په مږو، موږکانو او چرگوږیو کې ترسترگو شوي دي. د Citrinin په واسطه د اوږدمهال لپاره د مږو د درملنې په نتیجه کې د ینې او پښتورگو اډینوماتوس هایپرپلازیا لیدل شوې ده. د نسجونو په کرڼه (۷۷۹ حجات) کې، د مږې د ینې د میکروزوم (S۹) د علاوه کولو څخه وروسته نوموړی مرکب کروموزمي انحراف رامینځته کوي.


پنیسیلیک اسید (Penicillic acid)

Penicillic acid د پاتولین په څېر یو α, β -unsaturated لکتون دی. نوموړی مرکب په گڼ شمېر د اسپرجیلوس او پنیسیلیم په جنس کې موندل کېږي، کوم چې اکثرًا د انسانانو او حیواناتو خواړه ککړوي. دغه سایتوتوکسیک مرکبات د تیول د گروپونو لپاره ډېر تمایل لري او د گلوتاتیون کمبود مینځ ته راوړي. همدغه د هیپاتوتوکسیک اغیزولپاره مسؤل دی، چې د لوړ ډوز د مصرف څخه وروسته ترسترگو کېږي. د همدې کبله د Penicillic acid تسمم په وړاندې د گلوتاتیون یا سیستین تجویز، ساتونکی رول لري. په مزمن ډول د تطبیق څخه وروسته یې په موږکانو کې Hepatocarcinogen ځانگړتیاوې ترسترگو شوي دي.

ستریو ویریډین Citreoviridin

وریجې تل د *Penicillium citreoviride* په نوم د فنجي په واسطه ککړېږي، کوم چې د Citreoviridin په نوم مایکوتوکسین تولیدوي. نوموړی مرکب (شکل ۱۹) نیوروتوکسیک او کارډیوتوکسیک قدرت لري، کوم چې د زړه د ناروغیو د انډیمیکو پیښو (Cardiac beri beri) د مینځ ته راتلو مسؤل گڼل کېږي. د

Citreoviridin د مصرف له کبله د يني او د پښتورگو تخريب ته هم ارتباط ورکړل شوی دی. داسې فکر کېږي چې دغه مرکب د مایټوکاندريا ATPase نهې کوي ، کوم چې د حجرو د انرژي د حمايې لپاره مهم دی. په ځانگړي ډول عصبي او عضلي حجرات ډېر حساس دي ، کوم چې دخپل برقي پوتنشيال د حمايې لپاره ، لوړه کچه انرژي ته اړتيا لري.




ليوتیوسکایرین او روگولوزین (Luteoskyrin and Rugulosin) دوه نور مرخپري په بیاځلي ډول په آسیا کې وریجې ککړوي، چې عبارت له *Penicillium islandicum* او *P.rugulosum* څخه دي. د ککړتیا څخه وروسته د وریجو رنگ ژیر اوړي، کوم چې د Luteoskyrin (*P.islandicum*) او Rugulosin (*P.rugulosum*) مایکوتوکسینونو له کبله مینځ ته راځي. دغه دوه bis-anthraquinones (شکل ۲۰) د لابراتواري حیواناتو لپاره

هیپاتوتوکسیک او د ینې لپاره سرطاني دي. داسې باور کیږي چې د آسیا په لویه وچه کې د ینې د تومورونو د اندیښنې وړ سلنه ، په دغو موادو دخوړو د ککړېدو له کبله ده. د دواړو موادو په هکله داسې څرگنده شوې ده چې په ینه کې په لوړه کچه ذخیره کیږي. داسې باور کیږي چې Luteoskyrin په واسطه د ینې تخریب د اکسیجن د فعالې نوع په لاس کوم چې د Luteoskyrin د Semiquinone راډیکل د خپل سري اکسیدیشن په پایله کې لاسته راځي ، کوم چې د یو الکترونه ریډوکس سیستم پواسطه چې د ینې د NAD(P)H پورې اړوند سایتوکروم ریډوکتاز پواسطه کتلاز کیږي ، تولیدیږي. له هغه ځایه چې نوموړی مایکوتوکسین میوتاجنیک ندی ، کیدای شي چې د Oxidative stress په واسطه یوه Epigenetic پروسه د Hepatocarcinogenicity مسؤؤل وگڼل شي.


اسلانډیتوکسین یا سایکلوکلوروټین (Islanditoxin(Cyclochlorotin)

Islanditoxin د ډېر سره ورته پېتایډونو یو مخلوط دی (شکل ۲۰)، چې د L-dichloroproline یوه برخه هم لري او په *Penicillium islandicum* کې موندل کیږي. نوموړی توکسین د مورکانونو لپاره ډېر غښتلی دی ($LD_{50}=0.45\text{mg/kg}$). سمیت یې په عمومي توګه ینه د حملې لاندې نیسي. د اغیزې میکانیزم یې د اکتین په فایبر باندې د نوموړي مرکب پر نښیلولو ولاړ دی. د Islanditoxin سره د ینې د حجراتو د تماس په پایله کې ، د حجراتو شکل توپیر مومي او د حجروي غشاء په سطح ګڼ شمېر تناکې راڅرګندیږي. کله چې ژوونکي د $50\mu\text{g/kg/day}$ په واسطه تغذیه کړل شي ، د ینې په شاوخوا کې نګروز لیدل کیږي چې بیا د سیروزس او هیپاتوما لامل ګرځي. داسې څرګنده شوې ده چې په نوموړي مرکب کې د کلورین شتون د دغه مالیکول د سمې عمل لپاره ضروري دی.




سایکلوپیاکونیک اسید او پینیترم A) Cyclopiaconic acid and (Penitrem A

د *Penicillium cyclobium* په نوم فنجي په تکراري ډول حبوبات ککړوي. دغه فنجي د Cyclopiaconic acid او Penitrem A په نوم نیوروتوکسیک مرکبات تولیدوي (شکل ۲۱). داسې له سترگو شوېده چې نوموړی مرکبات د دې لپاره چې د GABA، Glutamic acid او اسپارتیک اسیدو له نیوروترانسسمیټرونو سره مداخله وکړي د مرکزي عصبي سیستم په ماقبل ساینپسي برخه کې عمل کوي.



سايکلوبيازونیک اسيد



پنينترم A

شکل ۲: د پنسليم سايکلوبيم څخه لاسته راغلي مايکو توکسينونه


د فساريم انواع (Fusarium species)

د فساريم نوعې په عمومي توگه هغه مرخپري دي چې حبوبات ، وچ وانه او نور د حيواناتو خواړه ککړوي. نوموړي فنجي د فوق العاده سمې مرکباتو يوه ورايتي توليدوي ، چې له ځانه نيورو توکسيک ، ايميونو توکسيک او سايتو توکسيک اغيزې بشي.

ترايکو تيسينونه (Trichotecenes)

د فساريم د نوعې تر ټولو مهم توکسينونه د ترايکو تيسينونو څخه عبارت دي (شکل ۵). دغه مرکبات د ۲۰ څخه د زياتو سره ورته مرکباتو کورنۍ جوړوي، کومه چې په څلورو فرعي ټولگيو وېشل شوې ده. نوموړي مرکبات په عمومي توگه د ۱۲م او ۱۳م کاربن تر مينځ ايپوکسي گروپ او د اتم او نهم کاربن تر مينځ يوه دوه گوني رابطه لري. ځينې مهمې بېلگې يې په ۲۲م شکل کې ښودل شوې دي. سمې تاثير يې د څنگ ته زنجير د شتون له کبله دی. هغه حقيقت چې د زرقې او نورو طريقو له لارې پر عين ډول سميت دلالت کوي ، داپه گوته کوي چې د معدي معايي لارې د نوموړې مادې جذب ښه دی. د دغې مادې د مشتق يعنې Diacetoxyscirpenol سميت له موږکانو څخه په مېو کې ، له مېو څخه په

سویانوکی او له سویانو څخه په هندي څوگ کې ډېر دی. داسې گمان کیږي چې انسانان یې په وړاندې ډېر حساس دي.

				
Trichothecenes			تر اکو تیسینونه	
R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅
OH	OAc	OAc	H	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ OCO
OH	OH	OAc	H	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ OCO
OH	OAc	OAc	H	H
OH	OAc	OAc	H	OH
OH	OH	OH	OH	O
OH	OAc	OH	OH	O
OH	OAc	OAc	OH	O
OAc	OAc	OAc	OAc	O
OH	H	OH	OH	O
AC	H	OH	OH	O
H	CH ₃ CH=CHOCO	H	H	O
H	OH	H	H	O

شکل ۲۲: د ترای کلورو تیسینونو کیمیاوي جوړښت

ترایکو تیسینونه سایتو توکسیک مرکبات دي، کوم چې د Eucaryotic رایبوزومي پروتینو پر ۲۰S واحد نښلي او په پایله کې د پروتین د سنتیز څخه مخنیوی کوي. Procaryote یې په وړاندې ډېر لږ حساس دي. د توکسینونو د ایپوکسي گروپ د فعالیت لپاره ډېر ضروري دی. د دغه گروپ هایډرولایزس د ده فعالیت له مینځه وړي. نوموړې د غیر فعاله کولو لپاره یوه مهمه لاره ده چې د یې په حجراتو کې صورت نیسي. څنگ ته زنځیر یې، رایبوزوم نښلیدونکې پروتینونه ته د توکسین د تمایل لپاره مهم دی. د تیول گروپونه د نښلیدو په پروسه کې برخه اخلي.

لوړ سايټوټوکسيک قدرت د معدي معايب تيوب د مخاطي غشاء د تخریش مسؤول گڼل کېږي، کوم چې د زړه بدې ، کانگو او شديده دستونو لامل گرځي. وروسته د سم له جذب څخه، د هډوکو په مغز د سايټوټوکسيک عمل په واسطه، سمې اعراض تسلط پيدا کوي. مينځ ته راغلی معافيتي انحطاط يا Immunosuppression د ډېرو ثانوي اغيزو کوم چې په فساريم باندې د ککړو شويو غله دانو له مصرف څخه وروسته په انسان او حيوان کې ليدل شوې، مسؤول گڼل کېږي. په لايراتوراري حيواناتو کې د ځينو ترايکوتيسينونو (T-۲ او deoxynivalenol) له تطبيق څخه تر اتوجنيک اغيزې له سترگو شويدي. په همدې ډول T-۲ په چينايي لويو موږکانو کې د کروموزمي انحرافاتو لامل گرځيدلی ده. د ترايکوتيسينونو ميوتاژنيک او يا مستقيم سرطاني اغيزې نشي ليدل کيدلای، اما د DMBA له شروع سره دغه مرکباتو د تومور توليدوونکي په حيث رول لوباوه. په جنوبي افريقا کې يوې سروې په خوړوکې د Deoxynivalenol اود مړۍ د سرطان تر مينځ اړيکه ښوودلې ده. ميکانيزم يې کيدای شي چې د ترايکوتيسينونو تومور توليدوونکي خاصيت يا Immunosuppression وي. د سرطان په وړاندې د معافيت د يوه فعاله سيستم شتون د يوه طبعي دفاعي ميخانيکيت په توگه مهم دی.

مونيليفورمين (Moniliformin)


جوار په عمومي توگه د Fausarium monilifrome په واسطه ککړېږي، کوم چې د دغه غلې د ضايع کيدو لامل گرځي. دغه مرخپړی ډېر توکسينونه توليدوي د کومو په مينځ کې چې Moniliformin ډېر مهم دي. دغه مرکب د Cyclobutadien مشتق دی (شکل ۲۳) چې لوړ سمې پوتنشنيل لري. موږکانو ، چرگوريو او مږو ته د وژونکي ډوز له تطبيق څخه وروسته ، نوموړي حيوانات په ساه کښلو کې د توقف له کبله مري. د وژونکي څخه په کم ډوز سره د زړه د عضلاتو تخريب رامینځ ته کېږي. ميکانيزم يې د Pyruvate dehydrogenase انزايم د غير رجعي نهی کيدو څخه عبارت

دی، چې په پایله کې یې د ستريک اسید له سیکل او بیا د حجرو د انرژي د حمایتي څخه مخنیوی کېږي. عضلې او په ځانگړي ډول د زړه عضلې او حجرې، د بدن د نورو حجراتو په پرتله په لوړه کچه انرژي ته اړتیا لري، کوم چې کېدای شي د نوموړي توکسين په وړاندې د دوي د زیات حساسیت لامل وي.

زیرالینون (Zearalenon)

Fusarium gramineum هغه مرخپې دی چې نه یوازې جوار او وچ وانه ککړي، بلکه نور ډول نباتي خواړه هم ککړوي. نوموړي مرخپې یو ډول توکسين چې د Zearalenon په نوم یادېږي، تولیدوي، کوم چې له ځانه استروجنیک خاصیت نشي. په بنسټه حیواناتو کې یې ځانگړي اعراض عبارت د رحم د هایپرپلازیا، د رحم التهاب او القاحي ناوړتیا (کوم چې نارینه جنس هم اغېزمن کوي) څخه دي. د هغه غواگانو شیدې چې په نوموړي توکسين ککړ وانه خوري، په پوره کچه نوموړی توکسين له ځانه سره لري. د نوموړو شیدو خوړل په جینکيانو کې د جنسي غړو په بېره د پخېدو، په بالغو مېرمنو کې د استروس دورې د گډوډۍ او په نارینه جنس کې د القاحي ناوړتیا لامل ګرځي.

داسې ښوودل شوې ده چې Zearalenon د رحم د داخل الحجروي استروجن په آخډو پورې وصلېږي. همدارنګه دغه مرکب په هایپوتلاموس او نخامیه غده کې د استروجن پر آخډو وصلېږي. دغه حالت د Estrogen-feedback د میخانیکیت د گډوډي لامل ګرځي. په لابراتواري حیواناتو کې د سرطاني اغیزو د لیدو وروسته، په زړو ښځو کې د استروجن د عوض په توګه د Zearalenon کارونه ودرول شوه. ضمناً دانه څرګنده شوې ده، چې خپله استروجن د تیونو او رحم د تومورونو انکشاف ته پرمختګ ورکوي. Zearalenon په مېو او هندي خوګانو کې تر اتوجنیک ثابت شوی ده. په هډوکو کې په ځانگړي ډول سوء تشکلات زیات شایع وو. د دغه مشاهداتو ته په نظر کې نیولو سره په زړو ښځو کې Osteoporosis یو عام مشکل ګڼل کېږي.



د نورو یو حجروي فنجیانو توکسینونه


سایتوچلا سینونه (Cytochalasins)

سایتوچلا سینونه د جوړښت له مخې د هغه سره ورته مایکوتوکسینونو ډله جوړوي، کوم چې د *Helminthosporium dematioideum* (cytochalasin A & B)، *Zygosporium*، *Metarrhizium anisopliae* (cytochalasin C)، *Aspergillus clavatus* (cytochalasin D) او *mansonii* (cytochalasin E) فنجیانو په واسطه تولیدیږي. حاد سمی ډوز د شعریه رگونو د سخت تخریب، کوم چې په زیاته کچه د داخل وعايي رگونو د ضایع کېدو، د سیستمیکي اذیما او شاک لامل ګرځي. دغه مرکبات د تجربوي فارمکولوژي او د حجري د فزیولوژي لپاره ګټوره وسیله ده ځکه چې دوی په تیوبولین او اکتین پورې هم نښلي او هم یې د فعالیت څخه مخنیوی کوي.

د تومور ضد انټي بیوټیکونه (Antitumor Antibiotics)

د *Daunorubicin* او *Doxorubicin* (شکل ۲۴) په نوم سورنګه مایکوتوکسینونه په ترتیب سره د *Streptomyces peucetius* او *S. peucetius* var. *caesius* فنجیانو په واسطه تولیدیږي. دغه مرکبات د انټراسیکلینونو په ګروپ پورې اړه لري او په معالجوي ډول د Antineoplastic

عاملینو په توګه کارول کېږي. Doxorubicin پراخه اغیزې لري او د Leukemia او سخت تومورونو په درملنه کې کارول کېږي ، په داسې حال کې چې Daunorubicin په ځانګړي ډول د Leukemia په درملنه کې کارول کېږي. د ژیر انتراسیکلین مشتق یعنې Aclacinomycin (شکل ۲۴) د Streptomyces galileus په واسطه تولیدېږي. نوموړی مرکب هم ، د Leukoblastoses او د ځینو سختو تومورونو په درملنه کې کارول کېږي. که څه هم د انتراسیکلینونو د بیولوژیکي عمل تشریح د زرګونو پاڼو یو مضمون جوړوي ، بیا هم د تاثیر میکانیزم یې تر اوسه معلوم ندی. دا ترډېره د مختلفو عملونو د خلاصې په پایله کې مینځ ته راځي. د دوي په مینځ کې د DNA د زنځیر د القلیو ترمینځ الحاق ، د اکسیجن د فعالې نوعې مینځ ته راتلل او د سایتوپلازمیکي غشاء سره انترکشن شامل دی. د نورو انتی نیوپلاستیک درملو په څېر ، د انتراسیکلین په واسطه درملنه د خطرناکو جانبي عوارضو سره مله ده ، کوم چې د ډېریدو په حال کې نسجونو لکه د معدي معایي اپیتلیم او د هډوکي د مغز پرضد د عمل څخه عبارت دی. Daunorubicin او Doxorubicin له ځانه کارډیوتوکسیک اغیزې بنسټي، کوم چې د زړه د عضلو د حجراتو په مایټوکانډریا کې د راډیکلونو مینځ ته راتلل په ګوته شوي دي. دغه اغیزې په یو ځایي ډول صورت نیسي او د هغه ډوز چې په درملنه کې کارول کېږي د محدودولو لامل ګرځي. دواړه انتراسیکلینونه په بکتريا او تي لرونکو کې په in vitro ډول میوتاجنیک او په ژوونکو کې د وژونکي ډوز څخه د کم د واحد داخل وریدي ډوز له تطبیق څخه وروسته سرطان تولیدوونکی دی. د انتراسیکلینونو د جینوتوکسیکو او سرطاني اغېزو لپاره د قندي برخې لمرنۍ د امین ګروپ اړین ګڼل کېږي. Aclacinomycin A ، کوم چې د N,N-dimethylated قندي برخه لري، نو د همدې کبله میوتاجنیک ندی او په مړو کې د تومورونو د مینځ ته راتلو لامل نه ګرځي.




د کلاویسپس یا ارگوت الکلوئیدونه (Claviceps Alkaloids) د *Claviceps purpurea* په نوم طفیلي فنجي چې د *Secale cornutum* په نوم هم مشهور ده په طفیلي ډول پر غنمو، جودرو او نورو وابنه لرونکو بوټو باندې رازرغونېږي. نوموړي فنجیان اوږده، تور او خفیفاً منحنی شکل لري، سکلوټیم یې چې یو نوع الکلوئیدونه لري د ارگوت په نوم یادېږي (شکل ۲۵). د لو او درمند کولو پرمهال سکلوټیا له دانو سره ګډېږي. عصري تخنیکونه مخکې له اوږه کولو څخه دانې او سکلوټیا سره جلا کوي، اما په اوسنیو وختونو کې ځینې وخت چې په زیاته کچه *Secale* په غلو دانو اوبیا په اوږو او ډوډۍ کې شتون ولري، په انډیمیک ډول سمیت رامینځ ته کوي. د اروپایي ټولنې لارښوونکي دهغه غله دانو کارونه منحصره کوي چې د ۰،۱٪ څخه کم ارگوت هم ولري.


دوه ډوله مزمن سمیت یې پېژندل شوی ده چې عبارت له *Gangrene ergotism* او *Convulsion ergotism* څخه دی. دویم ډول یې د شریانونو د دایمي تقبض، اسکیمیا او د ګانګرین د پرمختیا پربنسټ د غو په نهایتو کې خاربست رامینځ

ته کوي. دغه اغيزمن غړي کېدای شي چې له پرې کولو سره مخامخ شي. اختلاحي شکل يې د Tonoclonic اختلاجونو سره پېژندل کېږي، کوم چې ډېر دردناک وي. همدارنگه د ارگوت الکلوئيدونه په مرکزي عصبي سيستم هم اغېزه کوي، کوم چې د رواني گډوډيو لامل گرځي او په پايله کې يې Dementia رامېنځ ته کېږي. په پلنو عضلو د دوی د تفصلي خاصيت د لرلو له کبله، ارگوت په زاړه طب کې د زېږون د عمليې د چټک کوونکو درملو يا د جنين د سقط په موخه کارول کېده. په عصري طب کې د ارگوت الکلوئيدونه د نيم سري د سرخوږي په درملنه کې کارېږي.

د ارگوتامين له هايډرولايڅخه وروسته ليزرجيک اسيد توليديږي. N,N-dimethylamin ته د ده اوښتل، د يو ډېر غښتلي Hallucinogenic درمل د لاسته راتلو لامل گرځي، چې د LSD په نوم ياديږي. د LSD رواني اغېزې د خيالي شيانو د ليدلو او شهواني احساساتو سره يو ځای ليدل کېږي. نوموړې درمل چې په لمړي ځل د الماني کيمياپوه A.Hofmann په واسطه د سويس د Basel په Ciba-Geigy کې سنتيز شول، د Hippie movement يا تحريک په دوران کې ډېر مشهور وو کوم چې د ۱۹۶۰ کلونو په وروستيو کې شروع شو. اغيزمن ډوز يې چې د خيالونو يا وهم لامل وگرځي د $2-5 \mu\text{g/kg}$ څخه عبارت دی. لوړ ډوزونه يې کېدای شي د هغې پېښې لامل شي چې د Horror trip په نوم ياديږي، کوم چې د ډار او ليونتوب له حالتونو څخه پېژندل کېږي. ځينې وختونه نوموړي اعراض د اونيو لپاره دوام مومي. د LSD د لوړو ډوزونو د اخيستلو وروسته غيررجعي پاراکروماتيزم او شيزوفرينيا هم تر سترگو شوې ده.



ارگو تامين



لیزرچیک اسید دای ایتایل امید یا LSD

شکل ۲۵: د ارگوت الكلويډونه او سنتيتيک ډار توليدوونکي


د مرخبریو (Basidiomycetae) توکسینونه

د لویو فنجیانو یا مرخیریو (mushroom) په مینځ کې ډېرې سمې نوعې شتون لري ، کوم چې تر ډېره په انسانانو کې د خطرناکو او یا هم ځینې وختونه د وژونکو سمیتونو لامل ګرځي. ترټولو سمې مرخیرې د Amanita ، Inocybe او cortinarius په جنسونو کې موندل کېږي. د خوړلو وړ مرخیریو په ځای د سمې مرخیریو راټول، په بوتانيکي پوهه کې د کمبود له کبله پیښیږي. د نېکه مرغه وژونکي سمیتونه یې کم دي. بیا هم د سمې مرخیریو له خوړلو وروسته د معدې او کولمو التهاب او نارامۍ مینځ ته راځي. د سمې مرخیریو د ډېرو مهمو انواعو سروې په لاندې ډول ده.

د امانیتا انواع (*A.phalloide* , *A.virosa* , *A.citrina* & *A.verna*)

تر ۹۰ سلنې پورې د مرخړيو د سميت له کبله مړينه د امانيتا فالوئيډ او د امانيتا د نورو انواعو په واسطه رامینځ ته کيږي. سميت يې د دوه گروپه حلقوي پېتايدونو پرينسټ ولاړ دی ، چې د Amatoxin (شکل ۲۲) او Phalotoxin


(شکل ۲۷) په نوم يادېږي. نوموړي اماتوکسينونه د RNA polymerase د نهی په واسطه د Transcription د پروسې څخه مخنيوی کوي. دغه حالات د داخل حجروي mRNA د کمبود لامل گرځي او په تعقيب يې په تدريجي ډول د پروتينو کمبود رامينځ ته کېږي، په پايله کې يې د حجري د مرگ لامل گرځي. ينه د نوموړو توکسينونو د عمل موخه ده، کوم چې د يني څخه د لمري تيريدو د غښتلي تاثير له کبله ده. په همدې ډول تخريب په معدي معايي تيوب او پښتورگو کې ليدل کېږي. دامانيتا د سميت په ډېرو حالاتو کې د تماس څخه دوه ورځې وروسته د يني سميت تر سترگو کېږي. په دغه حالت کې د يني د تخريب درجه په عمومي توگه شديده او غير رجعي وي.



شکل ۲۷: اماتوکسينونه

فالوتوکسين په حجروي غشاء کې د اکټين له فايروسره نښلي، چې دغشاء د نفوذ په وړتيا کې د تغير لامل گرځي، کوم چې بالاخره د حجروي مرگ لامل گرځي. د دوی اغېز د سايتوچلاسينونو له اغېز سره د پرتلې وړ دی. د اماتوکسينونو په نسبت، فالو توکسينونه خپل تاثيرات وروسته له شپږو ساعتونو څرگندوي. اماتوکسينونه د فالوتوکسينو په نسبت ډېر غښتلي دي. که چېرې په لوړه کچه مرخپري وخورل شي، د سميت اعراض يې کيدای شي چې د فالوتوکسين د لمړنيو اغېزو سره يوشان وي. د اماتوکسينونو او فالوتوکسينونو


وژونکی ډوز په ترتیب سره ۰.۱ ملي گرامه او ۱-۵ ملي گرامه دی. ۱۰۰ گرامه تازه *Amanita phalloides* ، ۱۷ ملي گرامه اماتوکسینونه لري. دهمدې کبله یو رسیدلي مرخپړی دیوې مکملې کورنۍ د وژلو لپاره کافي دی.



په عرضي ډول د امانیتا د سمیت درملنه ډېره مغلقه ده. د معدې لواړ د ناهضمه موادو د دفع کولو لپاره مهم دی. د خولې له لارې د کاراکول تطبیق د هغه توکسینو سره د نښلیدو په خاطر مرسته کوي، کوم چې په معدې معایي تیوب کې پاته وي. د مایعاتو او پلازما د زیاتوونکو تطبیق د شاک په صورت کې اړین ګڼل کیږي. اضافي درملنه یې په لوړ ډوز سره د ویتامینونو، فیبرینوجن، انټي بیوټیکونو، ګلوکو کورټیکوئیدونو، او بالاخره د قلبي ګلايکوزیدونو انفیوژن ته اړتیا لري. عصري غښتلي وقایې دمړینې کچه د ۲۰٪ په اندازه راټیټه کړې ده. د یني د تخریب د سخت جریان څخه وروسته، د مریض د ساتلو یوازینی درملنه او وروستی شونتیا د یني له تعویض څخه عبارت ده.


Amanita pantherina او *Amanita muscaria*

دواړه مرخپري انتبي کولينرجيک مرکبات يعنې Ibotenic acid چې Muscimol ته هم اوږي او کولينرجيک مواد يعنې مسکارين لري (شکل ۲۸).



د نوموړي مرخپري له خوړلو څخه وروسته په عمومي توګه انتبي کولينرجيک اعراض لکه د زړه د ضربان زياتېدل ، د بدن د تودوخې د درجې لوړېدل او د سترګو د حدقې توسع رامېنځ ته کېږي. پاراسمپاتيک اعراض لکه د زړه د ضربان کمېدل، د لاپو زياتېدل او همدارنګه ځينې وختونه د سترګو د حدقې کوچنيوالی ترسترګو کېږي. د انتبي کولينرجيک مادې اتروپين په څېر ، Ibotenic acid او Muscimol هم مرکزي عصبي سيستم ته ننوزي او د عکس العملونو لکه د سرګرځېدل، په حرکاتو کې عدم توازن، هډيانات، وهم او د جنسي غريزو احساسات رامېنځ ته کېږي. نوموړي مرخپري د رواني اغېزو د لرلو له کبله په تاريخي لحاظ په ځينې ديني مراسمو او د جادوګري د نسخو په تيارولو کې کاريدل. وژونکی سميت يې کم ليدل کېږي. سميت يې تر ډېره په هغه وخت کې

پېښېږي چې په غلطۍ سره د *Amanita pantherina* (وژنکی ډوز = ۱۱۰ گرامه تازه) مرخپړی د خوړو وړ مرخپړیو یعنې *Amanita rubescens* پرځای راټول کړل شي. د *A. muscaria* لپاره، کوم چې د *A. pantherina* په پرتله کم سمی دی تقریباً د مړینې یې کوم راپور ندی ورکړل شوی او همدارنگه د دغه مرخپړي سور رنگ په غلطۍ سره د نوموړي د راټولېدو مخنیوی کوي.



د اینوسیټب انواع (*Inocybe species*)

نږدې د اینوسیټب د انواعو له ۱۳۰ څخه ډېر ډولونه سمی دي. ځینې یې د وژونکو سمیتونو لامل هم ګرځي (د بېلګې په توګه *Inocybe patoullardi*). نوموړی مرخپړی په زیاته کچه مسکارین لري، کوم چې په مابعد ساینسې ساحه کې په استایل کولینرجیک (مسکارینیک) آخزو نښلي (شکل ۲۸). نود همدې کبله

سمیت یې په لوړه کچه د پاراسمپاتیتیکي تنبهاو (د لږو ډبریدل ، اوبنکې بهیدل ، خوله کول ، معدي معایي اختلاجونو ، شدید دستوني ، دزړه دضربان کمیدل او د قصباتو د سپازم) له څرگندېدو څخه پېژندل کیږي. که چېرې طبي وقایوي اقداماتو ته په بېره لاس رسی وشي ، مخنیوی یې بڼه صورت نیسي ، ځکه چې ټول اعراض یې د اتروپین له تطبیق څخه وروسته راڅرځیدونکي دي. که چېرې اتروپین ورنه کړل شي ، نوموړي اعراض ادامه موي او د تنفسي او قلبي حرکاتو د توقف لامل ګرځي. نور سمی مرخېري په شپږم جدول کې ترتیب شويدي(شکل ۲۹).

جدول ۲: هغه سمی مرخېري چې د خطرناکو یا وژونکو سمیتونو لامل ګرځي		
مرخېری	سم یا زهر	
Amanita phalloides	اماتوکسین	دینې
سمیت		
Amanita verra	اماتوکسین	د
ینې سمیت		
Amanita verosa	اماتوکسین	دینې سمیت
Amanita pantherina	ایپوتینیک اسید	پاراسمپاتولایتیک
Amanita muscaria	ایپوتینیک اسید	پاراسمپاتولایتیک
Cortinarius ssp	اوریلانین	
Galerina ssp	اماتوکسین	
Gyrometra esculenta	جیرومیتیرین	
Inocybe ssp	مسکارین	
Lactarius ssp	نکتارونون	
Omphalotus olearius	سسکي ترین	
Paxillus involutus	نامعلوم	

نباتي توکسينونه

دېر نباتات داسې مرکبونه لري چې د انسانانو او حيواناتو لپاره سمې گڼل شويدي. دېر دغه مواد د نبات خوړونکو حیواناتو ، فنجیانو یا بکتریاوو په وړاندې د مدافع رول لوبوي. نور بې کیدای شي په تصادفي ډول سمې وي. سمې بوټي دهغه وخت څخه چې دوی شتون لري د انسانانو له خوا د مختلفو موخو لپاره کارول کېږي. د تحلیلي کیمیا عصري لارې دا شونتیا رامینځ ته کړې ده ترڅو د سمې نباتاتو فعاله مواد لاسته راوړي ، او د هغوی د فارمکولوژیکي او توکسیکولوژیکي اغیزو میکانیزم باندې څیړنې ترسره شوې دي.

د نباتاتو په واسطه سمیت په عمومي توګه د خولې له لارې د یوه نبات او یا د نبات د یوې برخې د خوړلو له کبله رامینځ ته کېږي. ماشومان د لویانو په پرتله دېر په خطر کې دي ځکه چې دوی احتیاط نه کوي او ځینې وختونه نبات ورته په زړه پورې وي او ځان ته یې جذبي (لکه د سره Foxglove بنایسته رنګ اویا د بلاډونا د بوټي د میوې مشتې غوښتنه). د ځوانانو په برخه کې، د بوتانيکي علم کموالی د دې لامل ګرځي ترڅو په غلطۍ سره سمې بوټي د خوړو او یا د فایتوتراپی (د نباتاتو په واسطه درملنه) د نسخې په څېر وکارول شي. بالاخره سمې بوټي د جنین د سقط ، ځان وژنې او د بل وژنې لپاره هم کارول کېږي.

د سمې نباتاتو د توکسينونو د فعاله برخو په مینځ کې توپیر مشکل کار دی، ځکه چې سمیت یې تر ډېره د یو لړ مخلوط موادو د اغیزو په پایله کې مینځ ته راځي چې د خپل تاثیر لپاره متفاوت عملونه کاروي (شکل ۷). له دې څخه پرته په

حساسیتونو کې فردي توپیرونه ، کیدای شي چې مختلف اعراض مینځ ته راوړي، په ځانګړې ډول که چېرې الرژیک عکس العملونه هم په کې دخپل شي. په عادي توګه نباتي توکسینونه د حیواني توکسینونو په نسبت لږ خپل هدف ته لارپیدا کوي. همدارنګه ترډېره نباتي توکسینونه داسې مواد لري چې انتاګونستیک خاصیت لري په داسې حال کې چې حیواني توکسینونه په ډېرو حالاتو کې په سینرجیتیکي ډول عمل کوي.

هغه مواد چې پر معدي معایي سیستم اغیزه کوي د معدي معایي تیوب د مخاطي غشاء خرابت د ډېروهغه نباتي توکسینو په واسطه مینځ ته راځي چې د خولې له لارې بدن ته لارپیدا کوي. په ضمن کې ځینې نباتي توکسینونه نږدې خپلې اغیزې همدلته تولیدوي. د دوي په مینځ کې ساپونینونه شتون لري ، چې د هغه ګلايکوزیدي مرکبونو له ډلې څخه دی چې لیپوفیلیک اګلايکون او هایډروفیلیک قندي برخه لري. د دوی نوم له لاتیني ټکي یعنې (Princium saponeum) چې صابن ته وایي څخه اخیستل شوی ده او د دغه مرکب د پاکوونکي عمل په واسطه پیژندل کیږي. ساپونینونه د نباتاتو په دنیا کې په پراخه کچه شتون لري او اکثره نباتات یې د نه خوړو وړ ګرځولي دي. د ساپونین لرونکو نباتاتو یوه بېلګه چې په لویډیځه اروپا کې یې په تیرو پېړیو کې په انډیمیک ډول سمیت رامینځ ته کړی ده د *Argostemma githago* L څخه عبارت دی. د دغه بوټي دانې ، کوم چې ځینې وختونه د حبوباتو سره یوځای شنه کیږي د *Githagin glycoside* په نوم یو ساپونین لري. د هغه ډوډۍ خوړل چې په *Argostemma* ککړو غنمو د اوږو څخه تیاره شوې وي ، په انډیمیک ډول د ځینو سمیتونو چې مړینه هم لري لامل ګرځي. سمیت یې په کورنیو حیواناتو کې هم لیدل شوی ده. سمی ډوز یې د ۳ څخه تر ۵ ګرامه د *Argostemma* له دانو څخه عبارت دی. یو بل ساپونین لرونکی نبات له *Cyclamen purpurescens* څخه چې یو مشهور کورنی بوټی دی ، عبارت دی. پیاز یې ترای ترپن ګلايکوزید *Cyclamin* لري. سور *Foxglove* یعنې *Digitalis purpurea* L د ډیجیتونین

په نوم ساپونین لري (شکل ۳۰). ښه پیژندل شوی ساپونین لرونکی نبات عبارت له Horse chestnut یا *Asceculus hippocastanum* L څخه دی. نوموړی نبات د Aescin په نوم ترای ترین گلايکوزید لري. په شمالي امریکا کې امریکایي Pokeweed یا (*Phytolacca Americana*) په سنتي طب کې د روماتیزم د درملو په څېر کارېږي. دنوموړي بوټي ټولې برخې او په ځانگړي ډول رېښه یې ترای ترین گلايکوزیدونه لري.

جدول ۷: په ډېرو مهمو نباتي توکمونو یو نظر اچونه		
مورکب	ښتون	سمیت*
اډین		
<i>Alnus procurrens</i>	WLD _۰ (پړیټول) ۰.۲۰ ملی گرام فی کلوگرام دجوړي سمیت ، دمعدي او کولمو التهاب	دعصبي هډايت
اکوتینین	<i>Aconitum</i> spp	WLD _۰ (پړیټی) ۰.۱۶ ملی گرام فی کلوگرام
ز ډایټدل، بیا قلع		
اډونیکسین	<i>Adonis vernalis</i>	WLD _۰ ۱۱۱ مایکروگرام فی کلوگرام
گلايکوزیدونه ته ورته فکیز		
پیتا اېسین	<i>Aesculus</i> spp	WLD _۰ (پړیټی) ۴۰۰/۲ ملی گرام فی کلوگرام دعي: دمعدي او کولمو التهاب نژدتي
اېتوسین	<i>Aethusa cynapi</i>	سیازم
تولیدوونکی		
ایل اېزوټیوسایفات	<i>Brassica nigra</i>	WLD _۰ (پړیټی-پړیټول) ۰.۸ ملی گرام فی کلوگرام
امیگدالین	<i>Cotoneaster</i> spp	
سیټا ډ تولیدوونکی ، اسفکسیا		
انټا ټرین	<i>Nicotiana glauca</i>	LD ۲۲ (H) ملی گرام
د ګلايکيا پلاک کوټکی		
اریکولین	<i>Arca calacha</i>	WLD _۰ : تحت الجدي) ۰.۱۰ ملی گرام فی کلوگرام
اریستولویچیک امید	<i>Aristolochia clematitis</i>	WLD _۰ (پړیټول) ۰.۳۰ ملی گرام فی کلوگرام دمعدي او کولمو التهاب سرطاني
اټروپین	<i>Atropa belladonna</i>	LD ۶۰-۱۰۰ (H) ملی گرام پاراسمیتو لاپټیک
بربرین	<i>Berberis vulgaris</i>	WLD _۰ (پړیټول) ۱۰۰ ملی گرام فی کلوگرام دمعدي ، کولمو او پیتورگو التهاب
بروسین	<i>Strychnos nux-vomica</i>	LD ۲۰ (H) ملی گرام سیازم تولیدوونکی
بلو ګلټین	<i>Corydalis cava</i>	WLD _۰ : تحت الجدي) ۱۱۵ ملی گرام فی کلوگرام
کافیین	<i>Coffea arabica</i>	RLD _۰ : خولی له لاري) ۲۰۰ ملی گرام فی کلوگرام
کاتینینول	<i>Cannabis sativa</i>	RLD _۰ : خولی له لاري) ۷۶۰ ملی گرام فی کلوگرام
کپساپسین	<i>Capsicum</i> spp	CLD _۰ : وړیټی) ۶۰ ملی گرام فی کلوگرام
چیروسین	<i>Cheilanthes chlori</i>	
		CLD _۰ گلايکوزیدونه ته ورته فکیز
چیروتوکسین	<i>Cheildolan chlori</i>	LD ۱۰ (C): وړیټی) ۰.۲۰ ملی گرام فی کلوگرام
		CLD _۰ گلايکوزیدونه ته ورته فکیز
چیلیدونین	<i>Cheildolan majus</i>	WLD _۰ : وړیټی) ۲.۵ ملی گرام فی کلوگرام
دعضلو احتطاط		
کریزوټین	<i>Adria araroba</i>	WLD _۰ : وړیټی) ۰.۴ ملی گرام فی کلوگرام
	سایټوټوکسیک، ټومور تولیدوونکی	
سیکوتوکسین	<i>Cicuta virosa</i>	LD ۱۰ (C): خولی له لاري) ۷ ملی گرام فی کلوگرام سیازم تولیدوونکی
کوکټین	<i>Erythroxylon coca</i>	RLD _۰ : وړیټی) ۱۷ ملی گرام فی کلوگرام موضعی یی حسی - تنبیه
کولشیسین	<i>Colchicum autumnale</i>	LD ۲۰ (H) ملی گرام عضلي احتطاط

LD (H) ۸۰۰ میلی گرام	<i>Cosmos maculatus</i>	کوتینین
LD (F) ۲۰۰ میلی گرام فی کلورگرام قلیی گلائیگزیدوتو ته ورته لقیز	<i>Cosularia majalis</i>	کاتولاتوکسین
	<i>Nicotiana tabacum</i>	کوتینین
LD (R) ۶۲ میلی گرام فی کلورگرام	<i>Cycas revoluta</i>	سکاسین
دعمدی اوکولموالتهاب . هیپولایز	<i>Cyclanassa papirascens</i>	سیکلانین
LD (C) ۰۰۰ میلی گرام فی کلورگرام	<i>Laburnum anagyroides</i>	سیتوسین
دعمدی	<i>Digitalis purpurea</i>	دیجیتونین
		اوکولموالتهاب . هیپولایز
LD (C) ۰۰۰ میلی گرام فی کلورگرام قلیی گلائیگزیدوتو ته ورته	<i>Digitalis purpurea</i>	دیجیتوکسین
LD (C) ۰۰۰ میلی گرام فی کلورگرام قلیی گلائیگزیدوتو ته ورته	<i>Digitalis purpurea</i>	دیجیتوکسین
LD (R) ۲۰۰ میلی گرام فی کلورگرام ساچوتوکسیندعمدی اوکولموالتهاب	<i>Cephaelis ipecacuanha</i>	ایپیتین
LD (M) ۱۰۰ میلی گرام فی کلورگرام سعیا تویمیهیتیک	<i>Ephedra vulgaris</i>	اقدیرین
LD (C) ۰۰۰ میلی گرام فی کلورگرام	<i>Digitalis</i> spp.	جیتوکسی جنین
LD (GP) ۰۰۰ میلی گرام فی کلورگرام	<i>Helleborus</i> spp.	هیالبرین
LD (H) ۶۰۰۰۰ میلی گرام	<i>Solanum</i> spp.	ل-سولانوم
		پاراسماتولایک
قوتوتوکسین	<i>Hypericum</i> spp.	هایپریرین
		MAOase های کونگی
LD (R) ۰۰۰ میلی گرام فی کلورگرام سیازمولایتیک	<i>Amelanchier</i>	کلین
دعمدی	<i>Amorpha</i>	لیکورین
		اوکولموالتهاب دیستکی خاریت
LD (M) ۵۰۰ میلی گرام فی کلورگرام هذیقات . تراوتوچیک	<i>Lophophora williamsii</i>	مسکالین
LD (P) ۲۰۰۰۰۰ میلی گرام مرکزی انلیجریا . تنفسی اتصالط	<i>Papaver somniferum</i>	مورفین
سیازمولایتیک	<i>Papaver somniferum</i>	نارکوتین
دککلیا پاکول	<i>Nicotiana tabacum</i>	نیکوتین
LD (R) ۲۰۰ میلی گرام فی کلورگرام	<i>Nicotiana tabacum</i>	نارنیکوتین
LD (M) ۲۰۰ میلی گرام فی کلورگرام سیازم تولیدکنی	<i>Oenothera biennis</i>	اوپتاتوکسین


سمیت یې په لوړ ډوز سره د نوموړي نبات د چای (poke tea) له څښلو څخه ، چې له رینبو او یا یې له پانو څخه جوړیږي ، مینځ ته راځي. اعراض یې په عمومي توګه له معدي معایبي سیستم سره اړه لري. نور ساپونین لرونکي نباتات چې په انسانانو کې یې سمیت لږ تر سترګو کیږي عبارت له (*Primula L. (primuse)* ، *Astragalus glycyphyllos L. (licorice)* ، *Viola purpurea L. (Violet)* (Field milkvetch) ، *Panax ginseng C. Mayer (ginseng)* او *Equisetum arvense L. horsetail*) څخه دي.

ساپونین ضعیفاً د کولمو له لارې جذبیږي. د دوي د صابوني خاصیت د لرلو له کبله ، دوی د معدي او کولمو د اپیتیلیم د حجروي غشاء په شحمي برخه کې ذخیره کیږي ، کوم چې ویجاړ شوی ده. د شدیدې څارښت لامل ګرځي ، کوم چې په خوله او معده کې د سوزېدلو ، ټوخي ، د لارو د زیاتیدو او اوبنکو بهېدلو له مخې پیژندل کیږي ، په تعقیب یې کانګې ، زړه بدې ، او دستوني رامینځ ته کیږي ، او ځینې وخت د مایعاتو او الکترولیتونو د ډېرو ضایعاتو لامل ګرځي. مرګ تر ډېره د شاک په غبرګون کې پېښیږي. که څه هم ساپونین د جذب له مخې کمزوري دي ، اما د کولمو موضعي تخریب ، د کولمو دېوال ته د نفوذ وړتیا ډېروي. له جذب څخه وروسته د ساپونین سیستمیکي غبرګونه تر ډېره د وینې سرو کریواتو ته لار مومي او کېدای شي چې هیمولایز هم ورسره وي ، چې د ثانوي غبرګون په ډول انوکسیا او د پښتورګو د ناوړتیا لامل ګرځي.

د ساپونینونو د سمیت درملنه د خولې له لارې د فعاله کاربن تطبیقول دي ، ترڅو ساپونین ځانته جذب او بیا یې غیرفعاله کړي. دوریجو او اوربشو یا پارافینو د څرېښناک مخلوط تطبیق د معدي د مخاطي غشاء لپاره ساتونکی رول لوبوي. د څوځلي کانګو او دستونو څخه وروسته د مایعاتو او الکترولیتونو د ضایعاتو دوباره جبرانول اړین ګڼل کیږي. که چېرې مسموم زیات تنبیه شوی وي باید آراموونکي درمل ورکړل شي او که چېرې تنفسي مشکلات ولري باید


مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي. د عصري غښتلي ويايي له امله د ساپونين لرونکو نباتاتو وژونکي سمیتونه ډېر کم دي.

د هغه نباتي توکسينونو بل گروپ چې د معدي معايي سيستم د خاښت لامل گرځي د هايډروکسي انټراکينونونو (Hydroxyanthraquinones) څخه عبارت دی. دوی په مختلفو طبي نباتاتو کې شتون لري، کوم چې ډېرېې د مسهل په توگه کارول کېږي. انټراکينون لرونکي نور نباتات له Aloe (Aloe barbadensis P.Mill. او Aloe ferox Mill.) ، Sannae folium او Sannae fructus يعني Cassia angustifolia Vahl. ، له رينبو او ساقو Rhamni (Rheum officinale Baillon ,Chinese Rubrub) او Rhamnus ssp, buckthorn يعني frangulae cortes څخه عبارت دي. دوی د Rhein په نوم انټراکينونه، Aleo-emodin ، Chrysophanol اود اگلایکون او گلایکوزيډ په ډول د Physcion په نوم ماده لري (شکل ۳۱).



شکل ۳۱: هايډروکسي انټراکينونونه او گلایکوزيډونه په هغه طبي بوټو کې شتون لري چې د مسهل په توگه کارول کېږي په اول او اتم موقعيت کې د هايډروکسيل گروپونه د مسهل (او تومور توليدوونکي) خاصيت لپاره اړين گڼل کېږي.

د کولمو اړونده باکتریاوې انتراکینونه (گلایکوزید) ، ډېرو فعالو انټرونونو ته ارجاع کوي، کوم چې د کولمو د دېوال د تخریش په پایله کې د خالصه مایع افراز په تیوب کې ډېروي. دغه پروسه د مسهله اغېزو لامل ګرځي. په اول او اتم موقعیت کې د دوه هایډروکسیلونو شتون د مسهل عمل لپاره اړین ګڼل کیږي. دانټراکینونو د مزمې کارونې په پایله کې د دوی مسهله اغېزې کمیږي او په یوه ویجاړوونکي حالت اوږي (شکل ۳۲).



ځينې انټراکینونه (شکل ۳۱) لکه Aleo-emodin او emodin په یوډول in-vitro لنډ مهال ارزونو کې پر جینونو باندې سمې اغېزې ښوودلې دي. ټول هایډروکسی انټراکینونونه کوم چې په لمړې او اتم موقعیت کې د هایډروکسي ګروپونه لري (فعال مسهله یي) د میتوز د لارې د پیل د ابتدایي حجرو په کښت کې او د C_3H مورک په فېروپلاستونو کې (دلر ډوز د تطبیق څخه وروسته د خبیثه تغیر د مینځته راتلو له لارې) تومور تولیدوونکې اغېزې له ځان څخه ښيي. په هغو مورکاتو او مېو کې چې د هایډروکسي انټراکینونو په واسطه تغذي


کړل شوي وې سرطاني اغيزې وليدل شوې. همدارنگه يولې محدوده شواهد شتون لري کوم چې د مسهله انټراکټينو د کارونې په پايله کې د لويو کولمو د سرطان د مينځ ته راتلو څرگندوي دي. ډېر احتمال لري چې د هايډروکسي انټراکټينونو اغېزې په Oxidative stress پورې اړه ولري.

د Ricin ، Abrin او Phasin په نوم سمې پروټينونه د Ricinus communis L يا Coster bean ، Abrus precatorius L ، jequirity bean ، Phaseolus vulgaris L يا Phaseolus coccineus L او kidney bean يا Scarlet runner نباتاتو په دانوکې شتون لري. هغه مرکبات کوم چې په لکتينونو پورې اړه لري د نبات د پخولو په ترڅ کې له مينځه ځي ، که څه هم دوی د هضمي انزايمونو په وړاندې مقاومت لري. Ricin او Abrin د هغه ډېرو قوي سمې نباتي زهرونو په مينځ کې شتون لري چې تر اوسه پېژندل شوي دي. په موږکانو کې د داخل وريدي زرق له لارې د تطبيق څخه وروسته يې LD₅₀ ۰.۱ μg/kg ، په انسانانو کې يې د خولې له لارې وژونکي ډوز له ۵ μg/kg څخه عبارت دی. که چيرې د jequirity په نوم لوبيا يا کاستر لوبيا يې له ژوولو څخه وخورل شي ، د زهر ازايدل د دوی د پوټکي په واسطه نهی کيږي. کله چې نوموړې لوبيا ژوول کيږي په نتيجه کې يې وژونکي سميت رامينځ ته کيږي. د jequirity په نوم د لوبيا پوډر د Aztec په نوم د يوې بخیلې بنځې له خوا د خپل بيوفا مير په خوړو کې گډ شوي ول. د پښتورگو په نوم لوبيا که چيرې په خام ډول وخورل شي د فازين د لرلو له کبله سميت رامينځ ته کوي. په ماشومانو کې د نوموړې لوبيا د ۵ يا ۶ خامو دانو له خوړلو څخه وژونکي حالت رامينځ ته کيږي.

سمې لکتينونه د پروټينو له دوه ځنځيرونو (A ، B) څخه مينځ ته راغلي دي ، کوم چې د ډای سلفايډ پل په واسطه سره نښلېدلي دي. د B ځنځير په اشتراکي ډول د حجروي غشاء سره اړيکه جوړوي ، په داسې حال کې چې د A ځنځير د حجروي داخل ته ننوزي او د rRNA په ماليکول کې د ادينين د تجزيې پرېنستد رايبوزوم په واسطه د پروټينو د سنتيز څخه مخنيوی کوي. داسې باور کيږي چې د Ricin يا

Abrin ځانگړی مالیکول کولای شي چې یو حجره له مینځه یوسي. د خولې له لارې دنوموړو مرکباتو د خوړلو وروسته ، ترټولو وړاندې د هضمي تیوب مخاطي حجرې تخریبېږي. د سمې پروټینونو له جذب څخه وروسته کیدای شي چې شديده کانگې او دستونې ، کوم چې د شک سندروم په واسطه د مرگ لامل گرځي ، رامینځ ته شي. نور غړي په ځانگړې توگه ینه او پښتورگي هم له تخریب سره مخامخ کېږي. د نوموړي سم د خوړلو او مړینې ترمینځ د اخفاء دوره په نارمل ډول د ۲ څخه تر ۳ ورځو پورې رسیږي. د پوستکي له لارې د تماس (کوم چې د تخریب شوي پوستکي له لارې صورت نیسي) څخه وروسته ، بې له دې څخه چې هضمي لاره تعقیب کړي په بیرته اعراض راڅرگندېږي.

Capsaicin د خوړلو څخه وروسته کوم چې په گرمو مسالو لکه مرچ کې شتون لري، دمعدې معایي تیوب موضعي خارش ته هم رامینځ ته کېږي (شکل ۳۳).




دنوموړې مادې لوړه کچه (تر ۱٪) د کایین په نوم مرچ یا Capsicum frutescens L. کې شتون لري. د Capsaicin سوزوونکی خوند د ۱ او ۲۰۰۰۰۰ په نسبت تر رقیق کولو وروسته هم په څرگند ډول معلومیږي. خردل او Horseradish د Allyl isothiocyanate په نوم تخریش کوونکې ماده لري (شکل ۳۳). په لوړ ډوز سره د نوموړو موادو د خوړلو په پایله کې د معدې معایي

تیوب د تخریش له کبله کیدای شي چې کانګې او دستونې رامینځ ته شي. دزره او پښتورگو کرنې هم تر اغیزې لاندې راځي. دنوموړو موادو سرطاني اغیزې په لابراتواري حیواناتو کې ترسترگو شوي دي.

پرزره باندي اغېز کونکي مرکبات:

کارډیوتوکسیک مرکبات له هغو ګلايکوزیدونو څخه عبارت دي ، کوم چې په *Digitalis purpurea* L او *Digitalis lanata* Ehrh(foxglove species) ، *Nerium* ، *Convularis majalis* L.(European lilly of the vally) *Adonis vernalis* ، *Cheiranthus cheiri* L. ، *oleander*(Oleander) *Helleborus niger* L.(black hellbore) ، L.(spring pheasant's eye) ، *Scilla bifolia* L. او (spindle tree) *Euonymus europeaus* L. ، پیدا کيږي.


ټول قلبي ګلايکوزیدونه یو ډول کیمیاوي جوړښت لري. بنسټیز جوړښت یې ستروئیدي کړی تشکیلوي، کوم چې په اوولسم کاربن کې د یوې غیرمشبوع رابطې لرونکي ګاما لکتون کړی (کارډینولید ګروپ) او یا د دوه غیرمشبوع اړیکو لرونکې δ -lactone کړی سره اړیکه لري. د دواړو ګروپونو لپاره بیلګې په ۳۴م شکل کې ښوودل شوې دي. د *Bufadienolid* ګروپ مشتقات د *Toad* په نوم ذوحیاتینو په لارو کې هم شتون لري. د نبات څخه د لاسته راغلو ګلايکوزیدونو د ګلايکونونو برخه ، په قندي بقایا لکه *D-glucose* , *D-fructose* , *D-fucose* , *L-rhamnose* او ځینو ځانګړو برخو لکه *۲-oxo* یا *۳-O-methyl* قندونو پورې نښتې دي.




د نوموړو مرکباتو گلايکوزيډي برخه او د لکتون کړی د دوی د اغیزو لپاره اړینه نه گڼل کیږي، که څه هم وروستی یې د اغیزو په قوت کې برخه اخلي. دغه مرکبات د زړه د عضلاتو د حجرو د $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATPase}$ له انزایمونو سره ډېر تمایل لري. د نښلیدو په پایله کې یې د حجروي غشاء په مسیر کې د $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ جریان کمیږي او بالاخره د حجرو په دننه کې د کلسیم د ایون غلظت لوړیږي. کم ډوز یې مثبت ایونوتروپیک اغېز لري، کوم چې د زړه په ناورټیا کې په معالجوي ډول کارول کیږي. د معالجوي ډوز ساحه هم پراخه نده. سمیت یې صرف د ۲۰٪ لوړ ډوز په

پایله کې څرگندېږي د مدرر درملو د کارولو په وجه د پوتاشیم کمبود ، د الدوسترون د کچې لوړېدل او یا دستونې د قلبي گلايکوزیدونو سمیت زیاتوي. د قلبي گلايکوزیدونو سمیت په لوړه کچه د پوتاشیم دلاسه وتلو د ځانگړتیا په اساس، کوم چې په تعقیب یې برادې کار دیا ، اریتمیا او بالاخره بطینی فبریلیشن او د زړه ناورتیا رامینځته کیدو لامل گرځي، پېژندل کېږي. د Digitonin وژونکی ډوز نږدې ۱۰ ملی گرامه دی، کوم چې د سور Foxglove د ۲ یا ۳ پاڼو دخوړلو په پایله کې مینځ ته راځي.

د *Cinchona pubescens* Vahl یا کونین پوتکی د کینین او کینیدین الکلوئیدونه لري (شکل ۳۵). نوموړي مرکبات په معالجوي ډول د ملاریا او د زړه د بې نظمي په درملنه کې کارول کېږي. دواړه مرکبات په خپل سرد زړه د تقلصاتو څخه مخنیوی کوي او په لوړ ډوز سره بالاخره د زړه د دریدلو لامل گرځي. د Spartein په نوم د مرکب په واسطه هم په عین ډول تاثیر سرته رسیږي ، کوم چې د *Genista* او *Lupinus* په جنسونو کې شتون لري.




Taxus baccata L. یا yew tree د taxanes په نوم د سمی الکلوئیدونو مخلوط لري (شکل ۳۲). دغه سم د نبات په ستن ډوله پانیو او د مېوې په مینځ کې شتون لري. د مېوې پوښ د زهرو څخه تش او دخوړو وړ دی. سمیت یې تر ډېره په کورنیو څارویو لکه آسونو، غواگانو او خوگانو کې پېښېږي. د آس لپاره یې وژونکی ډوز نږدې د ۵۰۰ گرامه پانیو خوړل تشکیلوي. سمیت په عمومي توګه د تاکسین (شکل ۳۲) په واسطه رامینځ ته کیږي، کوم چې د دوه قسمه مرکباتو مخلوط او قوي کارډیوټوکسیک اغیزې لري. د نوموړي نبات د سمی کچې له خوړلو وروسته وځیمه *Bradycardia* رامینځته کیږي، کوم چې د زړه د دیاستولیک توقف لامل ګرځي. احتمالاً چې نوموړې اغیزې د غشاء په دواړو خواوو کې د سودیم او کلسیم دایونونو د تېرېدلو مخنیوی کوي.




په يڼه (جیگر) اغیز لرونکي مرکبات

يڼه د غیر رسمي کولو مرکزي غړی دی. ټول هغه مرکبات چې د خولې له لارې اخیستل کېږي، د معدي معایبي تیوب څخه د تېرېدو وروسته د يڼې څخه تېرېږي. د همدې کبله يڼه د ټولو هغه سمو مو لپاره چې زموږ بدن ته ننوزي، یوه موخه گڼل کېږي. اگر که یو څه شمېر توکسينونه د يڼې لپاره ځانگړي دي. د دوي په مینځ کې هغه سمې ثانوي سمې مرکبات شامل دي، کوم چې د يڼې د حجراتو په لاس د بهرنیو موادو د میتابولیزم په پایله کې په مینځنیو فعاله موادو بدلېږي او نږدې په مکمل ډول د يڼې پر ماکرومالیکولونو یا لویو مالیکولونو باندې نښلي.


د نباتي مهمو مرکباتو یو گروپ چې پر يڼه سمې اغیزې پرېږدي د پیرولیزیدین د الکلوتیدونو څخه عبارت دی، کوم چې شاوخوا په ۳۵۰ نباتاتو کې شتون لري. د دوی په مینځ کې گڼ شمېر طبي نباتات لکه *Tussilago farfara* L.(coltsfoot)، *Petasites hybridus* (L)، *Symphytum officinale* L.(comfrey)، یا *Butterbur* *Cynoglossum officinale* L.(hound's tongue) او د *Senecio* ssp مختلفې انواعې شتون لري. د پیرولیزیدین الکلوتیدونه نږدې دوه سوه مشتقات لري، چې د هترو سکلیک حلقوي سیستم او د نیسین د قلوي پورې، کوم چې د دوه تیزابي برخو چې تر ډېره غټ حلقوي دوه قلوي یا Two-basic اسید وي، سره تړلي دي. د پیرولیزیدین د الکلوتیدونو دوه عمومي ډولونه یعنې مشبوع او غیر مشبوع نیسین لرونکي شتون لري. صرف غیر مشبوع ډول یې سمې دی. په ۳۷ شکل کې د پیرولیزیدینونو ځینې جوړښتونه د نمونې په ډول ښودل شوي دي.



ايشيميدين- نوع Ecl



سنيسيونين- نوع Se




سنيكرين- نوع Se

شکل ۳۷: د پيروزاليدین د ځانگړي الکلوئيدونو کيمياوي جوړښت

د جذب څخه وروسته د پيروزليزيدین الکلوئيدونه د يني د مخلوط فعاليت لرونکي اکسيداژونو په واسطه تحمض او د پايړول په ډېر فعاله مشتقاتو باندې بدليږي، کوم چې په اشتراکي ډول د يني د حجراتو په غټو ماليکولونو باندې نښلي. د سمې ډوز خوړل يې کېدای شي د يني د نکروتيک تخریب لامل شي، کوم چې د Veno-occlusive سندروم په نوم ياديږي. د مرکزي امريکا او کارابین ټاپو په ځينو برخو لکه جامايکا، په هغو ماشومانو کې چې د Bush teas (دهغو

نباتاتو څخه لاسته راځي چې *Senecio spp* لري). په واسطه يې درملنه شوې وه، په انډيمیک ډول د يني سيروزس ترسترگو شويدي؛ دغه مواد د ستنې درملو په توگه د ډېرو مرضونو په درملنه کې کارول کېږي. په انډيمیک ډول د پيروليزيډين د الکلويډونو سميت د نړۍ له نورو برخو هم راپور ورکول شوی دی. په افغانستان کې د هغه غلو دانو له خوړلو وروسته چې د *Halotropium* او *Crotalaria* د انواعو دانې يې لرلې، د يني شديد تخریب مينځ ته راغی. په استراليا کې نږدې ۱۰۰ ميليونه پسونه د *Halotropium* د خوړلو له کبله د يني له شديد تخریب سره مخامخ دي. حيوانات په نارمل ډول ترڅو چې نور غیر سمی خواړه پيدا کولی شي د دغه نباتاتو له خوړلو څخه ځان ژغوري، ليکن په وچ موسم کې چې خواړه کم وي حالت دغسې ندي.

د پيروليزيډين الکلويډونه د طبعي سرطان توليدوونکو د يو مهم ټولگي استازيتوب هم کوي. داسې ښوودل شوېده چې د ميتابوليکي فعاليدو وروسته د پيروليزيډين الکلويډونه په اشتراکي ډول د يني له DNA سره نښلي. د پيروليزيډين د الکلويډونو داى استرد دې وړتيا لري ترڅو د DNA د Cross-link لامل شي (شکل ۳۸). نوموړي مرکبات په گڼ شمېر د بدن څخه د باندې تجربو کې ميوتاجنيک او په لابراتواري حيواناتو کې تراتوجنيک اغيزي لري. هغه مړې چې د اوږد مهال لپاره د پيروليزيډين د الکلويډونو او يا د دغه مرکباتو لرونکو نباتاتو په واسطه تغذيه کړل شويدي، په ينه کې يې ځانگړي ډول تومورونو انکشاف کړی دی.



پر پښتورگو سمي اغېز لرونکي مرکبات د اطراح د عمليې پر مهال ډېر خارجي مواد په پښتورگو کې ذخيره کېږي. د همدې کبله دا د حيرانيدو وړنده چې پښتورگي ځينې وخت د کيمياوي مرکباتو په سمي کړنو کې برخه اخلي. غير مستقيم ميخانيکيتونه هم کيدای شي د پښتورگو د فعاليت د گډوډۍ او تخريب لامل وگرځي. په شديد ډول د داخل وعايي هيمولايږ په پايله کې کيدای شي د پښتورگو په تيوبونو کې د Heme کرستلونه رامينځ ته شي، چې وروسته بيا د پښتورگو د ناوړتيا لامل گرځي. د تشو متيازو کمبود يا نه شتون هم کيدای شي په الکتروليتونو کې د عدم توازن له کبله، کوم چې د ځينې نباتاتو د سميت په پايله کې د شديد اسهالاتو لامل گرځي، وليدل شي. په دې حالت کې د پښتورگو ناوړتيا د رينين-انجيوتنسين-الدوسترون د سيستم د فعاليدلو په پايله کې مينځ ته راځي. ځينې نباتي توکسينونه په ځانگړي ډول پر پښتورگو اغېز کوي. اعراض د نوموړو مرکباتو د خوړو په کچې پورې اړه لري او

له سپکې اولیگو یوریا څخه نېولې بیا تر مکملې Anuria پورې رسیږي. په ورته ډول اعراض په لوړه کچه د اگزاليک اسیدو د مصرف په پایله کې هم رامینځ ته کیږي، کوم چې په ځینو سبزیو کې لکه څکرای، اسفناج او کرفس کې شتون لري. د پښتورگو د تیوبولونو تخریب د کلسیم اگزالات د کرسټالیزیشن له کبله مینځ ته راځي.


هیماتو توکسیک عمل کوونکی بوټي

د ډېر بوټي ساپونینونه لري کوم چې د جذب څخه وروسته د هیمولایز لامل ګرځي. په کولمو کې د کم جذب له کبله د ساپونینونو اغیزې تر ډېره په معدې معایي سیستم پورې تړلې پاته کیږي. که چېرې د اندیښنې وړ کچه ساپونین جذب شي، کیدای شي چې شدید هیمولایز رامینځ ته شي چې د سیانوزس او د پښتورگو د ناوړتیا لامل ګرځي. د Horse chestnut ساپونین یعنې Aescin په کلینیکي توګه د مغزو د عملیات څخه د مخکې اذیما د درملنې یا مخنیونې لپاره کارول شوی. په جرمني کې یې لوړ ډوز په ماشومانو کې د ځینو وژونکو حالاتو د مینځ ته راتلو لامل شوی ده.

لکتینونه د هغه مرکباتو له ګروپ څخه مینځ ته راغلي دي چې د وینې په کریواتو عمل کوي. دغه مرکبات چې په ګڼ شمېر نباتاتو کې شتون لري، په حجروي غشاء کې د ځانګړو قندونو په برخه کې نښلي. د ریسین، ابرین او فازین په هکله مخکې لا بحث شوی دی. بل لکتین د کانکناوالین (Concanavalin) څخه عبارت دی چې د Canavalia ensiformis (L.) D.C. په نوم لوبیا کې شتون لري. لکتینونه د وینې د کریواتو د لخته کېدو لامل ګرځي. ځینې مشتقات یې د لمفوسایتونو مایټوزس هڅوي او د یوه انټي جن په څېر عمل کوي. که څه هم میکانیزم یې مشخص ندی. همدارنګه لکتینونه په تشخیصیه ډول د وینې د ګروپونو د پیدا کولو لپاره هم کارول کیږي.

د فاویزم په نوم سندروم په حساسو اشخاصو کې د Vicia faba (horsebean) L. په نوم لوبیا د خوړلو په پایله کې مینځ ته راځي. ناروغان په

غښتلې هیمولایز اخته او ځینې وخت وژونکې پایلې هم ورسره ملې وي. حساسیت یې له بارزه کروموزمي تشوشاتو سره اړه لري کوم چې د وینې په سرو کریواتو کې د Glucosi-۲-phosphate-dehydrogenase د انزایم د کمبود لامل ګرځي. نوموړي تشوشات په تورپوستو، آسیایانو او د مدیترانې د سیمې په اوسیدونکو کې په زیاته کچه لیدل کیږي. نوموړی انزایم د NADPH د سنتېز لپاره مهم دی، کوم چې د ارجاع شوي ګلوتاتیون کچه کنټرولوي. د ګلوتاتیون په سویه کې ټیټوالی د وینې د سرو کریواتو تحمضي تخریب ډېروي او د هیمولایز لامل ګرځي. Horsebean د Divicin او Isouramil (شکل ۳۹) په نوم مرکبات لري، کوم چې GSH اکسیدیشن کوي او په GSSG یې بدلوي. هغه اشخاص چې د Glucosi-۲-phosphate-dehydrogenase انزایم په نارمله کچه لري د سمې موادو په واسطه د رامینځ ته شوي Oxidative stress د جبرانولو لپاره په کافي مقدار NADPH لري. په حساسو اشخاصو کې د GSH کچه د عادي حالت په پرتله ۲٪ په اندازه راټیټیږي.




په عصب او عضلو سمې تاثیر لرونکي نباتي توکسينونه گڼ شمير له نباتاتو څخه لاسته راغلي توکسينونه د مرکزي او محيطي عصبي سيستم پر برقي هدايت او اسکليتي عضلو باندې تاثیر لري. ډېر دغه مرکبونه الکلوئيدونو پورې اړه لري، کوم چې د بدن د داخلي نيورو ترانسميټرونو د تنبيه او نهې لامل گرځي. ځينې دغه مرکبونه په مستقيم ډول له حجروي غشاء څخه د ايونونو په جريان اغېز لري. دغه ډول مرکبونه له نباتاتو څخه تصفيه، همدارنگه د نبات دخلاصې په ډول يا خپله نبات د طبي موخو لپاره کارول کېږي، لکه د وينې دفشار کنټرول، د سپازم پرضد، د روحي او رواني ناروغيو پرضد کارول کېږي.

په اتونوميک عصبي سيستم اغيز لرونکي مرکبات دغه مرکبات په دوو ډلو وېشل شويدي اول هغه چې پر سمپاتيټيک او پاراسمپاتيټيک اعصابو اغېز لري او دويم هغه چې پر اتونوميک غوټو اغېز لري، چې په ټول اتونوميک عصبي سيستم اغېز لري. په وروستۍ ډله پورې د پيريډين الکلوئيدونه اړه لري چې په تمباکو کې شتون لري (*Nicotiana tabacum*) (شکل ۴۰). عمل يې په اساسي توگه په نيکوتين پورې اړه لري، کوم چې په ټولو اتونوميک غوټيو کې د ډيپولاريزيشن لامل گرځي. د نيکوتين کوچنی ډوز هڅوونکې اغېزې لري. د اشتها له مينځه وړلو اغېز د ادرنالين د ازادېدو له کبله دی، کوم چې د گلايکوجنولايזس عمليه هڅوي چې په تعقيب يې په وينه کې د گلوکوز سويه لوړېږي. په لوړ ډوز سره پاراسمپاتيټيک تاثيرات لري چې د خولې کيدلو او د کولمو د تشنجاتو سره يوځای وي. د بالغ انسان لپاره يې وژونکی ډوز له ۴۰ څخه تر ۲۰ ملي گرامه پورې رسېږي، چې د يونيم يا دوه سگرتو د نيکوتين له کچې سره برابر ده. دا چې د سگرتو د څکولو څخه وروسته د نيکوتين حاد تاثيرات نه ليدل کېږي، په کراره د نيکوتين د اخيستلو او په سرعت سره يې په سږو کې د غير فعاله کېدو له کبله دی. پردې برسېره په ډېر ځکونکو کې د نيکوتين په وړاندې تحمل هم رامېنځ ته کېږي. په هر حال په بيا ځلي ډول د خولې له لارې د نيکوتين سميت تر سترگو کېږي، د بېلگې په توگه د وړو ماشومانو له

خوا د سگرتو خوړل. همدارنگه د نیکوتین لرونکو حشره وژونکو سره بې له احتیاط څخه لاس وهنه یا د ځان وژنې په موخه خوړل هم وژونکي سمیتونه رامینځته کوي. د تمباکو د اوبلن محلول سره د پوستکي د تماس په پایله کې کېدای شي د نیکوتین سمی مقدار بدن ته تېرشي. د نیکوتین وژونکې کچه کولای شي د لنډ مهال لپاره اختلاجونه رامینځ ته او په تعقیب یې د تنفسي او قلبي حرکاتو د توقف لامل وگرځي.


سیتیزین (Cytisin شکل ۴۰)، چې د laburnum په انواعو لکه Labarum anagyroides Medik (یو پیژندل شوي د باغچې نبات) کې پیدا کېږي د دوي د فامکولوژیکي اغیزو او جوړښت له مخې نیکوتین ته ورته دی. اساساً دغه سم د نبات په دانو کې شتون لري. د لویانو لپاره د ۱۵ څخه تر ۲۰ دانو پورې وژونکې دي، په داسې حال کې چې پنځه دانې یې کولای شي ماشوم له مینځه یوسي. د وزې د شیدو له خوړلو وروسته هم د سیتیزین سمیت راپور ورکول شوی ده. هغه وزې چې په نسبي ډول د Cytisin د سمی اغیزو په وړاندې حساسیت لري، د دغه نبات له خوړلو وروسته په شیدو کې نوموړی مرکب اطراح کوي. د Cytisin د سمیت اعراض د نیکوتین هغو ته ورته دي، اما مرکزي تنبیه کوونکې اغېزې چې پر Medulla oblongata یې تر سره کوي ډېرې مهمې دي. نوموړي اعراض د اوعیو د تقبض په پایله کې د فشار په لوړېدو او د زړه د ضربان په ډېرېدو سره پیل او په تعقیب یې د عضلاتو غښتلی تشنج، د شعور له لاسه ورکول او د تنفسي حرکاتو توقف رامینځ ته کېږي. د نبات د پاته شونو څخه دمعدې د مینځلو وروسته د مسموم درملنه په عرضي ډول ترسره کېږي.



پیلوکارپین (Pilcarpine شکل ۴۱) د جابورنډي دبوټی د پاڼو فعاله ماده (*Pilocarpa jaborandi* Holmes)، د پاراسمپاتیټیک اخذو میکانیزم تنبیه کوي. دغه مرکب په خالص ډول د سترگو د فشار (گلوکوما) په درملنه کې په فارمسیتوټیکي توګه کارول کیږي. د Pilcarpine د سمیت اعراض په غښتلي ډول د پاراسمپاتیټیک عصبي سیستم د تنبیه په پایله کې د لارو د زیاتېدو، خوله کیدو، د حدقې د کوچني کېدو، نږدې د ټولو ښویو عضلو د تشنجاتو او برادې کارډیا څخه عبارت دي. د ۲۰ ملي ګرامه Pilcarpine د خوړلو په پایله کې وځیم سمیت مینځ ته راځي. بل مرکب چې پر پاراسمپاتیټیک اخذو باندې اغېز لري د مسکارین څخه عبارت دی، چې د Basidiomycete په نوع کې شتون لري (د مایکوتوکسینونو برخه وګورئ).


Physostigmine، چې په افریقایي نبات *Physostigma venenosum* Balf یا Calabar bean کې شتون لري، خپل کولینرجیک تاثیرات په غیر رجعي ډول

د Acetylcholinesterase انزایم د نهې کولو پر بنسټ تولیدوي. د دې په پایله کې په لوړ مقدار داخلي استایل کولین تراکم کوي. اساساً اعراض د سمپاتیتیکو اغیزو لرونکي دي. د مستقیم عمل کوونکي مرکب یعنې *Pilocarpine* په پرتله، *Physostigmine* د مخططو عضلو تقبض هم مینځ ته راوړي. د سمیت درملنه یې د اتروپین او ډیازپام له تطبیق څخه عبارت ده.



د *Tropa* الکلوئیدونه د کولینرجیک د آخزو د انتاګونست په څېر عمل کوي. د دغه ډول مرکباتو په مینځ کې *L-hyoscyamine* د اتروپین *racemate* (مخالف لوري ته نور څرخوونکی) او د اتروپین ایپوکساید یعنې سکوپولامین (شکل ۴۲) شتون لري. دغه مرکبات د *Solanaceae* (night-shade) د نباتاتو د کورنۍ په مختلفو جنسونو په کې پیدا کېږي. لوړ غلظت یې په *Atropa* *Hyoscyamus niger* L. (black henbane)، *belladonna* L. (*atropa*) *Mandragora officinarum* او *Datura stramonium* L. (jimson weed) *L.* (*mandrake*) کې پیدا کېږي. چیرته چې دغه نباتات په وحشي ډول راشنه کېږي، د بلاډونا تورې وږې دانې او د داتورې تخمونه ډېرځل د ماشومانو په

واسطه خوړل کيږي. د اتروپا وړې دانې اشته راوړونکې انځور لري او يو په زړه پورې خفيفاً خوړ خوند لري. په ماشومانو کې صرف ۲ يا ۳ وړې دانې وژونکې دي، په داسې حال کې چې په لويانو کې وژونکې ډوز د ۲۰ دانو په شاوخوا کې دی. د Solanaceae په نباتاتو سميت هم تر ډېره د نباتي نسخو د لوړ ډوز له کبله رامینځ ته کيږي.




د اتروپا د وړو دانو او يا د اتروپين د نورو منابعو د مصرف څخه وروسته، د سميت اعراض د خولې او ستونې له وچېدو، د مخ د سور کيدلو او د حديقې د لوښېدو سره پيلېږي. د مرکزي تنبھاتو اعراض لږ څه وروسته پيلېږي. مريض بيدار خوشحال او محرک معلومېږي. تر ډېره په مسموم کې خيالي او عشقي حرکات تر سترگو کيږي. نوموړي حالات وروسته بيا اضطراب او غصې ته اوږي. نبض تيز او ضعيف او تنفس غېږلونکی وي. په مرگونو حالاتو کې تنبهي اعراض په کراره له مينځه ځي او ژوره کوما رامینځ ته کيږي. په معمول ډول مړينه د تنفسي انحطاط له کبله پېښېږي.

د Solanaceae د کورنې د نباتاتو لکه Jimson weed ، black henbane او Mandarke خلاصې يا نچوړ په اروپا کې د مينځنيو پېړيو په دوران کې د يو ځانگړي ملهم په تيارولو کې د جادوگرانو په واسطه کارېده. نوموړی ملهم د جنسي غړو په مخاطي غشاء تطبيق کيده تر څو د يوه غبښتلي او عشقي حالت د

مینځ ته راتلو لامل شي. همدارنگه د Jimson وانبه د شمالي او لاتینې امریکا د ځایي خلکو له خوا وپیژندل شو. Awtec چې یو مکسکویي امپراطور وو دغه نبات ته یې عبادت کاوه او همدارنگه د مذهبي کلتور د ترویج او سزا لپاره یې کاراوه. اویو ځانگړې ډول کارونه یې په مقعد کې د تاو کړل شوو پانیو کېښوودل وو. د کلتوري موخو په څنګ کې د Solanaceae کورنۍ نباتات د خلکو د وژلو لپاره هم کاریدل.


پر سمپاتیتیک اعصابو اغېز لرونکي توکسينونه
د Ephedra distachia L.(joint fir) په نوم نبات، کوم چې په عمومي توګه د مدیترانه اي سیمو کې پیدا کیږي، د اپیدرين په نوم الکلوتید لري (شکل ۴۳) کوم چې د نارایی نفرین سره په عین ډول اغېزې لري. نوموړی مرکبات د آس لکۍ ته ورته بوټي یا Catha edulis(Vahl) Forsskal ex endl(Khat) کې هم شتون لري. نسبت د دوي تنبهي اغېزولرلو ته، په مینځني ختیځ او شمالي افریقا کې د Khat پانې ژوول کیږي. د اپیدرين فارمکولوژیکي تاثیر په محیطي عصبي سیستم کې د نارایی نفرین او په مرکزي عصبي سیستم کې د نارایی نفرین، سیروتونین او ډوپامین له آزادېدو څخه عبارت دی. دغه حالت، توجه او وړتیا ډېروي او سترې او لوړه کموي. په مزمن ډول د نوموړې مادې کارونه اعتیاد او تحمل (Tachyphylaxia) مینځ ته راوړي په لوړ ډوز سره د نوموړې دوا د خوړلو په پایله کې خوله کېدل، د حدې توسع، بې خبري، د ادار احتباس او قبضیت رامینځ ته کیږي. سمې ډوز یې د اختلاجاتو، شاک او تنفسي انحطاط لامل ګرځي.



آفدرين

شکل ۴۳: آفدرين؛ *Ephedra distachya* L او *Ephedra vulgaris* او صنوبر اساسي فعاله ماده


نور نباتي مرکبونه چې پر سمپاتيتيک اعصابو اغېز لري د Indol د الکلوئيډونو څخه عبارت دي چې *Rauvolfia serpentine*(L) Benth ex Kurz (serpentine wood) په نبات کې شتون لري. ترټولو مهم مشتق يې له ريزرپين (شکل ۴۴) څخه عبارت دی. دغه مرکب د سمپاتيتيک اعصابو په سرونو کې ويزيکلونو ته د نارايي نفرين له دوباره جذب څخه مخنيوی کوي، کوم چې تدريجاً له مينځه ځي. په سمپاتيتيک عکس العمل کې د کموالي د اغېز څخه د لوړ فشار په درملنه کې کار اخيستل شوی ده. د مرکزي اعراضو لکه آرام او انحطاط د لرلو له کبله نوموړي مرکبات د سنتيتيک مرکباتو په وسيله تعويض شول. سمې ډوز يې د برادې کارډيا، د زړه د بې نظمي او په پايله کې د زړه د حرکاتو د توقف لامل گرځي.




ريزرپين

شکل ۴۴: ریزرپین؛ د *Rauwolfia serpentina* (L) ترټولو مهم داندول الکلوئیدونه

له نباتاتو څخه مشتق شوي مرکبات چې د سپازم ضد اغېزې لري د پاپاورين او نارکوتين، چې دواړه په کوکنار يا *Papaver somniferum* L. کې شتون لري او *Khellin* چې د *Visnaga daucoides* Gaertn يا *Ammi visnaga* (toothpickweed) يو مرکب دی، څخه عبارت دي (شکل ۴۵). دغه مرکبات چې د بنويو عضلو په حجرو کې د کلسيم د جريان د نهي کوونکي په څېر عمل کوي، په فارمسيوټيکي ډول د مختلفو بنويو عضلو لرونکو غړو د تشنج په درملنه کې کارېږي. لوړه دوز يې د وينې فشار کموي او د زړه د فلج لامل گرځي.




په مخطط عضلو اغېز لرونکي نباتي توکسينونه دغه توکسينونه په دوو گروپونو ویشل شوي دي چې يو يې د فلج او بل گروپ يې د اختلاجاتو لامل گرځي. د فلج کوونکو مرکباتو په مينځ کې کورار (Curare) قرار لري، کوم چې په پورته ختونکي قطبي بوټي Chondrodendron tomentosum کې شتون لري. بنسټيز مرکبات يې لکه (+)-tubocurarin او C-toxiferin (شکل ۴۶) په عصبي-عضلي نهاياتو کې د استايل کولين د اخذو د نهې لامل گرځي. د جنوبي امريکا په ځنگلونو کې شته هندوان، د ښکار لپاره غشي د نوموړي نبات د خلاصې په واسطه مشبوع کوي. کله چې نوموړی توکسين د وينې جريان ته ننوزي تقريباً ډېر زر مسموم فلج کيږي. دواړه توکسينونه ډېر غښتلي دي. په موږکانو کې د توبوکورارين LD_{۵۰} له ۱۳۰ μg/kg او د C-toxiferin لپاره صرف ۲۳ μg/kg څخه عبارت ده. لکه د امونيم د څلور قيمته مالگو په څېر، د خولې له لارې د خوړلو وروسته نه جذبېږي.



شکل ۴۲: توبوکورارین او C-toxiferin I د کورارونو بنسټیز سمی مواد


نوځکه C-توکسیفرین ۱ (+)-توبوکورارین کلوراید کانډروکورارینیوم کلوراید وي، ترڅو چې د معدي معیبي سیوب اړیږي. څخه د خوړلو وړ دي. که چېرې نوموړي توکسینونه په کافي مقدار دوراني سیستم ته لار پیدا کړي، په بیره د ټولو خط لرونکو عضلاتو د فلج لامل ګرځي. په حجاب جاجز کې د تقلص د نه کېدو له امله ساه بندي یا اختناق مینځ ته راځي. په جراحي کې د tubocurarin کارونه ځکه منع شول چې د هسټامین د ازادیدلو لامل ګرځیده او په تصادفي ډول یې انافلاکتیک غبرګونونو رامینځ ته کول. بل مرکب چې فلج کوونکې اغیزې لري Coniin (شکل ۴۷) دی، کوم چې په Aethusa cynapium او Conium maculatum L. (Poison hemlock) کې شتون لري. دغه مفره مرکب د نباتاتو په ټولو برخو کې ویشل شوی دی. د hemlock یا شوکران د بوټي په تخم کې یې غلظت تر ۵.۳٪ پورې رسېږي. په ډېرو حالاتو کې د موږک ادرار ته د Coniin د ورته بوي د لرلو له کبله انسان د نوموړي له خوړلو څخه ډډه کوي. په هغو حیواناتو کې چې پوستکی یې غوړ وي، سمیت یې زیات دی. پخوانیو یونانیانو د hemlock د زهر خلاصه

د انسانانو د محاکمه کولو لپاره کاروله ترټولو مهمه پېښه په ۳۹۹ میلادي کال د سقراط محکمه کول دي، چې دقیقاً د هغه د ملګري Plato په واسطه رپور ورکړل شوی ده. د بالغ انسان لپاره یې وژونکی ډوز، نږدې ۵۰۰ ملي ګرامه دی. نوموړی مرکب د معدې معایي تیوب له لارې او همدارنګه د پوستکي له لارې په اسانۍ سره جذبېږي. د سمې ډوزونو د اخیستلو څخه وروسته، د سمیت اعراض د لنډمهاله تنبهاو سره پیلېږي او د فلج په واسطه چې له ښکته غړیو څخه شروع او په کراره تر سر پورې ادامه مومي، تعقیبېږي. کله چې فلج حجاب عاجز ته رسیږي، د خفقان (سفوکیشن) له کبله د مړینې لامل ګرځي. په دې دلیل چې بیداروالی او هوش تر اغیزې لاندې نه راځي نو ځکه مسموم د سمیت ټولې مرحلي تر پایه تجربه کوي. په حیواناتو کې Coniin له ځان څخه تر اتوجنیک اغیزې ښیي.



اختلاج تولیدوونکي مرکبات په دوه ګروپونو چې لمړی یې پر میډولا او دویم یې پر شوکي نخاع اغېز لري وېشل شوي دي. په مرکزي ډول اغېز لرونکو مرکباتو


په مینځ کې پیکروتوکسین (Picrotoxin) ځای لري، کوم چې په پورته ختونکي اسیایي نبات یعنې *Anamirta cocculus* کې شتون لري. Picrotoxin د دوه برخو یعنې، Picrotoxinin سمې او Picrotin غیرسمې مرکباتو له مخلوط څخه عبارت دی (شکل ۴۸). له دې کبله چې د نوموړي مرکب په وړاندې بحري حیوانات ډېر حساس دي، خلاصه یې د دغې منطقې د خلکو لخوا د ماهیانو د نېولو په موخه کارېدله. په طبي توګه Picrotoxin د رواني ناروغیو په درملنه کې کارېږي. له ۱۰ ملي ګرام څخه په کم ډوز سره محرک الوعایي او تنفسي مرکزونو هڅوي. دغه اغیزې د تنفسي انحطاط د درملنې په توګه کارېږي. سمې ډوز یې مړې ته ورته اختلاجات رامینځ ته کوي. په موږکانو کې یې د وړیدي لارې LD_{۵۰} له ۴mg/kg څخه عبارت ده.




Cicuta virosa L. (Mackenzie's water hemlock) یا د اوبو شوکران، یو له سمې بوټو څخه ده چې د معتدله سیمو په خټینو برخو کې زرغونېږي. د نوموړي نبات پیاز د کرفس پیاز ته ورته دی او د روښانه ژېړ-نارنجي شیرې چې په سوریو کې موقعیت لري، لرونکی دی. ټول نبات او په ځانګړې ډول پیاز سمې Polyinol cicutoxin (شکل ۴۹) لري. په عمومي توګه سمیت تر ډېره په ماشومانو کې پېښېږي، څوک چې یې په غلطۍ سره پیاز خوري. پخوا نوموړی نبات د ځان وژنې

او بل وژنې په موخه هم کارېدلی ده. د Picrotoxin په څېر cicutoxin هم په میډولا یا بصله کې د تنبیه یا هڅونې لامل ګرځي. د Cicuta په پیاز کې یو ځل نینس وهل، کیدلای شي چې د چیچونکي لپاره مرګونی ثابت شي. د سمیت اعراض یې له یو سخت تکلیف او عذاب څخه عبارت دي. هر ۱۰ تر ۲۰ دقیقو وروسته مړې ته ورته دردناک او غبستلی اختلاج څرګندیږي او د عمومي سترتیا لامل ګرځي (ATP کمښت مومي). مرګ د تنفسي او یا قلبي توقف په پایله کې رامینځ ته کیږي.


سمی پولي اینول Oenanthotoxin (شکل ۴۹) په *Oenanthe crocata* L. کې شتون لري. د نوموړي بوټي پیاز پاستینک ته ورته په زړه پورې بوی لري. د وریدي لارې یې په موږګانو کې LD_{۵۰} له یو ملي ګرام فی کلوګرام وزن بدن څخه کم دی. *Aethusa cynapium* L. د فلج کوونکي توکسين یعنې کوئین سره یو ځای د Ethusin په نوم غیرمشبوع الیفاتیک هایډروکاربن لري (شکل ۴۹). ځینې وخت سمیت په غلطی سره د شوکران (*Petroselinum crispum*) په ځای د نوموړي نبات د خوړلو په پایله کې رامینځ ته کیږي. د سمیت اعراض په مخلوط کې د دوه توکسينونو په تناسب پورې اړه لري او کېدای شي چې یا فلج او یا هم اختلاج وي.



سیکوتوکسین



ایتوزین




اوینانتوتوکسین

شکل ۴۹: سمی پولی اینولونه. سیکوتوکسین (*Cicuta virosa* L.) ، اوینانتوتوکسین (*Oenanthe crocata* L.) ، ایتوزین (*Aethusa cynapium* L.) .

سترکنین او بروسین (شکل ۵۰) دوه اړونده توکسینونه دي چې په *Strychnus* *nux vomica* L. او *Strychnus ignatii* Berg کې شتون لري او په نخاع کې اغېز کوي. د Picrotoxin په څېر سترکنین هم د رواني منبه يا هڅوونکي په توګه کارېږي. په اساني سره د لاس رسي (ځکه چې پخوا د ژوونکو د له مينځه وړلو په موخه کارېده) او د غښتلي سميت (د لويانو لپاره يې وژونکي ډوز ۱۰۰ ملی ګرامه او د ماشومانو لپاره له ۱ څخه تر ۵ ملی ګرامه پورې دی) د لرلو په دليل، نوموړی توکسین اکثره د وژونکې مادې په څېر کارېده. سترکنین او بروسین په بعد ساينسې برخه کې نهې کونکي نيورونونه، نهې کوي، نوځکه له مرکزي عصبي سيستم څخه راغلی سياله نوره هم غښتلي کوي. په کم ډوز سره حسي ادراک رامینځ ته کېږي، په داسې حال کې چې له سمې ډوز څخه وروسته ټيټانوئيد

اختلاجات رامینځ ته کیږي. بیاځلي اختلاجات یا خو په خپل سر او یا هم د وړوکي شان هڅونې لکه شور، رڼا او یا لاس وروړلو سره پیلیدي. له همدې کبله په تیاره کوټه کې مسموم ځای په ځای کول د درملنې د اړینو برخو څخه شمېرل کیږي. مړینه د مرکزي محرک الوعایي او یا تنفسي سیستم د نهې په واسطه رامینځ ته کیږي.




Hypnotic یا Psychotropic اغېز لرونکي مرکبات

Hypnotic (خوب تولیدوونکي یا منوم)

د ترياک (Papaver somniferum) د دانو د چاودلو کپسولونو ټينگه شيره، چې د اپيوم په نوم پيژندل کيږي د ۲۰ په شاوخوا کې د فينانترين او يا هم د ايزوکينولين نوع الکلوئيدونه لري. دسپازم ضد اغېز لرونکي د ايزوکينولين مشتقات لکه پاپاورين او نارکوتين مخکې تر بحث لاندې ونيول شول. د اپيوم د فينانترين د مشتقاتو استازي له مورفين، کوډين او تيبائين څخه عبارت دي، چې د منوم، د درد ضد او رواني اغيزو لرونکي دي (شکل ۵۱). په ځانگړي ډول وروستنی اغيزه (رواني) د زړونو کلونو راپدې خوا په اپيوم باندې د خلکو د اخته کېدو لامل گڼل کيږي. د سوماريانو په واسطه د اپيوم دکارونې تاريخ ۴۰۰۰ کاله راپور ورکول شوی ده، چې بيا وروسته د پخوانيو مصريانو، يونانيانو او رومانيانو له خوا کارول شوی ده. Paracelsus چې د ۱۴۹۳ او ۱۵۴۱ ميلادي کلونو ترمنځ يې ژوند کاوه، اپيوم يې د Laudanum په نوم ونوماوه او د

مختلفو طبي موخو لپاره يې وکاراوه. په نولسمه پېړۍ کې اپيومو، په ځانګړي ډول د شاعرانو په مينځ کې د يو فيشنې درملو په شکل پرمختګ وکړ. داپيوم کاروونکو په لست کې Friedrich Schlegel , Novalis, E.T.A Haffman او Edgar Poe , Charles Beaudelair شامل دي.




په عصري طبابت کې مورفين د يوه اغېزمن مرکزي انلجزيک په څېر، په داسې حال کې چې کوډيين د توخي ضد درملو په څېر کارول کېږي. مورفين او مشتقات يې د اوپيوئيد (اندورپين) اخذو د اګونست په توګه عمل کوي، کوم چې د داخلي انلجزيک سيستم پورې اړه لري. په اوږدمهال ډول يې کارونه د تحمل او اعتياد د مينځ ته راتلو لامل ګرځي. په پراخه کچه د مخدره موادو په شکل د سوء استفادې او په ځانګړي ډول د مورفين د نيمه سنتيتيک انالوګ، هيروئين د شتون له کبله د اپيوم د الکلويډونو سميت کم ندی (شکل). د مورفين په ماليکول کې د

هایدروکسیل د دوه گروپونو سره د استایلیشن په نتیجه کې، په شحمو کې انحلالیت ډېرېږي. په همدې دلیل د مورفین په پرتله هیروئین ډېر په چټکۍ سره مرکزي عصبي سیستم ته لارمومي او سایکوتروپیک اغیزې یې ډېرې څرگندېږي. د اپیوم الکلوئیدونه په اسانۍ سره له پلاستنا څخه تېرېږي او په زیږول شوو ماشومانو کې د اعتیاد او تحمل لامل ګرځي. همدارنګه نوموړي مرکبات په شیدو کې هم اطراح کېږي. که څه هم د لاروښانه نده چې آیا دغه ډوز پر شیدې خوړونکي ماشوم باندې اغیزلپاره کافی دی. د اپیوم د الکلوئیدونو د سمیت اعراض د خولي له لارې د اخیستلو څخه ۳۰ یا ۲۰ دقیقې او په زرقي ډول د سمې ډوز د اخیستلو څخه وروسته په بیرې څرګندېږي. دغه اعراض له سرګرځېدنې، خوب آلوده ګي، عمومي آرامتیا او په تنفسي انحطاط کې د ډېروالي څخه عبارت دي. د تشخیص لپاره د دریو اعراضو یعنې د حدقې کوچنۍ کیدل، تنفسي انحطاط او د شعور له لاسه تلل یو ځای کول مهم دي. د حدقې تقبض اعظمي (Pin point pupil) یا دسجاق دسریه اندازه دی، او که چیرې اسفکسیا رامینځ ته شوه دوباره له مینځه ځي. د کولمو او مثاني مؤثره په غیرارادي ډول تقلص کوي. مرګ د تنفس د مرکزي توقف له کبله رامینځ ته کېږي.


سایکوتروپیک خاصیت لرونکي نباتي توکسينونه د خوشالۍ په مراسمو کې د سایکوتروپ اغیزلرونکو بوټو کارونه، نږدې د هر کلتور په تاریخ کې شتون لري. دغه دواګانې د شیطاني ارواحو او د مړود ارواحو سره د اړیکې نیولو لپاره کارېدل. د دغو دواګانو کارونه هېڅ وخت پای ته ونه رسیدله او ډېر عصري هیوادونه لا اوس هم د سایکوتروپ یا روانی دواګانو له سوء استفادې سره په مشکل اخته دي. که څه هم د ډېرو سایکوتروپ موادو تجارت او ملکیت منع کړل شوی دی، بیا هم هغه پیسې چې د دې موادو د غیرمجاز تجارت څخه لاسته راځي د هغه پیسو څخه چې په مجاز ډول د نورو دواګانو څخه لاسته راځي، ډېرې زیاتې دي.

د جنوبی امریکا په گرمواو لمدو لوړو سیمو او جاوا کې د Erythroxylum coca Lam په نوم بوټی شین کیږي. د نوموړي بوټي پاڼې له ۰,۷ څخه تر ۲,۵ سلنې پورې الکلویډونه لري، چې عموم یې له کوکائین (-)Cocaine او Cuskohegrin (شکل ۵۲) څخه عبارت دي. که څه هم له کیمیاوي لحاظه اتروپین ته ورته والی لري، لیکن کوکائین له پاراسمپاتولایتيک ځانگړتیاوو څخه خالي دی. دغه مرکب په اکسوني کڅوړو کې د نارایی نفرین له دوباره جذب څخه مخنیوی کوي، نو له همدې کبله ادرینرجیک خواص لري. کوکائین همدارنگه د کتکولامینونو تجزیه کوونکی انزایم یعنی Monoaminoxidase (MAO) هم نهی کوي. له غیرمعایي لارو په ځانگړي توگه د پوزې له لارې د سون کولو څخه وروسته د تحریک یا هڅونې، د دروغجنې خوشحالي او تجسم لامل گرځي. د خولې له لارې یې فعال ډوز ۵۰ ملی گرامه دی، په داسې حال کې چې د پوزې له لارې نسبتاً ډېر کم ډوز کافي دی. وژونکی ډوز یې په نارمل ډول له ۱ څخه تر ۲ گرامه پورې دی، که څه هم صرف له ۱۰۰ تر ۲۰۰ ملی گرامه ډوز څخه وروسته هم وژونکي حالتونه راپور ورکړل شوي دي. د وريدي لارې په موږکانو کې یې LD_{۵۰} له ۱۷,۵mg/kg څخه عبارت ده. د سمیت اعراض یې له روانې هڅیدنې، اختلاجونو، اوبالاخړه له تنفسي انحطاط څخه عبارت دي. په مخاطي غشاء او وروسته بیا د پوستکي لاندې زرق له لارې د تطبیق په پایله کې کوکائین انسټیټیک خاصیت لري. له دغه عمل څخه د ډېر وخت څخه راپدې خوا کار نه اخیستل کیږي، لیکن تر اوسه پورې په ساده طریقه د نوموړې دوا د تشخیص په توگه کار اخیستل کیږي، ځکه چې کوکائین په موضعي توگه د ژبې سره د تماس په پایله کې د بې حسي لامل گرځي.



کوکائین په لوړه کچه او په غیرقانوني ډول په لابراتوارونو کې تولیدیږي. دې مقصد ته درسیدو لپاره لمړې په هایدروکلوریک اسیدو کې د پانوله خلاصې څخه کار اخیستل کیږي. هایدروکلوریک اسیدوکلوتیدونه لاسته راځي، بیا له میتانول سره ایستریکېږي او بیا د بنزویل گروپ پرې نصب کیږي. په لوړه کچه کوکائین په کولمبیا، بولیویا او پیرو کې لاسته راځي، له کوم ځای څخه چې بیا په غیرقانوني ډول د اروپا او جنوبي امریکا تورو بازارونو ته انتقال مومي. کوکائین د تریاکو د الکلوتیدونو په څېر د اعتیاد لامل ګرځي. په مزمن ډول یې کارونه د فزیکي او ذهني تخریباتو لامل ګرځي. د باراداري پرمهال د کوکائین کارونه په پام وړ ډول د سوء تشکلاتو پېښې زیاتوي. د جنوبي امریکا هنديان د کوکا پانې له چوڼې اویاهم د هلوکو له ایرې سره ګډوي او بیا یې ژوي. په دې ډول یې الکلوتید هایدروکلوتیدونه لاسته راځي. اګونین له ځان څخه کافیین ته ورته هڅوونکې اغېزې ښيي او د لوږې احساس کموي، کوم چې د بې وسه خلکو لکه د جنوبي امریکا هندي نژادو لپاره مهم دی. د زرقي لارو په پرتله دکوکا ژوول د اعتیاد د مینځته راتلو لامل نه ګرځي.


دواگانو یعنې ماریجوانه (د بنځینه بوټوله وچوڅو کوڅخه) او چرسو (د بنځینه بوټو د پانیو او گلانو دنسوارۍ ریزین څخه لاسته راځي) د لاسته راوړنې لپاره کارول کیږي. د کښت عمومي سیمې یې له مینځني ختیځ، هندوستان او مکسیکو څخه عبارت دي. نوموړې سایکوتروپیک اغیزې د ۹،۱۰- Δ tetrahydrocannabinol (THC) (شکل ۵۳) مرکب په واسطه مینځ ته راځي. دغه مواد په پراخ ډول د ماری جوانه او یا چرسو د مخلوط په توګه په سګریتو او یا پایپ کې ځکول کیږي. د یو ګرام ماری جوانه او ۰،۳ ګرامه چرسو یو ډول له ۵ څخه تر ۲۰ ملی ګرامه THC لري کوم چې د یو لغزش لپاره ضروري ډوز دی. دغه مواد دخولې له لارې د جذب څخه وروسته هم اغېز لري که څه هم په معدي معایې تیوب کې د کم جذب له کبله په لوړ ډوز اخیستل یې ضروري دي. د دې موادو د تاثیر په پایله کې دروغجنه خوښي او خیالات رامینځ ته کیږي. لوړ ډوز یې په اوږدمهاله توګه د رواني ګډوډیو اود غیر قابل تصور غبرګونونو (وحشت احساساتو) لامل ګرځي. په داسې حال کې چې د اعتیاد مینځ ته راتلل یې د بحث وړ موضوع ده، اما د ماری جوانه کاروونکي ترډېره د غښتلو دواگانو لکه هیروئین او کوکائین په لوري ورګرځي.



د جنوبي او مرکزي امریکا هندوانو يو اغزي لرونکی نبات چې د Peyotl په نوم يې ياد او په ځينو کلتوري مراسمو کې کاراوه. د دې نبات سایکوتروپيک اغيزې د Mescaline په واسطه مينځ ته راځي (شکل ۵۴). د مسکالين د ساده کيمياوي جوړښت د لرلوله کبله نوموړی مرکب په لوړه کچه د ۱۹۷۰ کال په شاوخوا کې سنتيز کړل شو او د ډېر غښتلي LSD مرکب په عوض د هڅوونکي درو په توگه د Hippie غورځنگ پر مهال د Flower power خلکو لخوا وکارول شو. اغيزمن ډوز يې له ۲۰۰ څخه تر ۵۰۰ ملي گرامه پورې رسيږي. نن ورځ مسکالين د ډېر غښتلی مشتق ۲،۵-methoxy-۴-methylphenylethylamin يا DOM په واسطه په کامل ډول تعويض شوی دی. د مسکالين او DOM اغيزې په مرکزي Tryptamine آخډو باندې د LSD داغيزوسره پرتله کيږي. دغه اغيزې د ليدلو او اوريدلو د کچې د پراخېدو او په همدول د تماس د احساس د ډېرېدو لامل گرځي. حيواني تجارب ښيي چې مسکالين تراتوجنيک اغيزې لري. ورته اغراض د Psilocybine په واسطه هم لاسته راځي (شکل ۵۴)، کوم چې د *Psilocybe mexicana* Heims په نوم مرخيږي کې، کوم چې په مکسيکو کې شين کيږي، پيدا کيږي. د Psilocybine واحد ۱۰ ملي گرامه ډوز د مسکالين په پرتله ډېر غښتلی دی. د Psilocybine د فمي اخيستني څخه وروسته اعراض د مسکالين او LSD هغې ته ورته دي او تاثير يې هم پر مرکزي Tryptamine آخډو د اغېز له کبله دی. د مسکالين په ډول د Psilocybine په هکله هم داسې فکر کيږي چې په لابراتواري حيواناتو باندې تراتوجنيک اغيزې لري. نور د Tryptamine مشتقات د هغې ونې په دانو کې پيدا کيږي چې د Orinoco په سيند او د Trinidad په جزيره کې شنه کيږي. دغه ونه چې د بومي خلکو په واسطه د Yopo (Piptadenia Benth) peregrine (L.) په نوم پېژندل شوېده، د N,N-dimethyltryptamin (DMT) N-methyltryptamin, ۵-methoxy-N-

N,N-dimethyl-۵- methyltryptamin او


hydroxytryptamin(bufotenin) مرکبونه لري. هندوان نوموړې دانې میده کوي، له اېرو سره یې ګډوي او د پوزې له لارې یې تنفس کوي. د Rivea corymbosa L. Hall او Ipomoea tricolor Car په نوم دوه پیچي بوتې چې په مکسیکو کې زرغونېږي، دانې یې د لیزرچیک اسیدو اماید لري، کوم چې LSD ته ورته اما کمزورې اغېزې لري. اغېزمن دوز یې له ۲ څخه تر ۱۰ ملی ګرامه پورې دی. همدارنګه بومي خلکو دا خوښوله چې په کلتوري مراسمو کې یې وکاروي.




سایتوتوکسیک (حجره وژونکی) اغېز لرونکي نباتي سموم ځینې له نباتاتو څخه لاسته راغلي سایتوتوکسیک مرکبات لا تر مخه په دې چپټر کې تر بحث لاندې نیول شوي دي (د لکتین ریسین، ابرین او فازین). کولشیسین (شکل ۵۵) د Colchicum autumnale L.(autumn

(crocus) د حجرې د مایتوزس د نهې کیدونکې په خبر عمل کوي. دا یو ډېر قوي سم دی. د لویانو لپاره یې LD₅₀ شل ملی گرامه او د ماشومانو لپاره پنځه ملی گرامه ده. د نوموړې بوټي د خوړلو ۲-۶ ساعته وروسته یې لمړني اعراض پیلېږي، چې د معدي معایې تیوب د غښتلي خارشیت، کانگو او دستونو څخه عبارت دي. همدارنگه د کولشیسین د جذب وروسته یو پرمخ تللی فلج څرگندیږي. مرگ د دوه ورځنۍ اخفا څخه وروسته د تنفسي انحطاط له کبله رامینځ ته کیږي. د مسموم د بیداري حالت تر پایه دوام مومي. کولشیسین د حجروي تیوبولین سره تعامل کوي او د مایکروټیوبولونو د ډیپولیمیرایزیشن لامل ګرځي. مایتوزس یې د انا فاز په مرحلې کې نهې کیږي. له دغه خاصیت څخه د کرموزمونو د څیړنې لپاره د انساجو په کښت کې ګټه اخیستل کیږي.

په عین ډول اغیزې د وینکا الکلویډونه (شکل ۵۵) هم لري، کوم چې د *Catharantus roseus*(L.) G. Donc په نوم بوټي کې شتون لري. Vincristine او Vinblastine د سرطان په درملنه کې د کیموتراپيوتیک موادو په څېر کارول کیږي. دواړه مرکبات قوي سمې جانيې اعراض لري، چې عبارت له نیوروټوکسیکي عکس العملونو او کله کله نه راګرځیدونکې د نهایتو بې حسې څخه دي. نوموړې دواړه مرکبات د لکوپنیا لامل ګرځي، کوم چې تر ډېره د وینبلاستین د تطبیق له کبله څرګندیږي او په ډوز پورې اړه لري.



د مونوترپینونو په مینځ کې داسې مواد هم شتون لري چې قویاً سائیتوتوکسیک پوتنشل لري. ترتولو مهم یې له Thujon (شکل ۵۲) څخه عبارت دی، کوم چې د *Thuja occidentalis* L. (Eastern arborvitae) او د *Artemisia absinthium* L. (Absinth) په نوم بوتوکی شتون لري. په حاد تسمم کې یې د معدی معایې تیوب شدید خاربنت او همدارنگه د پښتورگو او ښې ویجاړتیا رامینځ ته کیږي. بالاخره د مرکزی عصبي سیستم فلج رامینځ ته کیږي. مزمن سمیت یې په نولسمه پیړۍ کې د مستیارې د الکولی مشروب له کبله بیخي عام وو چې د Fennel, vermouth او anise له پاسه یې براندې په نوم شرابو ته تقطیر کول. په دې حالاتو کې اعراض د مغز د تخریب څخه پیلیدي چې په پایله کې د رواني او فزیکي ګډوډیو لامل ګرځي. نن ورځ د نوموړي مشروب تولید او تجارت بند شوی دی.



د پوستکي تخريش کوونکي او الرژيک اغېز لرونکي نباتي توکسينونه د بوټو او يا بې د توليداتو له کبله د پوستکي خاښت او حساسيتي عکس العملونه عام دي او په دې هکله انديښنې ورځ په ورځ د طبعي ارايشي موادو او د پوستکي ساتونکو د توليداتو د کارونې د پراختيا له وجې په ډېرېدو دي. د پوستکي تخريش کوونکي بوټي په غير له دې څخه چې معافيتی سيستم په کې رول ولري، د التهاب د مينځ ته راتلو لامل گرځي. دغه عمل د بېلگې په ډول د ځينو امينونو لکه استايل کولين، هستامين او سيروتونين په واسطه هم ترسره کېږي، کوم چې د *Urtica dioica* په وينسته ډوله جوړښتونو کې شتون لري. د وينسته ډوله جوړښتونو سليکاني سرونه د پوستکي سره د تماس په نتيجه کې ماتېږي او نوک لرونکي جوړښتونه په پوستکي کې ځان ننه باسي. دغه امينونه د پوټيکي د سوروالي او خاښت لامل گرځي. که چېرې د پوستکي پراخه ساحه تماس وکړي کيدای شي چې شديده اعراض لکه وژونکی شاک او حتی د مړينې لامل وگرځي.

د ځينو *Euphorbiaceae* شيدې داسې مرکبات لري، کوم چې د خپلو داخلي ذخيرو لکه ماست حجرو څخه هستامين او نور فعاله عصبي امينونه آزادوي. کيماوي جوړښت يې له دای او يا ترای تريپنونو څخه مينځ ته راغلی دی. د دغو


مرکباتو په مینځ کې د Phorbol استر هم شتون لري، کوم چې د یو غښتلي تومور تولیدوونکي په توګه پیژندل کیږي. د بوټو څخه لاسته راغلي انزایمونه هم کولای شي چې د پوستکي د تخریش لامل وګرځي. بېلګې یې له پاپین څخه، کوم چې د Carica papaya L.(papaya) په نوم بوټي کې او Bromelain څخه کوم چې د Ananas comosus په نوم بوټي کې شتون لري، عبارت دي.

الرژیک توان لرونکي نباتات

له دغو بوټو سره تماس داسې حساسیتي عکس العمل رامینځته کوي، په کوم کې چې د T Lymphocytes حجرې هم برخه اخلي. د بوټو د الرژن سره د بیاخلې تماس په پایله کې لیمفوکالین او سایتوکینونه آزادېږي، چې د التهابي عکس العملونو او اکړیما د پېښو لامل ګڼل کیږي. تراوسه د ۱۰۰۰۰ په شاوخوا کې الرژیک توان لرونکي بوټي پېژندل شوي دي. دغه بوټي ترډېره د Asteraceae (پخوانی نوم Compositae) په کورنۍ کې قرار لري. د Anarcardiaceae د کورنۍ د بوټو نوعې د ځانګړې توجه وړ دي. ځینې نوعې یې لکه Rhus toxicodendrom L.(poison ivy) د موجوده ترټولو غښتلی الرژن تولیدوونکی بوټو په مینځ کې ځای لري.

اکثره وختونه د تماس په واسطه الرژي د بڼې د بوټو لکه Primula vulgaris Tulipa sylvestris L.(Tulip) ، Huds(English primrose) او Crysanthemum frutescens L.(marguerite) ، غذایي بوټو سره لکه Helianthus annus ، Humulus lupulus L. (Common hops) او L.(sunflower) او Cynara scolymus L.(globe artichoke) او ځینې طبي نباتاتو (جدول ۸) سره د تماس په پایله کې رامینځ ته کیږي. د نباتي نسخو د شهرت او د غیر قابل کنترول کاروني ډېرېدلو د طبي بوټو په وړاندې د الرژي د پېښو د رامینځ ته کېدو شونتیا زیاته کړې ده. یوه بېلګه یې Arnica montana L.(mountain arnica) ده. له نوموړي بوټي د غوټیو څخه

لاسته راغلی تنکچر په خارجی او داخلي ډول د ټولو ټیپونو لپاره کارول کیږي.
زهري مواد یې له سسکي ترپن لکتونونو څخه عبارت دي (شکل ۵۷).



د غلیظه خلاصې د خارجی کارونې په پایله کې شونې ده چې د پوستکي گردۍ تباکې رامینځ ته شي. داخلي کارونه یې د مخاطي غشاء د تخریش لامل گرځي. د سسکي ترپنو د جذب څخه وروسته سرخوږی، قلبي وعایي او تنفسي گډوډۍ رامینځ ته کیږي.

جدول ۸: د الرژنیک توان لرونکي طبی بوټي a	بوټی
قدرت	

غښتلی	Anthemis cotula L. (بدبویه)
غښتلی	Arnica Montana L. (غرنی ارنیکا)
متوسط	Cinnamomum zeylanicum (دسینامون ونه)
متوسط	Hedera helix L. (انگلیسی پیچک)
	کله کله
متوسط	Helianthus annuus L. (کاپرگل)
	کله کله
	Innula helenium L. (Elecampane inula) غښتلی
په اروپاکې لږ، په	Rhus toxicodendron L. (زهري پیچک) ډېر غښتلی
	متحده ایالاتو کې ډېر
	a (۱۹۸۸) Hausen پرنسټ


وژونکی پېښې بې هم راپور ورکول شوې دي. هغه ناروغان چې د ارنیکا سره بې حساسیت درلود د استراسی د کورنۍ د نورو غړو سره او په همدې ډول د نورو کورنیو د سسکۍ ترین لرونکي بوټو لکه Calophyllum ssp., laurel سره بې هم حساسیت درلود.

ترټولو غښتلی نباتي الرژن د Rhus toxicodendron L (poison ivy) په نوم د نبات شیدو ته ورته نچوړ څخه عبارت دی. صرف د پاڼو سره بې تماس کېدای شي چې د پوستکي د سخت سوروالي لامل وگرځي. د ۲۰ څخه تر ۸۰ سلنه پورې د جنوبي امریکا اوسیدونکي د نوموړي بوټي سره حساسیت لري. یوځل چې حساسیت کسب شو بیا چی نوموړې هومیوپاتیکی خلاصه شپږ ځله هم رقیقه کړی شي، بیا هم حساسیت ښيي. بنسټیز سمی او الرژنیک مواد بې Urushioles په نوم مرکبات پېژندل شوي دي. د کیمیاوي لحاظه نوموړي مواد د کتکول مشتقات دي او اړخیز الیفاتیکی زنځیر لري، او د یو بل سره د اوږدوالي او دوه ګونو رابطو د لرلو په اساس فرق لري.


فوتوتوکسیک مرکبات لرونکي بوټي

ځينې بوتي داسې مرکبات لري چې له تماس او يا خوړلو وروسته د پوستکي التهابات رامینځ ته کوي. اعراض يې هغه وخت پيلېږي چې شخص د لمر د ماوراء بنفش وړانگو سره مخامخ شي. ډېر فوتوتوکسیک مرکبونه د فورو کومارين (شکل ۵۸) گروپ پورې اړه لري. په اروپا کې تر ډېره د پوستکي نوري التهابونه د *Heracleum mantegazzianum* Somm. Et Lev(giant hogweed) او *Heracleum sphondylium* L. له کبله رامینځ ته کېږي. کله چې نوموړي بوتي ټپي کړل شي، سپینې شیدې ترې بهیږي کوم چې د فورو کومارينونو مخلوط لري. نوموړي مرکبونه د پوستکي سره د تماس څخه وروسته دنور د ۳۱۰ څخه تر ۳۲۰ نانومتره د موج اوږدوالی کې فعالېږي او ځينې وختونه د غښتلي خارش او د پوستکي د تڼاکي لرونکي التهاب لامل گرځي. بياجوړېدل کيدای شي چې څو هفتې ونیسي.

نور فوتوتوکسیک خاصیت لرونکي بوتي عبارت له *Ruta graveolens* L.(common rue)، *Archangelica officinalis*(Monech) Hoffm، *Peucedanum*، *Angelica archangelica*(Norwegian angelica)، *Pastinaca sativa*، *osthruthium*(L.) W.D.J.Koch(masterwort)، *Dictamnus albus* L.(gas plant) څخه دي. هغه بوتي چې د انټراکینونو اړونده فوتوتوکسیک مرکبونه لري عبارت له *Fagopyrum* او *Hypericum perforatum* L.(St.johns wort) *esculentum* Monech(buck wheat) څخه دي. لمړنی يې يو طبي بوتي ده چې په عمومي توگه د مینځني اراموونکي او دویم يې د غذايي بوتي په ډول کارول کېږي. فوتودرماتوزس د هايپريکوم د داخلي کارونې او بيا د لمر د وړانگو سره د تماس په پايله کې رامینځ ته کېږي. په کورنيو ژوو لکه آس کې د دغه بوټو په ځانگړي ډول د *St.johns wort* د خوړلو له کبله د فوتوتوکسیسیتی وژونکي پېښې هم لیدل شوې دي.




فیوروکومارین




فوتوتوکسیک انتراکینونونه

زانئونوکسین
برکلپتین
امپراتورین



فاکوپایرین
هایپریسین




شکل ۵۸: له بوتو څخه راغلي مرکبات چې فوتوتوکسیک خواص لري.

سرطان تولیدوونکي او تومورمخته وړونکي نباتي مرکبونه د پام وړ سلنه پیژندل شوي سرطان تولیدوونکي له طبیعي منابعو څخه دي. ډېر یې د فنجیانو په واسطه، لیکن ځینې یې د نباتاتو په واسطه سنتز کېږي. تقریباً هیڅ سرطان تولیدوونکی هم د ژوو په واسطه نه تولیدېږي. طبیعي سرطان تولیدوونکي د انساني سرطان یومهم لامل ګڼل کېږي او شونې ده چې د تکاملي سرطان د تولیدوونکو څخه یې هم اهمیت تجاوز وکړي. د سرطان تولیدولو پېښې په ځانګړې نباتي کورنۍ په مرکبونو پورې اړه نلري او په ډېرو لمړنیو بوټو لکه Pteridophytes (ferns) څخه نېولې تر ډېرو پرمخ تللیو جنوسپرمونو (Cycas palms) او تر ډېرو زیاتو پرمخ تللیو انجیوسپرمونو (Senecio spp) پورې نباتاتو کې خپاره شويدي. له نباتاتو څخه لاسته راغلي سرطان تولیدوونکي د کیمیاوي جوړښت پر بنسټ په خپل مینځ کې سره تفاوت لري. په نهم جدول کې د ډېرو مهمو سرطان تولیدوونکو یوه سرسري مطالعه ښودل شوې ده. د Braken fern یا Pteridium aquilinum L. kuhn د هغو اولیو بوټو چې سرطاني اغیزې لري ترټولو مهم نماینده دی. نوموړی بوټی په هر ډول اقلیم او د

نړې په مینځني قطبي سیمو کې شتون لري او په پام وړ ډول د کورنیو ژوو د له مینځه تلو مسؤل ګڼل کیږي. اکثره غواګانې او پسونده د نوموړي بوټي د خوړلو په نتیجه کې یا د حاد سمیت له کبله او یا هم په مری او کولمو کې د تومورونو د مینځ ته راتلو له کبله مري. په جاپان کې د حیواناتو د غذايي منبع په توګه د Braken fern د کارونې او مری د سرطان ترمینځ اړیکه ثابت شوې ده. سرطان تولیدوونکی خاصیت یې په aqualide A پورې اړه لري (شکل ۵۹). نوموړی مرکب په بکترياوو کې میوتا جنیک او په مږو کې سرطان تولیدوونکی دی. د Cycas , Zamia , Macrozamia ,Bowenia ,Enzepaloartos او Stangeria د کورنیو مېوه لرونکي یا Cycad بوټي د نړۍ په ټولو حاره او نیمه حاره سیمو کې پیدا کیږي. په افریقا، آسیا او مرکزي امریکا کې د نوموړو بوټو مختلفې برخې د خوړو او درملو په جوړولو کې کارېږي. سرطان تولیدوونکی خاصیت یې د Cycasin یا methylazoxymethanol- β -D-gucoside پورې اړه لري، کوم چې د Cycas په ځینو انواعو (Cycas revolute Tunb او Cycas cirinalis L.) کې شتون لري او د غذايي بوټو په څېر کارېږي. Methylazoxymethanol چې یو نهایي سرطان تولیدوونکی دی د قنډي رابطې له ماتېدو وروسته مینځ ته راځي. دغه مرکب له DNA سره اشتراکي رابطه ټینګوي او د اوږدمهال لپاره یې د خولې له لارې اخیستل په لابراتواري ژوو کې میوتیشن رامینځ ته کوي. تومورونه په یڼه، گردو او کولمو کې مینځ ته راځي. د Betel یا تنبول په نوم د یو ترېخ بوټي ژوول په مالیزیا، نوې ګاینیا، ختیځه افریقا او مدغاسکر کې ډېر مشهور دي. د دغه بوټي د ژوونکو شمېره تر څلور سوه پنځوس میلیونه تنو رسیږي. د دغه شخوند مواد د Areca catechu L. د وچې میوې، شنو پانو او چونې یا کلسیم هایډروکسایدو څخه عبارت دي. خوند یا ذایقه یې د تنباکو او مسالو په زیاتولو سره نوره هم مشخص کیږي. د Betel ژوونکو خلکو کې په فوق العاده ډول د مری او ستوني د سرطان پېښې ترسترګو کیږي. ډېر احتمال شته چې نوموړی عمل د Arecoline د الکلوتید په واسطه رامینځ ته شي (شکل ۵۹)، دغه مرکب په پاراسمپاتیټیک اعصابو اغېز لري.

تینون نه هم کېدای شي چې د نوموړي بوټي په سرطان تولیدوونکو اغیزو کې رول ولري.



د Alkylbenzene مشتقات لکه سفرول، ایزو سفرول، استراګول او بیتا اسارون په ډېرو داسې بوټو کې شتون لري چې د خوړو او یا هم د خوړو د اډي فوربول ول کارېږي. د دو اکولید A، پ کرفس، ریحان، ساسافراس، خطمي، گاڅري، کېلې، تورمرچ او تخمر شوي تنباکو ځای لري. په ځانګړي ډول په لوړ غلظت سفرول د ساسافراس په تیلو کې هغه وخت و موندل شول چې د

ساسافراس د ونې (Sassafras albidum(nutt) Nees) پوټکی او لرگی د تقطیر د عملیې لاندې ونېول شو. خوړو او مشروباتو ته لکه د رینسوییر او د اېسنتین شرابو ته د سفرول او بیتا اسارون ور علاوه کول نن ورځ منع کړل شويدي. حیواني تجربې ښيي چې یڼه د Alkylbenzene د سرطاني اغېز بنسټیزه موخه ده.

جدول ۹ سرطان تولیدوونکي نباتي مرکبونه (a)				
مرکب	بوټی	نوع	دهد لاندې غړی	سرچینه
Allylthiocyanate	Brassica ssp	موږک	معدة او پوستکی	خردل، کرم، سرخس
Aquilid A	Pteridium aquilinum	مږه	سینه، کولمې او مثانه	Braken fern
Arecoline	Areca catechu	موږک	یڼه، سږي او معده	فوفل
Aristolochic acid	Aristolochia clematitis	مږه	کولمې، پښتورگي، مثانه	دروگ
β - Asaron	Acorus calamus	مږه	کولمې	دروگ او خوند ورکوونکی مواد
Asiaticosid	Centella asiatica	موږک	پوستکی	خارجی ټپونه
Benzylacetat	Jasminum ssp	موږک	معدة او یڼه	عطر او یاسمین چای
Capsaicin	Capsicum ssp	موږک	کولمې	تورمرچ، سورمرچ
Crotonoil	Croton tiglium	موږک	پوستکی	له بوټی سره

تماس				
غذایی اډيتيو ، خوشبو کونکي ، دروگ	دصفرا تيوب	مړه	Dipteryx odorata	Coumarin
			Asperula odorata	
			Cinammonum cassia	
			Lavendula officinalis	
دسيکاس غوټي ، نشايسنه او دروگ	ينه ، پښتورگي ، کولمې ، سړي ، سينه ، ماغزه ، خصيې	مړه	Cycas ssp , zamia ssp	Cycasin
	ينه ، پښتورگي ، سړي ، دهلوکي مغز	موږک		
		کاوبای		
خوشبو کوونکي او ذايقه ورکوونکي عاملين	ينه	موږک	Artemesia darculuncus	Estragole
			Ocimum basilicum	
			Foeniculum vulgare	
دکاتڼ دتخم تيل	پوستکي	موږک	Gossypium hirsutum	Gossypol
خوشبو کوونکي او ذايقه ورکوونکي عاملين	ينه ، مړي	مړه	Cananga odorata	Isosafrole
دستروس تېل	پوستکي	موږک	Citrus ssp	Limonene

سبزی، انحر، دروغ او ارایشی مواد	پوستکی	موږک	Umbiferaceae	Psoralene
			Rutaceae	
			Leguminoseae	
			Moraceae	
			Orchadaceae	
ژلاتینی مواد	موضعی سارکوما	مږه	Sorbus aucuparia	(+)Parasorbinic acid
د پیرولیزیدین الکلوئیدونه				
	ینه	مږه	Ligulaira dentate	Clivorine
دروغ	څوگوني غږي	مږه	Heliotropium ssp	Dehydroheliotridine
دروغ او غذا	پوستکی	موږک	Crotalaria ssp	Dehydromonocrotalin
دروغ او غذا	عضلې	مږه	Senecio ssp	Dehydroretrenecine
دروغ	پانقراض، ینه، مثانه ، خصیې	مږه	Heliotropium ssp	Heliotrine
دروغ او غذا	ماغزه	مږه	Tussilago farfara	Hydroxysenkirkine
دروغ او غذا	ینه	مږه	Heliotropium ssp	Lasiocarpine
دروغ او غذا	پوستکی، دهلوی مغلز		Symphytum ssp	
دروغ او غذا	ینه	مږه	Petasites japonicas	Petastenine
دروغ او غذا	ینه	مږه	Senecio ssp	Isatidine
دروغ او غذا	ینه	چرگوپی	Senecio ssp	jacobine
دروغ او غذا	پانقراض	مږه	Amsinckia intermedia	Lycoposamine
دروغ او غذا	ینه، سږي، پانقراض	مږه	Crotalaria ssp	Monocrotaline
دروغ	نخامیه او نخاع	مږه	Senecio ssp	Retronecine
دروغ او غذا	ینه	مږه	Senecio ssp	Retrorsine

	، پښتورگي ، سړي			
دروگ او غذا	ينه	مړه	Senecio ssp	Riddeline
دروگ	ينه	مړه	Tussilago farfara	Senkirkine
دروگ او غذا	ينه ، پښتورگي ، سړي	مړه	Symphytum officinale	Symphytine
دروگ	ينه ، ادرنال ، ددهوکی مغز	مړه	Rauvolfia serpentine	Reserpine
حشره وژونکي او پستيسيدونه	سینه د تایروید او پاراتایروئید غدي	مړه	Derris ssp	Rotenone
			Tephrosia ssp	
			Lonchocarpus ssp	
معطر شراب د زعفران چای او تورمرچ	ينه ينه ، سړي	مړه موږک	Sassafras albidum	Safrole
			Illicium anisatum	
			Myristica frafrans	
			Cinammonum ssp	
د جوزونه				
دروگ ، غذایی تیل	مثانه	مړه	Argemone Mexicana	Sanguinarine
شین بوټی	معدده ، دهلوکي مغز	موږک	Unmerous planst	Shikimic acid
د کاتین د زړو تیل	ينه	ماهي	Sterculia foetida	Sterculic acid
			Hibiscus syriacus	
چای ، سره شراب ، میوه ، سبزي ، خرمن ، صنعت	ينه	مړه	Cammellia sinensis	Tannines
	ينه ، مثانه	موږک	Acacia mollissima	
			Hammamelis	
			Virginiana	
			Pteridium	

			Aquilinum , Areca catechu	
دروگ ، فنجی وژونکي ، منسوجات ، کاغذ ، دعکسونو صنعت ، ارایشی مواد	ینه ، تایروئید غده تایروئید غده ینه	مړه موږک ماهي	Laburnum ssp	Thioureas
(a) د (۱۹۸۷) Lai und Woo په اساس				

تینونه، چې پولي فینولیک مخلوطونه دي په یوشمېر خوړو او مشروباتو کې شتون لري. لوړ غلظت یې په سرو شرابو، تورچای او ځینو ځانګړیو چایونو (Illex paraguariensis A. St. Hil)، کاکاو (Theobroma cacao) او Khat یا Catha edulis (Vahl) Forsskal ex Endi کې موندل کېږي. یو شمېر اپیدیميولوژیکي څېړنې د تین د مصرف او دینې او مری د سرطان ترمینځ اړیکه ښيي. دینې سرطانونه په هغه هیوادونو کې چې سره شراب کاروي (فرانسه، یونان او ایټالیا) نسبت هغه هیوادونو ته چې سپین شراب کاروي (جرمني) په عمده ډول زیات دي. د برازیل په کابایانو کې د مری د سرطان پېښې بیخي ډېرې لیدل کېږي. د Illex paraguariensis A. St. Hil د پانو څخه تیارشوی ځانګړي جنسي تحریکونکي چای، چې له تینو څخه غني او د mate په نوم پیژندل کېږي، د کارونې او د مری د سرطان ترمینځ غښتلی احتمال شتون لري. د ختیځې افریقا په هغه هیوادونو کې چې د Khat ژوول په کې عام دي، په لوړه کچه د مری د سرطان پېښې تر سترګو کېږي. د تینونو سرطان تولیدوونکی خاصیت په مړو کې هم څرګند دی.

بله پولي فینول ماده چې سرطاني ځانګړتیا لري د Gossypol (شکل ۵۹) څخه عبارت ده، د کتان د دانو په تېلو کې شتون لري او په ځینو هیوادونو (لکه مصر) کې د پخلي لپاره کارول کېږي. Gossypol د ۱۰mg/day یا په ورځ کې لس ملي

گرامه ډوز سره د سپرماتو جنیزس د عملیې نهې کوونکې خاصیت لري. په چین کې د لس زرو په شاوخوا کې سړي په تجربوي ډول د دغې مادې د بارداری ضد اغېز د لرلو په اساس تداوي شول. د Gossypol په هکله داسې ښوودل شوې ده چې د موزک په پوستکي کې د یو غښتلي تومور مخته وړونکي رول لري.

ځینې طبي بوټي، د بېلګې په ډول د پیرولیزیډین د الکلوتید لرونکي بوټي لکه Petasites hydrides ، Tussilago farfara L.(coltsfoot) Symphytum officinale L.(common ، L.(Pestilence wort) comfrey) او د Senecio نوعې (rag wort) سرطان تولیدوونکي مرکبونه لري. نوموړي مرکبونه په بڼه کې د پایرول په سمې مشتقاتو بدلېږي، کوم چې د ښې د حجرو له DNA سره اشتراکي اړیکې ټینګوي (شکل ۳۸). د پیرولیزیډین د الکلوتیدونو لکه Senekirine, Hydroxysenekirine ، seneconine ، Lasiocarpine ، monocrotaline ، dehydromonocrotaline, retrorsine, retronecine ، isatidine ، riddeline ، lycopsamine ، intermedine او Seneciphylline په بڼه باندې سرطان

تولیدوونکې اغېز په څو حیواني مطالعو کې څرګند شوی دی.

یو بل سرطان تولیدوونکې نایتروجن لرونکې مرکب چې نباتي منشا لري Aristolochic acid (شکل ۵۹) دی، کوم چې د Aristolochia clematitis L.(birthwort) په نوم بوټي کې، چې له پخوانه په سنتي ډول کارېږي شتون لري. نوموړي مرکب داسې ښوودلې ده چې په مېو کې له DNA سره اړیکه ټینګوي او د معدې د تومور د مینځ ته راتلو لامل ګرځي. په ډېرو هیوادونو کې له birthwort څخه د درملو جوړول منع کړل شوي دي، په داسې حال کې چې نور سرطان تولید کوونکي مواد لرونکي بوټي لاتراوسه کارول کېږي د دوی په مینځ کې د پیرولیزیډین الکلوتید لرونکي او انتراکینونو لرونکي بوټي ځای لري.

فوربولسترونه Phorbolsters (شکل ۵۹) په ډېر غښتلي تومور مخته وړونکو ګروپ پورې اړه لري چې تر اوسه پیژندل شوي دي. دغه مواد د Euphorbiaceae کورنۍ او په ځانګړي ډول د Croton tiglium L.(purging croton) د نبات په زړو کې موندل کېږي. د کروټون د تیلو خوړل د معدي معایي

سیستم د مخاط د تخریش لامل گرځي او په پایله کې کانګې او د ستونې رامینځ ته کیږي. په همدې ډول د کروتیون د تیلو سره جلدې تماس هم خاړښت رامینځ ته کوي. د کروتیون څلور زړې کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل شي. التهابي عکس العمل د پروستاگلانډین او ډاکسیجن د فعالې نوعې په واسطه مخ ته وړل کیږي، کوم چې په قوي احتمال سره د کروتیون د تیلو د تومور تولیدوونکي خاصیت مسؤل ګڼل کیږي.

دریم فصل

خواړه

د مرکباتو مربوطه اړخونه

پېژندنه

په لومړي نظر کې د Food toxicology اصطلاح د اصولو له مخې تناقض لري. ځکه چې خواړه د مغذي موادو په معنی دي او باید په هېڅ ډول شرایطو کې سمې نه وي. ولې داهم حقیقت ده چې په ځینو حالاتو کې د خوړو مصرف د سمې کیدنې او مرض لامل ګرځي. دغه قسم غذايي تسممات تر ډیره د میکروبي سمومو او یا هم په خوړو کې د ځینو مرکباتو پواسطه چې په طبعي ډول شتون لري، مینځ ته راځي. په غذايي توکسیکولوژي یا Food toxicology کې بل مهم بحث د غذايي اډیټیوونو او نورو شاملو موادو او همدارنګه د ځینې ملوث کوونکو موادو او مختلفو پاته شونیو توکسیکولوژیکي ارزونه ده. دغه ارزونه د اندیښنې وړ موادو د توکسیکولوژیکي مطالعې د پایلو پر بنسټ ولاړه ده کوم چې په خوړو کې د خطرناکه موادو په پېژندنه او د دوی څخه مینځته راغلي خطر د قوت د مشخص کولو څخه عبارت دي. که چیرې شونې وي دغه ارزونه به د تحمل وړ خوړلو په کچه ترسره شي.

هغه توکسینونه چې د میکروبوونو پواسطه جوړېږي

د غذايي تسمماتو عمده عامل هغه توکسینونه دي چې د بکټریاوو پواسطه مینځ ته راځي. په دې جمله کې تر ډیره هغه انتروتوکسینونه راځي چې له ستافیلوکوکسی ګانو (*Staphylococcus aureus*) څخه مشتق شوي دي، کوم چې د تیارولو پر مهال خواړه ککړوي. نوموړي توکسینونه پروټینونه دي چې د تودوخې پواسطه نه غیرفعال کېږي. دوی د داسې غذايي تسمم لامل ګرځي کوم چې د کانګواو دستونو له مخې پېژندل کېږي. په عین ډول غذايي تسمم د *Bacillus cereus* او *Clostridium perfringens* څخه د لاسته راغلو

توکسینو پواسطه هم مینځ ته راځي. ترټولو خطرناک تسمم د کلوستریدیم بوتلینوم د توکسین پواسطه مینځ ته راځي (بوتلیزم). دغه حالتونه کم دي خو ځینې وخت یو مرګونی شکل غوره کوي. په دې حالت کې مشخص اعراض عبارت د کتنې یا دید له ګډوډیو او عصبي فلج څخه دي. دوی ترډیره په کورونو کې د جوړشوي کانسروا خوړو چی خراب شوي وي اود هغه غوښې پواسطه چې یاښه دود شوې نه وي یا ښه پخه شوي نه وي، په واسطه رامینځته کیږي. د بوتلینوس توکسینونه د یوګروپ له نیورو توکسیک پروتینو څخه عبارت دي کوم چې د تیتانوس توکسین ته ورته دي. د نوموړو توکسینو ترټولو قوي سمیت د پام وړدی. په انسانانو کې د خولې له لارې ۱۰ میکروګرامه د بوتلین A توکسین کیدای شي چې د مرګ لامل وګرځي.

په هر حال د بکتریایي توکسینو پواسطه تسمم باید له غذایی انتاناتو سره ګډ نه کړل شي لکه سلمونیلوزس کوم چې بکتریاوي منشا لري او د کولمود تبه لرونکي التهاب لامل ګرځي.

د سکامبروئید تسمم هم میکروبي منشالي. دغه ډول تسمم د سردردې، بې اشتهايي، دمخ د سوروالي او خاربنت لامل ګرځي اوبالعموم د سکرومیلا اوساردین په نوم د ماهي د خوړلو څخه وروسته مینځته راځي. کله چې ماهي اویا د ماهي محصولات په بده واوړي د عضویت دهستامین او نورو بایوجنیکو امینو (Tyramine, Phenylethylamine, cadaverin, Purescine) چې د امینواسیدو د میکروبي ډیکاریوکسیلیشن په واسطه تولیدیږي، دغه حالت مینځ ته راځي.

بایوجنیک امینونه په تخمرشوو خوړو لکه پنیر، شراب اوسرکه کې هم تولیدیږي. په ځانګړي ډول سخت پنیر په لوړه کچه هستامین اوتیرامین لري د هغو مریضانو څخه چې MAOI (مونوامين اکسیداز نهی کوونکي) دواخوري پرته، په سخت پنیر کې د بایوجنیکو امینو په مقابل کې د نورو ناروغانو د ځینو مشکلاتو راپور ورکړل شوی دی. په دې حالت کې د نوموړو مشکلاتو لپاره د

قدمې يا شروع کوونکي ډوز اندازه نسبت نورو خوړو ته لوړه ده. چې داله پښرخه په معدي معايي تيوب کې دامینونو د کراره خوشي کولو له کبله ده.

مرخپري هم کولای شي چې خطرناکه توکسينونه جوړکړي او بيا د تسمم (مايکو توکسيکوزس) لامل وگرځي. د دې لرغونی مثال د *Claviceps purpurea* پواسطه د جاودر متنن کيدلو څخه عبارت دي، کوم چې بيا د ارگوت د الکلوئيډونو د جوړيدا لامل گرځي. په لمړنيو پيړيو کې د ارگوت د تسمم پېښې يا ارگوتېزم په کتلوي شکل مينځ ته راته ولې اوس ډېر وخت کيږي چې پېښې يې په غذايي سميت کې رول نه لري.

نور مايکو توکسينونه چې د مختلفونارو غيولامل گرځي، په خوړو کې د اسپراجيلوس او پنسلیم پواسطه جوړيږي. د مثال په ډول د افريقا په ځينو استوايي او همدارنگه د چين او تاييلنډ په هيوادونو کې چېرې چې مرخپري تر ډېره په خوړو کې کارېږي نو ځکه افلاتوکسين B هم چې د ښې له سرطان سره څرگنده اړيکه لري ډېراخيستل کيږي، دغه مرض د دغې سيمې په هيوادونو کې نسبت اروپاته ډېر دی. په مشاهده رسيدلې ده چې په يوگوسلاويا، بلغاريا او رومانيا کې د بالکان عصبي ناروغي د *Ochratoxin A* په واسطه د ککړشويو غلو دانو له کبله مينځ ته راځي.

ډېرنور خواړه ککړونکي مايکو توکسينونه (جدول ۱) د انډينې وړ سمې وړتياوې لري. په هرحال په انسانانو کې تراوسه په استثنایي حالاتو کې ناروغۍ ترسترگو شويدي د مثال په توگه په ختيځه سايبيريا کې د *Fausarium* او *Cladosporium* پواسطه د ککړشويو حبوباتو مصرف (Kashin-Back disease and toxic aleukia).

د الجيانو پواسطه جوړ شوي توکسينونه (فايکو توکسينونه) هم کولای شي چې د غښتلي غذايي تسمماتو لامل وگرځي. دغه تسمم تر ډېره د صدفونو د خوراک څخه وروسته کوم چې سمې الجيان په ځانگړي ډول د اينوفلاجيليتونه له اوبو څخه فلټراو متراکم کوي، مينځ ته راځي. هغه توکسينونه چې په دې جمله کې پيژندل شويدي عبارت له PSP يا Paralytic Shellfish Poisoning، DSP يا

Neurotoxic Shellfish Poisoning یا NSP ، Diarrhetic Shellfish Poisoning یا DSP او Amnesic Shellfish Poisoning څخه دي؛ دوی په ترتیب سره د فلج، اسهالاتو، عصبي مشکلاتو او د حافظې د گډوډیو لامل گرځي. د PSP د گروپ په اوبو کې منحل توکسینونه له لس سره ورته تتراهایدروپیورین له مشتقاتو څخه مینځته راغلي دي او د دوی په مینځ کې ساکسي توکسین ښه پیژندل شوی دی. په شحمو کې منحل د DSP توکسینونه د اوکاډائیک اسید مشتقات دي. د ASP گروپ له ډلې څخه ډوموئیک اسید چې یو سمی امینو اسید دی پیژندل شوی ده. په ځینو هیوادونو کې د تحمل وړ ډوز سرحد په ۱۰۰ گرامه صدف کې ۸۰ میکروگرامه د ASP توکسین ټاکل شوی دی او د DSP توکسین باید په هیڅ میتود سره تشخیص نه کړل شي. د سیگواتیرا د ماهي تسمم هم د ډاینوفلاجيلاتا څخه د لاسته راغلیو توکسینو پواسطه مینځ ته راځي. د سیگواتیرا توکسینونه (سیگواتوکسین او مایتو توکسین) چې د حاره سیمو په ماهیانو کې تراکم کوي، په اروپا کې د غذايي تسمم په برخه کې رول نه لري که څه هم هر کال د کارابین بحر او ارام سمندر تر شاوخوا سیمو کې له دې کبله ۵۰۰۰ معدي معايي او عصبي پېښې رامينځ ته کېږي. مشخصې نښې نښانې یې له عضلي کمزوري، په لاسو او د خولې په مخاط کې خاړښتي او سوزیدونکي حساسیت او د بدن د تودوخې د خوځښت څخه عبارت دي.

جدول ۱ په خوړو کې مایکو توکسینونه	
مایکو توکسین	منبع
افلاتوکسین	موم پلي ، ماش پلي ، حبوبات ، سویا بېن
اکراتوکسین A	حبوبات ، کافی ، لوبیا
سیترينین	حبوبات
سترگماتو سیستین	غلې یا حبوبات
پاپولین	د منې جوس

زیارالینون	غلې یا حبوبات
ترای کوتیسین	غلې یا حبوبات
فیومونیزین	غلې یا حبوبات
ارگوټ الکلوئید	جاودار

د سمې خوړو جوړوونکي مواد

د هغه توکسينو څخه پرته کوم چې د میکرو ارگانيزمونو پواسطه جوړیږي، د عادي خوړو متشکله مواد هم کیدای شي چې سمې وي (جدول ۲) او کیدای شي چې د تسمماتو او ناکراريو لامل شي.

جدول ۲ د نباتي خوړو سمې مرکبونه	
مرکب	منبع
سیانو جنیک الکلوئیدونه (امیگدالین)	ترخه بادام، د میوو زړي او سختې برخې
دورین	سورگوم
لینامارین	د کتان زړي، کاساو، او د لیمو په نوم لوبیا
ایروسیک اسید	د Rape په نوم د بوټي دانې
ګلایسیریک اسید	د خوړولي رینې
ګوسیپول	د کاتن تخم
هیما ګلوټینین	لوبیا
ایزوفلاوون ګلایکوزیدونه (جنیستین، ډایډزین)	سویا بین
میرسټیسین	د جوز بوټی
نیورو توکسیک امینو اسیدونه	د لاتیروس د نوعې زړي (لاتیریزم)
سورالینونه	کرفس
سولانین	الوګان

تيوگلو کوزيدونه (سينيگرين)	کرم ، خردل ، يو نوع مولى
ويسين ، کانويسين	فاوا بين (Vicia faba) (فاويزم)

ډير بوټي سيانوجنيک گلايکوزيدونه لري. دغه مواد د گلايکوزيداز انزايم پواسطه هايډرولايډ کيږي کوم چې په نباتاتو او يا په کولمو کې شتون لري او هايډروسياننيک اسيد ازادوي. نباتي خواړه کوم چې دا ډول گلايکوزيدونه لري له ترخو بادامو او نورو ميوو له زړو (اميگډالين)، کتان، د نشايستې د کاساوا، د ليما د لوبيا (لينا مارين)، سورگوم (دهورين) او هندي کرکي څخه عبارت دي. په لويانو کې د ۲۰ او په کوچنيانو کې د ۵ څخه تر ۱۰ ترخو بادامو له خوړلو څخه وروسته مرگونى تسمم مينځته راځي. ليکن د دومره بادامو خوړل د دوى د تريخ خوند له کبله په غير ارادي ډول ممانعت کيږي. په نورو حالاتو کې په کلتوري ډول د خوړو پخول د هايډروسياننيک اسيد او د گلايکوزيدونو له مينځه وړل تضمينوي. د بيلگې په توگه د مانويک ريښې له پوسته کيږي او د اوږد مهال لپاره مينځل کيږي او بيا پخېږي. د ليما لوبيا او سورگوم مېده کيږي، په اوبو کې کيښودل کيږي او په سرخلاصې لوبني کې له اوبو سره پخېږي او بيا يې اوبه ايسته کيږي. سره له دې په استوايي هيوادونو کې د کاساوا، د ليما د لوبيا او سورگوم د تسمماتو راپور په پرله پسې ډول ورکول کيږي. د هندي کرکي له کبله هم تسمم رامينځته کيږي او د لمړۍ نړيوالې جگړې په ترڅ کې اروپا ته د ليما د لوبيا (Phaseolus lunatus) له وارديدلو څخه ډيره مړينه رامينځ ته شوې وه.

هغه نظريه چې د کتان د تخم په هکله په پخوانيو اثارو کې راغلې او وايي چې د کتان تخم د تسمم د وروسته کيدو لامل گرځي، غلطه ده. د ليناز په نوم انزايم چې د کتان په تخم کې د لينامارين سره يوځای پيدا کيږي، په معده کې په فزيولوژيک ډول غير فعاله کيږي. حتی چې د معدې د تيزابو په نه شتون کې له لينامارين څخه د هايډروسياننيک اسيدو لږ ازاديدل هم د لمړۍ درجه غير سمى کيدو په پروسه کې جبرانيږي.

د فاوایین یا د فاوا د لوبیا (Vicia faba) مصرف کیدای شي چې د فاویزم یا هیمولایټیکې کم خوني لامل شي. د دغه مرض پټالوژي له بیټا گلوکوزیدونو، ویسین او کانویسین سره اړیکه لري، له کوموڅخه چې په خپله په لوبیا او یا په هضمي تیوب کې Pyrimidine، Divicine او Isouramil د غیرقنډي برخې په توگه آزادېږي. نوموړي مواد گلوتاتیون تحمض کولای شي نوله همدې کبله د هیمولایټیک کم خوني لامل گرځي. په شدید حالاتو کې د مریضي اعراض له تبې، هیموگلوبینیمیا، زیرې او د توري او ینې له غټوالي څخه عبارت دي. کلینیکي انځورې په مدیترانه یي هیوادونو کې وروسته د تازه اویا په مکرر ډول د کمې پخې شوې لوبیا له مصرف څخه لیدل کیږي. حتی چې دغه حالت د گردې پواسطه هم رامینځته کیږي. د فاویزم په رامینځته کیدو کې یومهم لامل د Glucose-۶-phosphate dehydrogenase د انزایم کموالی دی کوم چې د مدیترانه یي هیوادونو په اوسیدونکو کې ډېر خپور دی. د فاویزم په مرض کې دغه انزایم په سرو کریواتو کې تر ۲٪ پورې کمیږي چې په نتیجه کې د ارجاع شوي گوتاتیون د ټیټې کچې لامل گرځي. که چیرې پاتې شوی گلوتاتیون د فاوا د لوبیا د پیریمیدین پواسطه تحمض شي نوپه سرو کریواتو کې نارمل میتابولیزم گډوډ او کم خوني واقع کیږي.

لاتیریزم Lathyrism هم یو غذايي مریضي ده او د هغو خوړو د مصرف په مقابل کې رامینځ ته کیږي چې یو پر دریمه نخود (Lathyrus sativus) ولري. دوی ډیر په اروپا کې رول لوبوي و لیکن په ۱۹۵۸ کال په هندي سیمو کې تر ۲۵۰۰۰ نوموړې پېښې ترسترگوشوې. دوه ډوله یی سره جداشويدي، یو یې Osteolathyrism کوم چې صرف په حیواناتو کې له سترگو کیږي او بل یې Neurolathyrism دی. په وروستني هغه کې یې د انسان عصبي گډوډی، له ښکته نهایتو د عضلاتو د فلج، د مثاني او کولمو فلج او دماغي تخریب څخه عبارت دي. دغه نیوروتوکسیکي اغیزې په نخودو او د لاتیروس په نورو انواعو کې د ځینو امینواسیدولکه بیټا سیان الانین د شتون له کبله دي. د دې په

پرتله β -aminopropionitrile او β,β' -iminodipropionitrile د Osteolathyrisms مسئل دي.

سمي مواد صرف په بېلګانه خوړو او يا هغو خوړو کې چې په سيمه ايز ډول يا کله کله مصرفيږي شتون نلري بلکه په هغه موادو کې چې د خوړو د اصلي جز په څير لکه الوګان کارېږي هم شتون لري. لکه د نورو سمي او مخدره نباتاتو د کورنۍ په څير، په ځانګړي ډول خام يا شنه څوکي وهونکي الوګان د سولانين په نامه د دوه ګلايکوالکلوئيدونو الفاچاکونين او الفاسولانين مخلوط لري. چون د الوګانو پوست او څخۍ، لرې کيږي او د پخولو اوبه يې لرې کيږي نو ځکه يې د سميت واقعات هم کم هم لند دي کوم چې په ستوني کې د څارنستي او سوزيدونکي حساسيت، سردرد، کانګو او اسهالاتو پواسطه پيژندل کيږي. کله چې الوګان له پوسته کرل شي په ډيرو انواعو کې يې په ۱۰۰ ګرامه الوګانو کې له ۲ څخه تر ۱۰ ملي ګرامه سولانين شتون لري. کله چې د موادو غلظت ۴۰ ملي ګرام ۱۰۰ ګرامه ته رسيږي، سميت واقع کيږي. داسې ويل کيږي چې په انسانانو کې د سولانين سمي ډوز ۲۵ ملي ګرامه او وژونکي ډوز يې ۴۰۰ ملي ګرامه دی.

غذايي اډيتيرونه

د غذايي توکسيکولوژي يوله مهمو برخو څخه د غذايي اډيتيرونو د مصونيت ارزونه ده. غذايي اډيتيرونه داسې تعريف شويدي چې له هغه موادو څخه عبارت دي چې په خوړو کې د تکنالوژيکي موخو لپاره د توليد، پروسس، تيارولو، درملنې، بسته بندي، انتقال او ذخيره کولو په دوران کې اچول کيږي. د دوی د کارونې هدف په غذا کې د میکروبي، کيمياوي او فزيکي تغيراتو څخه د مخنيوی او په خوند، ظاهري شکل او ثبات کې د بهبود په خاطر کارول کيږي (جدول ۳). په ځينو هيوادونو کې د غذايي اډيتيرونو تعريف توپير لري، بڼا اډيرمغذي مواد او خوندور کوونکي له دې لست څخه لرې شوي او ډير وراضافه شويدي.

جدول ۳ د غذايي اډيتيرونو موخې	
د کارونې موخه	اډيتيو

د میکروبي تغیر څخه دمخنیو په خاطر	پریزرویتو یا ساتونکي
د کیمیاوي تغیر څخه دمخنیو په خاطر	انټی اکسیدانټونه ، تېزابونه ، او د تیزابیت تنظیموونکي
د فزیکي تغیر څخه دمخنیو په خاطر	درطوبت جذبوونکي ، د ځک جوړیدو ضد مواد ، د پریږدو ضد مواد
د ظاهري شکل ښه کول	رنگونه ، درنگ ثابت کوونکي ، ښوی کوونکي
د ثبات پرمختګ	مستحلبونه ، جل کوونکي ، سخت کوونکي ، دلخته کیدو ضد مواد ، ضخیم کوونکي ، ثابت کوونکي
د خوند یا ذایقې پرمختګ	خواره کوونکي ، ذایقه ورکوونکي ، د ذایقې لوړوونکي

په اصولو کې د غذايي اډیټیوونو کارونې ته هغه وخت اجازه ورکول کیږي چې کارونه یې مصوونه وي. د دې لپاره چې کارونه یې مصوونه شي اډیټیوونه باید تصویب شي او د دوي د مصوونیت ثبوت د مناسبو مطالعوپه واسطه مهیا کړل شي. د توکسیکولوژیکي مطالعاتو ډول او پراختیا د خوړو او کرنې د تنظیم (FAO) او نړیوال روغتیايي پروګرام (WHO) په غذايي اډیټیوونو د متخصصینو د کمیټې د شریکوڅیړنو (JEFCA) او د اروپايي ټولنې په خوړو باندې د علمي کمیټې (SCF) اصولو او د مصوونیت ثبوت ته اړتیا لري. غذايي اډیټیوونه باید د حاد ، تحت مزمن او مزمن سمیت لپاره په دوه نوعه حیواناتو باندې تجربه کړل شي. علاوه مطالعات باید کم له کمه پر دوه نسله لابرټواري حیواناتو ترسره شي او د اباید معلومه شي چې آیا پرتکتري سیستم او د هغې په نوی زیږول شوو باندې د تراتوجنیکو اغیزو قدرت لري او که نه له دې نه علاوه که چیرې د جینو توکسیکو او یا سرطان تولیدوونکو اغیزو د شتون سوال وي باید

څېړنې ترسره شي. د مطالعاتو پرواګرام د اډيټيوونو پير جذب، توزیع، استقلال او اطراح او همدارنگه په انساجو کې پر ممکنه ذخيره مطالعې ترسره کوي. د ځانګړي اهميت لرونکې موضوع پر انسانانو د حرفه وي تماس، اپيديميو لوژيکي موندنو، د تسمم د راپورونو، د خپلو تجربو او پر رضاکارانو د څارل شویو مطالعاتو په اساس د مشاهداتو راټولول دي.

د ترسره شویو مطالعاتو موخه دا ده ترڅو په توکسيکولوژيکي ډول مواد وپيژني، ترڅو بې سمې او نامطلوبه اغيزې او له ډوز سره اړيکه وپيژندل شي او ترڅو هغه اعظمې ډوز پيدا کړي چې د موندلو وړ اغيزو، نه لامل کېږي (NOEL, no observed effect level).

د امريکا په متحده ايالتونو کې د خوړو او درملو ادارې غذايي اډيټيوونه په درې گروپونو (له ۱ څخه تر ۳ کچې پورې) ويشلي دي کوم چې د کيمياوي جوړښت له مخې د پيش بيني شوي تماس او د دوی د سميت د تخمين شوی قدرت پر بنسټ صورت نيولی ده. د تجربې ضروريات په لږ مظنون کيمياوي جوړښت لرونکي مرکباتو په ډله کې چې د تماس کچه يې له $50 \mu\text{g/kg} / \text{BW}$ او حتی له $2,5 \mu\text{g/kg}$ د بدن وزن څخه لاندې وي، کم شوي دي. په اکثره نامعلوم يا مظنون کيمياوي جوړښت لرونکي موادو په ډله کې صرف هغه وخت کمېږي چې کله د تماس اندازه له $12,5$ څخه لاندې او يا له دې څخه هم ډير کم يعني $0,22 \mu\text{g/kg}$ وزن بدن وي.

د غذايي اډيټيوونو د مصوونيت ارزونه د قبول وړ ورځني اخيستلو (Acceptable daily intake) د اصولو پر بنسټ کوم چې د JEFCALخوا د پستيسيدونو (Pesticides) د پاته شوني او غذايي اډيټيوونو لپاره انکشاف موندلی ده، صورت نيسي. NOEL د مزمنه غذايي تجاربو په واسطه، د ممکنه ډيرو پارامترونو د مشاهدې په نظر کې نيولو سره او په ډير مناسب او حساسو حيواناتو په نوع کې د موادو د معاینه کولو پر بنسټ ټاکل کېږي. نو بيا د قبول وړ ورځنی ډوز يا ADI له NOEL څخه د ځينو مصوونه فکتورونو له شاملولو وروسته لاسته راځي. نو ځکه ADI د ځينو مصوونه

فکتورونو په لرلوسره NOEL په پرتله په حیواني تجاربو کې لږ ټاکل کېږي. او داسې تعریفېږي چې له هغه مقدار mg/kg څخه عبارت ده کوم چې د اوږمهال لپاره هره ورځ به له کوم محسوس صحي خطر څخه خورل کېږي.

په عمومي توګه د ۱۰۰ قیمت د مصوونیت د فکتور په حیث ټاکل شوی ده. داسې فرض شوې ده چې د انسان او لابراتواري حیوان ترمنځ د ممکنه حساسیت تفاوت هم د ۱۰ فکتور وي او د انسانانو په مختلفو جنسونو (نسبت جینوتايب، جنس، عمر، د خوړو حالت او صحت ته) کې د حساسیت تنوع هم د ۱۰ فکتور وي.

ADI ته هروخت د عددي قیمت اختصاص نه ورکول کېږي او په ځای یې لیکل کېږي چې ADI یی نده مشخص شوي (ADI not specified). اما دغه شکل هغه وخت کارېږي چې غذایی اډیټیو کم سمیت ولري او له غذا سره یې ممکنه ټول خوړل کوم صحي خطر نه رامینځته کوي. داسې اډیټیو باید د GMP سره مطابق و کارول شي، او د ضروري تکنالوژیکي موخو ته د رسیدو په خاطر په کم ډوز وکارول شي، باید د خوړو د ټیټ کیفیت او تقلب د پتیدو لامل نه شي او باید غذایی بې تعادلي رامینځته نه کړي (WHO, ۱۹۸۷).

د ADI قیمت صرف د موجوده پوهې او د معاینه کولو د طرز العملونو د کچې پواسطه تضمین کېږي. نوله همدې کبله د ADI قیمتونه د نویو موندنو له کبله تغیر کوي او په ځینو حالاتو کې په ډراما ټیکي ډول کمبود موندلی دی. برسيره پردې د یادولو وړ ده، هغه قیمتونه چې د مختلفو کمیټو پواسطه لاسته راغلي دي همیش یوشان ندي.

Generally recognized as safe (GRAS) یوه بله اصطلاح ده چې خوړو ته د وړاچول شوو موادو مصوونیت مشخص کوي. د امریکا په متحده ایالتونو کې دغه اصطلاح د هغه موادو (ځینې مالګې، مصالې، ذایقه ورکونکي، د سبزیجاتو ګم، او د قنادي ځینې پوډر) لپاره کارېږي کوم چې د تصویب په پروسه کې له لسټ څخه باسل کېږي نوله همدې کبله د غذایی اډیټیوونو لپاره د ضروري رسمي موادو له لسټ څخه هم باسل کېږي. د کارونې شرط یې داده چې د تجربه لرونکو

متخصصینو په مینځ کې یې د ټاکل شوي موخې لپاره د کارونې په مصوئیت اتفاق رامنځته شي.

په تیرو وختونو کې څېړنو ښودلې ده چې غذایی اډیتيونه د خطر لرونکو حالاتو د مینځ ته راتلو توان لري نوځکه باید جدي ونیول شي. مثالونه یې د کوچوزیږ رنګ او د دولسین په نوم خواړه کوونکي مواد دي چې دواړو یې په حیواني تجربو کې له ځانه سرطان تولیدوونکې اغیزې ښودلې دي. دغه مواد په غذا کې د کارونې څخه باسل شويدي. د نورو غذایی اډیتيونو کارونه لکه بوریک اسید، اریتروزین او کانتازانتین د دوي د سمې خواصو د لرلو له کبله منحصر شويدي.

د نورو غذایی اډیتيونو لپاره، هغه مشاهده شوې اغیزې چې په حیواني تجاربو کې پیژندل شويدي د دوی د مصوئیت سره اړیکه نلري. دغه حالت عبارت د ادرنال د غدې او پښتورگو د هایپرپلازیا څخه دی چې له نفروکلستینوزس سره مل وي او د لوړ ډوز Polyol لکه ایزومالتول، لاکتیتول، مالتیتول، مانیتول، ساریتول او زایلیتول له کبله مینځته راځي. همدارنګه د لوړ ډوز سکروز د مزمن تطبیق څخه وروسته په نارینه مورکانو کې د مثاني د تومور په هکله هم داسې فکر کېږي چې د خواړه کوونکي (سکرین) سره اړیکه نلري.

د خوړو ککړونکي

د خوړو د توکسیکولوژي بل مضمون د هغو موادو ارزیابي ده چې د ککړونکو په څېر په خوړو کې ځای نیسي. د غذا د ستندرد پروګرام او د WHO او FAO د مشترک غذایی کوډکس یا Codex Alimentarius د تعریف له مخې؛ هغه مواد چې په قصدي ډول په خوړو کې نه اچول کېږي بلکه په خوړو کې د تولید (زراعتي فارمونو، حیواني فارمونو او د ویترنري دواګانې)، صنعت، پروسس، تیارولو، درملنې، پاکټ کولو، بسته بندي، انتقال، پورته کولو او یا د محیطي ککړتیا په نتیجه کې ځای نیسي. دغه تعریف نه یوازې ټول قصدي ککړیدونکي مواد تر پوښښ لاندې نیسي بلکه د Pesticides له کارونې څخه د پاته شونیو، د

ویترنري دواگانو، غذایی اډیتیوونو او د هغو موادو انتقال چی له غذا سره د تماس نیوونکو موادو څخه صورت نیسي هم تعریفوي.

تر ټولو مهم غذایی ککړونکي له محیطي کیمیاوي موادو څخه عبارت دي، چې د صنعت او د انسان د فعالیتونو څخه سرچینه اخلي او د خاورې، اوبو، هوا او غذایی ځنځیر له لارې خوړو ته ننوزي. د نورو موادو په مینځ کې محیطي ککړونکي له درندو فلزاتو لکه د سرب، کدیمیم او سیمابو څو کره ایز اروماتیک هایدروکاربنونه او هلو جن لرونکي عضوي مرکبونه لکه څو کلورین لرونکي بای فینایلو نه او د Polychlorinated dibenzo-p-dioxin او د dibenzofurans د گروپونو څخه عبارت دي.

اکثر د دې محیطي ککړونکو له ډلې څخه ډیر سمی دي او سرطان تولیدوونکی قدرت لري. له دې نه علاوه ځینې یې په عضویت کې تراکم کوي او غذایی ځنځیر ته لار پیدا کوي. کله چې د تحمل وړ له کچې څخه په لوړ ډول بدن ته داخل شي د انسان په بدن کې روغتیا ته غښتلی گواښ رامنځته کوي. په گڼ شمیر پېښو کې د دغه موادو پواسطه د خوړو ککړیدل په لوړه پیمانه تسممات مینځ ته راوړي. د بیلگې په توگه په جاپان کې د هغو وریجو مصرف چې لوړه کچه کدیمیم یې لرل د Itai-Itai د ناروغۍ لامل وگرځیدلې. د کلونو لپاره د هغه سیند له اوبو څخه د وریجو د کښت لپاره استفاده کیدله چې د جستو، کدیمیمو او سربو د کان پاته شوني ورسره گډیدل. تر دوه زره پورې کسان په ناروغۍ کې ولویدل کومو چې په هلوکو او بندونو کې له سخت درد څخه شکایت کاوه او شديده Osteomalacia یې ورسره لرله او مرگونې پایلې یې لرلې. همدارنگه په جاپان کې له زرو څخه ډېر د هغو کب نیوونکو او د هغوي په کورنیو کې چې د میناماتا په جزیره کې اوسیدل له داسې عصبي تشوشاتو سره مخامخ شول چې سرچینه یې د سیمابو په میتایل د ډیرو ککړو کبانو او شیل فیشونو خوړل وو. پرسیمابو د ککړتیا لامل د هغه نبات شتون وو چې په خپل ځان کې د استلین څخه د اسیت الډیهایدو د تحمض په خاطر، سیماب کاروي او سیماب په جزیره کې هم خوشي کوي نوله همدې کبله

دغه بحري حیوانات چې په دې سیمو کې نیول کېږي په یو کلوگرام کې ۱۰۰ ملی گرامه د سیمابو میتایل لري.

که څه هم په دومره لوړه کچه ککړتیا کمه رامینځ ته کېږي. په نارمل ډول د محیطي کیمیاوي موادو په واسطه د خوړو ککړتیا په نسبي ډول کمه وي. د بېلگې په توګه د خوړو څخه د سربو ورځنی مقدار له ۳۰۰ مایکروگرام څخه ډیر کم اخیستل کېږي. که چېرې له نورو محسوسو سرچینو څخه د سرب اخیستل شتون ونلري نو په یوه بالغ انسان کې یې غلظت $30 \mu\text{g}/\text{dl}$ ته نه رسېږي. که څه هم ماشومان نسبت لویانو ته ډېر په خطر کې قرار لري. ماشومان د لوړ انجذاب د وړتیا په لرلو سره په مرکزي او محیطي عصبي سیستم باندې د سربو د اغېزو په وړاندې ډېر حساس دي. په جنین او په نوو پیداشوو ماشومانو کې د وینې $10 \mu\text{g}/\text{dl}$ له کمترین غلظت څخه عبارت ده چې ناوړه پایلې مینځته راوړي (LOAEL). تر شپږ کلني عمر ماشومانو کې د وینې دغه کچه د خوړو سره ورځني ۲۰ مایکروگرامه د اخیستلو وروسته تولیدېږي.

د کډمیم مینځنی اخیستنه چې له خوړو سره صورت نیسي نږدې په ورځ کې له ۱۰ څخه تر ۵۰ مایکروگرامه پورې رسېږي. کډمیم د ډیر اوږد نیم عمر سره مشخص شویده او په ځانګړي ډول په پښتورګو کې تراکم کوي او هلته د پښتورګو د عدم کفایې او د حجراتو د تخریب لامل ګرځي. د پښتورګو په قشر کې یې بحراني غلظت $20 \text{mgCd}/\text{kg}$ دی او دا غلظت هغه وخت مینځته راځي چې شخص د ۴۵ کلونو لپاره نږدې هره ورځ ۲۰۰ مایکروگرامه کډمیم له خوړو سره واخلي. د خوړو سره یی د اخیستلو اوسط په روښانه ډول ټیټ دی. که څه هم په غذا کې د کډمیم د شتون مقدار او د جذب عادت تغیر موندونکې دي کوم چې اصل جذب په ګوته کوي. داسې پیشنهاد جوړ شویده چې د هغو خوړو مصرف راتیټ کړي چې په نسبي ډول لوړه کچه کډمیم لري لکه د زړو حلال شوو حیواناتوینې او ګردې او په همدې ډول ډیر مریځي.

د سیمابو د میتایل په شکل د سیمابو عمده سرچینه کبان او د کبانو تولیدات دي. ورځنی تخمین شوی د میتایل مرکبوري مقدار چې له خوړو سره اخیستل کېږي،

۲,۴ مایکروگرامه دی کوم چې خطرناک نه دی. د بالغانو په وینه کې یې د $200\mu\text{g/litter}$ د غلظت سره او په ویښتانو کې یې د $50\mu\text{g/g}$ د غلظت سره شتون د عصبي اختلالاتو پریپیل دلالت کوي او هغه وخت رامینځ ته کیږي چې په لوړه کچه په درانده ډول دککړ ماڼي غوښه وخورل شي.

د درندو فلزاتو په څېر څوکلورین لرونکي بای فینایلونه (PCBs) اود Polychlorinated dibenzo-p-dioxin او dibenzofurans یعنې PCDD/PCDF اوسمي $2,3,7,8\text{-tetrachlorodibenzo-p-dioxin}$ یا TCDD په پراخه کچه په چاپیریال کې خپرېږي او بیا په غذايي ځنځیر کې تراکم کوي. دا په ځانگړي ډول په کبانو، غوښو، او شیدو کې شتون لري. په ځوانانو کې له خوړو سره د PCBs ورځنۍ اخیستنه له 0.05 څخه تر 0.2 مایکروگرام فی کلوگرام د بدن دوز اود TCDD هغه یې $1\text{-}2\text{pg TCDD equivalent/kg/BW}$ تخمین شوې ده. نسبت په شحمو کې د دوی د لوړې کچې انحلالیت ته د انسان په شیدو کې په نسبي ډول لوړ غلظت تشکیلوي. د شیدو روډلو په دوران کې د ماشومانو بدن ته په اوسط او ورځني ډول د $2\text{-}12\mu\text{g/kg/BW}$ په اندازه PCBs او $150\text{pg equivalent/kg}$ په اندازه TCDD د داخلیدو راپور ورکړل

شویده. حیواني تجربو ښوودلې ده چې د دغه موادو کم ډوز هم پرتکتري سیستم اغیزې لري او هم سرطان تولیدوونکي دي. د تومور تولیدیدل د دوی تومور تولیدوونکي فعالیت ته نسبت ورکول کیږي او په انسانانو کې نسبت تجربوي حیواناتو ته حساسیت کم لیدل کیږي. په چاپیریال کې د دغه موادو له پیژندلو څخه وروسته باید په خوړو کې د دوی له شتون څخه مخنیوی وشي. د محیطي ککړوونکو لپاره د اخیستنې یا خوړنې د تحمل وړکچې ټاکل البته د امکان په صورت کې نه یوازې په تجربوي حیواناتو د توکسیکولوژیکي مطالعې پر بنسټ بلکې ترجیحاً د اپیدیميولوژیکي موندنو او د پیژندل شویو تسمماتو د حالاتو پر بنسټ تحقق مومي. د اکثر ملوث کوونکو طبعي وقوع او د ټولو متصورو منابعو څخه د موادو مجموعي اخیستنه باید په محاسبه کې ونیول شي. په ارزونه کې هغه وخت مشکلات رامینځته کیږي چې په عضویت کې د موادو

تراکم متصور وي او د سمې ډوز اونه لرې کیدونکې اخیستنې ترمینځ توپیر په نسبي ډول کم وي.

د غذايي اډیتيوونو لپاره د ADI د کارونې په مقایسه د هغو محیطي ککړونکو لپاره چې په بدن کې تراکم کوي، اونیزه د تحمل وړ مؤقتي اخیستنه یا Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI) په نظر کې نیول شوې ده.

دې ته عمداً مؤقتي ویل کیږي ځکه چې له دې څخه د تحمل وړ د تماس د کچې استنتاج دایمي ندی. د دغه موادو لپاره چې په بدن کې تراکم نه کوي د مؤقتي اعظمي د تحمل وړ ورځنۍ اخیستنې اصطلاح یا PMTDI کارول کیږي.

په خوړو کې د Pesticides د پاته شونیو شتون د غذايي ککړونکو بل شکل ده کوم چې د انډیبنې وړ خطر قدرت لري. نو د همدې لپاره Pesticides مضمون تصویب شوی او د پاته شونیو اعظمي کچه یې تاسیس شوی ده. لکه په غذايي اډیتيوونو کې په توکسیکولوژیک ډول د Pesticides د اخیستنې د قبول وړ کچه په ابتدايي شکل په تجربوي حیواناتو د تجاربوله پایلو څخه مشتق کیږي او د مصوونیت فکتورونه هم ورسره شاملیږي. نسبت د دغه موادو د غښتلي سمیت په لرلو، لاسته راغلی د ADI قیمت د غذايي اډیتيوونو په پرتله ډیر ټیټ دی. د Pesticides د پاته شونیو متوسطه اخیستنه په عمومي ډول کمه ده او ترڅو چې پاته شوني د اعظمي کچې څخه تېری ونه کړي د کوم خاص خطر توقع باید ونه کړل شي.

د Pesticides په مینځ کې د ارگانوکلورین د مرکباتو ګروپ لکه Aldrine, Dieldrin, chlordane, DDT, Heptachlor, Hexachlorobenzene او Hexachlorocyclohexane (CHC) له ځانه ځانګړي توکسیکولوژیک مشکلات ښيي. دغه مواد په عمومي ډول په بدن کې د تجزیې وړ دي، په خاوره کې ذخیره کیږي او په غذايي ځنځیر کې تراکم کوي. دوی د انسان په شحمي نسجونو کې ذخیره کیږي نو ځکه د انسان په شیدوکې پیداکیږي. د HCH (Lindane) څخه پرته د دغه موادو کارونه په ډیرو هیوادونو کې منع شوې ده.

بالاخره د ویترنري دواگانې او غذايي اډیتيونه د هغه ملوث کونکو په ډله کې باید یاد کړل شي چې د غوښو، شیدو او هگیو د ککړتیا لامل گرځي. د Pesticides په څېر دوی هم صرف هغه وخت تصویبېږي چې په خوړوکې یې د متصوره بقایاوو شتون له ADI څخه تیری ونه کړي.

په دغه موادو د ککړتیا په صورت کې اداري نتایجوته انتظار مهم رول لوبوي ترڅو مطالعاتو په نتیجه کې له دې څخه اطمینان حاصل شي چې د حیوان د حلالولو او یا د شیدو یا هگیو د ټولو په وخت کې کوم بحراني پاته شوني ندي لیدل شوي.

د خوړو سره تماس لرونکي مواد

د خوړو ککړونکي مواد په همدې ډول هغه مواد هم دي چې د غذا له ساتونکي قطیو یا کانتینرو، د بسته بندۍ له موادو څخه، د آشپزخانې له لوازمو او لوښو څخه خوړو ته تیرېږي. په تېرو وختونو کې د خوړو کانتینرونه له فلزاتو او سرامیکو څخه جوړېدل چې کله کله د فلزاتو د آیونونو د آزادیدو له کبله د سمیت لامل گرځیدل. په همدې ډول هغه کانتینر او پاکتونه چې له پلاستیک جوړېږي هم په خوړوکې د ځینو موادو لکه د پولیمیرایز څخه پاته شویو خامو موادو (مونومیرونو)، د پولیمیرایزیشن د پروسې لپاره د ځینو کمکي موادو (دکراس لینک لپاره ځینې عاملین او کتلسټونه)، او د پلاستیک د خواصو د نفوذ په خاطر د ځینو اډیتيونو (ثابت کوونکو، پلاستیسیزرونو، غوړونکو، د اور ضد موادو، ډکوونکو، رنگونو او محرک موادو) د ازادیدو لامل گرځي. په پلاستیک کې د غټ مالیکول لرونکي مواد، خوړو ته نشي تیریدلای ځکه چې غیرمنحل دي نو ځکه د توکسیکولوژیکي مشکلاتو د مینځ ته راتلو لامل نه گرځي. اما کوچني مالیکولي وزن لرونکي خام مواد، کمک کوونکي مواد او اډیتيونه د قوي خطرناکه مشکلاتو لامل گرځي د دې لپاره توکسیکولوژیکي تجربو او ارزونو ته اړتیا لیدل کیږي.

د پلاستیک د موادو توکسیکولوژیکی ارزونه د دوی د مهاجرت پر بنسټ صورت نیسي کوم چې په تحلیلي محاسبو کې د دوي انتقال، خوړو او خوړو ته ورته موادو (لکه بې آیونه شوې اوبه، ۳٪ استیک اسید، ۱۵٪ ایتانول او د زیتون تیل) کې سنجول کیږي. د موادو د مهاجرت له قیمت څخه کوم چې د موادو اړونده پارامتر دی، د دغه موادو تماس د دوی د توکسیکولوژیکی خواصو په پرتله تخمینېږي. لکه دوی چې اکثراً نامعلوم دي، نوڅکه د تماس د کچې اړونده توکسیکولوژیکی مطالعات ضروري دي. کله چې په پلاستیک کې کارېږي دغه نتایج باید د دغه موادو مصونیت وښيي.

په اروپایي ټولنه کې د خوړو سره د تماس لرونکي پلاستيکي مواد د ټولنې د نفوس د کچې په اساس تنظیمېږي او د پلاستیک د مرکباتو توکسیکولوژیکی ارزونه په خوړو باندې د علمي کمیټې (SCF) له خوا سرته رسیږي. د دغې کمیټې په تگلاره کې د پلاستیک د مرکباتو توکسیکولوژیکی مطالعه د تماس د درجې پورې اړه لري؛ او د تماس درجه د سطحې پر بنسټ د مهاجرت څخه لاسته راځي او داسې فرض کیږي چې یو کلوگرام خواړه د ۲۰۰ سانتي متر مربع یا ۸۳ انچ مربع سطحې پلاستیک سره تماس لري او هر بالغ ۲۰ کلوگرام وزن لرونکی شخص هره ورځ یو کلوگرام همدا ډول خواړه مصرفوي.

د هغه موادو لپاره چې ډېر له ۵mg/kg له مقدار څخه مهاجرت کوي نو د لازمه تجربو د سرته رسولو لپاره، ۹۰ ورځني غذايي رژیم ته ضرورت دی؛ د بدن څخه د باندې درې میوټاجنیسیټي تجارب (په بکټریاوو کې د جن میوټیشن، د تي لرونکو حیواناتو په حجرو کې کروموزمي انحراف او د تي لرونکو حیواناتو په حجرو کې میوټیشن)، په توکسیکوکنیتیک باندې مطالعې، د تکثري سیستم سمیت، تراتوجنیسیټي او یو اوږد مهاله د سمیت او د کارسینوجنیسیټي مطالعه ترسره شي. په ځینو حالاتو کې د یو حیوان په انواعو باندې تجارب کافي گڼل کیږي. په خوړو کې د مهاجرت د ۵-۰.۵mg/kg اندازو کوم چې د اعظمي اخیستنې یعنې ۱mg/kg BW/day سره معادله ده، پدې حالت کې د ټسټ یا تجربې نیازمندي ټیټه ده. په عمومي توګه دا د یوه ۹۰ ورځني غذايي رژیم په

مطالعي، درې د ميوتاجنيسيتي ټسټونو، او په عضویت کې د تراکم په اړه د ارقامو (داوبو-اوکتانول په مخلوط کې د ویش ضریب) پورې محدودیت لري. د 0.5 mg/kg په اندازه د موادو د مهاجرت په صورت کې د اعظمي ممکنه اخیستنې کچه یوازې $1 \mu\text{g/kg BW/day}$ ده. د دې لپاره درې د ميوتاجنيسيتي ټسټونه لازم دي.

د هغې پوهې پر بنسټ چې د توکسيکولوژيکي مطالعو څخه لاسته راغلي ده، په غذايي موادو علمي کمیتې د پلاستیک هغه مرکبات چې خوړو ته لارمومي په ګروپونو ویشلي دي. یوځل چې کافي معلومات لاسته راشي، د اخیستنې مسؤونه کچه بڼه اندازه کېدلای شي. د مستقیم غذايي اډیټیوونو لپاره د ADI په مقایسه دلته د Tolerable daily intake یا د TDI اصطلاح کارول کېږي. د پورته بحث شوي فرضيې یا نظرياتي دوي د مهاجرت حد چې د SML (specific migration limit) یعنې د مهاجرت ځانګړی حد هم نومېږي، ته تغیر شکل کوي (جدول ۴). د ځینو موادو لپاره په خوړو کې د اضافي انحصار او یا په موادو کې اعظمي مجازه اندازه یا QM تاسیس شوی ده. په ۱۹۹۱ کال کې نږدې ۱۲۰۰ مونومیرونه او ۱۰۰۰ غذايي اډیټیوونه د دې سیستم پر بنسټ طبقه بندي شوي دي.

د امریکا په متحده ایالتونو کې ځینې مواد چې له غذا سره تماس لرونکي موادو په توګه کارېدل د FDA (د قانون قدمه) پواسطه له قانون څخه مستثنی وګرځول شول. دا په دې معنی که چیرې نوموړي مواد شتون ولري، ټسټ ته یې په کلي ډول اړتیا نشته، دغه مواد سرطان تولیدوونکي ندي او یا د دوي کیمیاوي جوړښت د دې لامل نشي کېدلای چې په دوی باندې د سرطان تولیدوونکو اغیزو شک وشي. د پورتنی ټولموادو اندازه په خوړو کې باید له 0.5 ppb څخه تجاوز ونه کړي او د هغو فرضیاتو لاندې چې د امریکا په متحده ایالتونو کې پلې کېږي دغه اندازه له $1.5 \mu\text{g/day}$ سره سرخوري. د سرطان تولیدوونکي قدرت او جینوتوکسيکو فعالیتونو سره د غیرمضبوع مونومیرونو د خطر ارزونه یو ځانګړی مشکل دی. د دغه ډول مونومیرونو بېلګې له ۱،۳-، Acryl amide ، acrylonitrile ، Vinylidene chloride او butadiene ، vinyl chloride څخه عبارت دي د

دوی د کم ډوز د غیر رجعي او تراکمي اغیزو د لرلو له کبله د داسې موادو لپاره قدمه نشي ټاکل کیدلای. د عمومي اصولو په حیث د همدې لپاره د کمولو قواعد پلي کیږي چې د هغو په مطابق باید له تماس څخه مکمل مخنیوی وشي او که چیرې دا شونې نه وي، نو باید کارونه یې هرڅنګه چې ممکنه وي تر انحصار لاندې شي. دا په دې معنی چې په پلاستیک کې باید د داسې مونومرونو کچه باید د قبول شویو حساسو طریقو له لارې تراصغري کچې راتیټه کړل شي، هېڅ انتقال باید له دغه ډول پلاستیک څخه هغه غذاګانو ته صورت ونه نیسي چې له دوی سره تماس نیسي.

د خوړو سره چلند او د تیارولو طرز العمل

په پراخ مفهوم سره هغه مواد هم په غذايي ککړونکو کې شاملیږي چې په غذا کې د ځینو طرز العملونو او د تیارولو په ترڅ کې ځای نیسي. دغه ککړونکي له ځان څخه یولې توکسيکولوژیکي مسایل هم نسي. یوله دغو بیلګو چې په خوړو کې د سمی عکس العمل لامل ګرځي د نایتروجن کلورایدو پواسطه د اوږو درملنه ده (د اژین پروسه) کومه چې په پخوا وختونو کې مروج وه. د دغه رفتار سره د میتیونین سلفو کساماید کچه لوړیږي کوم چې په هغه سپیو کې چې دغه اوږه یې کارول، صرعې ته ورته اختلاجات پیدا کیدل. یو بل مثال چې د تغذیې عمله اغیزمنه کوي هغه د ترای کلورو ایتلین سره د سویابین د اوږو د خلاصه کولو په وخت کې د S-(۱،۲-dichlorovinyl)-L-Cysteine جوړیدل دي، کوم چې په غواګانو کې د خونریزی تشو شاتو او په پسونو او آسونو کې د خبیثې کم خونې لامل ګرځي.

د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې جوړ شوي تولیدات چې د ځینو طرز العملونو په ترڅ کې مینځ ته راغلي ووپه ۱۹۶۰ کال په هالنډ کې د ۱۰۰۰۰۰ څخه د ډېرو کسانو په جلدې التهاب د اخته کېدو مسئول وګڼل شول. د دغه تشوش نسبت د مارګرین

(Planta margarine) د نوې ورايتې يا نوعې مصرف ته کيږي او د مارگرين د مريضې په نوم ياده شوه، که څه هم د دې لاملونه په دقيق ډول روښانه ندي. په همدې ډول د غوړيو د گرمولو په وخت کې په شحمي اسيدونو کې د هايډروپراکسايډ او ايبوکسيډونو جوړېدل يو مشکل دی. په ډېرو تودو شوو غوړيو کې د نورو جوړو شوو موادو په څنګ کې د اکسيډيشن دغه محصولات په هغو لږ اتواري حيواناتو کې د سميت لامل وګڼل شول چې د سرو کرو غوړيو څخه ورکړل شوي وو. په هرحال انسان ته له دې کبله خطر ناڅيزه ده ځکه چې په سرو غوړيو کې تيارشوي خواړه کم مصرفيږي. د ځينو سختو حالاتو څخه پرته صرف کم مقدار د اکسيډيشن محصولات جوړيږي او د دوی له ډلې څخه ډير يې په کولمو کې د جذب څخه ډير تخريبيږي.

جدول ۴ د غذايي موادو لپاره د مونوميرونو او پلاستيکي اډيټيوونو د تحمل وړ ورځنۍ اخیستنه (TDI) او د ځانګړي انتقال حد (SML)		
مرکب	د تحمل وړ ورځنۍ اخیستنه يا کارونه ملی ګرام فی کلو ګرام د بدن وزن mg/kg body weight	د ځانګړي انتقال حد د خوړو او يا خوړو ته ورته موا په mg/kg
اکریلو نایتریل	--	د پیداکولو وړ نده (د ټاکلو کچه ۰.۰۲)
Bis(۲-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	۰.۰۰۵	۳
بيس فينول A	۰.۰۰۵	۳
۱،۳ بوتادايين	--	د پیداکولو وړ نده (د ټاکلو کچه ۰.۰۲)
کاپرولاکتام	۰.۲۵	۱۵
Di-η-octyltin	۰.۰۰۰۳ (د قلعي)	۰.۰۱۸ (د قلعي مرکبات)

مرکبات)	compounds	
۰,۱۲۵	تریتالیک اسید	۷,۵
۰,۰۱	تترهایدرو فوران	۰,۲
--	وینایل کلوراید	دپیدا کولو وړنده (دټاکلو کچه ۰,۰۱)
د SCF په واسطه تاسیس شوی		

د غوړیو بل تغییر شکل هغه وخت مینځ ته راځي چې نباتي پروتین چې له خامو موادو څخه لا یوه اندازه شحم لري د هایدرولیک اسیدو په واسطه هایدرولایز شي. هغه برخه گلیسرول چې په شحمو کې شتون لري تعامل کوي او کلوروپروپانول جوړوي کوم چې سرطان تولیدوونکې او میوتاجنیک خواص لري.

کله چې بورې ته په لوړه درجه حرارت کې تودوخه ورکړل شي په سوی قند بدلیږي. د امینواسیدونو یا امینونو په شتون کې د قندونو د کاربونیل ګروپ له امین سره تعامل کوي او مختلف مرکبات جوړوي کوم چې د خوړو د نسواري کیدو (Maillard reaction) لامل ګرځي. له دې نه علاوه د کامپلکس تعامل په امینواسیدونو کې د عدم توازن سبب کیږي او د پروتینو کیفیت راټیټوي، لکه ډیر امینواسیدونه او د هغه جملې څخه ضروري امینواسیدونه لکه لایزین بیا زړلاسته نه راځي. په هرصورت په غذایی رژیم کې د Maillard محصولات تر اوسه په توکسیکولوژیکي ډول ندي مشاهده شوي.

د غوښې د پخولو په دوران کې له امینواسیدونو څخه هتروسکلیک امینونه جوړیږي. دغه مواد له پایرولایټیک محصولاتو څخه عبارت دي کوم چې د Trp-p-۱, Trp-p-۲, Glu-p-۱, یعنی Imidazole او Aminopyridoindole او Glu-p-۲ او د متوسطه شرایطو لاندې او د کریټین په شتون کې aminoimidazoquinoline (IQ, MeIQ), Quinoxaline (MeIQ) او – Pyridine (PhIP) کیمیاوي جوړښت لري. دغه مرکبات قویاً متوتاجنیک

پوتنشیل لري او په مږو او مورکانونو کې د تغذي تجاریو بنوودلې ده چې دغه مواد سرطان تولیدونکي هم دي. د دغه موادو د هدف لاندې غړي له یښې او گېډې څخه عبارت دي.

له دې څخه وړاندې څو کره ایز اروماتیک هایډروکاربنونه (PAHS) لکه بنزواییرین هغه وخت تولیدیږي چې غوښه په غوړیو کې سره کرل شي او په ځانگړي ډول کله چې کباب یا بریاني شي، په دویم حالت کې په عمده ډول کله چې د غوړیو څاڅکي په اور کې لویږي. د توکسیکولوژي له لحاظه نسبت د دوی سرطان تولیدوونکو اغیزو ته باید محاسبه کرل شي. په عمومي توگه PAHS د غیرکامله سوزېدنې او د عضوي مرکباتو د پایرولایز په نتیجه کې مینځ ته راځي، دامواد په همدې ډول د دوی د فعال حضور اود وچولو په دوران (مستقیمه تودوخه) اود دود وهلي خوړو د تیارولو په دوران کې د خوړو د ککړتیا لامل گرځي.

په همدې ډول په خوړو کې مهم ککړونکي مواد N-Nitroso مرکبات دي کوم چې د پروسس شوې غوښې په محصولاتو کې په ځانگړي ډول د صباناري د مالگینې غوښې د پخولو په دوران کې د نایتريتو د ترشي او یا په خوړو کې د شته امینونو او یا امایدونو څخه لاسته راځي. تر ټولو مهم یې عبارت له N-Nitrosodimethylamine (NDMA)، nitrosodimethylamine او N-nitrosopiperidine څخه دي کوم چې د دوي د سرطان تولیدوونکو اغیزو له کبله د پام وړ گرځیدلي دي. په پخوا وختونو کې د NDMA مهمه سرچینه په کوره کې د اوریشود مالټ او نایتروجن اکساید د تماس څخه لاسته راته. له دې نه وروسته د بیرو ککړیدل چې متوسط حد یې $2-3 \mu\text{g NDMA/liter}$ او لوړ قیمت یې $28 \mu\text{g NDMA/Liter}$ سره معادل وو د تکنالوژیکي سنجش پواسطه راکم کرل شو (غیرمستقیمه تودوخه).

له دې څخه پرته د خوړو د تشعشع کولو پروسې هم ځینې توکسیکولوژیکي پوښتنې را پورته کړې. په خوړو د تشعشع د کیمیا او یو شمېر هغو تجربو چې پر تشعشع شوي خوړو ترسره شوې، د موندنو پر بنسټ نن ورځ داسې فرض شوې ده

چې په خوړو کې شته مرکبات د تشعشع په نتيجه کې ځانگړی توپير نه مومي. که څه هم لکه په نورو طريقو لکه په تودوخه ورکولو کې متغير محصولات په کم مقدار او په قسمي ډول پيژندل شوي دي.

له خوړو سره د سمې موادو غلطول او تقلب

د خوړو سره د ځينو محصولاتو چې غذا نه وي ځينې وختونه کولای شي چې د خطرناکه مسموميت د مينځته راتلو سبب شي. دغه حالت صرف په غلطۍ سره د سمې مرخپړيو او يا نباتاتو د خوړلو په نتيجه کې نه راځي بلکه د مثال په ډول د هغو دانو خوړل چې په فنجي وژونکو ککړوي د مسموميت لامل گرځي کوم چې په تېرو وختونو کې کله کله پېښيدل.

په ځينو کتابونو کې له لسو څخه په ډيرو برخو کې د سيمابو په مرکباتو، هکزاکلوروبنزين او يا تاليم سلفېټو باندې د ککړو دانو د مصرف راپور ورکړل شويده. په ځينو حالاتو کې دغو موادو څوزه خلک اغيزمن کړيدي. د ۱۹۷۱ او ۱۹۷۲ کلونو تر مينځ ژمي کې په عراق کې د هغو دانو د ډوډۍ د مصرفولو څخه چې په داسې فنجي وژونکو ککړې وې چې د سيمابو ميتايل يې لرل يوه غم گينه پېښه رامېنځته شوه. له ۲۵۰۰ څخه ډېر کسان روغتون ته وړل شوي وو او ۲۵۹ يې له مينځه لاړل. په همدې ډول او عين پراختيا د ۱۹۵۵ او ۱۹۵۹ کلونو تر مينځ په ترکيه کې يوکتلوي سميت رامېنځ ته شو. په دغه حالت کې غلې دانې د Hexachlorobenzene فنجي وژونکي پواسطه ککړې شوې وې. ځانگړي اعراض يې د جلدي سوروالي څخه عبارت وو.

په کانټينونو او رستورانټونو کې ډېر ځله پوډرته ورته خواړه (لکه شيډي اوسوډيم کلورايد) له هغو پستيسيدونو سره چې عين شکل ولري او يا په ځانگړي ډول له سوډيم فلورايد لرونکي، ژوونکو وژونکو (Rodenticides) سره په بياځلي ډول غلط شوي دي. دې ډول ته ورته پېښو له جملې څخه ترټولو بده يې په ۱۹۴۲ کال د اوربگان په يوه روغتون کې هغه وخت راپېښه شوه چې د سوډيم فلورايد پوډر د شيډو له پوډرو سره د هگۍ پخولو په وخت کې غلط شوی وو، ۲۲۳ کسان اغيزمن او ۴۷ يې مړه شول.

په ۱۹۸۴ کال په میسینگن کې هغه وخت د پام وړ او لوی سمیت را مینځته شو چې مگنیزیم اکساید کوم چې د حیواناتو د تغذي لپاره کارېږي د اور وژونکي PBB یا Polybromobiphenyl سره مغالطه شول. دغه مغالطه هغه وخت د پام وړ وگرځېده، کله چې د حیواناتو د شیدو کمیدل او د حیواناتو له مینځه تلل پیل شول. ککړې شوې شیدې د اوږد مهال لپاره مصرف شوې. ډېر فارم لرونکي څوک چې په مستقیم ډول اغیزمن شوي وو له ځانه یې د تسمم ښکاره نښې نښانې لکه د حافظې له لاسه ورکول، د عضلو کمزوري، سرخوږی او معدوي شکایات، ونښودل.

هغه غم جنه پېښه چې د ۱۹۸۱ کال په پسرلي کې په هسپانیه کې رامینځ ته شوه د سمی تېلو د سندروم په توګه تشریح شوه او نسبت یې د خوړو تقلب ته ورکول شو. د دغه ګډوډیو لمرني اعراض د موضعي سینه بغل سره تبه، په پوستکي داغونه، ځانګړې ایوزینوفلیا څخه عبارت دي او اکثراً وروسته بیا له شدیدې نیورومیوپاتي، د رګونو التهاب او د پوستکي د منظرې د انحراف یوې مزمنې مرحلې ته تغیر کوي. دغې پېښې نږدې ۲۰۰۰۰ کسان اغیزمن کړل کوم چې ۱۱۰۰۰ یې روغتون ته یووړل شول او له ۵۰۰ څخه یې ډېر له مینځه لاړل. په اپیدیميولوژيکي ډول د دغو اعراضو د څرګندېدو او د متقلبو غوړیو د مصرف په مینځ کې یوه ټینګه اړیکه شتون لري، کوم چې د Rapeseed د غوړیو چې د صنعتي موخو لپاره د انیلین پواسطه خراب شوي وو او په کوڅو کې خرڅیدل، د مصرف څخه وروسته مینځته راغلي وو.

د ایتایل الکولو سره د میتایل الکولو غلطیدل او یا په الکولیک مشروباتو کې په قصدي ډول د میتانول علاوه کول د ډېرو قربانیانو پواسطه صورت نېولی ده. د خالصو میتانولو وژونکی ډوز د ۳۰ څخه تر ۱۰۰ ملی لیټرو په مینځ کې راپور ورکړل شوی ده. لیکن سمې اغیزې یې په ځانګړي ډول د لیدلو ګډوډۍ او د دید له لاسه ورکول، وروسته د څوملی لیټره د مصرف څخه مینځته راځي. او په همدې ډول د ایتانولو اخیستل یې بې اغیزې کوي او دامشکله ده چې تثبیت کړل شي چې په مشروباتو کې د میتانول کوم غلظت صحي مشکلات رامینځته کوي. تر

۱۵۰mg/lit سپين شراب او ۳۰۰mg/lit سره شراب يعنې هغه حد چې د شرابو د نړيوال دفتر لخوا تضمين شوی دی او د مېوې په شرابو يا برانډي کې ۱۳,۵g/lit خالص الکول په اوسني وخت په اروپايي ټولنه کې اعظمي دزغم وړ کچې دي کوم چې بې خطر ه فکر کېږي. بل تقلب په شرابو کې د ايتلين گلايکول د اچولو څخه عبارت دی چې په اطريش کې اوس هم پيښيږي. که څه هم تر ۴۸g/lit غلظت پورې پيدا شويدي او د دای ايتلين گلايکول کمترین ډوز چې په بالغانو کې سمې اغيزې لري له ۳ څخه تر ۲ گرامه تخمين شوی ده بياهم هيڅ يوه پيښه د دغه تقلب شويو شرابو له مصرف څخه وروسته نده ترسترگو شوې.

په خوړو کې سرطان توليدوونکي مواد

په غذايي توکسيکولوژي کې مرکزي مشکل د هغه خطراتو ارزونه ده چې په خوړو کې د سرطان توليدوونکو موادو له شتون څخه مينځ ته راځي. دا په يوه خوله او په اتفاق فرض شوېده چې د سرطان د توليد خطر د خوړو پواسطه اغيزمن کېږي. Doll او Peto (۱۹۸۱) د نظريې بنسټ د امريکا په متحده ايالاتو کې ۳۵٪ سرطاني مرگونه د خوړو له کبله دي. که څه هم تر ټولو مهم د خطر فکتورونه عبارت له ډېرو خوړو، په لوړه کچه د غوړيو مصرف او نور په غذايي رژيم پورې تړلي موضوعات دي، ولی سوال دا دی چې ايا هغه سرطان توليدوونکي مواد چې له خوړو سره يوځای اخيستل کېږي هم د سرطان د پرمختيا نسبت ورکول کېږي که نه.

هغه مواد چې په حيواني تجربو کې سرطاني ثابت شويدي د خوړو طبعي برخه ده يا ملوث کوونکي دي، يا پاته شوني دي او په ځينو حالاتو کې خوړو ته ورعلاوه کړل شويدي. د روغتيايي مشکلاتو او د دوی د خوړنې ترمينځ اړيکه له يوې مادې څخه تر بلې مادې، د تجربې لاندې مادې د عمل په ميکانيزم او د سرطان توليدوونکي قدرت او همدارنگه د اخيستلو په کچه پورې اړه لري.

اوس په دې کې کوم جنجال نشته چې الکوليک مشروبات سرطاني پوتنشيل لري. اپيډيميولوژيکي شواهد په ډېرېدو دي چې نه صرف په پام وړ کچه د الکولو

څخه سوء استفاده د سرطان د مینځته راتلو لامل ګرځي بلکه نسبتاً د ټیټې کچې الکولو مصرف هم له ځان سره نوموړي خطرونه لري. که څه هم د ایټایل الکولو سرطان تولیدوونکې خاصیت تراوسه په تجربوي ډول ندی ثابت شوی.

له دي سره سره په خوړو کې د سرطاني موادو د شتون او په انسانانو کې د سرطان د پېښو تر مینځ اړیکه روښانه او په ځینو ځانګړیو حالاتو کې د باور وړ ګرځیدلې ده. دغه حالت د B۱ له افلاتوکسین سره کوم چې د ینی (جیګر) له سرطان سره اړیکه لري په ځینو حاره هیوادونو کې چې خواړه له مرخپړیو سره یوځای او یا په افلاتوکسین ککړ خواړه مصرفیږي، ډېر لیدل کیږي. په همدې ډول د بالکان په هیوادونو کې د اوکراتوکسین A په لوړه کچه اخیستل هم د پښتورګو د تومورونو د انډیمیکې نیوروپاتي لامل بلل شوی ده. په خوړو کې د N-Nitroso مرکباتو په لوړه کچه شتون هم په ځینو اسیایي هیوادونو کې د تومورونو د پېښو (دمری او د معدې سرطان) د ډېرېدو لامل بلل شوی دی. اماتراوسه په ډیر ټیټ ډوز او د ککړې شوې سیمې څخه د باندې د سرطان د پرمختیا او د دغه موادو تر مینځ کومه د پام وړ اړیکه نده لیدل شوې.

د توکسیکولوژیکي خطرونو د ارزیابی لپاره په اصولو کې د جینوتوکسیک او غیر جینوتوکسیک سرطان تولیدوونکو تر مینځ باید یو توپیر وشي. د جینوتوکسیک سرطان تولیدوونکو لپاره د قدمې ډوزنه شي ټاکل کیدلای چې هریو یې د میتابولیکي فعالیتونو وروسته د حجرو له جنیټیکي موادو سره تعامل کوي او له همدې کبله تومور جوړېدنه پیلېږي. په هر حال لکه د نورو موادو په څېر دوی هم په ډوز پورې اړه لري. د دوی د خطر د پوتنشل پراخوالی کیدای شي چې د ورځني مصرف او TD_{۰۱} (هغه ورځنی مقدار چې د ۰.۵٪ تومورونو د پېښو لامل ګرځي) تر مینځ د پرتلې، کوم چې په تجربوي حیواناتو کې ټاکل کیږي، یا د سرطاني پوتنشل د نورو محاسبو پواسطه، او د ترټولو کم سرطاني اغیزې لرونکي ډوز (LOEL, Lowest observed effect level) پواسطه ښودل کیږي.

داسې پرتلې (شکل ۵) ښيي چې د مصرف ورځنۍ کچه يې په پام وړ ډول پر تجربوي حيواناتو ترسترگوشي اغيزناک ډوزڅخه کمه ده. د بېلگې په توگه د پروټين څخه په غني پخو خوړو کې د هتروسیکليک اروماتیک امينونو اخيستنه د بدن د وزن په حساب په ورځني ډول $1.5 \mu\text{g/kg BW/day}$ ده. که څه هم دغه اخيستنه د نورو جينوتوکسيکو سرطان توليدوونکو په پرتله په نسبي ډول لويه ده، او د دغه گروپ د موادو د TD₀₁ د اصل مفهوم په پرتله د ۵۰۰۰ عدد د ضريب اندازه کمه ده، کوم چې په موږکانو کې د بدن دوزن په حساب په ورځني ډول $8000 \mu\text{g/kg BW/day}$ ده. کله چې د ترټولو کم اغيزناک ډوز سره پرتله شي بې له شکه چې لږ دی د بېلگې په توگه د امريکا په متحده ايالتونو کې له موم پليوڅخه د افلاتوکسين B₁ ورځنۍ اخيستنه، $0.25 \text{ ng/kg BW/day}$ ده نو د همدې لپاره د 50 ng/kg BW/day ډوز څخه، کوم چې په روښانه ډول په موږکانو کې سرطان توليدوونکی تشبث شوی ده، ۲۰۰ چنده کم يا د ۲۰۰ فکتور يا ضريب په اندازه کم ده. له دې څخه ها خوا د اوکراتوکسين A لپاره د ترټولو ټيټ روښانه سرطان توليدوونکي ډوز او په خوړو کې د مينځني مصرف ترمينځ فکتور يا ضريب ۸۰۰۰ او د بنزوپيرين لپاره ۳۷۰۰۰ دی. بنزوپيرين چون د نورو څو کره ايزو اروماتیک هايډروکاربنو سره يو ځای وجود لري نو د همدې لپاره د دغه موادو مجموعي مصرف په روښانه ډول لوړ دی.

جدول ۵: له خوړو څخه د جينوتوکسيک سرطان توليدوونکو موادو اخيستل (خوړل)		
مرکب	ورځنۍ اخيستل (DI)	NOEL
	($\mu\text{g/kg/day}$ د بدن وزن)	($\mu\text{g/kg/day}$ د بدن وزن)

٨٠٠	١٠٥	هټروسيکليک اروماتيک امينونه
(مينځنۍ TD _{٥٠} په موډکانوکې) TD _{٥٠} /DI		
١٠٠	٠٠٠٢	ايتايل کاربامات
	a٠٠٢	
٨	٠٠٠٨	نايتروздаي ميتايل امين
١٥٠	٠٠٠٠٤	بنزو اپيرين
٧٠	٠٠٠٠٩	اوکراتوکسين A
٠٠٠٥	٠٠٠٠٢٥	افلاتوکسين B
a د زړو لرونکو ميوو د شرابو د ٥٠ ملی ليتره لږ مصرف په شمول		

له جينوتوکسيک سرطان توليدوونکو څخه پرته په خوړو کې ځينې سرطان توليدوونکي شتون لري چې جينوتوکسيک ندي او يا دويمې جينوتوکسيک اغيزې لري (جدول ٢). دغه مرکبات د حجرې له جنيتيکي موادو سره تعامل نه کوي او نه په خپله جينوتوکسيک موادو ته اوړي. د دوی تاثير د نورو ميکانيزمونو پر بنسټ صورت نيسي لکه د نارمل حجراتو د تکثر تعجيل، د حجراتو سميت او د اکسيجن د راډيکولونو رامينځته کيدلو څخه عبارت دي. يو ځل چې د دغه لمړنيو اعراضو لپاره د قدمې يا شروع ډوز وټاکل شي نو بيا د دويمې نوموړ جوړېدنې لپاره NOELs لاسته راځي. ځينې لمړنۍ اغيزې چې ډېرې يا ډيرې په مزمن ډول د زايليتول يا تيريپتالک اسيدو د تطبيق څخه وروسته د مثاني د تيرو جوړېدل، د نارينه موډکانو د پښتورگو په تيوبولونو کې د d-limonene پواسطه د α - μ -globulin تراکم (Hyalin droplet nephropathy) او د di(2-ethylhexyl) adipate(DEHA) او ethylhexyl phthalate(DEHP) پلاستيسيزرونو له کبله د زياتو اکسيجنې راډيکولونو له جوړېدا وروسته د

Peroxisomes د تکره له مینځ ته راتللو څخه عبارت دي. یو ځل چې د دې موادو NOELs وپېژندل شو او یا دا چې د اړونده عمل مېکانیزم په انسانانو کې تطبیق نه شي نو دا اخیستنې د تحمل وړه دوز د مناسب او مصوونه فکتورونو د یو ځای کولو وروسته لاسته راټلای شي. په دې ډول د d-limonene (چې ADI یې مشخص ندی) او د سکرین (0.5 mg/kg BW/day) لپاره، ADI پرغذایي اړتیاووونو باندې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو د ګډې کمیتې لخوا تثبیت کړل شو. د DEHP لپاره د اروپایي ټولنې د غذایي موادو د علمي کمیتې لخوا د TDI قیمت، 0.5 mg/kg BW/day ټاکل شوی دی.

جدول ۲: له خوړو څخه د غیر جینو توکسیک سرطان تولیدوونکو موادو اخیستل (خوړل)	
مرکب	ورځنۍ اخیستل (DI) NOEL NOEL/DI ($\mu\text{g/kg/day}$ د بدن وزن) ($\mu\text{g/kg/day}$ د بدن وزن)
کافیک اسید	$\sim 10^2$
d-لیمونین	$\sim 10^2$
سکرین	7.5×10^2 (LOEL) 3×10^2
DEHP	3×10^1
TCDD	1.3×10^{-1}
	(TCDD معادل)

مركباتو په ډله پورې اړه لري چې جینو توکسیک خاصیت نلري. د هغه څه پر بنسټ Dibenzo-furans او Polychlorinated dibenzo-p-dioxins هم د هغه

چې د ارایل هایډروکاربن په آخډو اړونده د عمل د میکانیزم پورې اړه لري، دوی له ځانه نوموړته انکشاف ورکونکو په توګه پیژندل شوي دي د کومو لپاره چې باید د قدمې یا د پیل قیمت موجود وي. د دوی د فوق العاده لوړ سرطان تولیدوونکي پوتنشل له کبله د دوي د NOELs قیمت ډېر زیات کم دی، د بیلګې په توګه د TCDD په صورت کې نوموړی قیمت $0.001 \mu\text{g/kg BW/day}$ دی. د دغه NOEL او د حفاظتي کارول شویو فکتورونو پر بنسټ د TCDD لپاره د تحمل وړ کچه د $1-10 \text{ pg/kg BW/day}$ په شاوخوا کې تثبیت شوې ده.

د اصطلاحاتو توضېحنامه

Acceptable daily intake: هغه کچه مواد چې په ورځني ډول لکه پوستکي او يا تنفسي سيستم بدن ته داخليږي.

Adenomas: د غدواتو د سالم تومورونو څخه عبارت دی

Aging: لغوی معنی يې زړېدل دي ، ولی د پستيښوونو په توکسيکولوژي کې پر هغه حالت دلالت کوي کله چې پر استایل کولین استراز نېستی ارگانو فاسفیت د الکایل دواړه گروپونه له لاسه ورکوي.

Alkylating Agents: هغه مواد دي چې پر کيمياوي موادو د الکایل گروپ (میتایل ، ایتایل ، پروپایل او داسې نور) نصبوي.

Animal venoms: وينوم له هغه زهري موادو څخه عبارت دي چې حيوانات لکه مار ، لږم او غنې بې له ځان څخه د چيچلو په وخت کې آزادوي.

Asymptomatic: له هغه حالت څخه عبارت ده چې مرضي اعراض په کې نه لیدل کېږي.

Carcinogenictiy: د یوې مادې له سرطان تولیدوونکي خاصیت څخه عبارت دی.

Codex Alimentarius: له هغه رسمي سند څخه عبارت دی چې د خوړو د پروسس ، تولید ، ساتنې ، کنترول او کارونې په اړوند ټول اړخونه څیږي.

Cortalidae: د مارانو یوه ځانگړې کورنۍ ده چې پوستکۍ یې سرې او ژیرې پټې لري.

Crinotoxic: له هغه حیواناتو څخه عبارت دي چې خبل زهر د پوستکي له لارې آزادوي.

Cross link: هغه پدیده ده چې عضویت پر یوې مادې د بلې فکر کوي لکه معافیتي سیستم کله کله یوه فزیولوژیکي ماده د انتی جن په توگه غلطوي.

Depolarization: د پوتنشیل د عمل دلمړۍ مرحلې څخه عبارت ده چې په هغه کې د سودیم آیون نیورون ته ننوزي او داخلي چارج لوړوي.

DNA replication: هغه فزیولوژیکی پروسه ده چې په هغه کې د DNA له مالیکول څخه کاپی اخیستل کېږي یعنې یو مالیکول DNA په دوه عین مالیکولونو اوږي.

G compounds: یو ډول سمی فاسفیت لرونکي مواد دي چې په اعصابو کې د کولین استراز انزایم نهی کوي.

GABA: چې د گاما امینو بیوتاریک اسید لنډیز دی او یو انحطاطي نیورو ترانس میتر دی چې د عصبي سیالې د کنترول مخنیوی کوي.

Gastropoda: هغه ډول حشرات دي چې په گېډه کې پښې لري.

Generally recognized as safe (GRAS): له هغه کیمیاوي موادو څخه عبارت دي چې په هکله یې داسې فکر کېږي چې زهرجن نه بلکې مصون دي.

Grouper: یو ډول ماهي دی چې د گرمو سیمو په اوبو کې ژوند کوي او د سیگو اتیراتوکسین په نوم زهري مواد لري.

GSH: د گلو تاتیون د دری امینو اسیدو (گلو تامیک اسید، سیستین او گلا یسین) لرونکي پپتاید لنډیز دی په عضویت کې یو ساتونکی رول لوبوي او هغه اکسیدانت مواد چې د نکروز لامل ګرځي ارجاع کوي.

Hemagglutinin: هغه مواد دي چې په وینه کې د سرو کریواتو د نښلیدو لامل ګرځي، چې په ځینې معافیتي حالاتو کې رامینځ ته کېږي.

Hematuria: هغه پتالوژیک حالت دی، چې په تشو متیازو کې د وینې سره کریوات شتون ولري.

Heme: د وینې غیر پروتیني برخه ده چې د اوسپنې ایون لري.

Hepatitis: هغه پتالوژیک حالت ده چې ینه د کیمیاوي سمی یا بیولوژیکي لاملونو له کبله پر التهاب اخته کېږي.

Hexose monophate shunt: هغه بیوشیمیکی پروسه ده چې په هغه کې NADPH او پنتوز قند مینځ ته راځي.

Hydrophiids: هغه زهري ماران دي چې په اوبو کې ژوند کوي او نور بحري حیوانات ګواښي.

Immunosuppression: هغه پروسه چې معافیتي سیستم په کښې خپل کيږي او په فزیولوژیک ډول فعالیت نه شي کولای.

Itai-Itai: ایتای یوه جاپانی اصطلاح ده چې د سخت درد معنی لري، او توکسیکولوژي له مخې د کډمیم له سمیت څخه عبارت ده کوم چې په جاپان کې یی د ۱۹۱۲ په شاوخوا کې په کتلوي ډول د پښتورگو او هډوکو یو غښتلی سمیت رامینځ ته کړل.

JEFCA: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives د خورواو کرني د تنظیم (FAO) او نړیوال روغتیا یی پروگرام (WHO) په غذایی اډیتيووونو د متخصصینو د کمیټې د مشترکو کارپوهانو ډله چې تل پر غذایی اډیتيووونو کار او څېړنې کوي.

LD: هغه مقدار کیمیاوي مواد دي چې د لابر توارې حیواناتو د مړینې لامل ګرځي. LD_{۵۰}: هغه مقدار کیمیاوي مواد چې د پنځوس سلنې لابر توارې حیواناتو د مړینې لامل ګرځي.

Lowest observed effect level (LOEL): دیوی سمی مادي هغه تر ټولو کمه کچه چې له ځانه هیڅ ډول سمی اغېز نه لري.

Mandarke: یو ډول بوټی دی چې خلاصه یی مقوی جنسی خاصیت لري. Man-of-war: یو ډول سمی خطرناک او وینښته لرونکی کب دی، نوموړی وینښتان هستامین او حساسیت تولیدوونکي مواد لري.

Mast cell degranulating peptide (MCDP): دوه ویشتمو امینواسید لرونکی پپتاید دی چې د گبینو د موچيو په زهرو کې شتون لري، د ماسټ حجرات تخريبي او هستامین ترې ازادوي او همدارنګه مرګي تولیدوونکی او فشار ټیټوونکی ځانګړتیاوې لري.

Mediastinum: په سینه کې د دواړو سږو په مینځ کې له هغې برخې څخه عبارت ده، چېرې چې د مری، زړه، حجاب حاجز او د واګوس اعصاب پراته دي.

No observed effect level: هغه کچه کیمیاوي مواد چې وروسته له مصرفولو هیڅ ډول اغېز له ځانه نه ښیي.

Organophosphate-induced delayed polyneuropathy: هغه عصبي مشکل چې د ارگانوفسفیتونو د سمیت په پایله کې رامینځ ته کیږي. په دې حالت کې د NTE (Neuropathic Target esterase) په نوم انزایم نهی کیږي. کوم چې لیزولیسیتین له مینځه وړي او د نیورونو د میالین له ویجاړتیا څخه مخنیوی کوي.

Osteomalacia: د ناقص منرالایزیشن په پایله کې د هډوکو نرمېدل چې د کلسیم او فاسفورس د کمبود له کبله رامینځ ته کیږي. Oxidative stress: هغه حالت بیانوي چې په عضویت کې د تجمض کوونکو موادو کچه لوړه شي او ارجاع کوونکي مواد لکه ویتامین سي، گلوتاتیون او نورو نه کولای شي چې دغه حالت جبران کړي.

Paracelsus: د هغه سویسی عالم نوم دی چې د عصري توکسیکولوژي پلار ګڼل کیږي، او په لمړي ځل یې د زهر او درملو تر مینځ د توپیر لامل، دوزو ګاڼه. Pest.Pesticides: یوه لاتیني کلمه ده چې د مضر یا خطرناک معنی لري، نو له همدې کبله هغه مواد چې مضره ژوي او بوټي له مینځه وړي د پستیسیډ په نوم یادېږي ځکه چې د حشراتو، مورګانو او بېکاره بوټو پر ضد کارول کیږي. Procaryote: هغه حجرات چې پر مختګ یې نه وي کړی او هستې نلري. اکثره یې یو حجروي دي لکه د بکتریاوو حجرې.

Provisional Tolerable Weekly Intake(PTWI): د کیمیاوي موادو له هغه او نیز موقتي دوز څخه عبارت دی چې په مقابل کې یې شخص یا لابراتواري حیوان زغم نشي. بالعموم د هغه موادو لپاره کارول کیږي چې په بدن کې ذخیره کیږي او ځکه ورته موقتي ویل کیږي چې له نوموړو شمېرو څخه نتیجه اخیستنه د دایمي پایلو سره صدق نه کوي.

Rapeseed: په انګلیسي کې شپښم ته ویل کیږي. RNA polymerase: هغه انزایم دی چې د RNA مالیکولونه پولیمیرایز کوي. RNA Synthetase: د RNA د مالیکول په جوړولو کې کمک کوي.

SML(specific migration limit): یا د انتقال ځانګړی حد ، له هغه مقدار کیمیاوي مادې یا دیو ډله کیمیاوي موادو څخه عبارت دی چې په خوړو کې انتقال مومي.

Sublethal: له هغه ډوز څخه عبارت دی چې له وژونکي ډوز څخه کم وي.
Tachyphylaxia: له هغې فارمکولوژیکي پدیدې څخه عبارت ده چې یوه دوا د بیا ځلي تکرار له امله خپل اغېز له لاسه ورکوي.
Teratogenicity: د کیمیاوي موادو له هغه ناوړه اغېزو څخه عبارت ده چې پر جنین یې له ځان څخه پریږدي.

Terrestrial Animal: هغه ژوي چې په وچه کې ژوند کوي.
Tonoclonic: له هغه ډول اختلاجاتو څخه عبارت دي چې ټول ځان له پوښښ لاندې نیسي.

Toothpickweed: غاښ ټومبونکي وښو ته ویل کیږي.
William Shakespear's Macbeth: هغه تراژیدیکه پېښه ده ، چې د شکسپیر په واسطه د هغه چا په هکله بیان شوې ده چې د څوکی د نېولو لپاره شاه وژني او بیا د خپل قدرت د زیاتولو لپاره نور کسان هم له مینځه وړي.
Woolster's disease: د انتراکس له ناجوړي څخه عبارت ده چې د انتراکس د باسیل د سپورونو سره د خوړ شوي پوستکي د تماس په پایله کې رامینځ ته کیږي.



مننه او کور ودانی

د افغانستان ملي تحریک له هېواد پال او فرهنگپال شخصیت
بناغلي (ډاکتر زلمي خان احمدزي) څخه د زړه له تله مننه کوي چې د
دې اثر چاپ ته يې اوږه ورکړه. ملي تحریک وياړي چې د علمي اشارو
د چاپ لړۍ يې پيل کړې ده. دا لړۍ به دوام لري. موږ له ټولو درنو
هېوادوالو څخه په خورا درنښت هيله کوو چې په خپل معنوي او
مادي وس د کتابونو د چاپ دا لړۍ لا پسې وغځوي.

يو ځل بيا ددې اثر له ژباړونکي او چاپوونکي څخه د زړه له تله مننه
کوو چې ددې اثر د ژباړلو او چاپولو جوگه شول.

په فرهنگي مينه

د افغانستان ملي تحریک

TOXICOLOGY

Translated By:
Abdul Karim Totakhel

د خپرونو لړۍ: ٦١



د افغانستان ملي تحریک
www.melitahrik.com

Thank you for reading

Find more e-books and articles on Ketabton - your multilingual digital library.

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English