



د پوهنې وزارت

د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو د روزنې او

د ساینس مرکز معینیت

د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د

تألیف لوی ریاست

د ښوونکي کتاب

د کیمیا د تدریس لارښود

یوولسم ټولگی



د پوهنې وزارت
د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو د
روزنې او د ساینس مرکز معینیت
د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي
کتابونو د تألیف لوی ریاست

کیمیا

یوولسم ټولگی



Ketabton.com

د چاپ کال: ۱۳۹۰ هـ. ش.



د پوهنې وزارت

د تعلیمي نصاب د پراختیا، د ښوونکو د روزنې او د ساینس مرکز معینیت

د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تألیف لوی ریاست

د ښوونکي کتاب

د کیمیا د تدریس لارښود

یولسم ټولگی

د چاپ کال: 1392 هـ. ش.



ليکوالان:

- پوهندوي ديپلوم انجينير عبدالمحمد عزيز
- مولف عتيق احمد شينواری د تعلیمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف د رياست علمي غړی

علمي او مسلکي ايډيټ:

- پوهندوي ديپلوم انجينير عبدالمحمد عزيز

د ژبې ايډيټ:

- مولف محمد قدوس زکو خيل د پښتو څانگې علمي غړی

دیني ، سياسي او کلتوري کمیټه:

- حبيب الله راحل د پوهنې د وزارت سلاکار د تعلیمي نصاب د پراختيا په رياست کې.
- مولف ليلي ساير د ديني علومو علمي غړی

د څارنې کمیټه:

- دکتور اسدالله محقق د تعلیمي نصاب، د ښوونکو د روزنې او د ساينس مرکز معين
- دکتور شير علي ظريفي د تعلیمي نصاب د پراختيا د پروژې مسؤل
- د سرمؤلف مرستيال عبدالظاهر گلستاني د تعلیمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوی رئیس.

کمپوز: ربیع الله اکبري او احمد طارق سلطانزی

طرح او ډیزاین:

حمید کریمی سنجد دره يي

د چاپ د سمون چارې: محمد کبير حقميل د پوهنې وزارت د نشراتو او اطلاعاتو رئیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ملي سرود

دا وطن افغانستان دی	دا عزت د هر افغان دی
کور د سولې کور د تورې	هر بچی یې قهرمان دی
دا وطن د ټولو کور دی	د بلوڅو د ازبکو
د پښتون او هزاره وو	د ترکمنو د تاجکو
ورسره عرب، کوچري دي	پامېریان، نورستانیان
براهوي دي، قزلباش دي	هم ایماق، هم پشه یان
دا هیواد به تل ځلیري	لکه لمر پر شنه آسمان
په سینه کې د آسیا به	لکه زړه وي جاویدان
نوم د حق مودی رهبر	وایو الله اکبر وایو الله اکبر

بسم الله الرحمن الرحيم

د پوهنې د وزیر پیغام گرانو استادانو او ښوونکو،

ښوونه او روزنه د هر هېواد د پراختیا او پرمختګ بنسټ جوړوي. تعلیمي نصاب د ښوونې او روزنې مهم توکی دی چې د علمي پرمختګ او ټولنې د اړتیاوو له مخې چمتو کېږي. څرګنده ده چې علمي پرمختګ او ټولنیزې اړتیاوې تل د بدلون په حال کې وي. له دې امله لازمه ده چې تعلیمي نصاب هم د وخت له غوښتنوسره سم علمي او رغنده پراختیا ومومي. البته نه ښایي چې تعلیمي نصاب د سیاسي بدلونونو او د اشخاصو د نظریو او هیلو تابع شي.

د ښوونکي د لارښود د کتاب چې نن ستاسو په لاس کې دی، پر همدې بنسټ چمتو او ترتیب شوی دی. د تدریس د نویو میتودونو له مخې فعالیتونه او معلوماتي مواد په کې وړزیاات شوي دي چې په ډاډ سره به د زده کړې په بهیر کې د زده کوونکو د فعال ساتلو لپاره ګټور او اغېزمن وي.

هیله من یم د دې کتاب منځپانګه، چې د فعالې زده کړې د میتودونو د کارولو له لارې تالیف او چمتو شوې، ستاسو درنو استادانو د ګټې وړ وګرځي. له فرصت څخه په استفادې د زده کوونکو له میندو او پلرونو څخه غوښتنه کېږي د خپلو لوڼو او زامنو په باکیفیته ښوونه او روزنه کې پرله پسې مرسته وکړي چې په دې توګه د پوهنې د نظام موخې او هیلې ترسره شي او ځوان نسل او هېواد ته ښې پایلې او بریاوې ور په برخه کړي.

زموږ گران استادان او ښوونکي د تعلیمي نصاب په رغنده پلي کولو کې ستره دنده او دروند مسؤلیت لري.

د پوهنې وزارت تل زیار کاږي چې د پوهنې تعلیمي نصاب د اسلام د سپېڅلي دین له بنسټونو او ارزښتونو، د ټولنې د څرګندو اړتیاوو، ملي ګټو او وطنپالنې له روحیې او د ساینس او تکنالوژۍ له نوو علمي معیارونو سره سم پراختیا ومومي.

ددې سترې ملي موخې د تر لاسه کولو لپاره د هېواد له ټولو علمي شخصیتونو، د ښوونې او روزنې له پوهانو او د زده کوونکو له میندو او پلرونو څخه هیله لرم چې د خپلو نظریو او رغنده ګټورو وړاندیزونو له لارې زموږ له مؤلفانو سره د درسي او د ښوونکي د لارښود د کتابونو په لا ښه تالیف کې مرسته وکړي.

له ټولو هغو پوهانو څخه، چې ددې کتاب په چمتو کولو او ترتیب کې یې برخه اخیستې او همدارنګه له ملي او نړېوالو درنو موسسو او نورو ملګرو هېوادونو څخه، چې د نوي تعلیمي نصاب په چمتو کولو او تدوین او د درسي او د ښوونکي د لارښود کتابونو په چاپ او وېش کې یې مادي یا معنوي مرسته کړې ده، مننه او درناوی کوم او د لا نورو مرستو هیله یې لرم.

ومن الله التوفيق

فاروق وردک

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې وزیر

لړلیک

مخ	سرلیک
1	د ښوونکو لپاره اړین معلومات
2	د ښوونکي لارښود
3	د افغانستان د پوهنې ښوونیزه او روزنیزه پالیسي
4	په افغانستان کې د ښوونې او روزنې عمومي موخې (هدفونه)
7	د تدریس ستراتیژي
9	ارزول (Evaluation)
10	د تدریس د ستراتیژيو ډلبندي
13	د مضمون د تدریس لارښود
14	لومړۍ څپرکي: محلولونه
18	د محلولونو تعریف
22	د محلولونو اجزاوي
24	مشبوع او غیر مشبوع محلولونه
27	ایوني محلولونه
30	د محلولو غلظت
33	د مولاريتي غلظت
35	د نارمليتي غلظت
38	دویم څپرکي: د محلولونو خواص
42	د محلولونو کولیگاتیف خواص
45	داسموس عملیه او اسموتیک فشار
49	د حل شوي مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټدل
52	د محلولونو د ایشیدو د درجې لوړیدل
55	د محلولونو د کنگل کیدو د درجې ټیټدل
58	الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه
62	ضعیف او قوي الکترولیت محلولونه
66	درېم څپرکي: د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا
70	د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا
75	د کیمیاوي تعاملونو د چټکتیا اندازه کول
80	د کیمیاوي تعاملونو په چټکتیا باندې اغیز من لامل
93	د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملونو باندې
86	د اړهینوس معادله
89	د Collision نظریه یا د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه

92	کتلستونه
95	څلورم څپرکی: کیمیاوي تعادل
101	رجعي تعادل او د تعادل حالت
105	کیمیاوي تعادل
105	د کتلې د عمل قانون
111	په تعادل کې اغیزمن عاملونه، د غلظت اغیزه
115	د حجم بدلونونه یا د فشار اغیزه، د تودوخې اغیز، د کتلست غیزه
118	ایوني تعادل، د اوبو تولیدونه، د ایونایزیشن ثابت
120	دگډوډ (یوځای) ایون اغیزه
123	په تعامل کې محاسبې، د امونیا د تولید په صنعت کې د کیمیاوي تعادل په پام کې نیولو اهمیت
126	پنځم څپرکی: د تیزابونو او القلي اوبلن محلولونه
133	د تیزابونو او القليو تعریف
137	د گیلبرت لیویس د نظریې پر بنسټ د تیزابونو او القليو تعریف
141	د اوبو تیزابي او قلوي خواص
144	د تیزابیت معیار - pH
147	د تیزابونو او القليو قوت
150	کمزوري او قوي تیزابونه، کمزوري او قوي القلي
153	د کمزورو تیزابونو ټوټه کیدل
157	د ایونایزیشن سلنه، د ټوټه کیدو ثابتونه او د القليو ایونایزیشن
159	شپږم څپرکی: د تیزابونو او القليو تعاملونه
162	د تیزابونو او القليو تعاملونه او د مالگو جوړیدل
165	د تیزابونو تعاملونه له فلزونو سره
167	د تیزابونو او القليو دخنثی کولو تعاملونه
170	د عضوي تیزابونو تعاملونه له القليو سره، خنثی جوړونه او تودوخه
173	تیتريشن، د تیتريشن معرفونه
177	اووم څپرکی: له کیمیاوي تعاملونو څخه د بریښنا تولید
181	د بریښنا تیروونکي او نه تیروونکي
184	کیمیاوي تعاملونه چې د بریښنا د رامنځته کیدو لامل ګرځي
188	کیمیایي بریښنايي پیل
191	د پیل محرکه قوه، دستندرد الکتروډ پوتنسیال
193	وچ اولانده پیلونه، د سوځیدو پیل، د پیل په ولتاژ باندې د غلظت اغیزې
195	اتم څپرکی: بریښنايي تجزیه
199	الکترولیتیکي پیلونه، د ویلي شوې خوړو مالګې الکترولیز

202	په اوبلنو چاپېريالونو کې د الکترولیز تعاملونه
206	د خوړو مالګې الکترولیز
209	د سلفوریک اسید د محلول الکترولیز
214	د ځمکې لاندې فلزي کتودونو ساتنه او ملمع کول
217	دالکترولیز مقداري قانون یادفاري قانون، تخلیص (نگه) کول، رالیسته اودفلزونو تولید
220	نهم څپرکی: فلزونه
227	دفلزونو دلاسته راوړ لو لاره
230	دلومړي اصلي گروپ فلزونه
232	سودیم
235	د دویم اصلي گروپ عنصرونه
238	کلیسم
240	د دریم اصلي گروپ عنصرونه، المونیم
244	انتقالي فلزونه، اوسپنه
248	مس، کرومیم
252	لسم څپرکی: غیر فلزي عنصرونه
256	د غیر فلزي عنصرونو ځانګړي خصوصیات، د اووم گروپ عنصرونه
261	کلورین
265	د شپږم اصلي گروپ عنصرونه، اکسیجن
269	سلفر
271	د پنځم اصلي گروپ عنصرونه، نایترجن، فاسفورس
275	د څلورم اصلي گروپ عنصرونه، کاربن
279	یوولسم څپرکی: د شبه فلزونو عناصر
283	د شبه فلزونو د عنصرونو جوړښت او خواص، د بور عنصر
286	د بورون مرکبونه
288	د بورون فلوراید جوړښت، د بورون هایدرایډونه
292	سلیکان عنصر، سلیکان اکساید
295	د سلیکان ډای اکساید کیمیاوي خواص، سلیکان هایدراید

د ښوونکي لپاره اړين معلومات

درنو ښوونکو:

په دې څپرکي کې ستاسو د پوهې د لوړلو او معلوماتو د زیاتولو لپاره یو لړ اصطلاحگانې او ګټور مطالب راوړل شوي چې لوستل یې تاسې ته اړین بلل کېږي.

ښوونیز یا تعلیمي نصاب څه شی دی؟

په دې اړه چې تعلیمي نصاب څه شی دی، یې شتون لري بېلابېلې نظر لري، څوک یې درسي مفردات ګڼي او څوک یې درسي کتاب بولي. د ښوونې او روزنې پوهانو یې هم بېلابېل تعریفونه کړي دي. ښوونیز یا تعلیمي نصاب هغه لارښود هم دی چې د ښوونې او د هغوی روزنې ټول فعالیتونه پکې شامل او تر لاسه کول یې موخه ده.

تعلیمی نصاب له ټولو ټاکل شوو پوهې، مهارتونو او ذهنیتونو څخه عبارت دی چې یوه تعلیمي موسسه یې زده کړه د خپلو زده کوونکو لپاره په پام کې نیسي، په بله وینا تعلیمي نصاب د یوې تعلیمي موسسې د ښوونیزو او روزنیزو زده کړو د پروګرام ټولې زده کړې دي چې درسي کتاب، درسي مرستندویه توکي، د ښوونکي لارښود، تجربې او عملي کارونه پکې شامل دي.

هغه څه چې نن یې د ښوونې او روزنې د ماهرینو پام ځانته اړولی، ددې پوښتنې ځواب دی چې د مفرداتو چمتو کوونکي او د درسي کتابونو لیکوال باید څه شی په ټاکلو لارو چارو زده کوونکو ته ورزده کړي چې په اوسني او راتلونکي ژوند کې یې ګټور وي؟

ټول سره په یو نظر دي چې کوچنيان په بېلابېلو شرایطو کې وده کوي او په راتلونکې کې ښایي له نوو مسألو سره مخامخ شي، له دې امله زیاتره ددې پېژندل ورته ډېر سخت دي چې هغوی ته د څه شي زده کړه اړینه او د څه شي ورته اړینه نه ده او د زده کړې تر ټولو اغېزمنه لاره کومه یوه ده.

له بله پلوه د ځوانۍ پیر له ځانګړتیاو له مخې؛ لکه: د خپلواکۍ پرېکړې د نیولو، د مسؤلیت د منلو، راتلونکې ته د کتنې او په مسایلو کې بیا غور په څېر ځانګړتیاوو له مخې دا پیر له نور پېرونو څخه توپیر لري. ځوانان له ټولنې سره رغنده راشه درشه او د لویانو نړۍ ته د ورننوتو لپاره بېلابېلو وړتیاوو موندلو ته اړتیا لري، هغوی باید پوه شي دا چې په هغه ټولنه کې چې ژوند کوي، اړتیا یې کومې دي او څومره پوهه او علمي مهارتونو وړتیاوې ورته په کار ده؟ هغوی ځان پېژندنې ته اړتیا لري، پېښو او حوادثو ته څنګه ګوري، حقیقتونه څنګه درک کولای شي او څنګه ټاکنه کولای شي؟ څنګه عمل کوي؟ هغوی هغه پوهې ته اړتیا لري چې یې فکر کولو، مطالعې او په ټولنیز ژوند کې څیړنې ته وهڅوي.

له پورته وینا ته په پام سره د کیمیا د درسي مفرداتو په چمتو کولو کې، په داسې حال کې چې له علمي اړتیاوو سره تړاو لري، د زده کړې په نوو لارو چارو ټینګار شوی، ترڅو زده کړه د پخوانیو لارو چارو پر ځای پر هغه زده کړې ډېر ټینګار وشي چې د فعالې، ګډې، ابتکاري او انتقادي زده کړې په لارو چارو ولاړه وي.

په فعالې او ګډې (مشارکتې) زده کړې يا فعالې زده کړې (Active Learning Method) کې ښوونکي د تدریس په بهیر کې ستره ونډه لري. د ښوونکي دنده په دې ونډه کې د معلوماتو او پوهې په لېږدونه پای ته نه رسېږي، هغه د زده کړې تجربې په غور سره نیولو او حفظولو پورې تړلې نه بولي. په دې ونډه کې ښوونکي زده کړې د تر پام لاندې شرایطو لارښود او مرسته کوونکي دي. هغه د مطلوبو د یو اړخیزه لېږدولو پر ځای د زده کړې پر لارو چارو، د تجربې په ترلاسه کولو او د مسئلې په حلولو ډېر ټینګار کوي. د ښوونکي د لارښود د کتاب یوه موخه هم د زده کړې لپاره د لارو چارو وړاندې کول دي.

د ښوونکي ددې لارښود د تالیف د نورو موخو او لاملونو په ترڅ کې د زده کړو د موخو څرګندول، د محتوا (متن) د ټاکلو اصول او د یولسم ټولګي د کیمیا درسي کتاب ارزول دي.

دا لارښود کتاب دښوونکو زده کړې لپاره چمتو شوی او د زده کوونکو د زده کړې لپاره په کې د ډېرو تجربو رامنځته کول په پام کې نیول شوي دي، د ښوونکي د لارښود د کتاب چمتو کول اړین بلل شوي. باید وینو چې تدریس؛ زده کړه یو ابتکاري او تجربې کار دی او نوښتګر او مبتکر ښوونکي په دې برخه کې نوي شیان او لارې چارې رامنځته کوي. دا هم باید له یاده ونه ایستل شي چې د زده کړې د ستراتیژۍ په ټاکلو کې، موخو، د ارزونې له لارو چارو، د زده کوونکو د ګډون شونتیا او نورو اصولو ته چې د ارواپېژندنې، د روزنې ارواپوهنې او د زده کړې د ارواپوهنې سره په همغږۍ کې زموږ په وړاندې پراته دي، سمه پاملرنه وشي. دا هم باید له یاده ونه ایستل شي چې متن د کومو اصولو له مخې وټاکل شي، د محتوا د همغږي کولو اصول کوم دي؟ د تدریس او ارزونې لارې چارې کومې دي او څه اهمیت لري؟ دا چې د مهمو مفهومونو راییستل څنګه سرته رسېږي، د ښوونکي په دې لارښود کې څرګند شوي دي.

د ښوونکي لارښود څه شی دی؟

د ښوونکي لارښود چې د ښوونکو لپاره د زده کړې یوه وسیله ده، هغه کتاب دی چې له ښوونکي سره مرسته کوي ترڅو د یو درسي ساعت او یا د روزنې د دورې په اوږدو کې د خپل تدریس پلان چمتو کړي. د ښوونکي په لارښود کې د هر لوست او ځانګړې موخې، د تدریس وسایل، لارې چارې، د زده کوونکو پارول، د ښوونکي فعالیتونه، د زده کوونکو فعالیتونه، د زده کوونکو د زده کړې د ټینګښت برخه او ارزونه او په پای کې د لوست په اړوند اضافي معلومات او اخځلیکونه په پام کې نیول شوي دي. د ښوونکي لارښود ددې لپاره لیکل کيږي چې ښوونکي د درسي پلان له جوړولو او د زده کړې په یو پړاو کې د ښوونې او روزنې له ټولنیزو موخو سره بلد کړي. له ښوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د هر لوست مفاهیم او موضوعات ومومي، د لوست اړوند ورته اضافي معلومات چمتو کړي، د هېواد په ټولو ښوونځیو کې د درسي کتاب د یو خپل او همغږي تدریس لپاره لاره هواره کړي او په دې توګه د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې د لوست تدریس په پام کې نیول شوې دورې کې سرته ورسوي او درسي کتاب په بشپړ توګه ولوستل شي. دا خبره اړینه کيږي چې درسي کتاب، هغسې چې د هېواد په پلازمېنې یا د بل لوی ښار په کوم عصري ښوونځي کې تدریسېږي، د هېواد د لرې پرتو ولسوالیو او بانډو په ښوونځیو کې هم هماغسې یو خپل او یو راز تدریس شي او لکه چې ویل کيږي د یو متوازن او هر اړخیز معارف لپاره په ټول هېواد کې لاره هواره کړي.

د افغانستان د پوهنې ښوونیزه او روزنیزه پالیسي

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په شپاړسمه، درې څلویښتمه، څلور څلویښتمه، پنځه څلویښتمه، شپږ څلویښتمه او اووه څلویښتمه ماده کې د لیکل شوو احکامو او د افغانستان د پوهنې د قانون د شپږمې، اوومې مادې او نورو احکامو له مخې او د هېواد د معنوي او مادي اړتیاوو او واقعیتونو ته په پام او د افغانستان د ښوونې او روزنې د نظام د اساسي لیکو د انځورولو په خاطر د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پوهنې ښوونیزه او روزنیزه پالیسي په لاندې ټکو کې رانغاړل کېږي:

1. د خدای پالنې، د اسلامي احکامو او ارزښتونو تطبیق ته د پابندۍ، وطن دوستۍ، د ملي یووالي ټینګښت، ګډ ژوند او بشر دوستۍ په روحيې د هېواد د ماشومانو، تنکیو ځوانانو او ځوانانو لپاره که ښځینه وي یا نارینه، د ټاکلې ښوونې او روزنې د زمینو چمتو کول.
2. ټاکلې له خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، د ځمکنۍ بشپړتیا، اسلامي ورورولۍ، ملي پیوستون، له سولې سره د مینې او فرهنګي بډاینې څخه د دفاع، د توپیر او زور زیاتۍ د ټولو ښو او ډولونو د له منځه وړلو د روحيې پیاوړتیا.
3. د ښوونیزو او روزنیزو موسسو بیا رغول، جوړول، پراختیا او سمبالول.
4. په نړۍ کې له علمي مثبتو بدلونونو سره جوخت د هېواد د ښوونیز او روزنیز سیستم پراختیا،
5. د نورو هېوادونو له ښوونیزو او روزنیزو رغندو او بریالو تجربو څخه ګټه اخیستنه،
6. د جنس، توکم، ژبې، مذهب، نژاد او ټولنیز دریځ له پام کې نیولو څخه پرته ټولو ته تر لومړنیو او منځنیو (1-9) ټولګیو پورې په جبري او وړیا توګه د لومړنیو زده کړو چمتو کول.
7. په ښوونځیو (دولتي او خصوصي) کې په هغو ژبو تدریس چې په اساسي قانون کې تسجیل شوي دي.
8. د اسلام د سپیڅلې دین له زده کړو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د ارزښتونو او د افغاني ټولنې له دودونو سره سم او د پیداګوژیک اصولو او عملي تجربو ته په پام سره او د افغانستان د ښوونې او روزنې د کیفی ښه والي په خاطر د افغانستان د پوهنې سیستم د هلکانو او نجونو د جلاوالي پر بنسټ ولاړ دی. له دې امله ګډه زده کړه د لومړنۍ دورې له دریم ټولګي څخه وروسته د زده کړې په هیڅ یوه موسسه کې که دولتي وي یا خصوصي، کورونو، ورزشي کلبونو او نورو ځایونو کې مجاز نه ده.
9. د دریمو ژبو تدریس (د اساسي قانون 16 ماده) په اړوندو سیمو کې د یو مضمون په توګه.
10. د بیخایه شوو کورنیو، کډوالو او د ځانګړو اړتیاوو لرونکو زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې د زمینو چمتو کول.
11. د اسلامي زده کړو د مدرسو، عمومي زده کړو، حرفوي او مسلکي ښوونځیو او د ښوونکو د روزنې موسسو پراخوالی او د هغوی سمبالول.
12. د ښوونکو د علمي او مسلکي سوېې لوړول.
13. د ښوونکو د ژوندانه د حالت سمبالول.
14. د بیسوادۍ د له منځه وړلو، د حیاتي سواد او د کارګري متمدن ښوونځیو (نارینه او ښځینه) د پراخوالي لپاره هلې ځلې.
15. د افغانستان د پلي شوو قوانینو په اډانه (چوکاټ) کې د پوهنې د مسلکي تخصصي اداري ظرفیتونو په رغولو، سمبالولو او لوړولو کې د هېوادونو، نړیوالو موسسو، غیر دولتي موسسو او اشخاصو له بې غرضه او بشر دوستانه مرستو او ونډې څخه ملاتړ.



16. د متوازن معارف پیاوړتیا او د هېواد په مرکز او ولایتونو کې د ښوونیزو او روزنیزو امکاناتو سم او عادلانه ویش.
 17. د تاوتریخوالي، تبعیض، ناروا جگړو، نشه یي توکو، مسکراتو او اخلاقي مفاسدو په څېر د ناوړو پدېدو پر زیانونو د زده کوونکو خبرول.
 18. ازادۍ، سولې، سوله ییز ګډ ژوند، شورا او دموکراسۍ، بشري حقونو ته درناوی او د استوګنې د چاپیریال د ساتنې په څېر غوره ارزښتونو ته د زده کوونکو لارښوونه.
 19. له اسلامي احکامو او ارزښتونو سره سم د نجونو ښوونې او روزنې ته هراړخیزه پاملرنه او د نجونو او هلکانو د ښوونځیو ترمنځ د توازن رعایت.
 20. د خاصو زده کړو (ډېرو هوښیارو، ږندو، کڼو او ذهني وروسته پاتې زده کوونکو) ته پام او د ښوونې او روزنې لپاره یې اغیزمنې او ګټورې لارې چارې لټول.
 21. د هېواد د پلي شوو قانونونو په اډانه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پوهنې د تعلیمي نصاب، په (دولتي او خصوصي) ښوونځیو کې له تدریس او درسي موادو څخه د ګټې اخیستنې څارنه او نظارت.
 22. د ورزش، سپورت او بدني روزنې د ودې لپاره د زمينې چمتو کول.
 23. د علمي بریاوو او مسلکي تجربو د راکړې ورکړې په موخه د تعلیمي نصاب د پراختیا، د اسلامي زده کړو د معینیت او د ښوونکو د روزنې، د ساینس د مرکز د ریاستونو او په هېواد کې د اړوندو پوهنتونونو او نورو ارګانونو تر منځ د اړیکو ټینګښت او د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول.
 24. د افغاني ټولنې له اړتیاوو سره سم د اسلامي زده کړو د مدرسو هراړخیزه وده، پراختیا او رغنده کول.
- د لوی خدای (ج) په مرسته به د هېواد په پوهنې کې ددغې پالیسۍ په پلي کولو لاندې لویې پایلې ترلاسه شي:
- په اسلامي روحيې د هېواد د اولادو روزل، د الله جل جلاله د رضا د ترلاسه کولو او د یوې سوکاله او نېکمرغې ټولنې رامنځته کول.
 - د ملي هویت ساتنه.
 - د مسلمانانو، هېوادپالو، ګټورو، ژمنو او متمدنو انسانانو په توګه د هېواد د اولاد سالمه روزنه.
 - د نړۍ او ټولنې له علمي معیارونو سره سم د بریمن تطبیق په موخه د پوهې، مهارتونو او رغنده تفکر تر لاسه کول.
 - د کار موندلو لپاره د لازمو وړتیاوو د ترلاسه کولو او د کار مارکیټ ته په بري سره د ننوتو په منظور د زده کوونکو د پوهې د کچې لوړول،

په افغانستان کې د ښوونې او روزنې عمومي موخې (هدفونه)

د هېواد د ښوونې او روزنې نظام د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د احکامو، د پوهنې د قانون او پالیسۍ پر بنسټ او د افغاني ټولنې اړتیاوو او واقعیتونو ته په پام د زده کوونکو د سالمې روزنې په خاطر لاندې موخو ته ځان رسوي:

الف - عقیدتي او اخلاقي موخې

1. د اسلام د سپیڅلي دین پر اساساتو او ارزښتونو د ایمان او عقیدې پیاوړتیا، د قرآني زده کړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثو پر بنسټ د اسلامي لیدنو پراخوالی.
2. د خدای جل جلاله د پیژندنې په منظور د ځان پیژندنې د روحيې پیاوړتیا.
3. پر ځان د ویا او پر اخلاقي ښیګڼو د پابندۍ د روحيې پیاوړتیا.



4. د نظم او د دسپلين د منښت د روحيې وده او روزنه او د قانوني احكامو او ارزښتونو منل.
5. د ديني، ټولنيزو، ښوونيزو او روزنيزو ارزښتونو په وړاندې مسؤليت ته د غاړې ايښوولو د روحيې پياوړتيا.

ب. د زده کړې او روزنې موخې

1. د زده کړې د مهارتونو لاسته راوړل او پياوړتيا، لکه: اوریدل، خبرې کول، لوستل، لیکل، په رسمي او بهرنيو ژبو کې د شمېر او حسن خط کارول.
2. د پوهنو، فنونو او معاصرې تکنالوژۍ زده کړه او د اړتيا وړ فردي او ټولنیزو مهارتونو ترلاسه کول.
3. د زده کړې د وړتیاوو وده او د زده کړې په اوږدو کې ځانې زده کړه او ارزونه.
4. په علمي، ادبي، فرهنګي او فني ډګرونو کې د تفکر، استدلال، مطالعې، څېړنې، پېژندنې او نوبت د وړتیاوو وده او پراختیا.
5. د فردي او ټولنیزو ستونزو د موندلو او هواری لپاره د وړتیاوو ترلاسه کول.

ج. فرهنګي، ادبي او هنري موخې

1. د فرهنګ، ادب او رغنده هنر په برخو کې د زده کوونکو د فطري وړتیاوو وده او پراختیا او د تاریخي، فرهنګي، ادبي پاتې شونو (میراثونو) او شتمنیو د پېژندلو، ساتلو او د درناوۍ روحیه.
2. د افغانستان، اسلامي تمدن او د نورو هېوادونو له تاریخ، ادب او فرهنګ سره پېژندګلوي.
3. د فرهنګ، ملي هنرونو، د افغاني ټولنې د غوره او سالمو ادابو او دودونو پراختیا او د هغوی د اصالت ساتنه.
4. د تمرین او یوګسیزو او ډله ییزو فعالیتونو له لارې د ادبي او هنري مهارتونو پراختیا.

د. مدني او ټولنیزې موخې

1. د خپلواکۍ، وطن دوستۍ او ازادۍ غوښتنلو، د اسلامي ارزښتونو او ملي نوامیسو د ساتنې د روحيې پياوړتیا او د انسانانو د حقوقو د عدالت او رعایت په بنسټ د کورنیو اړیکو ټینګښت.
2. د اسلامي ورورولۍ، مرستې، سولې، ټولنیز عدالت، ملي او نړیوال پیوستون د روحيې پياوړتیا.
3. د خیر غوښتنې د حس پراختیا، د اخلاقي فضایلو لوړتیا او له زور زیاتي او ناروا جګړو سره ضدیت، له نشه یي توکو، مسکراتو، اخلاقي او ټولنیزو مفاسدو سره مبارزه.
4. قانون ته د درناوۍ او د هغه د منښت د روحيې پياوړتیا او د توکم، جنس، عمر، اقتصادي او ټولنیز دریځ او سیاسي تړاو له په پام کې نیولو پرته د هېواد د ټولو اتباعو د قانوني حقوقو ملاتړ،
5. په ټولنیزو اړیکو کې د زغم، سربښندنې او ایتار د روحيې پراختیا او ټولنیزې ګټې پر فردي ګټو پرمخ کول.
6. د انتقاد او انتقاد منلو، زغم او د نورو رایو ته د درناوۍ د روحيې پياوړتیا.
7. انساني کرامت ته د درناوۍ د روحيې پياوړتیا او پراختیا، د اشخاصو د حرمت ساتل، د معاشرت او په ټولنیزو اړیکو کې د بشري حقونو د ادابو رعایت.
8. په سوله ییز او رغنده ډول د توپیرونو او شخړو د هوارولو د روحيې پياوړتیا.
9. د زغم او د نورو د منلو د فرهنګ پياوړتیا.
10. د بشري ټولنې له علمي او تخنیکي تجربو او مثبتو بریاوو څخه د ګټې اخیستنې د روحيې پياوړتیا.
11. د هر ډول تبعیض د ردولو او له منځه وړلو د روحيې پياوړتیا او پراختیا.
12. د ښځې انساني دریځ ته د درناوۍ د روحيې پياوړتیا او له ښځو څخه ملاتړ.
13. د مورو پلار، مشرانو، ګاونډیانو، هېوادوالو او د نورو انسانانو حقونو ته د درناوۍ د روحيې پياوړتیا.



14. د استوگنې د چاپیریال او سمسورتیا د ساتنې د روحيې وړتیا، پر څارویو زړه سوی او د طبیعي ژوندانه او نباتاتو ملا تېر.

15. د اوبو د زیرمو د ساتنې د روحيې پیاوړتیا، د اوبو په کارولو کې زیاتې (افراط) نه کول او د سیندونو، ویالو، کاریزونو او څاگانو د اوبو له ککړتیا څخه مخنیوی.

هـ. اقتصادي موخې

1. په انساني ژوند کې د اقتصاد پر ارزښت پوهېدل، د ټولنې پراختیا او اقتصادي ودې او له کورني اقتصاد او فردي سلوک سره د اقتصادي فعالیتونو تړاو ته پاملرنه،

2. د کار پر ارزښت او اهمیت پوهېدل او د بیوزلۍ د له منځه وړلو په خاطر په ګټورو دندو کې د کار د روحيې پیاوړتیا.

3. د سپما، قناعت، اسراف او تجمل د مخنیوي د روحيې رامنځته کول او ځواکمنول.

4. د هېواد د اقتصادي سرچینو پېژندل او له هغو څخه د رایستلو په سمو لارو چارو پوهېدل او د ملي ګټو، شتمنیو او پانګو د ساتلو د روحيې پیاوړتیا،

5. د تکنالوژۍ له پرمختګ سره یوځای د بیلابیلو حرفو او تولیدي مشاغلو پیژندل، د ملي عایداتو د زیاتوالي او د بېکارۍ او د بل پر اوږو د سپړیدو د مخنیوي په موخه د لاسي او سیمه ییزو صنایعو بیارغونه او دودول.

6. په معاملو او اقتصادي فعالیتونو کې د اخلاقي اصولو د رعایت د روحيې پیاوړتیا او نامشروعو اقتصادي فعالیتونو پر خلاف مبارزه.

7. د حرفه یي فعالیتونو د زده کړې هڅول.

8. د ورکړې او غوښتنې پر اړیکو د زده کوونکو د پوهې د کچې لوړول.

- د انصاف او د کار د اخلاقو دودول او پر کار د ګومارونکو او کارکوونکو ترمنځ د کار قانون ته درناوی.

و- روغتيايي موخې

1. د پاک ساتنې (حفظ الصحې) او د فردي او ټولنیزې روغتیا په اړه د رغنده ژوند په لارو چارو پوهېدل.

2. د عمومي حفظ الصحې او د چاپیریال د پاک ساتنې د روحيې پراختیا.

3. له ناروغیو څخه د ساتلو په موخه له روغتيايي پوهې څخه برخمن کېدل او د اساسي مهارتونو پیاوړي کول.

4. د لارو چارو او شرایطو په رامنځته کولو د بدني او رواني روغتیا منځته ته راوړل او د سالمو تفریحو لپاره د بدني روزنې، ورزش او د سمسور چاپیریال چمتو کول.

5- د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه او د هغوی ننگه او ملاتړ.

و - ثانوي دوره (له 10 - 12 ټولګي)

- د تیرو ښوونیزو او روزنیزو دورو د بریاوو ځواکمنول او لوړو زده کړو ته چمتووالی،

- د تفکر د ځواک وده او لا پراختیا، په دیني مسایلو او اعتقادي بنسټونو کې ژور فکر او د معلوماتو تر لاسه کول او د ژوندانه د نظام په توګه د اسلام د دین له زده کړو سره د زده کوونکو زیات بلدول،

- د نفس پاکوالی او پر خدای جل جلاله او اسلامي لارښوونو باندې د ایمان پر بنسټ د اخلاقي فضیلتونو پیاوړي کول،

- په زده کوونکو کې د ښوونې او روزنې د روحيې پیاوړتیا او د مناسبو زمینو چمتو کول،



- د پوهنو، بشري تجربو او پرمختللي تکنالوژۍ په مرسته په طبیعت کې د موجودو قوانینو او د نړۍ د اسرارو د پیژندلو لپاره هلې ځلې،
- د رسمي او مورنۍ ژبې لارښوونې، د زده کوونکو د ادبي پوهې پراختیا او د بهرنیو ژبو زده کړه،
- د اړتیا وړ پوهنو او فنونو زده کړه او د فردي او ټولنیزو مهارتونو ترلاسه کول،
- له اسلامي ارزښتونو او د ملي فرهنګ له مثبتو غوښتنو سره سم له هنر سره د زده کوونکو بلدول او له هغې څخه معقوله ګټه اخیستل،
- د هېواد د ادبي، فرهنګي، هنري او تاریخي میراثونو د ساتنې د روحيې وده،
- د مرستې د روحيې او رغنده سیالیو ته د زده کوونکو د مینې وده او پراختیا،
- د ملي نوامیسو د ساتنې د روحيې پیاوړتیا او د اسلامي حقوقو او اخلاقو پر بنسټ د کورنیو اړیکو د بنسټ ځواکمنول،
- د خیر غوښتنې د حس پیاوړتیا، د اخلاقي فضیلتونو او د سوله غوښتنې د فضایلو لوړتیا، له تاوتریخوالي او ناروا جګړو سره ضدیت، له نشه یي توکو، الکولي څښاک او اخلاقي مفسدو سره مبارزه،
- مسؤلیت ته د غاړې ایښودلو د روحيې پیاوړتیا، د کورنیو او ټولنیزو چارو سم سرته رسول او په اسلامي، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې ونډه اخیستل،
- په ټولنیزو اړیکو کې د زغم، سربښندنې او ځان تېرېدنې د روحيې پیاوړتیا او ټولنیزې ګټې پر فردي ګټو لومړي کول،
- د سبا ورځې لپاره د زده کوونکو چمتو کول، د کورنۍ د جوړښت له ارزښت او په هغې پورې له اړوندو شرعي احکامو څخه خبرتیا،
- د اقتصاد ارزښت ته پام او د زده کوونکو معنوي بشپړتیا او سوکالۍ ته د رسیدو د یوې وسیلې په توګه د هغې رغنده وده،
- د ښوونې او روزنې په بهیر کې د ځاني ارزونې د وړتیاوو ځواکمنول،
- له ورزش سره د زده کوونکو د مینې پراخول او د بدني او رواني روغتیا څارنه،
- د فرهنګي یرغل په وړاندې له زده کوونکو سره مرسته او له بیخایه پېښو او تقلیدونو څخه د هغوی د مخنیوی او د افغاني او اسلامي ارزښتونو او هویت د ساتلو له لارې د وخت د مثبتو پرمختګونو او تکنالوژۍ څخه د استفادې د روحيې پیاوړتیا،
- د زده کوونکو د استعدادونو د روزلو په موخه په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو کې د هغوی د ګډون د روحيې پیاوړتیا،
- د مطالعې او د کتاب لوستلو د فرهنګ وده.

د تدریس ستراتیژي

دا کتاب د فعال او ګډ تدریس د اصولو له مخې تالیف شوی دی. له دې امله ښایي د کتاب په تدریس کې د فعال او مشارکتي لارو چارو څخه ګټه واخیستل شي، لکه؛ د مناظرې (Argument)، د پوښتنې او ځواب (Question & Answer)، د لکچر یا توضیحي (Lecture)، ډله ییزې خبرې اترې او مباحثه (Group Discussion)، د نقش لوبول (Role Play)، د علمي سیر (Excursion)، د ذهني یا فکري هڅول (Brain Storming). پروژه یي میتود (Project Method) دې هم په دې برخه کې ورزیات شي.

دې ټکي ته ښايي پام وشي چې تدريس يو ابتکاري او تجربې کار دی، نشي کېدای د يوه لوست يا کتاب لپاره د يوې ټاکلې او يوازنی لارې وړاندیز وشي؛ ځکه د هېواد په بېلابېلو برخو کې له امکاناتو او شرايطو سره سره هر ټولگی او ښوونځی خپل ټاکلي شرايط لري، دا ددې معنا نه لري چې يوه ټاکلې لاره (د تدريس له فعالو ستراتيژو څخه ګټه) دې وړاندې نشي.

د لوست اصلي برخې

هر لوست له لاندې برخو څخه جوړ شوی دی:

سرليک (عنوان)، سريزه (مقدمه)، متن، انځور، شکل، فرعي سرليک او ورودي، منځني او وروستني فعاليتونه. د دوی خوتنه لاندې څېړل کيږي:

د لوست سرليک

سرليک لوست ته د زده کوونکو د ذهني چمتوالي لامل کيږي. کېدای شي د لوست له سرليک څخه د يو فعاليت په توګه هم ګټه واخېستل شي.

انځور، نقشه او شکل

په هر لوست کې له متن سره سم انځورونه او نقشي راغلې دي. انځورونه او نقشي، نه دا چې کتاب لا په زړه پورې کوي، بلکې انگيزه يې کړنه هم تر سره کوي.

ورودي فعاليت

هر لوست په يوه فعاليت پيليږي چې د هغې له مخې د زده کوونکو ونډه او فعاليت هم پيليږي. فعاليت داسې کوم شی نه دی چې له متن څخه دې بېل په پام کې ونیول شي او يا دې متن او منځپانګه بېله تدريس شی.

منځنی فعاليت

د هر لوست دويم فعاليت لکه هم لومړي فعاليت (ورودي) ته ورته نقش لري؛ يعنې د راوړسته متن د تدريس لپاره کارول کيږي او کله هم د لومړنيو مفهومونو د ټينګښت او بشپړوالي نقش لري.

وروستنی فعاليت

د هر لوست په پای کې داسې فعاليتونه راوړل شوي چې د لوست د منځپانګې له پياوړتيا سره مرسته کوي او له مخې يې لوست هم اړوزل کېدای شي.

د لوست د اصلي پيغامونو په نښه کول (Key Concepts)

لومړی ښايي د «اصلي پيغامونو» معنا او مفهوم وپېژنو. هر لوست پوهنيزه موخه يا موخې لري. دا موخه يا موخې د يوه يا څو مفهومونو د زده کړې لپاره چمتو شوي دي. دا د لوست هماغه اصلي پيغامونه دي. ددې سريزې له مخې د لوست له اصلي پيغامونو څخه د ارزونې لپاره هم کار اخيستل کيږي؛ ځکه د زده کوونکو له خوا ددې عمل سرته رسول دا معنا لري چې هغوی لومړنی پوهه ترلاسه کړې ده.

کېدای شي د مختلفو متنونو د زده کړې او مطالعې مهارت او وړتيا (د لوست د اصلي پيغامونو په نښه کول) د زده کړې او ارزونې په پړاو کې د يو عمده مهارت په توګه وګڼل شي او په زده کوونکو کې د هغوی رامنځته کول او پياوړي کول يوه موخه بلل کيږي.



د لوست لنډول

د «د لنډولو» فعالیت هم په خپله یو اساسي مهارت دی او هم د ارزونې لپاره کارول کېږي، چې ښايي زده کوونکي یې زده کړي.

د «لوست د لنډولو» وړتیا د تفکر یو مهم مهارت دی. د لوست د لنډولو له لارې کېدای شي پراخ معلومات په لنډ ډول بیان شي، ترڅو د لوست د متن موخه اسانه په لاس راشي. لنډونه په لنډه وینا د لوست د اصلي مفهومونو بیان دی. لنډول په یوه وینا کې د ټولو جزیاتو نغښتل دي. د لنډولو توپیر د لوست د اصلي پیغامونو له را ایستلو سره دادی چې د اصلي مفهومونو د یادولو پر ځای زیار ایستل کېږي چې مفهومونه یوه پلا بیلا بېل سره یوځای شي او بیا بېرته نوی متن لاسته راشي.

د لنډولو لپاره ځینې لارښوونې

- 1- که غواړئ یو مطلب لنډ کړئ، زیار وباسئ له لیکلو او یاداشتولو پرته پرې پوه شئ.
- 2- تر مهمو کلمو او مفهومونو لاندې کرښه وکارئ. په دې کار هغه معلومات مخې ته نه راځي چې ګټه یې لږه وي.
- 3- لنډیز په خپلو عبارتونو ولیکئ. د اصلي متن د جوړښت په څېر یې مه لیکئ؛ ځکه شخصي عقیدې باید د لنډیز په متن کې ور دننه نه شي. په دې کار ډاډ تر لاسه کوئ چې خپل شخصي عقیدې مو په لنډیز کې نه دي راوستي؛ د لنډونو هره کلمه او عبارت باید پر متن ولاړ وي. لنډیز باید د ټول متن ۱۵ - ۲۰ سلنه وي.
- 4- له لنډیز څخه وروسته د خپل ډاډ لپاره هغه له اصلي متن سره پرتله کړئ.

ارزول (Evaluation)

ارزونه د زده کړې موخو ته د زده کوونکي د پرمختګ د معلومولو او ټاکلو لپاره له منظم بهیر څخه عبارت ده. منظم بهیر په دې معنا چې ارزونه ښايي د پلان له مخې منظمه سرته ورسېږي، په دې ترڅ کې د «زده کړې موخې» ددې لپاره دي چې په ارزونه کې باید د زده کړې موخې له وړاندې ټاکل شوې وي. په دې توګه د زده کړې ارزونه د تدریس له څرنگوالي سره د مرستې، د ښوونکو په اړه د لوړپوړو چارواکو د پرېکړې، د زده کوونکو سره د مرستې او د تدریس په برخه کې د پلټنې په اړه د لارو چارو د معلومولو په منظور سرته رسېږي. په ارزونې کې اساسي لارې چارې په دې بڼه وي چې د زده کړې د دورو موخو ته متوجه وي او پایلې یې زده کوونکو او ښوونکو ته د لارښوونې او له هغوی سره د مرستې لپاره وکارول شي. همدا راز ارزونه ښايي موخو، د تدریس لارو چارو او د درسي مضمون بېلابېلو توکو ته په پام سرته ورسېږي. ارزونه د زده کړې د بهیر د سمون لپاره سرته رسېږي. د زده کوونکو په اړه قضاوت باید د هغوی د کړنو، چال چلن او شخصیت په اړه د هر اړخیزو معلوماتو پر بنسټ ترسره شي، نه مازې د ازموینو د نومرو له مخې. له بل پلوه زده کوونکي ښايي په ارزونه کې ورګډ شي، ترڅو خپل ځان پخپله وارزولای شي. په لنډ ډول باید د ارزونې لپاره غوښتونکي شرایط به پام کې ونیول شي.

په زده کړه کې د ارزونې اهمیت او اړتیا

د زده کړې ارزونه دوې ګټې لري:

- 1- زده کوونکي پوهیږي چې په زده کړه کې یې څومره پرمختګ کړی او څومره بريالیتوب یې ترلاسه کړی.
- 2- د ښوونکي پوهیدل په دې چې د مضمون تدریس کې به څومره بریالی وي.



له خپل برياليتوب څخه د زده کوونکو خبرتيا ددې لامل کيږي چې زده کوونکي په سم ډول او ټاکلي لاره د خپل پرمختګ په اړه قضاوت وکړای شي، د زده کړې او برياليتوب لپاره د زيات مسؤليت احساس وکړي. زده کوونکي خپل کمزورتيا ټکي وپېژنې چې ويې مني چې د هغوی له منځه وړلو لپاره دې زيار وباسي. که چېرته ارزونه په ښه نيت او سم ډول سرته ورسېږي، پر ځان د زده کوونکو ويا پياوړي کيږي. د مضمون د تدريس له برياليتوب څخه د ښوونکي خبرتيا ددې لامل کيږي چې ښوونکي د لاسته راغلو معلوماتو له مخې د درسي مضمون په کمزورو او قوي ټکو وپوهيږي او د تدريس لاره چاره د هغوی له مخې سمه کړي او د تدريس فن د زده کړې په بېلابېلو لارو چارو او د تدريس د نوو مهارتونو د زده کړې له لارې ډلای کړي.

د ارزونې ښې

ارزونه د وخت او موخو له مخې په درېو ډلو ویشل کېدای شي:

تشخيصي، پرله پسې او وروستنی ارزونه.

الف: تشخيصي ارزونه د زده کړې په هر نوي پړاو کې د زده کوونکو د مخکنيو زده کړو او مهارتونو د معلومولو په موخه سرته رسيږي.

ب: پرله پسې ارزونه له منظمې او له پرله پسې ارزونې څخه عبارت ده چې د ښوونیز کال په اوږدو کې په هر څپرکي يا لوست کې د زده کوونکو ترلاسه شوې زده کړه او پوهه ازمويل کيږي.

ج: وروستنی ارزونه د يوه ښوونیز کال په پای کې په هر ټولګي کې د زده کوونکو ټولو په واسطه ټولو مفهومونو او مهارتونو د زده کړې د معلومولو لپاره تر سره کيږي.

د تدريس د ستراتيژيو ډلبندي

د تدريس لارې چارې (د تدريس ستراتيژي) په بېلابېلو لارو چارو ډلبندي کېدای شي. تر اوسه بېلا بېلې ډلبندي وړاندې شوي. لاندې ډلبندي د هغې له ډلې څخه يوه ده:

- 1 - دوديزه يا غير رسمي لاره، چې په جوماتونو او غير رسمي مدرسو کې ترسره کيږي.
- 2 - د تدريس نوي میتودونه.
- 3 - د لکچر میتود (وينا يا څرګندونې).
- 4 - د ذهني يا فکري هڅونې میتود.
- 5 - پرختيا (اکتشافی) میتود.
- 6 - د مسئلې د حل میتود.
- 7 - د پوښتنې او ځواب میتود.
- 8 - انفرادي میتود.
- 9 - د خبرو اترو میتود.
- 10 - د پروژې ورکولو میتود.
- 11 - ډله ییز میتود.
- 12 - د نمایش میتود.
- 13 - د تمثيل میتود.
- 14 - استقرایي میتود.

15 - آزمایښتي میتود.

16 - د کیسې ویلو میتود.

17 - تلفیقي یا ګډ میتود (په یوه لوست کې د څو میتودونو کارول)

د لوستونکو د لا زیاتو معلوماتو لپاره په لاندې ډول یوه بله ډلبندي راوړل کیږي:

1 - فعال دو اړخیز میتود

د تدریس یو شمېر میتودونه ښوونکي او زده کوونکي له غوښتنې سره سم فعالوي، یادول او ورزده کول له دوه اړخیزې لارې ترسره کیږي، په دې میتود کې مطلبونه او مفهومونه د ښوونکو او زده کوونکو له فعالیتونو څخه راوځي او هر یو یې انتخابي میتود د تدریس په محور کې جوړیږي. سربېره پر دې ښایي په هغه کې دننه له یوه یا څو میتودونو څخه ګټه واخیستل شي. دا میتودونه پراوونه لري چې په هغوی کې تدریس په منظم ډول پیلېږي چې د مفهوم تر موندلو پورې دوام مومي، ددې میتودونو له ډلې څخه کیدای شي استقرایي، د مسئلې د حل، د نقش د سرته رسولو، آزمایښتي او نورو میتودونو نومونه واخیستل شي.

2 - ګډ یا مشارکتي میتود

ګډ میتود د زده کړې د بهیر د فعال کېدو له مخې د فعالو میتودونو په ډله کې راځي. هغه څه چې مشارکتي میتود له نورو فعالو میتودونو څخه بېلوي، موخو ته د رسېدو لپاره د څو زده کوونکو همکاري او همفکري ده. ښایي د ښوونکي او زده کوونکو تر منځ فعاله زده کړه سرته ورسېږي، خو مشارکتي میتود په ډلییز ډول دی او په هغه کې د ډلې ګټې زیات اهمیت لري.

- غیر فعال یا یو اړخیز میتود

د تدریس یو شمېر نور میتودونه؛ لکه د لکچر میتود زده کوونکي چوپ او ښوونکي فعالوي؛ ځکه معلومات په یو اړخیز ډول سرته ورسېږي. څنګه چې دا میتود اکتشافی میتود نه دی، له دې امله په یوازې سر ترې په تدریس کې ګټه نه اخیستل کیږي.

د مضمون د تدریس وسیلې او بنسټیز توکي

1 - د اړتیا وړ درسي مرستندوی توکي

توره تخته، تباشیر، مارکر، د لوست کتاب، د ښوونکي لارښود، ورځپاڼې او مجلې، د زده کړې چارټونه، فلش، کارتونه، جغرافیایي نقشې، کمپیوتر، انټرنیټ، سلايډونه، انځورونه، فلمونه، تاریخي اطلسونه، د ځمکې د کرې مودلونه، ګرافونه، د مندلیف جدول، د تاریخي لړۍ شجرې، د موضوع په اړه تاریخي او داستاني مستند فلمونه، عکسونه، د انځورګرۍ تابلوګانې، د علمي، تاریخي، ملي شخصیتونو عکسونه، د اعتبار وړ کتابونه او ماخذ، د سکو، کاغذي لوټونو او فلزي پیسو البومونه او نور د درسي توکو په ډلې کې راځي.

2 - له ښوونکو څخه هیلې

الف - عمومي وړتیاوې

د ښوونکي له تجربې سربېره د لیسانس یا لږ تر لږه د فوق بکلوریا بریلیک لرل، د مضمون په اړه د وروستیو معلوماتو په اړه پوهه، د زده کوونکو په عمر او ذهن پورې اړوندو ځانګړتیاو پوهېدل، د فعال او مشارکتي تدریس په اړه معلومات او د زده کوونکو د ارزونې په اړه پوهه او معلومات، د ښوونکي له دندې سره مینه او د اخلاقي وړتیاوو درلودل.

ب: اختصاصي او مسلکي وړتياوې

- د بيلابيلو لوستونو لپاره د درسي پلان د چمتو کولو وړتيا.

- د ټولگي د ادارې وړتيا.

- له درسي مرستندويه توکو د کارونې وړتيا.

3- له ښوونځي څخه غوښتنې

- د اړوند مضمون د تدريس لپاره د شرايطو چمتو کول (د لوست د کتابونو، د ښوونکي د لارښود او د درسي مرستندويو توکو چمتو کول).

- د زده کوونکو له ميندو او پلرونو سره د منظمو اړيکو چمتو کول.

- د پلانونو په سر ته رسولو کې د پوهنې وزارت مصوبې په پام کې نيول.

- په ټولگي کې د ښوونکو د اعمالو څارنه او د ښوونکو لارښوونه.

- په ښوونځي کې د کتابتون جوړول.

- د کورنيو په مرسته د ښوونکو او زده کوونکو د اړتيا وړ کتابونو چمتو کول.

4- د زده کوونکو له ميندو او پلرونو څخه هيلې

- د زده کوونکو د تعليمي څرنگوالي په اړه د خپلو کوچنيانو له ښوونکو سره د اړيکو نيول.

- د زده کوونکو له درسي پرمختګ څخه خبرېدل.

- له ښوونځي سره پرله پسې مرسته او همکاري.



د مضمون د تدریس لارښود

ددې لارښود په تیرو مطالبو کې د درسي مضمون له عمومياتو او لومړنیو خبرو او د تدریس او ارزونې له لارو چارو سره بلد شوی، په دې برخه کې به د تدریس له کلني پلان او د هر لوست د تدریس له لارو چارو سره بلد شی. د تدریس کلنی پلان

د تدریس کلنی پلان څرگندوي چې د لوست کتاب پر یوه تعلیمي کال باندې څنګه ویشل شي. زموږ په هېواد کې تعلیمي کال د سړو او تودو سیمو لپاره یو له بله توپیر لري. په تودو سیمو کې تعلیمي کال د مني د فصل په پیل کې پیلېږي. د مرغومې د میاشتې په دوه اوونیو کې څلور نیم میاشتني ازموینه اخیستل کیږي. وروسته بیا زده کوونکي دوه اوونی رخصتېږي. د پسرلي د فصل په وروستی میاشت، یعنې غبرګولي کې په دوو لومړنیو اوونیو کې ازموینه اخیستل کیږي او له هغې وروسته زده کوونکي د کال وروستی رخصتي اخلي.

په سړو سیمو کې تعلیمي کال د وري په لومړۍ پیلېږي. څلور نیم میاشتني ازموینه د چنګاښ په میاشت کې اخیستل کیږي. زده کوونکي له ازموینې څخه وروسته د زمري په دوو لومړنیو اوونیو کې رخصتېږي. د تعلیمي کال په پای کې د لیندۍ د میاشتې په لومړیو دوو اوونیو کې کلنی ازموینې پیلېږي او له هغې وروسته زده کوونکي د ژمي په رخصتي ځي.

تعلیمي کال 28 اوونی دوام مومي. د کلني پلان د تنظیم لپاره د لوست د کتاب مخونه پر 28 ویشل کیږي. لاسته راغلې شمېره په یوې اوونۍ کې د لوست د کتاب د تدریس برخه څرګندوي.

د هر لوست په ورځني پلان کې د هر لوست د زده کړې موخې، د تدریس او ارزونې لارې چارې، د تدریس توکي، د تدریس فعالیتونه (د لومړنیو فعالیتونو سرته رسول؛ لکه سلام، روغې، د حاضرۍ اخیستل، د پخواني لوست پوښتنه، د انگېزې رامنځته کول، د نوي لوست وړاندې کول او د زده کوونکو د زده کړې ارزول)، د لوست د متن او پای په اړه پوښتنې او د زده کوونکو او ښوونکو لپاره اضافي معلوماتو برخه جوړوي، هغه په ځیر وګورئ او په پوره زړه سوي او رغنده ډول یې د شونتیا تر کچې پر خپلو زده کوونکو عملي کړئ.





لومړۍ څپرکي

د څپرکي موضوع: محلولونه

1- د تدریس وخت 8 درسي ساعتونه

ګڼه	د لوست سرلیکونه	درسي ساعتونه
1	د محلولونو تعریف	یو درسي ساعت
2	د محلولونو اجزاي	یو درسي ساعت
3	مشبوع او غیر مشبوع محلولونه	یو درسي ساعت
4	ایوني محلولونه	یو درسي ساعت
5	د محلولو غلظت	یو درسي ساعت
6	د مولاريتي غلظت	یو درسي ساعت
7	د نارمليتي غلظت	یو درسي ساعت
8	د لومړي څپرکي لنډيز او تمرین	یو درسي ساعت

2- د څپرکي د زده کړي موخې

- زده کوونکي دې پوه شي چې محلولونه کوم ډول مواد دي او د محلولونو د غلظت په اړه دې معلومات ولري.
- زده کوونکي دې درک کړي چې محلولونه د ژوندانه بنسټي مواد دي ، بیلابیل ډولونه او بیلابیل خواص لري.
- محلولونه دې له بیلابیلو غلظتونو سره برابر کړي او په خپل ورځني ژوندانه کې دې وکارول شي .

د تشریحي پوښتنو ځوابونه

1- گاز په گاز کې ؛ د بیلګې په ډول : هوا، مایع په مایع کې ؛ لکه : الکول په اوبو کې، جامد په جامد کې ؛ د بیلګې په ډول : الیاژونه.

2- په یوه ګیلاس کې لږ څه د خوړو مالګه په اوبو کې ور زیاته کړئ ، وڼه گورئ چې په حل کوونکې مادې کې ورزیاته شوې مالګه په ښه توګه نه حل کیږي او د ګیلاس په لاندینۍ برخه کې پاتې کیږي ، په هر محلول کې د تودوخې په ټاکلې درجې کې د حل کیدونکې مادې یوه ټاکلې کچه په حل کوونکې مادې کې حل کیدای شي او دا کچه دحل کیدونکې اوحل کوونکې مادې د ماهیت او د تودوخې د درجو تابع ده.

3- په عمومي توګه ورته مواد یو په بل کې دحل کید وړتیا لري ؛ د بیلګې په ډول: د نفتالین هایډروکاربن مرکبونه په بنزین کې په ښه توګه حل کیږي ؛ خو په الکولو کې ښه نه حلېږي ، د نفتالین مرکبونه په اوبو کې هیڅ نه حلېږي . د موټر موبلائیل په پترولو کې

حلیږي؛ ځکه دا دواړه مادې غیر قطبي دي چې د هغوی په ترکیب کې هایدروجن او کاربن شتون لري؛ د بلې خوا غوړي په اوبو کې نه حلېږي؛ ځکه اوبه قطبي ماده ده؛ په داسې حال کې چې غوړي غیر قطبي مواد دي. د یوې مادې حلیدل په بلې مادې کې، د هغوی د ذرو (مالیکولونو یا آیونونو) ترمنځ د څه ناڅه جذب له قواوو سره اړیکه لري.

3- د لاندې جدول په پام کې نیولوسره د AgNO_3 د انحلالیت لپاره د تودوخې په بیلوبیلو درجو کې کیدای شي دې پوښتنې ته ځواب ورکړل شي:

انحلالیت $\text{AgNO}_3 / 100\text{g } \text{H}_2\text{O}$	د تودوخې درجه ($^{\circ}\text{C}$)
0	122
30	216
40	311
60	440
80	585
100	733

الف: د تودوخې په لوړېدوسره په اوبو کې د AgNO_3 حلیدل هم ډیرېږي.

ب: څرنگه چې په جدول کې لیدل کیږي، که چیرې د تودوخې په 30°C کې 300g د سپینو زرو نایتریت په 100g اوبو کې ورزیات شي، تر لاسه شوی محلول مشبوع دی؛ ځکه د تودوخې په 30°C کې د هغه 216g په 100g اوبو کې حل او مشبوع محلول یې لاسته راځي.

ج- که چیرې د سپینو زرو نایتریت په اوبو کې د تودوخې په 40°C کې ورزیات شي، غلیظ محلول یې تر لاسه کیږي.

5-

$$\begin{array}{rcl} W\% = 6.5\% & 100 & - \quad 6.5\text{g} \\ m_{\text{Na}_2\text{SO}_4} = 458\text{g} & X & - \quad 45\text{g} \\ X = ? & X = \frac{100 \cdot 45\text{g}}{6.5} & = 692.3\text{g} \end{array}$$

له دې امله د محلول کتله 692.3g ده

6-

$$\begin{array}{rcl} W\% = 5\% & 100 & - \quad 5\text{g} \\ m_{\text{KI}} = 258\text{mg} & X & - \quad 258\text{mg} \\ X = ? & X = \frac{100 \cdot 258\text{mg}}{5} & = 5160\text{mg} \end{array}$$

7- الف:

$$\begin{array}{l} V = 250\text{mL} \\ m_{\text{NaHCO}_3} = 5.623\text{g} \\ C_M = ? \quad C_M = \frac{m \cdot 100\text{mL}}{M \cdot V} = \frac{5.623\text{g} \cdot 1000\text{mL}}{84\text{g} \cdot 250\text{mL}} = 0.268\text{molar} \end{array}$$

ب -

$$V = 500 \text{ mL}$$

$$m_{K_2Cr_2O_7} = 184.6 \text{ g}$$

$$C_M = ? \quad C_M = \frac{m \cdot 100 \text{ mL}}{M \cdot V} = \frac{184.6 \text{ g} \cdot 1000 \text{ mL}}{294 \text{ g} \cdot 500 \text{ mL}} = 1.256 \text{ molar}$$

$$V = 1.25 \text{ L}$$

$$n_{Na_2SO_4} = 2.5 \text{ mol}$$

$$C_M = ? \quad C_M = \frac{\text{mols}}{L} = \frac{2.5 \text{ mol}}{1.25 \text{ L}} = 2.00 \text{ molar}$$

ج -

د -

$$V = 1.00 \text{ L}$$

$$m_{NaCl} = 16.45 \text{ g}$$

$$C_M = ? \quad C_M = \frac{m \cdot 100 \text{ mL}}{M \cdot V} = \frac{16.45 \text{ g} \cdot 1000 \text{ mL}}{58.5 \text{ g} \cdot 1000 \text{ mL}} = 0.3 \text{ molar}$$

8 -

$$V = 2 \text{ L}$$

$$m_{NaOH} = 60 \text{ g}$$

$$C_M = ? \quad C_M = \frac{m \cdot 100 \text{ mL}}{M \cdot V} = \frac{60 \text{ g} \cdot 1000 \text{ mL}}{40 \text{ g} \cdot 2000 \text{ mL}} = 0.75 \text{ molar}$$

9 -

$$V = 500 \text{ mL}$$

$$m_{H_2SO_4} = ?$$

$$C_M = 3.5 \text{ molar} \quad C_M = \frac{m \cdot 100 \text{ mL}}{M \cdot V} \Rightarrow m = \frac{M \cdot C_M \cdot V}{1000 \text{ mL}}$$

$$m = \frac{98 \text{ g} \cdot 3.5 \text{ molar} \cdot 500 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} = 171.5 \text{ g}$$

10 -

$$n = ?$$

$$V_{HCl} = 85.00 \text{ mL}$$

$$C_M = 2.20 \text{ mol} \quad C_M = \frac{n}{V}$$

$$n = C_M \cdot V = 2.20 \text{ mol} / 1000 \text{ mL} \cdot 85.00 \text{ mL}$$

$$n = 0.2 \text{ mol}$$

11 -

الف - سودیم هایدروکساید حل کیدونکې ماده.

ب - اوبه حل کوونکې ماده ده .

ج -

$$m' = 1.5 \text{ kg}$$

$$m_{NaOH} = 80.00 \text{ gg}$$

$$C_m = ? \quad C_m = \frac{m \cdot 1000 \text{ g}}{M \cdot m'} = \frac{80 \text{ g} \cdot 1000 \text{ g}}{40 \text{ g} \cdot 1500 \text{ g}} = 1.3 \text{ molal}$$

-12

$$m' = 250 \text{ g}$$

$$m_{\text{NaOH}} = 36.5 \text{ g}$$

$$C_m = ? \quad C_m = \frac{m \cdot 1000 \text{ g}}{M \cdot m'} = \frac{36.5 \text{ g} \cdot 1000 \text{ g}}{36.5 \text{ g} \cdot 250 \text{ g}} = 4 \text{ molal}$$

-13

$$m' = 250 \text{ g}$$

$$m_{\text{HNO}_3} = ?$$

$$C_m = ? \quad C_m = \frac{m \cdot 1000 \text{ g}}{M \cdot m'}$$

$$m = \frac{C_m \cdot M \cdot m'}{1000 \text{ g}} = \frac{1 \text{ molal} \cdot 63 \text{ g} \cdot 3000 \text{ g}}{1000 \text{ g}} = 189 \text{ g}$$

-14

$$n_{\text{HCl}} = 1 \text{ mol}$$

$$N_{\text{HCl}} = \frac{n_{\text{HCl}}}{n_{\text{HCl}} + n_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$N_{\text{HCl}} = \frac{1 \text{ mol}}{1 \text{ mol} + 3.31 \text{ mol}} = 0.23$$

$$N_{\text{HCl}} = \frac{3.31 \text{ mol}}{1 \text{ mol} + 3.31 \text{ mol}} = 0.77$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = 3.31 \text{ mol}$$

$$N_{\text{HCl}} = ?$$

$$N_{\text{H}_2\text{O}} = ?$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = n \cdot M \Rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}} = 3.31 \text{ mol} \cdot 18 \text{ g/mol} = 59.58 \text{ g}$$

$$C_m = ? \quad C_m = \frac{m \cdot 1000 \text{ g}}{M \cdot m'} = \frac{18 \text{ g} \cdot 1000 \text{ g}}{18 \text{ g} \cdot 59.58 \text{ g}} = 16.8 \text{ molal}$$

-15

$$n_{\text{HC}_2\text{H}_3\text{C}_2\text{O}_2} = 0.763 \text{ mol}$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \text{ kg}$$

$$N_{\text{HC}_2\text{H}_3\text{C}_2\text{O}_2} = ?$$

$$C_m = ? \quad C_m = \frac{n \cdot 1000 \text{ g}}{m'} = \frac{0.763 \text{ mol} \cdot 1000 \text{ g}}{1000 \text{ g}} = 0.763 \text{ molal}$$

$$N_{\text{HC}_2\text{H}_3\text{C}_2\text{O}_2} = \frac{n_{\text{HC}_2\text{H}_3\text{C}_2\text{O}_2}}{n_{\text{HC}_2\text{H}_3\text{C}_2\text{O}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{0.763 \text{ mol}}{0.763 \text{ mol} + 55.5 \text{ mol}} = \frac{0.763 \text{ mol}}{56.313 \text{ mol}} = 0.0135$$



لومړۍ لوست

د درسي کتاب مخ: 3

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د محلولونو تعريف
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - زده کوونکي دې د محلول تعريف ، ډولونه او ځانگړتيا زده کړي . - يقين دې تر لاسه کړي چې محلولونه متجانس سيستمونه دي . د محلولونو د تعريف پر بنسټ دې محلولونه له مخلوطونو څخه توپير کړای شي .
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته او تباشير
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکنی ، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول : ایا کواکولا او فاتنا مو څښلې ده؟ دا کوم ډول مواد دي؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تختې پر مخ وليکي . د محلولونو د تعريف او نورو ځانگړتياوو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي . د سيستم، فاز او کمپنيت په اړه دې معلومات ورکړي . د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي . لوست دې په څو پوښتنو سره و ارزوي . زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي .		د ښوونکي توضيحاتو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري . د هغه معلومات چې ښوونکی يې د محلولونو په اړه ورکوي، يادداشت او زده دې کړي . د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي . د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب ورکړي . د کورنۍ دنده دې تر سره کړي .

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت (1-1)

د مخلوطونو ډولونه

د اړتیا وړ سامان او مواد: څلور عدده 150 ملي لیتر حجم لرونکي بیکرونه، د کولالي خاوره، رنگه څښونکي محلول، غوړي او ښښه یې میله.

کړنلاره

1- څلور بیلابیل مخلوطونه په څلورو بیکرونو کې جوړ کړئ چې هر یو یې د اوبو او لاندې موادو لرونکي وي.

a. 1g NaCl

b. 2.5g د کولالي خاوره

c. 10g رنگه نوښابه

d. 10mL غوړي

2. پورتنی مخلوطونه د ښښه یې میلې په واسطه ولړئ او د هغوی ځانګړتیاوې وګورئ.

3. د پورتنیو مخلوطونو څخه کوم یو یې متجانس دی؟

له پورتنی فعالیت څخه څرګندېږي چې NaCl له اوبو سره متجانس مخلوط جوړوي؛ له دې امله محلولونه له متجانس مخلوطونو څخه عبارت دي.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

عمومي معلومات

څرنگه چې مخکې په ګوته شوه، فشار، تودوخه او حجم د جامدو، مایعو او د ګازونو حالت روښانه کوي، همدا درې پارامترونه د محلول یو شمیر نور حالتونه هم روښانه کوي.

محلول د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغه د جوړوونکو اجزاوو نسبت تریوې ټاکلې کچه پورې بدلون منونکې دي. په عمومي ډول محلول د دوو برخو، حل کیدونکې مادې (Solute) او حل کوونکې مادې (Solventes) څخه جوړ شوی دی.

$$\text{Solution} = \text{Solute} + \text{Solvent}$$

حل کیدونکې ماده (Solute): د محلول هغه جز دی چې په حل کوونکي کې حل کېږي او په کوچنیو ذرو (مالیکولونو، اتومونو او یا ایونونو) توپه کېږي.

حل کوونکي (Solvent): د محلول هغه جز دی چې د حل کیدونکې مادې د حل کولو وړتیا لري او هغه په کوچنیو اجزاو توپه کوي. د طبیعت ښه حل کوونکې ماده اوبه دي، له دې امله د اوبو او په ژوند کې د هغو د رول په اړه باید معلومات ورکړل شي.

اوبه او د هغې اهمیت د ځمکې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې: د ځمکې کره د شمسې منظومې یوازینۍ سیاره ده چې د اوبو کچه په هغې کې ډیره ده، د اوبو د شتون له امله په دې سیاره کې حیوانات او نباتات خپل ژوندانه ته دوام ورکوي، د اوبو اهمیت



دهغې دبرخې اخېستني د اورگانيزم په حياتي فعاليتونو پورې اړه لري، ټول بيوشيمکي فعاليتونه د اوبو په شتون کې ترسره کېږي. فعاله ژوندۍ حجرې 20-60% اوبه لري، د بالغو او ژونديو نورمالو انسانانو په اورگانيزم کې چې د هغوی کتله 70Kg کيلوگرام وي، 45-50L ليتره اوبه لري، د هغوی له جملې څخه 3.5L ليتره يې په 5L ليتره وينه کې، 10.5L ليتره په لمفاوي غدو کې او د حجرو باندینې اوبه او پاتې شونې يې د حجرو په دننه کې شته دي.

دزياتو بيولوژيکي بهيرونو ځانگړتياوې د اوبو د فزيکي او کيمياوي خواصو په واسطه ټاکل کېږي، د غذايي موادو د هضم بهير، د ميتابوليزم، د دوينو جوړېدل او د نسجونو ترکيب، دا ټول په اوبلنو محلولونو او د اوبو د رغنده دندې له امله ترسره کېږي.

اوبه د عضوي او غير عضوي موادو بڼه حل کوونکې ماده ده، له دې امله زهري او فاضله مواد د اورگانيزم له دننه څخه د اوبو په واسطه د محلول په بڼه بهرته اېستل کېږي، هغه اوبه چې د خولو په بڼه د پوستکې له لاري براسپړی، د بدن د تودوخې درجه ټاکلې او نورماله ساتي، او بڼکې چې دسترگو د قرنيې د لوندو ساتلو دنده ترسره کوي او له سترگو څخه دورې او خاورې وباسي، 99% له اوبو څخه جوړې شوي دي.

اوبه په هغونسجونو کې خورا ډيرې دي چې د هغوی دنده په اورگانيزم کې ډيره مهمه وي؛ د بيلگې په ډول: شوکې نخاع 69.7%، د دماغ قشر 83.3%، پختورگي 83%، زړه 79.3%، کولمې 77%، سږې 79.1%، تريخی 76%، سپين کرويات 70%، عضلې 76%، پوستکي 72%، يڼه (کبد) 60%، نېبلوونکي نسجونه 76.6%، کرپندوکې (غضروف) 55% او هډوکي 22% اوبه لري.



د اوبو کيمياوي او فزيکي خواص زيات بيولوژيکي بهيرونه او څرنگوالي روښانه کوي، د خوړو د هضم بهير، د موادو ميتابوليزم، د وينې توليد او د انساجو جوړول د اوبو په محلولونو کې او د اوبو د رغنده ونډې له اخېستلو سره ترسره کېږي.

اوبه دروغجن خواص، د ويلې کيدو لوړه درجه، د ټوټه کيدو بڼه خاصيت او د تودوخې د تيرولو ټيټه وړتيا لري، دبراس د تودوخې زياته کچه لري. د اوبو په ماليکول کې د هايډروجن او اکسيجن ترمنځ اړيکه ډيره قطبي ده، دای پول مومنټ يې $6.1 \cdot 10^{-30} \text{ Cb} \cdot \text{m}$ دی چې د اوبو د ماليکول د مثبت او منفي دای پول دا کچه د ماليکولونو له يو بل په واسطه د لوري ورکولو لامل کېږي او اوبه خپل ځان په يوه سطحه کې ساتي، د اوبو يو ماليکول له خپلو څلورو نورو ماليکولونو سره هايډروجني اړيکې تړي چې د اوبو ماليکول د تترا هايډرال بڼه لري اود هغوی د ولانسي اړيکو زاويه 105 درجې ده.

د هايډروجني اړيکې انرژي $20-25 \frac{\text{Kg}}{\text{mol}}$ او 10 تر 20 ځلی د کوولانت اړيکې څخه ضعیفه او انرژي يې کمه ده؛ خو د واندروالس له اړيکې څخه څوځلي لوړه ده. د اوبو لوړ کثافت په 4°C سانتي گراد کې ترسترگو کېږي چې $1 \frac{\text{g}}{\text{mL}}$ دی.


هايډروجني اړيکه د اوبو په جامد حالت (يخ) کې غير منظمه ده؛ له همدې امله ده چې په کنگل کې يې ډيرې خاليگاوي شته دي او د کنگل کثافت يې له مايع اوبو څخه ټيټ دی.





د هایدروجنی اړیکو شکل

اوبه د اکسیدیشن او ریدکشن په بهیر کې فعاله برخه لري، زیات مرکبونه هایدرولیز کوي او ایونونو ته هایدرايتي قشر وربخښي چې دا جوړښت د ایونونو ثبات ټاکي.



دویم لوست

د درسي کتاب مخ: 6

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د محلولونو اجزاوې، د محلولونو ډولونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د محلولونو د اجزاوو او ډولونو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - یقین دې تر لاسه کړي چې محلولونه له بیلابیلو اجزاوو څخه جوړ شوي دي او د محلولونه بیلابیل ډولونه شته دي. - بیلابیل محلولون دې جوړ کړای شي او له هغوی څخه دې په ورځني ژوند کې ګټه واخېستلی شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر، د خوړو مالګه او مقطرې اوبه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنې، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ وخت په اخیستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیر لوست ارزونه. د انګېزې رامنځته کول: د پټاس په نوم کومه ماده پیژنئ او د هغې د کارولو په ځایونو پوهیږئ؟
1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي.		د ښوونکي توضیحاتو ته دې ځیر شي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري.
د محلولونو د اجزاوو او د هغوی د ډولونو په اړه دې زده کوونکو ته معلومات ورکړي.		هغه معلومات چې ښوونکي یې د محلولونو د اجزاوو په اړه وکوي، یادداشت او زده دې کړي.
د یو محلول دې له څو موادو څخه؛ دبیلګې په ډول: سیروم دې د سیروز، ګلوکوز، اوبو او مالګې څخه جوړ کړي.		د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي.
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.
د لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.		د لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.
د زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د محلولونو ډولونه : محلولونه د ذرو د جسامت د قطر له امله دوه ډوله دي چې له حقيقي او کلوئيدي محلولونو څخه عبارت دي.

رښتيايي محلولونه: دا ډول محلولونه د حل کوونکې او حل کيدونکې مادې څخه جوړ شوي دي چې متجانس سيستم او متحول ترکيب لري ، د دوی د ذرو د قطر غټوالی 1nm نانومتر دی.

د عالي مرکبونو محلولونه : د عالي مرکبونو په محلولونو کې عالي مرکبونه ؛ د بيلگې په ډول : پروټينونه ، مالګه او نور شامل دي چې د هغوی د ذرو قطر 10nm دی.

کلوئيدي محلولونه: - هغه محلولونو دي چې د هغوی ذرې برونې حرکت لري او د هغوی د ذرو د قطر غټوالی 8 nm دی.





دریم لوست

د درسي کتاب مخ: 6

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		مشبوع او غير مشبوع محلولونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د محلولود مشبوعيت په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې محلولونه په حل کوونکې کې د حل کيدونکې مادي د انحلايت له امله خوامخو مشبوع او غير مشبوع وي - د مشبوع او غير مشبوع محلولونو جوړولو توان دې ولري.
3- د تدريس میتود		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشير، د خوړو مالگه او مقطرې اوبه
5- د ارزوني میتود		شفاهي او ليکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په اخېستل، د کورنۍ د نندې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: آيا کولای شئ په يو گيلاس اوبو کې 10 (لس) قاشوغې بوره حل کړئ؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي.		د ښوونکي توضيحاتو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري.
د مشبوع او غير مشبوع محلولونو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي او د هغوی څرنگوالی دې روښانه کړي.		مشبوع او غير مشبوع محلولونه چې ښوونکي يې په نمایشي ډول جوړوي، کړنلاره دې يادداشت او زده دې کړي.
د زده کوونکو ته وروښيي.		د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.
د لوست دې په څو پوښتنو سره و ارزوي.		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه وړاندې کړي.
د زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

(1-2) فعالیت: مشبوع او غیر مشبوع محلولونه

د اړتیا وړ سامان او مواد: 250mL بیکر، ترمومتر، د بنسن څراغ، نیوونکې کړۍ، نه سوځیدونکې جالی، 60g گرام سودیم اسیتات ($\text{CH}_3 - \text{COONa}$).

کړنلاره:

- 1- 100mL اوبه په 250 ملي لیتره بیکر کې واچوئ او تر 80°C پورې تودوخه ورکړئ.
 - 2- په تودو اوبو کې تر هغه وخته سودیم اسیتات ورزیات او وېې ښوروی کوم چې محلول یې جوړ شي، په دې توګه خواصخوا یو څه سودیم اسیتات به د بیکر په لاندینۍ برخه کې پاتې وي.
 - 3- لاسته راغلی محلول فلتر او جامده برخه یې ورځینې جلاکړئ، بیا محلول پر خپل ځای کیردئ چې سوړ شي.
- کله چې محلول بیا د کوټې د تودوخې په کچه سوړ شو، د سودیم اسیتات کرسټال څو ورې ټوټې ورزیاتې کړئ، خپلې لیدنې ولیکئ.

د دې محلول د کښیناستلو لامل څه دی؟

کوم ډول محلول به د مشبوع محلول له کښیناستلو څخه وروسته په لاس راشي؟

ځواب: د هغه د چټک رسوب دلیل د سودیم اسیتات د محلول مشبوعیت دی چې نور حل کیدل یې په محلول کې شونې نه دی؛ ځکه د محلول د تودوخې درجه ښکته او محلول هم د منحلې مادې د ایونونو په هایدريشن کې بوخت دی چې اضافه منحلې ماده په ځان کې نه شي حلولی، له مشبوع څخه لوړ محلول تر لاسه او رسوب رامنځ ته کیږي.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د محلولونو د حلیدو کیمیاوي تیوري

د محلولونو خواص د هغوی د جوړوونکو اجزاوو له یو بل سره عمل پورې اړه لري، روسي عالم دیمتری ایوانوویچ مندلیف او بلن محلولونه مطالعه او تر څیرنې لاندې ونيول او داسې نظریې ورکړې چې د حل کوونکې او حل کیدونکې مادې د ذرو ترمنځ د محلول په حالت کې کیمیاوي مخامخ عمل ترسره کیږي او بې ثباته هایدريټي مرکب جوړوي. د مندلیف نوموړې تیوري د هایدريټي تیوري او یا کیمیاوي تیوري په نوم یاده شوي ده.


د محلولونو د حلیدو فزیکي تیوري

ځینې پوهان د موادو د حل کیدو بهیر په یو بل کې د فزیکي بهیر له ډولونو څخه چې په هغه کې د حل کیدونکې مادې ذرې په حل کیدونکې مادې کې په متجانس ډول خپرېږي، په پام کې لري، د دې تیوري منونکي وانټ هوف او ارهینوس دی. دوی د رقیقو محلولونو خواص د ایډیال ګازونو له خواصو سره پرتله کړل او د هغوی د مقداري پارامترونو د محاسبې او ټاکلو لپاره یې د ګازونو قانون یې وکاروه او وېې منه، دا تیوري د رقیقو ایډیالو محلولونو لپاره د منلو وړ ده، په حقیقي محلولونو کې په کار ده تر څو د محلولونو د اجزاوو کیمیاوي مخامخ عمل هم په پام کې ونيول شي.

له علم په ودې سره څرګنده شوه چې د محلولونو په جوړولو کې د حل کوونکې او د حل کیدونکې مادې د ذرو فزیکي مخامخ عمل او هم کیمیاوي مخامخ عمل یوځای اغیزه لري چې باید په پام کې ونيول شي.

د حل کیدو بهیر او د اوبو د حلولوقدرت : اوبه دلوړ دوه گوني بریښنايي ثابت ($\epsilon^\circ = 78$) د لرولو له کبله، زیاتره جامد کرسټالي مواد په ځان کې حل کوي، د اوبو مالیکولونه د کرسټالي مادې له ایونونو سره مخامخ عمل ترسره کوي، له دې امله ایونونه هایدريشن او د کرسټالي مواد هایدريشنی ایونونه جوړوي، د قطبي حل کوونکې مادې د پای پول ایون مخامخ عمل کیدای شي چې د فارادې او کولمب د قانون ($F = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$) په مرسته وارزول شي.

خرنگه چې لیدل کیږي د بریښنايي چارجونو د جذب یا دفعې قوه د چارجونه یو له بل څخه د واټن او د چاپیریال د پای الکتریک سره معکوس تناسب لري، په بل عبارت په اوبلن محیط کې ددو مخالفو چارجونو د جذب قوه 1.70 برخه د قوو ده چې هغوی په خلا کې یوبل جذب وي:



که چیرې د KCl د مالګې کرسټالونه په اوبو کې کیږدو، نود نوموړې مالګې د Cl^- او K^+ ایونونه له کرسټالي شبکې څخه د اوبو په واسطه جلا او په اسانۍ سره هایدريشن کیږي.

د ایونونو هایدريشن، په محلولونو کې د هغوی دپایښت لامل کیږي، د منفي له ایونونو څخه هریو یې د اوبو د پای پولو مثبت قطب ځانته راکاږي او د اوبو مالیکولونه ځان سره نژدې ساتي او مثبت ایونونه د اوبو منفي قطب جذب وي، مثبت ایونونه خوراډیر د اوبو په واسطه هایدريشن Hydration کیږي. هایدرایت شوي ایونونه ډیر با ثباته دي او «کتیوني» ایونونه یې لازياتره با ثباته دي، هر څومره چې د کیتونونو مثبت چارج لوړ وي، په هماغه کچه ډیر هایدريشن کیږي او ډیر با ثباته وي چې کیدای شي په جامد حالت کې په خپله کرسټالي شبکه کې ډیرې کرسټالي اوبه ولري، د بیلګې په ډول :



د درسی کتاب مخ: 8


د زده کونکو د زده کړې فعالیتونه

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

حل يې کړئ.

د لاندې گراف په پام کې نيولو سره لاندې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ.

- 1- که چيرې وغواړئ چې د امونيم کلورايد مشبوع محلول د تودوخې په 0°C , 40°C او 80°C کې برابر کړئ، د پورتنۍ تودوخې په هره درجه کې به په کومه کچه امونيم کلورايد په 100g اوبو کې حل کړئ.
- 2- که چيرې وغواړئ چې د سوډيم نايترېت مشبوع محلول د تودوخې په 0°C , 40°C او 80°C کې په لاس راوړئ، د تودوخې په ټولو پورتنيو درجو کې به په کومه کچه سوډيم نايترېت په 100g اوبو کې حل شي؟
لاندې گراف د تودوخې او د موادو د انحلايت ترمنځ اړيکه په 100g اوبو کې ښيي:



شکل: د مالگو د انحلايت گراف 100g اوبو کې

ځواب

- ۱- له پورتنۍ گراف څخه معلومېږي چې د تودوخې په 0°C , 40°C او 80°C درجو کې په پرله پسې بڼه 32g، 42g او 60g گرام امونيم کلورايد تر لاسه کېږي.
- ۲- له پورتنۍ گراف څخه معلومېږي چې د تودوخې په 0°C , 40°C او 80°C په پرله پسې بڼه 70g، 105g گرام او 150g گرام سوډيم نايترېت تر لاسه کېږي.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات:

په اوبو کې د مالگو منحل ډلې: د نايترېټو (Nitrate) ټولې مالگې په اوبو کې منحل دي.

د اسيتات مالگې په اوبو کې حل کيدونکې دي، د کلورايد، برومايد او ايودايد زياتره مالگې په اوبو کې حل ليرې؛ خو دسيمابو، سپينو زرو او سربو دهلوجنونو مالگې په اوبو کې نه حلېږي، د سلفيټو مالگې په اوبو کې حل ليرې، CaSO_4 ، AgSO_4 ، HgSO_4 او PbSO_4 په لږه کچه په اوبو کې حل کېږي؛ خو د SrSO_4 او BaSO_4 په اوبو کې نه حلېږي. د لومړي اصلي گروپ مالگې او امونيم مالگې په اوبو کې حلېږي.

په اوبو کې د نه حلېدونکو مالگو او القليو ډلې

زياتره هايډروکسايډونه په اوبو کې نه حلېږي؛ خو د القليو فلزونو هايډروکسايډونه، $\text{Ba}(\text{OH})_2$ او NH_4OH په اوبو کې حلېږي؛ همدارنگه $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ، $\text{Sr}(\text{OH})_2$ په اوبو کې لږ حل کېږي. زيات کاربونيټونه او فاسفيټونه په اوبو کې نه حلېږي؛ خو د القلي




فلزونو کاربونیټونه او فاسفیټونه او د NH_4^+ کاربونیټونه او فاسفیټونه په اوبو کې حلېږي، زیاتره بای کاربونیټونه او بای فاسفیټونه په اوبو کې نه حلېږي؛ خو د لومړي اصلي ګروپ او دویم اصلي ګروپونو د عناصرونو سلفایډونه او $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ په اوبو کې حلېږي.

د هایډریشن د بهیر انرژي

څرنګه چې مخکې یادونه وشوه، تودوخه د حلیدلو په بهیر کې اغیزه لري، د حلیدو د بهیر د تودوخې معادله عبارت ده له :

$$\Delta H_{\text{solution}} = U_{\text{cry}} + \Delta H_{\text{hydration}}$$

په پورتنۍ معادله کې ΔH_{sol} د حلیدو مولاري انتلپي بدلون، U_{cry} د کرسټالي شبکې انرژي او ΔH_{hyd} د هایډریشن دانتلپي بدلون ښيي.



پنجم لوست

د درسي کتاب مخ: 10

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د محلولونو غلظت
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د غلظت او د هغه د کچې ډټاکلو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې په طب او صنعت کې د محلولونو د ټاکلې غلظت ارزښتناکه رول لري. - د محلولونو د دقيق غلظت په ټاکلو دې لاس براب وي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر، حل کیدونکي مواد او محلولونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخیستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه . د انگېزې رامنځته کول : کوم ډول محلولونه کیدای شي چې په وینه کې وردننه کړل شي ؟
1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. - د محلولونو د غلظت په اړه د هغوی له ډلې څخه د مولي برخې او د کتلوي سلنې په اړه دې هر اړخیز معلومات ور کړي او د هغوی څرنگوالی دې روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې په څو پوښتنو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي توضیحاتو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د محلولونو د غلظت په اړه ورکوي، یادداشت او زده دې کړي. - محلولونه دې د بیلابیلو سلنو غلظتو سره دې جوړ کړي شي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ور کړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

دلوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د محلولونو غلظت (Solutiones Concentration)

د حل کوونکې مادې کچه د محلولونو په یوې ټاکلې واحد کې او یا د محلول په ټاکلې واحدې کتلې کې د غلظت په نوم یا دېرې:

$$C = \frac{m}{V}, C = \frac{n}{m'}$$

په دې فورمولونو کې C غلظت، m د حل کیدونکې مادې کچه ده، n د حل کیدونکې مادې مولونه، V حجم او m' د محلول د کتلې کچه ښيي.

که څه هم د محلولونو غلظت کیدای شي د باصرې او لامسې حس په واسطه وټاکل شي؛ خو په طب او صنعت کې د محلولونو دقیق غلظت او ټاکلې کچه باید وټاکل شي، د محلولونو د غلظتونو د کچو او د غلظت د موندلو لپاره شپږ قیاسي واحدونه په کار وړل شوي دي چې لاندې هریو یې په لنډ ډول څیړلو.

1- مول فرکشن ($Fraction\ Mole$): د محلولو د یوه جز د مولې برخه د محلولو د جوړوونکو اجزاوو د مولونو د مجموعې د ویش له کچې څخه عبارت دي:

$$N_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2 + \dots n_i}$$

مثال: د هغه محلول د منحلې مادې او محلول مولې برخه ومومئ کوم چې د 46g سودیم کلوراید او 180g گرام اوبو څخه جوړ شوی دی.

حل:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{180g}{18g/mol} = 10mol, \quad n = \frac{m}{M} = \frac{46g}{58.5g/mol} = 0.8mol$$

$$N_{NaCl} = \frac{n_{NaCl}}{n_{NaCl} + n_{H_2O}} = \frac{0.8mol}{0.8mol + 10mol} = 0.074$$

$$N_{H_2O} = \frac{n_{H_2O}}{n_{NaCl} + n_{H_2O}} = \frac{10mol}{0.8mol + 10mol} = 0.926$$

نوټ: د محلولونو د جوړوونکو اجزاوو د مولې برخې مجموعه، له یو سره مساوي ده:

$$N_1 + N_2 + \dots N_i = 1$$

1. کتلوي برخه او کتلوي سلنه:

کتلوي برخه، که چیرې د محلولونو د اجزاوو د یوې برخې کتله د محلولونو د جوړوونکو اجزاوو په مجموعي کتلې باندې ویشل شي، د محلول د پام وړ جز کتلوي برخه لاس ته راځي:

$$W_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + \dots m_i}$$

مثال: د 150g NH_4OH په 250g اوبو کې حل شوي دي، د NH_4OH کتلوي برخه په دې محلول کې ومومئ.

حل:

$$\left. \begin{aligned} M_{NH_4OH} &= 150 = g \\ M_{H_2O} &= 250g \\ W_{NH_4OH} &= ? \\ W_{H_2O} &= ? \end{aligned} \right\}$$

$$W_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + \dots m_i} = \frac{150g}{250g + 150g} = \frac{150g}{400g} = 0.375$$

$$W_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + \dots m_i} = \frac{250g}{250g + 150g} = \frac{250g}{400g} = 0.625$$

نوټ: د محلولونو د اجزاوو د کتلوي برخې مجموعه له یو سره مساوي ده.

$$W_1 + W_2 + \dots W_i = 1$$

د کتلوي برخې سلنه: که چیرې د محلولونو د یوه جز کتله، د جوړوونکو اجزاوو د ټولې کتلې (دمحلول کتلې) باندې وویشل شي او پاتې شونې یې له 100 سره ضرب شي، د محلول د اجزاوو د کتلوي سلنه لاسته راځي:

$$W\%_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + \dots m_i} \cdot 100$$

مثال: د 1300g KOH په 500g اوبو کې حل شوي دي، د KOH او اوبو کتلوي برخه په دې محلول کې ومومئ:

حل:

$$\left. \begin{aligned} M\%_{KOH} &= 1300g \\ M_{H_2O} &= 599g \\ W\%_{KOH} &= ? \\ W\%_{H_2O} &= ? \end{aligned} \right\}$$

$$W\%_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2 + \dots m_i} \cdot 100$$

$$W\% = \frac{130g}{130g + 500g} \cdot 100$$

$$W\%_{KOH} = \frac{130g \cdot 100}{630g} = 20.635\%$$

$$W\%_{H_2O} = \frac{500g \cdot 100}{500g + 130g} = \frac{50000g}{630g} = 79.365\%$$





شپږم لوست

د درسي کتاب مخ: 12

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د مولاريتي غلظت
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د مولاريتي غلظت په اړه دې هر اړخيز معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د حل کيدونکي مادې د مولونو کچه د محلولونو په يوه ټاکلي واحد حجم کې د مولاريتي او د مولونو کچه په يو ليتر کې د مولرد غلظت په نامه يادېږي. - د مولاريتي غلظت پر محاسبې باندې دې پوه او په خپل چاروکې دې وکارولی شي.
3- د تدريس میتود		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشير، د ژورته بالون حل کيدونکي مواد او بيلابيل محلولونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لوړمړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضري اخيستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: د يو نورمال سړي دوي غلظت 0.25 - 0.3 مولره دی، دا جمله څه مفهوم لري؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه وخت په دقیقه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي.		40 - د ښوونکي توضيحاتو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د محلولونو د غلظت په اړه ورکوي، يادداشت او زده دې کړي. - محلولونه دې د بيلابيلو سلنو له غلظت سره جوړکړای شي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه وړاندې کړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.


8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

مولاريتي غلظت: د مولاريتي غلظت لرونکې محلولونه کيدای شي داسې روښانه کړای شي:

مولاريتي غلظت: د حل کيدونکې مادې د مولونو کچه د محلول په يو تاکلي واحد حجم کې له مولاريتي غلظت څخه عبارت دی:

$$C_M = \frac{\text{moles}}{V}$$

د مولاريتي غلظت د ټاکلو واحدونه کيدای شي $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ ، $\frac{\text{mol}}{\text{dcem}^3}$ ، $\frac{\text{mol}}{\text{m}^3}$ وي، که چيرې د حل کيدونکې مادې د مولونو کچه په يو ليتر محلول کې شتون ولري دا ډول غلظت د مولر Moler په نوم يا دوي:



که يومول حل کيدونکې ماده په يوليتر محلول کې حل شوې وي، د محلول غلظت يو مولر دی او که د حل کيدونکې مادې درې موله په يوليتر محلول کې حل شوي وي، د محلول غلظت درې مولره دی، که چيرې د حل کيدونکې مادې 0.2 موله په يوليتر محلول کې حل شوي وي، د محلول غلظت 0.2 مولره (1decemeter) دی.

مولاريتي غلظت کيدای شي د نسبت، تناسب او يا لاندې فورمول په واسطه محاسبه شي:

$$C_M = \frac{m \cdot 1000 \text{ml} \cdot \text{molar}}{M \cdot v}$$

مثال: د Ca(OH)_2 120g په 10 ليتره محلول کې شتون لري، د هغه مولري غلظت محاسبه کړئ د Ca(OH)_2 ماليکولي کتله 74amu ده.

حل:

$$m_{\text{Ca(OH)}_2} = 120\text{g}$$

$$V_{\text{sol}} = 10\text{L}$$

$$C_M = ?$$

$$C_M = \frac{m \cdot 1000 \text{ml} \cdot \text{molar}}{M \cdot v}$$

$$C_M = \frac{120\text{g} \cdot 1000 \text{ml} \cdot \text{molar}}{74\text{g} \cdot 10000 \text{ml}} = 0.16 \text{molar}$$





اووم لوست

د درسي کتاب مخ: 13

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		نارملتي غلظت او مولاليتي غلظت
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د نارمليتي او مولاليتي غلظت په اړه دې هر اړخيز معلومات تر لاسه کړي . - يقين دې تر لاسه کړي چې د محلولونو په يو واحد حجم کې د حل کيدونکې مادې معادل-گرام د نارمليتي غلظت او د حل کوونکو په يوې ټاکلې کتلې کې د حل کيدونکې مادې ټاکلې مول له مولاليتي غلظت څخه عبارت دی . - د نارملتي او مولاليتي غلظت پر محاسبه دې پوه او په ورځيني ژوند کې دې وکارولی شي .
3- د تدریس میتود		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر، د ژوړه بالون، د حل کيدونکي موادو بیلایل محلولونه
5- د ارزونه میتود		شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د وخت په دقیقه کورنۍ د ندې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: له وینې سره دایزوتونیک سیرومونو غلظت څومره دی؟
وخت په دقیقه	د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه	1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)
وخت په دقیقه	د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه	د لوست سرلیک دې د تختې پر مخ ولیکي. - د نارمل او مولل محلولونو د غلظت په اړه دې هر اړخیز معلومات ور کړي او د هغوی څرنگوالي دې روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته بیان کړي. - لوست دي په څو پوښتنو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي. - د ښوونکي توضیحاتو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې د مولاليتي غلظت په اړه ورکوي، یادداشت او زده دې کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ور کړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

دلوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

نارمليتي غلظت: د محلولونو په يوه واحد حجم کې د حل کيدونکې مادې د معادل -گرام کچه له نارمليتي غلظت څخه عبارت دی:

$$C_M = \frac{Eq - g}{V}$$

د مول معادل يا نارمليتي غلظت د ټاکلو قياسي واحدونه کيدای شي $\frac{Eq - g}{m3}$, $\frac{Eq - g}{decem3}$, $\frac{Eq - g}{L}$ وي.

په هغه صورت که چيرې د حل کيدونکې مادې د معادل - گرامونو په کچه په يوليتري محلول کې شتون ولري، دا غلظت د نارمل

Narmal غلظت په نوم يا دوي:

$$C_N = \frac{Eq - g}{L} = \text{narmal}$$

که د حل کيدونکې مادې يو معادل - گرام په يوليتري محلول کې حل شوی وي، د محلول غلظت يو نارمل دی او که د

0.02Eq - g حل کيدونکې ماده په يوه ليتري محلول کې حل شي، محلول 0.02N يا 2 ديسي نارمله دی.

نارمليتي غلظت کيدای شي چې د نسبت، تناسب يا لاندې فورمول پر بنسټ محاسبه کړای شي:

$$C_N = \frac{m \cdot 1000mL}{Eq \cdot g \cdot V}$$

مثال: د H_2SO_4 محلول نارمل غلظت محاسبه کړئ کوم چې په 1500mL کې يې 130.4 گرامه H_2SO_4 شتون ولري د H_2SO_4 ماليکولي کتله 98amu ده.

$$\left. \begin{array}{l} m_{H_2SO_4} = 130g \\ V = 1500mL \\ M = 98amu \\ C_N = ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} C_N = \frac{m \cdot 1000mL \cdot N}{Eq - g \cdot V} \\ C_N = \frac{130.4g \cdot 1000mL \cdot N}{49g \cdot 1500mL} = 1.8N \end{array}$$

د مولاليتي غلظت: دحل کيدونکې مادې د مولونو کچه د حل کوونکې مادې په يوه واحده کتله کې د مولاليتي غلظت څخه عبارت دی:

$$C_m = \frac{mole}{m'solvent}$$

د مولاليتي غلظت د ټاکلو واحدونه کيدای شي $\frac{mol}{pound}$, $\frac{mol}{g}$, $\frac{mol}{Kg}$ او نور وي، که چيرې دحل کيدونکې مادې د مولونو

کچه په يو کيلوگرام حل کوونکې کې حل شوي وي، دا غلظت په ټاکلي ډول د مولال (molal) په نوم ياديږي:

$$C_m = \frac{mol}{Kg} = \text{molal}$$

که چيرې د حل کيدونکې مادې يومول په يو کيلوگرام حلكيدونکې مادې کې حل شوی وي، دمحلول غلظت يو مولل دی، که

د حل کيدونکې مادې دوه موله په يو کيلوگرام حل کوونکې کې حل شوی وي، د محلول غلظت يو مولل دی، همدارنگه که



چيرې دحل كيدونكې مادې 0.04mol په يو كيلوگرام حل كوونكې كې حل شوي وي ،دمحلول غلظت 4 ديسي مولل دی .
مولاليتي غلظت كيدای شي د نسبت، تناسب اولاندې فورمول پر بنسټ محاسبه كړای شي:

$$C_M = \frac{m \cdot 1000 \text{ml} \cdot \text{molar}}{M \cdot v}$$

په دې فورمول كې C_m مولل، m د حل كيدونكې مادې كتله، m' د حل كونكې مادې كتله او M د حل كيدونكې مادې ماليكول كتله ښيي.

مثال: د HNO_3 248g گرامه په 1500g اوبو كې حل شوي دي، د HNO_3 ماليكولي كتله 63amu ده، دهغه مولل غلظت محاسبه كړئ.

حل:

$$\left. \begin{array}{l} m = 248 \\ m' = 1500 \text{ g} \\ M = 63 \\ C_m = ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} C_m = \frac{m \cdot 1000 \text{g} \cdot \text{molal}}{M \cdot m'} \\ C_m = \frac{248 \text{ g} \cdot 1000 \text{ g} \cdot \text{molal}}{63 \text{ g} \cdot 1500 \text{ g}} = 2.62 \text{ molal} \end{array}$$

د تيترو غلظت (teter): دحل كيدونكې مادې د گرامونو كچه د محلول په يو ملی ليترو كې له تيترو غلظت څخه عبارت دی:

$$C_T = \frac{\text{grams}}{\text{mL}}$$

مثال: د NaNO_3 5molar محلول به د كوم تيترو غلظت ولري؟

د NaNO_3 ماليكول كتله 85amu ده.

حل:

$$n \quad \frac{m}{M}, \quad m = n \cdot M$$

$$m = 5 \text{ mol} \cdot 85 \text{ g/mol} = 425 \text{ g}$$

$$C_T = \frac{425 \text{ g}}{1000 \text{ mL}} = 0.425 \frac{\text{g}}{\text{mL}}$$



دویم څپرکی

د څپرکی موضوع: د محلولونو خواص

1- د تدریس وخت: 8 درسي ساعتونه

د درسي ساعتونه	د لوست سرليکونه	گڼه
يو درسي ساعت	د محلولونو کولېگاتيف خواص	1
يو درسي ساعت	د اسموس عمليه او اسموتیک فشار	2
يو درسي ساعت	د حل شوي مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټيټدل	3
يو درسي ساعت	د محلولونو د ایشيدو د درجې لوړېدل	4
يو درسي ساعت	د محلولونو د کنگل کيدو د درجې ټيټېدل	5
يو درسي ساعت	الکتروليت او غير الکتروليت محلولونه	6
يو درسي ساعت	ضعيف او قوي الکتروليت محلولونه	7
يو درسي ساعت	د څپرکي لښيز او د څپرکي پوښتنې	8

2- د څپرکي پوهنيزې موخې

- د محلولونو کولېگاتيف خواصو او د الکتروليت او غير الکتروليت محلولونو په اړه دې معلومات ولري.

- درک دې کړي چې د محلولونو ځينې خواص د حل شوې او حل کوونکې مادې په خواصو پورې اړه نه لري؛ بلکې د هغوی د جوړوونکو ذرو له حرکت سره اړيکه لري.

- د محلولونو خواص يو له بل څخه توپير کړای شي او محلولونه دې په بيلابيلو غلظتونو سره تر لاسه کړي، د هغوی د ایشيدو او کنگل کيدو درجه او اسموتیک فشار دې وټاکلی شي.

3- د څپرکي د پوښتنو ځوابونه

- 1- ج ، 2- ب ، 3- الف ، 4- الف ، 5- ب
- 6- ج ، 7- ب ، 8- الف ، 9- الف ، 10- ب

تشرېحي پوښتنو ته ځوابونه

1-

$$m = 5g \quad N_{C_6H_8O_2N_2S} = \frac{n_{C_6H_8O_2N_2S}}{n_{C_6H_8O_2N_2S} + n_{C_6H_8O_2N_2S}} = \frac{\frac{m_{C_6H_8O_2N_2S}}{M_{C_6H_8O_2N_2S}}}{\frac{m_{C_6H_8O_2N_2S}}{M_{C_6H_8O_2N_2S}} + \frac{m_{C_2H_6O}}{M_{C_2H_6O}}} = \frac{\frac{5g}{172g/mol}}{\frac{5g}{172g/mol} + \frac{10g}{46g/mol}}$$

$$\begin{aligned}
 m_{C_2H_6O} &= 10g \\
 -2 \quad p_0 &= 4000mmHg \\
 M_{C_6H_8O_2N_2S} &= 172 \\
 MC_2H_6O &= 46
 \end{aligned}
 \qquad
 \begin{aligned}
 N_{C_6H_8O_2N_2S} &= \frac{0.03mol}{0.03mol + 0.22mol} = \frac{0.03mol}{0.25mol} = 0.12 \\
 N_{C_6H_8O_2N_2S} &= \frac{\Delta p}{P_0} \Rightarrow \Delta p = N_{C_6H_8O_2N_2S} P_0 = 0.12 \cdot 400mmHg = 48mmHg \\
 \Delta p &= p_0 - p, \quad p = p_0 - \Delta p = 400mmHg - 48mmHg = 352mmHg \\
 p &= 352mmHg
 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}
 m &= 5g \\
 m_{H_2O} &= 100g \\
 p &= 31.2mmHg \\
 P^0 &= 31.82mmHg
 \end{aligned} \right\}
 \begin{aligned}
 \Delta p &= p_0 - p \\
 \Delta p &= 31.82mmHg - 31.2mmHg \\
 \Delta p &= 0.62mmHg \\
 \frac{\Delta p}{P_0} &= N_1, \quad \frac{\Delta p}{P_0} = \frac{\frac{m_1}{M_1}}{\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_{H_2O}}{M_{H_2O}}}
 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}
 M &= ? \\
 T &= 30^{\circ}C
 \end{aligned} \right\}
 \begin{aligned}
 \frac{0.62mmHg}{31.82mmHg} &= \frac{\frac{5g}{M_1}}{\frac{5g}{M_1} + \frac{100g}{18g/mol}} \\
 0.0195mmHg &= \frac{\frac{5g}{M_1}}{\frac{5g}{M_1} + 5.55mol}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0.0195mmHg \left(\frac{5g}{M_1} + 5.55mol \right) &= \frac{5g}{M_1} \\
 \frac{0.1g \cdot mmHg}{M_1} + 0.11mol \cdot mmHg &= \frac{5g}{M_1} \\
 \frac{0.1g \cdot mmHg}{M_1} - \frac{5g}{M_1} &= -0.11mol \cdot mmHg \\
 \frac{0.1mmg \cdot g - 5g}{M_1} &= -0.11mmHg \cdot mol \\
 M_1 &= \frac{-4.9mmHg \cdot g}{-0.11mmHg \cdot mol} = 45g/mol
 \end{aligned}$$

-3

$$\begin{aligned}
 & \left. \begin{aligned} m &= ? \\ m_{H_2O} &= 100g \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{\Delta p}{p_0} &= N1 \\ \frac{\Delta p}{p_0} &= \frac{\frac{m_1}{M_1}}{\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2}} \end{aligned} \\
 & \left. \begin{aligned} \Delta p &= 0.5 \text{tor} = 0.5 \text{mmHg} \\ P^0 &= 760 \text{mmHg} \\ M &= 60 \text{g/mol} \\ T &= 0^\circ \text{C} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{0.5 \text{mmHg}}{760 \text{mmHg}} &= \frac{\frac{m_1}{60 \text{g/mol}}}{\frac{m_1}{60 \text{g/mol}} + \frac{100 \text{g}}{18 \text{g/mol}}} \\ 0.000658 &= \frac{\frac{m_1}{60 \text{g/mol}}}{\frac{m_1}{60 \text{g/mol}} + 5.55 \text{mol}} \\ 0.000658 \left(\frac{m_1}{60 \text{g/mol}} + 5.55 \text{mol} \right) &= \frac{m_1}{60 \text{g/mol}} \\ \frac{0.000658 m_1}{60 \text{g/mol}} + 0.00365 \text{mol} &= \frac{m_1}{60 \text{g/mol}} \\ + 0.00365 \text{mol} &= \frac{m_1}{60 \text{g/mol}} - \frac{0.000658 m_1}{60 \text{g/mol}} \\ 0.219 \text{mol} m_1 &= 0.999342 \text{mol} \\ m_1 &= \frac{0.999342 \text{mol}}{0.219 \text{mol}} = 4.56 \text{g} \end{aligned}
 \end{aligned}$$

-4

$$\begin{aligned}
 m &= 2.4 \text{g} & \Delta T_f &= K \cdot C_m \\
 m' &= 75 \text{g} & \Delta T_f &= K \frac{m \cdot 1000 \text{g} \cdot \text{molal}}{M \cdot m'} \\
 T_2 &= -0.975^\circ \text{C} & M &= K \cdot \frac{m \cdot 1000 \text{g} \cdot \text{molal}}{\Delta T_f \cdot m'} \\
 T_1 &= 5.5^\circ \text{C} & \Delta T_f &= T_1 - T_2 = 5.4^\circ \text{C} - (-0.975^\circ \text{C}) = 6.37^\circ \text{C} \\
 \text{Farmol} &= ? & M &= 5.12 \frac{^\circ \text{C} \cdot \text{kg}}{\text{mol}} \cdot \frac{2.4 \text{g} \cdot 1000 \text{g} \cdot \text{mol} / \text{kg}}{6.475^\circ \text{C} \cdot 75 \text{g}} = 26 \\
 K &= 52.12^\circ \text{C} \cdot \text{kg} / \text{mol}
 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned}
 M &= 26 \text{ g/mol} \\
 M(C_nH_{2n-2}) &= 26 \\
 12n + 1 \cdot 2n - 2 &= 26 \\
 14n &= 26 + 2 \\
 C_2H_{2 \cdot 2 - 2} \\
 C_2H_2
 \end{aligned} \right\} \begin{aligned}
 , n &= \frac{28}{14} \quad , n = 2 \\
 HC \equiv CH
 \end{aligned}$$

حاصل شوی مرکب استیلین دی.

- 5

$$\begin{aligned}
 M &= 6.86 \cdot 10^4 \text{ g/mol} & P_{os} &= CRT \\
 V &= 100 \text{ mL} & P_{os} &= \frac{m \cdot 1000 \text{ molar}}{M \cdot V} RT \\
 P_{os} &= 6.15 \text{ mmHg} & m &= \frac{P_{os} \cdot M \cdot V}{1000 \text{ molar} \cdot RT} \\
 & & m &= \frac{6.15 \text{ mmHg} \cdot 6.86 \cdot 10^4 \text{ g/mol} \cdot 100 \text{ mL}}{1000 \text{ mL} \cdot 298 \text{ K} \cdot 62.35 \text{ mmHg} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K}} \\
 T &= 25^\circ \text{C} = 298 \text{ K} \\
 m &= ? & m &= 2.24 \text{ g}
 \end{aligned}$$

- 6

$$\begin{aligned}
 m &= 1.15 \text{ g} & \Delta T_f &= T_1 - T_2 = K \cdot C_m \\
 m &= 100 \text{ g} & \Delta T_f &= K \cdot \frac{m \cdot 1000 \text{ g} \cdot \text{molal}}{M \cdot m'} \\
 P_{os} &= 6.15 \text{ mmHg} & M &= K \cdot \frac{m \cdot 1000 \text{ g} \cdot \text{molal}}{\Delta T_f \cdot m'} \\
 T_2 &= 4.95^\circ \text{C} & M &= \frac{5.12^\circ \text{C} \cdot \text{Kg}}{\text{mol}} \cdot \frac{1.15 \text{ g} \cdot 1000 \text{ g} \cdot \frac{\text{mol}}{\text{kg}}}{0.45^\circ \text{C} \cdot 100 \text{ g}} \\
 T_1 &= 5.4^\circ \text{C} = 298 \text{ K} & M &= 130.8 \text{ g/mol} \\
 M &= ? \\
 K &= 5.12
 \end{aligned}$$



لومړۍ لوست

د درسي کتاب مخ: 18

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د محلولونو کولېگاتيف خواص
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د محلولونو د کولېگاتيف خواصو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د محلولونو له خواصو څخه ځينې يې د حل کوونکې مادې او د حل کيدونکې مادې پورې اړه نه لري؛ بلکه د هغوی د ذرو له حرکت سره اړيکه لري. - د محلولونو د کولېگاتيفو خواصو په محاسبه او ټاکلو دې وتوانېږي.
3- د تدريس میتود		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشير او د محلولونو بيلابيل ډولونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکنی، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: ولی د انتي فريز اوبه د تودوخې په ښکته درجو کې کنگل کېږي؟ وخت په دقیقه 5
1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
- د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د کالېگاتيف محلولونو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي او د هغوی څرنگوالی دې روښانه کړي. - د محلولونو د کالېگاتيف خواصو د ډولونو په اړه دې زده کوونکو ته هراړخيز معلومات ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي توضيحاتو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د محلولونو د کولېگاتيفو خواصو په اړه وړاندې کوي يادداشت او زده دې کړي. - د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
وخت په دقیقه 40		



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت

په حل کوونکي (محلول) کې د حل شوو موادو (منحله مادې) خپریدل او د هغوی د خپریدو چټکتیا د اړتیاوړ توکي او مواد: بیکر، د ښورولو میله، قیف، د فلتر کاغذ، نیل توتیا، د سلفر پوډر او مقطرې اوبه. کرنلاره: یو بیکر تر نیمایي برخې له اوبو څخه ډک کړئ، او په هغه باندې لږ څه د نیل توتیا مخلوط او د سلفر پوډر ورزیات کړئ، وگورئ چې د نوموړو مخلوطو له اجزاو څخه کومه یې ډیره خپرېږي؟

لږ څه وروسته د بیکر محتویات فلتر کړئ، خپلې لیدنې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او لاندې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ.

1. د مخلوطو د اجزاو څخه به کومه یوه په اوبو کې په چټکتیا سره خپره شي؟

2. د نوموړي مخلوط کوم جز به د فلتر کولو د عملیې په واسطه جلا شي؟

3. هغه محلول چې له فلتر کولو څخه وروسته لاسته راځي، له کومو اجزاو څخه به جوړشوی وي؟

له ویلو څخه دې پاتې نه شي چې مواد د خپریدو له کبله یو له بل سره توپیر کوي، هغه مواد چې لوېې ذرې لري، د خپریدو چټکتیا یې له هغو موادو څخه لږه ده کوم چې ذرې یې وړې دي.



شکل: د موادو د خپریدلو چټکتیا او څرنگوالی یو پر بل کې

حل:

1- څرنگه چې نیل توتیا په اوبلن محلول کې په ایونونو توپه کیږي، خو سلفر دا ځانگړتیا نه لري، له دې امله نیل توتیا له سلفر څخه زیاته او ښه خپرېږي.

2-د فلتر کولو د عملیې په واسطه سلفر له نوموړي محلول څخه په اسانۍ سره جلا کیږي.

3-له فلتر کولو څخه وروسته لاسته راغلی محلول د کاپرسلفیت له محلول څخه عبارت دی.


8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات

ډیفیوژن (*Diffusion*): د حل شوي مادې او حل کوونکې (محلول) مادې د غلظت په خپل سر د یوشان کیدو بهیر چې د هغوی د ذرو د حرکت په پایله کې تر سره کیږي، د ډیفیوژن په نوم یادېږي. که چیرې د خوړو د مالګې په غلیظ محلول باندې خالصې اوبه ورزیاتې کړو، و به لیدل شي چې د اوبو مالیکولونه د محلول لاندې برخې او د مالګې ذرې د محلول پورتنۍ برخې ته تر هغه وخت پورې حرکت کوي چې د محلول په ټولو برخو کې د موادو غلظت مساوي شي. د ډیفیوژن چټکتیا د *fick* د قانون په واسطه ټاکل کیږي چې د هغه معادله په لاندې ډول ده:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = D \cdot S \frac{\Delta C}{\Delta X}$$

په دې فورمول کې $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ د ډیفیوژن چټکتیا، D د ډیفیوژن ضریب، S هغه سطحه ده چې ډیفیوژن له هغې څخه تیرېږي، $\frac{\Delta C}{\Delta X}$ د غلظت ګراندت؛ یعنې د غلظت بڼه (شیپ) ښيي.





دویم لوست

د درسي کتاب مخ: 19


د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		داسموس عمليه او اسموتیک فشار
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د اسموس عمليې، اسموتیک فشار او دیالایلو محلولونو د اسموتیک فشار د محاسبې په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - یقین دې تر لاسه کړي چې داسموس عمليه او اسموتیک فشار په حیاتي او صنعتي بهیرونو کې بنسټیز رول لري. - دیالایلو محلولونو داسموتیک فشار د لاسته راوړنې محاسبه دې وکړای شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشیر، دیالایلو موادو محلولونه او اسمومتر
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخیستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: د انسانانو د فشار د لوړیدلو لامل څه دی؟
1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
- د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي. - د اسموتیک فشار په اړه دې هراړخیز معلومات وړاندې او د هغې څرنگوالی روښانه کړي. - د محلولونو په جوړولو کې دې د زده کوونکو له ډلو څخه مرسته وغواړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي توضیحاتو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د اسموتیک فشار په اړه ورکوي، یادداشت او زده دې کړي. - زده کوونکي دې په ډله ییز کار کې فعاله برخه واخلي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

فعالیت:

لاندې شکلونو ته په څیر سره وگورئ او روښانه یې کړئ چې له حیواني او نباتي حجرو څخه کومه یوه یې د هایپوتانیک، هایپرتانیک او ایزوتانیک محلولونو په دننه کې ځای لري؟ د نوموړو حجرو بدلونونه وټاکئ.



شکل :- په ایزوتانیک، هایپرتانیک او هایپوتانیک محلولونو کې د نباتي او حیواني حجرو څرنگوالی

ځواب:

- 1- په لومړي شکل کې حجرې په ایزوتانیک محلول کې شتون لري؛ نو له دې امله په هغوی کې کوم بدلون نه تر سترگو کیږي.
- 2- په دویم شکل کې حجرې د هغوی سره په هایپوتانیک محلول کې ځای لري، د حجرو هیمولیز صورت نیولی دی.
- 3- په دریم شکل کې حجرې په هایپرتانیک محلول کې شتون لري چې د هغوی پلازمولیز (پوچیدل) ترسره شوی دی.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

داسموس عملیه او اسموتیک فشار

له نیمگړې تیروونکې غشا څخه د اوبو یا د کوم بل حل کوونکې مادې تیریدل، د اسموس د عملیې په نوم یادېږي. د نیمگړې تیروونکې غشا ځانگړتیا دا ده چې کوچنیو ذرو ته د تیریدو اجازه ورکوي؛ خو لویو ذرو ته د تیریدو اجازه نه ورکوي او دروی یې، په رښتیا توگه چې داسموس عملیه له یو اړخیزه د فیوژن څخه عبارت ده.

اسموتیک فشار

هغه قوه چې حل کوونکې ماده مجبوروي چې تر څو له نیمگړې تیروونکې غشا څخه غلیظ محلول ته تیره شي، هغه فشار ته

ورته خواص لري کوم چې د گازونو تیریدل له لوړ فشار تر لاندې لوبښي څخه د لږ فشار لرونکي لوبښي لوړته مجبوروي، همدغه عمل کوونکې قوه د سطحې په یو واحد په محلولونو کې د اسموتیک فشار په نوم یادوي.

اسموتیک فشار د حل شوي مادې او حل کوونکې مادې خاصیت نه دی، دا پدیده په هغه سیستم کې منځ ته راځي چې له بیلابیلو غلظت لرونکو محلولو نوڅخه جوړ او د نیمگري تیروونکې غشا په واسطه یو له بل څخه جلا شوی وي.



د نریو محلولونو د اسموتیک فشار د محاسبې لپاره ، واندې هوف د گازونو د معادلې او قوانینو وړاندیز وکړ او لاندې نظریه یې ور کړه: د محلولونو مساوي حجمونه په مساوي کچه ذرې لري .

$$P = \frac{n}{V} RT \text{ اویا } PV = nRT$$

څرنگه چې $C = \frac{N}{V}$ دی؛ نو پردې بنسټ $P = CRT$ دی.

په دې فورمول کې P د محلول اسموتیک فشار، V د محلول حجم، n د منحلې مادې د مولونو کچه، T د محلول تودوخه او R د محلول ثابت دی چې په گازونو کې هم په کار وړل شوی دی ($R = 8.3 \text{ Joule} / k \cdot \text{mol}$).

اسمومتر



1- د لوبښي نیمگري د تیروني غشا

2- د اوبو او یا کوم بل حل کوونکي لرونکی لوبښی.

3- مانومتر

4- ربري میله

د الکترولیت محلولونو په یو واحد حجم کې د ذرو کچه ډیره ده ، له دې امله اسموتیک فشار یې ډیر دی ، څرنگه چې په الکترولیت محلولونو کې د ایونونو کچه د غیر الکترولیت محلولونو له کچې څخه ډیره ده ؛ نو له دې امله د الکترولیتو محلولو اسموتیک فشار د غیر الکترولیت محلول له اسموتیک فشار څخه ډیر دی، هغه فورمول چې د هغه په واسطه د الکترولیت محلولونو اسموتیک فشار کیدای شي محاسبه شي، په لاندې ډول دی:

$$P = iCRT$$

په دې فورمول کې i د واندې هوف ضریب دی او د محلولونو د انفکاک (ټوټه کیدو) له درجې سره اړیکه لري چې دا اړیکه کیدای شي په لاندې ډول روښانه او وموندل شي (په رښتیا چې i د الکترولیت مادې د ایونو کچه ورښيي):

$$I = \frac{\text{د ذرو ټول شمیر}}{\text{د منحلې مادې د مولونو شمیر}}$$

د نه ټوټه شوو مالیکولونو شمیر + ټوټه شوې ذرې = د ذرو ټول شمیر

$$nNAa = \text{ټوټه شوې ذرې}$$

$$NA - NAa = \text{نه ټوټه شوې ذرې}$$

$$NA = \text{د هرې مادې د یو مول د ذرو کچه}$$



$$i = \frac{nNAa + (NA - NAa)}{NA} = \frac{NA(na + 1 - a)}{NA}$$

$$i = \frac{na + 1 - a}{1}, \quad i - 1 = na - a, \quad i - 1 = a(n - 1)$$

$$\frac{i - 1}{(n - 1)} = \frac{a(n - 1)}{(n - 1)}, \quad a = \frac{i - 1}{n - 1}$$


په وروستی معادله کې n دایونونو هغه کچه ده چې الکترولیت ماده په هغوی تفکیک شوې ده.


پورتنۍ فورمول ښيي چې د (i) ضریب په ټولیز ډول له یو څخه لوړ دی، له دې څخه دا پایله تر لاسه کیږي چې د الکترولیت محلولونو اسموتیک فشار د غیر الکترولیت محلولونو له فشار څخه لوړ دی.

دوینې د پلازما اسموتیک فشار ثابت دی او په $700 - 800 \text{ Kpa}$ ترمنځ شتون لري، د وینې له لوړ فشار څخه معلومیږي چې د وینې غلظت زیات دی، په وینه کې لوړ مرکبونه او مالګې زیاتي شته دي، له دې فشار څخه یوه برخه یې د انکوتیک فشار (Angotic Pressure) په نوم یادېږي چې 0.5% دوینې فشار را ښيي او $3.5 - 4.9 \text{ Kpa}$ دی.

د اسموس عملیه د مایع حل کوونکو او د محلولونو د مالګو په تیریدنه په بیالوژیکي عملیو کې ډیر مهم رول لوبوي، حجروي غشاوې د نیم گرې غشا په توګه په ژونديو موجوداتو کې عمل کوي او د حجرو دننه ته دمایعانونوتل شوني کوي، سربيره له دې حل کیدونکې مادې ځینې مالیکولونه کیدای شي چې د حجرې د پوستکي له لارې څخه حجرې ته وردننه شي؛ ځکه د حجرو غشاوې قطبي دي او د ټاکلو وړتیا لري. د اسموس له عملیې څخه د پختورګو د ناروغانو د درملنې لپاره ګټه اخیستل کیږي چې دا عملیه د دیالیز (Dialysis) په نوم یادېږي. کوچني مالیکولونه؛ لکه یوریا له نیم گرې تیروونکې غشا څخه تیرېږي؛ خو لوی مالیکولونه؛ لکه: د پروتین مالیکولونه نه شي تیریدلی.

همدارنگه د سیندونو او سمندرونو تروې اوبه د اسموس د خواصو د معکوسې عملې په واسطه خوړې او د څښلووړ گرځي، څرنگه چې څرګنده ده، عادي او خوړې اوبه، په تروو اوبو کې ننوځي؛ له دې امله د تروو اوبو د مالګو غلظت ټیټیږي؛ خو که چیرې هغه تروو اوبو ته چې په نیم گرې غشا لرونکي لوبښي کې شتون لري، فشار ورکړل شي، برعکس اوبه له نیم گرې غشا له سوریو څخه وځي او ډیرې خالصې کیږي چې له دې عملیې څخه په بیړیو کې ګټه اخلي، لاندې شکل وګورئ:





دریم لوست

د درسي کتاب مخ: 22

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د حل شوی مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټيټېدل
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د محلولونو او محلولونو د براس فشار په اړه دې معلومات تر لاسه او زده دې کړي. - یقین دې ترلاسه کړي چې په حل کوونکې مادې کې د حل کیدونکې په ورزیاتولو سره د محلولونو د براس فشار ټيټېږي. - د حل کوونکې مادې او د محلولونو د براس د فشار په ټاکلو دې وتوانېږي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملی
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر، مقطرې اوبه، د حل کیدونکي الکترولیت مواد.
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: اوبه به ژر په ایشیدو راشي اویا که د هغې د مالګې محلول؟
6- 1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي.		د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي.
د محلولونو د براس فشار په اړه دې هراړخیز معلومات وړاندې او د هغه څرنگوالی دې روښانه کړي.		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.
زده کوونکي دې په ډلو وویشي، ترڅو زده کوونکي په عملی توګه د محلولونو او محلولونو د براس فشار وټاکي.		د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي.
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.
لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.		د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي.
زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي.




7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت

الف - په درې بیلابیلو لوښو کې په وار سره خالصې اوبه، د بورې یو مولره او د بورې دوه مولره محلول شته دي، د هریو محلول د براس چټکتیا او د براس فشار لاسته راوړئ.

ب - په لاندې شکلونو کې خالصې اوبه او د مالګې محلول په یوه تړلي چاپیریال کې د تودوخې له ثابتې درجې سره شتون لري، دوخت په تیریدو سره به د دوی د اوبو په کچه کې کوم بدلونونه ولیدل شی؟



(2-7) شکل: د خالص حل کوونکې او د هغې د محلول د براس د فشار پرتله

ځواب

الف - د خالص محلول د براس چټکتیا د یو مولره محلول په نسبت او د یو مولره محلول د براس چټکتیا له دوه مولره محلول څخه ډیره ده.

ب - په پورتنی شکل کې خالصې اوبه او د مالګې محلول په تړلي چاپیریال او ثابت تودوخه کې د وخت په تیریدو سره اوبه کم وي؛ ځکه د هغوی یوه کچه براس کیږي؛ خو په محلول کې لږ بدلونونه لیدل کیږي؛ ځکه د هغوی د براس سطحه ټیټه ده.

8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات

زده یې کړئ

د امونیم کلوراید 3% محلول د کوم براس فشار لرونکی دی؟ که چېرې د هغه حل کوونکې ماده اوبه او د نوشادرو (NH_4Cl) مالیکولي کتله 53.5 ده.

حل: لومړی باید د حل کوونکې یا حل کیدونکې مادې مولې برخه وموندل شي:

$$W\% = 3\% \quad N_{NH_4Cl} = \frac{m/M}{m/M + m/M} = \frac{3g/53.5g \text{ mol}^{-1}}{3g/53.5g \text{ mol}^{-1} + 97g/18g \text{ mol}^{-1}} =$$

$$m_{NH_4Cl} = 3g \quad N_{NH_4Cl} = \frac{0.056 \text{ mol}}{0.06 \text{ mol} + 5.38 \text{ mol}} = \frac{0.06 \text{ mol}}{5.44 \text{ mol}} = 0.0102$$


$$m_{H_2O} = 97g \quad N_{NH_4Cl} = \frac{\Delta p}{p^0} \quad \Delta p = N_{NH_4Cl} p^0 = 0.012 \cdot 101.3 \text{ kpa} = 1.03 \text{ kpa}$$

$$\Delta p = p_0 - P, \quad p = p_0 - \Delta p, \quad p = 101.3 \text{ kpa} - 1.03 \text{ kpa}$$


$$p = 100.258 \text{ kp}$$


په رښتیا چې د یوې نه تنبیدونکې مادې حل کول په خالص تنبیدونکې حل کوونکې کې د حل کوونکې د براس فشار د ښکته کیدو لامل کیږي او د هغه لامل دا دی چې د نه تنبیدونکې مادې د مالیکولونو تر منځ ډیره قوه شته، کله چې د حل کیدونکې مادې له مالیکولونو سره یوځای شي، د حل کوونکې مادې د مالیکولونو د پوتنسیال مجموعې انرژي راټیټه وي

یا په بل عبارت د حل کیدونکو مواد مالیکولونو، د حل کوونکو موادو مالیکولونه بوخت ساتي؛ په دې صورت کې د هغو مالیکولونو کچه کوم چې د مالیکولونو ترمنځ له پوتنسیال انرژۍ څخه ډیره انرژي ولري، کمېږي او په پایله کې د هغو مالیکولونو کچه چې د محلول له سطحې څخه تېښتي، لږ ده او د براس فشار یې راتیټېږي.



لاندې گراف د حل کوونکې مادې د مولې برخې او د محلول د براس فشار ترمنځ اړیکه ښيي:





خلورم لوست

د درسي کتاب مخ: 24

د مطلبونو شرح		د مطلبونو سرليکونه
د محلولونو د ایشیدو د درجې لوړېدل		1- د لوست موضوع
له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د محلولونو د ایشیدو د درجې په اړه دې معلومات تر لاسه او د حل کیدونکې مادې د ایشیدو د درجې سره دې پرتله کړي. - یقین دې تر لاسه کړي چې د حل کوونکې او حل کیدونکې مادې د مالیکولونو تر منځ قوه، د هغوی د ایشیدو د درجو د لوړېدو لامل ګرځي. - د محلولونو د ایشیدو د محاسبې وړتیا دې ولري.		2- د زده کړې موخې - پوهنيزي - ذهني - مهارتي
مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي		3- د تدریس میتودونه
کتاب، قلم، تخته، تباشیر، بیلابیل محلولونه او ترمومتر		4- د تدریس اړین مواد او توکي
شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه		5- د ارزونې میتود
وخت په دقیقه	لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، دحاضری اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: ایا د مقطرو اوبو د ایشیدو درجه لوړه ده یا د نل د اوبو؟	6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه
وخت په دقیقه	د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه	1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)
40	- د ښوونکي توضیحاتو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې د محلولونو د ایشیدو د درجو په اړه ورکوي، یادداشت او زده کړي. - په ډله ییز کار کې دې فعاله ونډه واخلي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.	- د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. - د محلولونو د ایشیدو د درجو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي او د هغوی څرنگوالی دې روښانه کړي. - زده کوونکي دې په ډلو وویشي، هرې ډلې ته دې دنده ورکړي ترڅو د بیلابیلو غلظت لرونکو محلولو د ایشیدو درجه ومومي او د مقطرو اوبو د ایشیدو درجې سره دې پرتله کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فکر وکړئ

د محلولونو د ایشیدو ټکي د هغوی له خالص حل کوونکي څخه لوړ دی؛ خو ثابت نه دی، د وخت په تیریدو سره ډیرېږي، ولې؟ لامل یې ومومئ.

حل: د محلولونو د ایشیدو ټکي د هغوی د خالص حل کوونکي څخه له دې امله لوړ دی چې دحل کیدونکو موادو مالیکولونو د حل کوونکو موادو مالیکولونه بوخت کړي دي؛ په دې صورت کې د هغو مالیکولونو کچه کوم چې د مالیکولونو ترمنځ له پوتنسیال انرژۍ څخه ډیره انرژي ولري، کمېږي او په پایله کې د هغو د مالیکولونو کچه چې د محلول له سطحې څخه تېښتي، لږ ده او د براس فشار یې راټیټېږي چې د ایشیدو ټکي د لوړیدو لامل کیږي.

8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د خالص محلول او محلول د ایشیدو درجې له پرتله کولو څخه معلومیږي چې د محلولونو د ایشیدو درجه د خالص حل کوونکي په پرتله لوړه ده؛ د بیلگې په ډول: د خوړو د مالګې د محلول او یا د بورې د محلول د ایشیدو درجه له خالصو اوبو څخه لوړه ده؛ ځکه د دې محلولونو د براس فشار ټیټ دی. یوه ماده هغه وخت په ایشیدو راځي چې د مایع د براس فشار د مایع د سطحې پرمخ فشار سره کوم چې د هوا له فشار څخه (د چاپیریال فشار) منځ ته راځي، مساوي شي. خالصې اوبه په یو اتموسفیر فشار کې په 100°C تودوخه کې په ایشیدو راځي او په همدې تودوخه کې د اوبو د براس فشار یو اتموسفیر ته رسیږي، دا په هغه حال کې دی چې د نوموړو محلولونو د براس فشار له خالصو اوبو څخه لږ دی، له دې امله اتموسفیر فشار ته د دې محلولونو د براس د فشار رسولو لپاره اړتیا ده ترڅو د اوبو مالیکولونه د محلول له لاندینۍ برخې څخه د محلول سطحې ته ولېږل شي او د سطحې مالیکولونو سره یوځای شي. څرنگه چې د محلولونو دنني مالیکولونه له هرې لوري څخه د نورو مالیکولونو په واسطه جذبېږي، له دې کبله یې حرکت ورو او د لږې انرژي څخه برخمن دي؛ نو له دې امله دا مالیکولونه خپل د براس لپاره ډیرې انرژۍ ته اړتیا لري، دا مطلب د دې لامل کیږي چې ترڅو د محلولونو د ایشیدو درجه د هغوی د خالص حل کوونکي په پرتله لوړه وي.

په عمومي ډول د نه تېښتیدونکو موادو د ایشیدو درجه د هغوی له خالص حل کیدونکي څخه لوړه ده.

څیړنه وکړئ

د پورتنیو وړاندې شوو مطلبو په پام کې نیولو سره، لاندې جدول بشپړ کړئ (فشار یو اتموسفیر دی)

د نه تېښتيدونکو موادو د محلولونو او د هغوی د خالص حل کوونکې د ایشیدو او کنگل کیدو د درجو د پرتله کولو جدول :


حل کیدونکې ماده	بوره	بوره	سودیم کلوراید	کلسیم کلوراید	پوتاشیم نایتریت
د اوبلن محلول غلظت په مولر	1	2	1	1	1
د محلول د ایشیدو د درجې پیل	$100.52^{\circ}C$	$101.04^{\circ}C$	$101.04^{\circ}C$	$101.56^{\circ}C$	؟
د محلول د کنگل کیدو د درجې پیل	$-1.85^{\circ}C$	$-3.71^{\circ}C$	$-3.71^{\circ}C$	$-5.55^{\circ}C$	؟
د حل کیدونکې مادې د ذرو د مولونو کچه	یو مول	دوه موله	دوه موله	دوه موله	دوه موله

د پورتنی جدول په پام کې نیولو سره، لاندې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ.

- 1- د بورې د یو مولره او دوه مولره محلولونو د ایشیدو درجو پایلې سره پرتله کړئ.
- 2- د سودیم کلوراید د یو مولره محلول او د بورې دوه مولره محلول د ایشیدو درجو د پرتلې پایله روښانه کړئ.
- 3- ایا د اطلاعاتو پر بنسټ کولای شئ د پوتاشیم نایتریت د یو مولره محلول د ایشیدو او کنگل کیدو د درجو وړاندوینه وکړئ؟
حل :

- 1- د بورې د یو مولره او دوه مولره محلولونو د ایشیدو درجې د پرتلې له پایلې څخه پوهیږي چې د بورې د یو مولره محلول د ایشیدو درجه د هغې دوه مولره محلول د ایشیدو له درجو څخه ټیټه ده.
- 2- د سودیم کلوراید د یو مولره محلول او د بورې دوه مولره محلول د ایشیدو درجې د پرتلې په پایله کې لاسته راځي چې دا دواړه کمیټونه یو له بل سره مساوي دي او لامل یې دا دی چې د هغوی د ذرو شمیر یو له بل سره یو شان دی.
- 3- د اطلاعاتو په بنسټ کولای شو ووايو چې د پوتاشیم نایتریت د یو مولره محلول د ایشیدو او کنگل کیدو درجه، د بورې ، سودیم کلوراید او کلسیم کلوراید د یو مولره محلول د پراس او کنگل کیدو له درجو سره یو شان دي؛ ځکه چې د ذرو کچه یې سره مساوي ده.





پنجم لوست

د درسي کتاب مخ: 25

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د محلولونو د کنگل کيدو د درجې ټيټيدل
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د محلولونو د کنگل کيدو د درجې په اړه دې معلومات تر لاسه او د حل کوونکي د کنگل کيدو د درجې دې سره پرتله کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د حل کيدونکې او حل کوونکې مادې د ماليکولونو تر منځ قوه د کنگل کيدو د درجې د ټيټيدو لامل کېږي. - د محلولونو د کنگل کيدو د درجې د محاسبې وړتيا دې ولري.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير، د محلولونو بيلابيل ډولونه او مقطرې اوبه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: ولې د موټرو د ليلتر اوبه په ژمي کې هم نه کنگل کېږي؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي.		د 40
د محلولونو د کنگل کيدو د درجې په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي او د هغې څرنگوالی دې روښانه کړي.		د ښوونکي توضيحاتو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري.
زده کوونکي دې په ډلو وويشي، هرې ډلې ته دې دنده ورکړي ترڅو د يو محلول د کنگل کيدو درجه د بيلابيلو غلظتونو سره ومومي او د مقطرو اوبو د کنگل کيدو درجې دې سره پرتله کړي.		په ډله ييز کار کې دې فعاله برخه واخلي.
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.
لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.		د کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		

7 - د لوست د متن د پوښتنه ځوابونه

فعالیت: د حل کیدونکې مادې په پرتله، د محلولونو د براس د درجې د لوړیدو او د کنگل کیدو د درجې په ټیټوالي باندې د اغیزمنو عواملو د موندلو لپاره، زده کوونکي دې له لاندې جدول سره سم، څو محلولونه په ټاکلو غلظتونو له لاندې ځانګړتیاوو سره جوړ او د هغوی د ایشیدو او کنگل کیدو د درجو کچه دې وټاکي، په دې تجربې کې دې د چاپیریال فشار یو اتموسفیر په پام کې ونیسي.

د حل کیدونکې مادې ډول	بوره	بوره	سودیم کلوراید	پوتاشیم نایتریت	کلسیم کلوراید
غلظت په مول	1	2	1	1	1
د ایشیدو د درجې پیل په $^{\circ}C$	100.52	101.03	101.04	101.04	101.56
د کنگل کیدو د درجې پیل په $^{\circ}C$	-1.85	-3.71	-3.71	-3.71	-5.55
د حل کیدونکې مادې د ذرو مولونه	یو مول	دوه موله	یو مول	یو مول	یو مول

الف - د سودیم کلوراید او پوتاشیم نایتریت د یو مولره محلولونو د ایشیدو ټکي سره پرتله کړئ او پایلې یې ولیکئ.

ب - د سودیم نایتریت یو مولره او د بورې دوه مولره محلولونو د ایشیدو ټکي سره پرتله کړئ.

ج - د پوتاشیم کلوراید د یو مولره او د بورې دوه مولره محلولونو د ایشیدو ټکي سره پرتله کړئ او پایلې یې ولیکئ.

د - د سودیم کلوراید، پوتاشیم نایتریت محلولونو او د بورې یو مولره محلول د کنگل کیدو د ټکو د سطحو ټیټیدل د خالصو اوبو په پرتله څرنگه دي؟ پایله یې ولیکئ.

ه - لاس ته راغلې پایلې د یوه یا څو قانونو په بڼه روښانه او هم وویاست چې دا قانون په نورو محلولونو کې هم د کارولو وړ دی که نه؟

حل: الف- د سودیم کلوراید او پوتاشیم نایتریت د یو مولره محلولونو د ایشیدو د درجې د پرتلو له پایلې څخه معلومیږي چې د دواړو محلولونو د ایشیدو درجه یو شان ده.

ب- د پوتاشیم نایتریت یو مولره محلول او د بورې دوه مولره محلول د ایشیدو د درجو د پرتلو له پایلې څخه معلومیږي چې دا دواړه کمیټونه سره مساوي دي، لامل یې دا دی چې د هغوی د ذرو کچه سره مساوي ده.

ج- د سودیم کلوراید یو مولره محلول او د بورې دوه مولره محلول د کنگل کیدو د درجو د پرتلو له پایلې څخه معلومیږي چې دا دواړه کمیټونه سره مساوي دي، لامل یې دا دی چې د هغوی د ذرو کچه سره مساوي ده.

د- د سودیم کلوراید او کلسیم کلوراید محلولونه او د بورې یو مولره محلول د خالصو اوبو په پرتله ټیټه ده، نتیجه دا چې د محلولونو د براس فشار له خالصه حل کیدونکي څخه ټیټ دی.


ه - په عمومي ډول د نه تېښتیدونکو موادو (غیرمفر) د ایشیدو درجه د هغوی له خالصو حل کیدونکو څخه لوړه ده او د نه تېښتیدونکو موادو د محلولونو د کنگل کیدو درجه د هغوی له خالصو حل کیدونکو څخه ټیټه ده.

8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات

کله چې حل کیدونکې ماده په حل کوونکې مادې کې حل شي، په دې صورت کې د لاسته راغلي محلول د کنگل کیدو ټکي د هغه د حل کوونکې مادې د کنگل کیدو له ټکي څخه ټیټ دی؛ د بیلګې په ډول: د خالصو اوبو د کنگل کیدو ټکي

0°C دی؛ خو که چیرې په کې نه تېښتیدونکې ماده حل شي، د کنگل کیدو درجه به یې 0°C نه وي (د یوې مادې د کنگل کیدو او د ویلې کیدو درجې دواړه سره یو شان دي)؛ ځکه د محلول په حالت کې د براس فشار د هغه د خالص حل کوونکې د یخ حالت له کنگل څخه ټیټ دی. د محلول په شرایطو کې یخ نه رامنځ ته کیږي، په هر صورت د تودوخې په ټیټوالي سره د یخ د براس فشار، د مایع اوبو له براس فشار څخه په ډیره چټکۍ سره ټیټیږي، له دې امله د محلول د سپړلو په پای کې د کنگل شوو او مایع اوبو د براس فشار په محلول کې کیدای شي یو شان وي. تودوخه چې په هغې کې یو محلول کنگل کیږي، دې تودوخه ته د مطلوبه محلول د کنگل کیدو ټکی ویل کیږي چې له صفر درجې څخه ټیټ دی او ښکارېږي چې ټیټ شوی دی.

په محلولونو کې د حل کیدونکې مادې شتون، د جامد حالت ته د مایع مالیکولونو د بیرته گرځیدلو چټکتیا کمه وي؛ نو له دې امله اوبلن محلولونه د تودوخې په 0°C کې یوازې د مایع په حالت کې شتون لري، د محلول له سپړلو سره، د کنگل په حالت کې د اوبو د مالیکولونو د وتلو چټکتیا کمه ده، هغه وخت چې دا چټکتیا د کنگل د منځ راتلو له چټکتیا سره یو شان شي؛ نو تعادل منځته راځي چې همدا ټکی د اوبو د کنگل کیدو ټکی د محلول په حالت کې دی، لاندې شکلونو ته ځیر شئ:



څرنگه چې حل کیدونکې ماده د اوبو د کنگل کیدو ټکی راپټوي؛ له دې امله د سودیم کلوراید او کلسیم کلوراید مالګې په کوڅو او لارو کې شیندي تر څو چې د کنگل له جوړیدو څخه په ژمي کې مخنیوی وشي. که چیرې د چاپیریال تودوخه د مالګین محلول د کنگل کیدو درجې څخه ټیټه وي، د لویو لارو پرمخ کنگل (یخ) جوړیږي.

مثال: د ایتلین ګلايکول ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) څو ګرامه په 10L لیتر اوبو کې حل شي؟ تر څو لاسته راغلی محلول د موټر په لیلتر کې د تودوخې په -23.5°C تودوخه کې کنگل شي، د ایتلین ګلايکول ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) مالیکولي کتله 62.1 g/mol او د محلول کثافت 1 g/mL دی.

$$\Delta T_f = K \cdot \frac{m \cdot 1000 \text{ g/molal}}{m \cdot M}$$

$$m = \frac{M \cdot \Delta T \cdot m'_f}{K \cdot 1000 \text{ g/molal}} = \frac{62.1 \text{ g} \cdot 23.3^{\circ}\text{C} \cdot 10000 \text{ g}}{1.86^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol} \cdot 1000 \text{ g/mol/kg}}$$

$$m = 7779 \text{ g} = 7.779 \text{ kg}$$



شپږم لوست

د درسي کتاب مخ: 27


د مطلبونو سرليک		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د الکترولیتو او غیر الکترولیتو محلولونو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - یقین دې تر لاسه کړي چې د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو خواص یو له بل څخه توپیر لري. الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه دې یو له بل څخه توپیر کړي او په ورځني ژوند کې دې وکارلی شي.
3- د تدریس میتود		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر، الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکني، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخیستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه . د انگېزې رامنځته کول: ایا د بورې له محلول څخه بریښنا تیرېږي؟
وخت په دقیقه 5		
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونې)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
وخت په دقیقه 40		
- د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. - د الکترولیتو او غیر الکترولیتو محلولونو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي او د هغوی څرنگوالی دې زوښانه کړي. - زده کوونکي دې په ډلو وویشي، هرې ډلې ته دې دنده ورکړي چې الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه له بیلابیلو غلطونو سره جوړ کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي توضیحاتو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - په ډله ییز کار کې دې فعاله برخه واخلي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه وړاندې کړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فکر وکړئ.

په الف، ب او ج شکلونو کې د څو اوبلنو الکترولیت محلولونو برېښنا یې هدایت یو له بل سره پرتله شوی دی، الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه یو له بل څخه جلا او د هغوی برېښنايي تیرونه یو له بله څخه توپیر کړئ.



(11-2) شکل: الف - د امونیا اوبلن محلول، ب - $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ محلول، ج - د بورې محلول په اوبو کې

حل:

الف - غیر الکترولیت دي؛ ځکه بوره په ایونونو نه پټه کیږي.

ب - د $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ محلول الکترولیت دی، د محلول مرکب CuSO_4 په اوبو کې د Cu^{2+} او SO_4^{2-} په ایونونو پټه شوی او د برېښنا تیرونکی دی.

ج - د امونیا او بلن محلول کمزوری هادی دی؛ ځکه د امونیا په اوبلن محلول کې د NH_4OH مرکب جوړ او د NH_4^+ او OH^- په ایونونو پټه کیږي چې دا مرکب کمزوری الکترولیت دی.

8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات

ډیر پوه شئ


په الکترولیتو محلولونو کې د ایونونو تر منځ، د جاذبې قوه شته او ایونونه د مالیکولي حل کیدونکي موادو پر خلاف، په بشپړه توګه یو له بل څخه بیل نه دي؛ ځکه د مخالفو چارج لرونکو ایونونو تر منځ ایوني قوه شته او د هغوی له جلا کیدو څخه مخنیوی کوي، پورتنۍ مطلب د لومړي ځل لپاره د سویډني عالم وانټ هوف په واسطه وڅیړل شو؛ نوموړي عالم د وانټ هوف ضریب (i) په نامه د یو کمیت وړاندیز وکړ او دا اغیزه یې په مقداري توګه روښانه کړه؛ د بیلګې په توګه: د NaCl او MgSO_4 په محلولونو کې، که څه هم د مرکبونو له یوه مول څخه دوه موله ایونونه په محلول کې جوړیږي؛ خو د MgSO_4 په محلول کې د ایونونو تر منځ د جاذبې قوه، د چارجونو د لویوالي له کبله د NaCl له محلول څخه چې یوشان غلظت لري، زیاته ده، دا چې د MgSO_4 د $0.001M$ محلول ایوني قوه مساوي 1.82 او د NaCl په $0.001M$ محلول کې مساوي 1.97 ده، دا ارقام ورښيي چې ځینې مخالف چارج لرونکي ایونونه سره نږدې شتون لري او دا د چارجونو نژدې والی، د ایونو د جوړو د منځته راتلو لامل ګرځي. په محلولونو کې د جفتو خنثی ایونونو جوړیدل د ایونونو د لږوالی لامل کیږي او د محلولونو په رقیق کولو له خنثی جفتو ایونونو څخه یو شمیر یو له بله لرې کیږي او د ایونونو شمیر ډیرېږي؛ په دې صورت کې د (i) قیمت یو ته نژدې

کیري؛ د بیلگې په ډول : د $NaCl$ د i کچه د نظري محاسبې له امله دوه ده؛ خو په عملي توګه د ایونونو تر منځ د جاذبې قواو د شتون له امله له دوو څخه لږ ده، هر څومره چې محلول رقیق شي په هماغه کچه د i ضریب دوو ته نژدې کیري:

مولار غلظت	0.1M	0.01M ی	0.001
د i کچه	1.87	1.94	1.97

د محلولونو د رسوب په سیستم کې تعادل

دلرو حل کیدونکو الکترولیتونو په مشبوع محلولونو کې؛ د بیلگې په ډول: $BaSO_4$ چې له جامد فاز سره په لګیدو کې شتون لري، په عین وخت کې دوه بهیره تر سره کیري چې یو یې له بل سره مخالف دی، له یوې خوا د اوبو قطبي مالیکولونه د Ba^{2+} له کتون او د SO_4^{2-} له انیون سره چې د $BaSO_4$ د کرسټالي شبکې په جوړښت کې شتون لري، په ټاکلي خوا کې شتون او هغوی راچاپیره وي چې له هایدريشن څخه یې ازاده شوې انرژۍ، هغوی له کرسټالي شبکې څخه جلا کوي او د هغوی محلول جوړوي، له بلې خوا د Ba^{2+} او د SO_4^{2-} هایدريت شوي ایونونه د هغوی د مختلفو چارجو ایونونو په واسطه چې تر اوسه هم په کرسټالي جامده شبکه کې شتون لري، بیرته جذبیري ($BaSO_4 \rightleftharpoons Ba^{2+} + SO_4^{2-}$) او په پایله کې له هایدريتي قشر څخه جلا او بیرته جامدې کرسټالي شبکې ته جذبیري، د تعادل په حالت کې د پورتنیو دواړو نوموړو بهیرونو چټکتیا یوشان ده، په دې صورت کې جوړ شوی غیر متجانس سیستم په لاندې ډول ښودل کیري:



په محلولونو کې د ایونونو لېږدول او د هغوی بر عکس بهیر (کرسټالي جامد فاز په جوړښت کې د ایونونو بیرته ننوتل) یوازې د کرسټالي مادې په سطحه ترسره کیري چې د جامدې مادې کمیت ثابت دی؛ نو دلته د کتلې د عمل د قانون په بنسټ د تعادل حالت د ایونونو د غلظت د ضرب په حاصل پورې چې یو ثابت کمیت دی، اړه لري:

$$K = \frac{[Ba^{2+}][SO_4^{2-}]}{[BaSO_4]}$$

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$$

په وروستۍ معادله کې K_{sp} د انحلالیت د ضرب له حاصل ثابت (Solubility product) دی او د حلیدلو د ضرب حاصل ثابت غیر متجانس تعادل ورښيي چې د لږ حل کیدونکو مالګو د جامد فاز او د هغوی له مشبوع محلولو څخه جوړ شوي دي. د $BaSO_4$ د انحلالیت د ضرب حاصل ثابت په $25^\circ C$ کې $K_{sp} = 1.1 \cdot 10^{-10}$ دی، په دقیقو محاسبو کې د ایونونو د غلظت په ځای د هغوی فعالیت په پام کې نیول کیري.

د ساده محاسبو لپاره که د لږ حل کیدونکو الکترولیتونو مشبوعو محلولونو ایوني قوه $m \leq 0.001$ وي، د ایونونو د فعالیت ضریب څه ناڅه یو دی او د ایونونو فعالیت د هغوی له تحلیلي غلظت سره مساوي دی.

د لږ حل کیدونکو الکترولیتونو د K_{sp} په پوهیدلو کیدای شي د هغوی انحلالیت محاسبه کړل شي چې د mol/L او g/L په واحد سره ټاکل کیري او په S ښودل کیري، د لږ حل کیدونکو دوه ایوني (Binary) الکترولیتونو؛ لکه: $AlPO_4$ ، $BaSO_4$ ، $AgCl$ او نور انحلالیت چې د S په واسطه ښودل کیري، دلته د هریو ایون غلظت د S له عین قیمت سره

مساوي دي؛ خو د هغوی د ضرب د حاصل ثابت عبارت له $K_{sp} = S^2$ او $S = \sqrt{K_{sp}}$ څخه دی؛ د بیلگه په ډول :

$$K_{sp} = [Ba^{2+}]m[SO_4^{2-}] = 1.11 \cdot 10^{-10}$$

$$S = \sqrt{1.11 \cdot 10^{-10}} = 1.05 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$S = 233 \text{ g/mol} \cdot 1.05 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L} = 2.45 \cdot 10^{-3} \text{ g/mol}$$

د S د مولی انحلالیت او دهغو لږ حل کیدونکو الکترولیتونو د ضرب د حاصل د ثابت قیمت تر منځ نسبت کوم چې له خو


ایونونو څخه جوړشوی وي، پیچلی دی؛ د بیلگې په ډول: د CaF_2 د یو مول د ټوټه کیدو څخه یو Ca^{2+} او دوه موله

F^- حاصلیږي چې د دې ایونونو غلظت مساوي دی په:

$$K_{sp} = [Ca^{2+}]m[F^-]^2 = S \cdot (2S)^2 = 4S^3$$

د پورتنۍ معادلې له کار اخیستنې څخه، د خو ایوني الکترولیتونو (*Polyions*) لپاره او په عمومي ډول د لږ حل کیدونکو

الکترولیتونو لپاره چې له لاندې معادلې سره سم ټوټه کیږي کیدای شي د انحلالیت ثابت په لاندې ډول تر لاسه شي:



په پورتنۍ معادله کې Me کټیون او A انیون رانښيي چې د دې ایونونو غلظت عبارت دی له :

$$K_{sp} = [Me^{n+}]^m [A^{m-}]^n = (mS)^m \cdot (nS)^n = m^m S^m \cdot n^n S^n$$

$$K_{sp} = m^m \cdot n^n \cdot S^{m+n}$$

$$S^{m+n} = \frac{K_{sp}}{m^m \cdot n^n}$$

$$S = \sqrt[m+n]{\frac{K_{sp}}{m^m \cdot n^n}}$$

مناقشه:

1- که چیرې د لږو حل کیدونکو ایونونو د انحلالیت د ضرب حاصل د ایونونو د غلظت د ضرب د حاصل ثابت (K_{sp}) څخه

کوچنی وي، په دې صورت کې رسوب نه جوړیږي.

2- که چیرې د لږو حل کیدونکو ایونونو د انحلالیت د ضرب حاصل له K_{sp} سره مساوي وي، په دې صورت کې مشبوع محلول او

رسوب نه جوړیږي.

3- که د لږو حل کیدونکو الکترولیتو ایونونو د انحلالیت د ضرب حاصل، له K_{sp} څخه لوړ وي، رسوب جوړیږي، رسوب

کول هغه وخت درېږي چې د لږو حل کیدونکو الکترولیتونو ایونونو د انحلالیت د ضرب حاصل له K_{sp} قیمت سره مساوي شي.



اووم لوست

د درسي کتاب مخ: 28

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		ضعيف او قوي الكتروليت محلولونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د کمزورو الكتروليټو او قوي الكتروليټو محلولونو په اړه دې هر اړخيز معلومات ترلاسه کړي. - يقين دې ترلاسه کړي چې د کمزورو او قوي الكتروليټونو محلولونو خواص يو له بل څخه توپير لري. - کمزوري او قوي الكتروليت محلولونه دې يو له بل څخه توپير کړای شي او هغه دې په خپل ورځني ژوند کې په کار يورلی شي.
3- د تدريس میتود		مناقشه، نمايشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشير، کمزوري او قوي الكتروليت محلولونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي اوليکنې، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضري اخېستل، د وخت په دقیقه دقیقه 5 کورنۍ د ندې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: ایا د بوري له محلول څخه د برېښنا بهیر تیرولای شئ؟ تجربې یې کړئ.
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونې)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه وخت په دقیقه
40		- د ښوونکي توضیحاتو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - په ډله ییز کار کې دې فعاله برخه واخلي. - د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
		- د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د الكتروليټونو او غیر الكتروليټونو محلولونو په اړه دې هر اړخيز معلومات وړاندې کړي او د هغوی څرنگوالی دې روښانه کړي. - الكتروليت او غیر الكتروليت محلولونه دې د هغوی له بیلابیلو غلظتونو سره برابر کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ورکړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنه ځوابونه

فعالیت

د خپلې زده کړې لپاره لاندې فعالیت تر سره کړئ:




1- په اوبو کې د لاندې مرکبونو د ټوټه کیدو معادلې ولیکئ.

الف - $(NH_4)_3PO_4$ ، ب - Na_2CO_3 ، ج - $Cr(NO_3)_3$

2- د لاندې مرکبونو څخه کوم یو یې په محلولو کې مالیکولي بڼه او کوم یو یې ایوني بڼه لري؟

الف - میتانول، ب - سودیم نایتریت، ج - پوتاشیم کلوراید، د - اسیتون

حل :



الف - میتانول په محلول کې په مالیکولي بڼه شتون لري.

ب - سودیم نایتریت په محلول کې په ایوني بڼه شتون لري.

ج - پوتاشیم کلوراید په محلول کې په ایوني بڼه شتون لري.

د - اسیتون په محلول کې په مالیکولي بڼه شتون لري.

فعالیت

که چیرې د اسیتیک اسید (CH_3COOH) 0.2 مولره محلول د ایوني ټوټه کیدو سلنه 0.935% وي ، د هایډروجن د ایونونو غلظت یې لاسته راوړئ.

حل :

$$\left. \begin{array}{l} \alpha\% = 0.935\% \\ \alpha = 0.00935 \\ C = 0.2M \\ [H^+] = ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} [H^+] = C \cdot \alpha \\ [H^+] = 0.2M \cdot 0.00935 = 0.00187M \end{array}$$

8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د ارهینوس د الکترولیتیکي ټوټه کیدو تیوري د محلولونو په تیوري کې خورا ډیر مهم رول ولوبوه ، نوموړي تیوري د الکترولیتو محلولونو د اسموتیک فشار زیات والی، د کنگل کیدو د درجې ټیټوالی او د ایشیدو د درجې لوړیدل یې د نه تېښتیدونکې غیر الکترولیت موادو په پرتله روښانه او تشریح کړل، د هغوی توپیر یې وروښود ، سربیره له دې، نوموړي تیوري د هایډریشن د تودوخې ثبات، د قوي القلیو په واسطه د قوي تیزابونو خنثی کیدل ، د بفرې محلولونو خواص، د ځینو الکترولیتو پړاو پرپړاو ټوټه کیدل، د مالګو هایډرولیز او داسې نور یې روښانه کړل، څرنگه چې د الکترولیتونو د ټوټه کیدو نظریه د محلولونو د فزیکي نظریې پر بنسټ ولاړه ده؛ نو له دې امله دې تیوري ونه شول کولی ترڅو په اوبو کې په ایونونو باندې د موادو ټوټه کیدل ، د قوي تیزابونو ، القلیو او مالګو د ثبات نه شتون روښانه کړي؛ له دې امله نوري تیوري منځته راغلې چې په لاندې ډول دي:

الکترولیتیکي ټوټه کیدل او د ایونونو هایدریشن

په ایوني کرسټالي مواد کې مخالف علامه چارج لرونکې ذرې د قوي الکتروستاتيکي قوې په واسطه جذب او سره اړیکې لري، که چیرې حل کوونکې ډیر قطبي وي او له ایونونو سره مخامخ عمل تر سره کړی شي؛ نو په دې صورت کې باید د هایدریشن او یا سلواتیشن له عمليې څخه د ازاده شوې انرژۍ کچه له هغې انرژي له کچې سره مساوي وي کوم چې د کرسټالي شبکې د اړیکو په پرې کیدو کې لگيري، په دې صورت کې ایونونه له کرسټالي شبکې څخه جلا او د ایونایزیشن عملیه ترسره کیږي. د حل کیدونکې د ټوټه کولو ځانګړتیا هغه وخت لوړه وي چې حل کوونکې قطبي او د هغه د ډای الکټریکي ثابت لوی وي. د اوبو د ډای الکټریک ثابت $\epsilon = 78$ دی؛ له دې امله د اوبو ټوټه کیدو وړتیا له نورو حل کوونکو څخه لوړه او په لومړي درجه کې شتون لري.

د $I \cdot A \cdot Rabl \text{ cov}$ په نوم عالم نظر ورکړ چې د حل کوونکو د ټوټه کیدلو وړتیا د هغوی د ډای الکټریک ثابت سره نیغ پر نیغه اړیکه لري، د ډای الکټریک ثابت له لوړوالي سره، د حل کوونکي حل کولو وړتیا له حل کیدوونکې مادې او حل کوونکې مادې سره عمل هم بنسټیز رول لوبوي چې په پایله کې د حل کیدوونکې مادې د ذرو او حل کوونکې مادې له نیغ عمل څخه بیلابیل با ثباته او پایدار مرکبونه جوړېږي.

د هایدریشن د بهیر څیړنې نه یوازې د هایدریشن د تودوخې ښودونکي دي؛ بلکې د اوبو د مالیکولونو کچه چې ایونونه چاپیریوي، هم ښودلې شي او په دې بنسټ د هایدریشن شوو ایونونو شعاع هم ټاکلې شي. د اوبو د مالیکولونو په کچې او د هایدریشن شوو ایونونو د شعاع په پوهیدلو، کیدای شي چې د هغوی خواص وټاکل شي؛ د بیلګې په ډول: د لومړي ګروپ د عنصرینو د ایونونو ایوني شعاع د هغوی په کرسټالي شبکه کې په ګروپونو کې له پورتنۍ خوا څخه ښکته خواته لوړېږي او له ښکته خوا څخه پورته خواته کوچنۍ کیږي؛ داسې:



خو په اوبو محلولونو کې د ایونونو له هایدریشن څخه وروسته، د هایدریشن شوو ایونونو د شعاع پرله پسې بدلون برعکس دی؛ یعنې: $\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Rb}^+ > \text{Cs}^+ > \text{Fr}^+$.

د هایدریشن شوو ایونونو د ایوني شعاع بدلون، د دوی د مثبتو ایونونو د شعاع په کوچني والي پورې اړه لري، که د مثبتو ایونونو شعاع کوچنی وي، د اوبو د مالیکولونو منفي قطب ښه جذبوي او د اوبو ډیر مالیکولونه په خپل چاپیریال کې را ټولوي، په پایله کې د اوبو د مالیکولونو کچه د ایونونو په چاپیریال کې ډیرېږي او د هایدریشن شوو ایونونو حجم زیاتېږي، د هایدریشن شوو ایونونو غټوالی او حجم د دې ایونونو خواص؛ لکه: د حجروي غشاو له سوریو څخه د هغوی د ننوتلو وړتیا، د اېساریشن او د هغوی کوآګلیشن ځانګړتیا ټاکي.

په کمزو الکترولیټو محلولونو کې د الکترولیټونو د ټوټه کیدو تیوري د کارولو وړ ده؛ خو نوموړې تیوري د قوي الکترولیټونو د محلولونو خواص او څرنگوالی چې اوبه هغوی په بشپړ توګه په ایونونو ټوټه کوي، د کارولو وړ نه ده، له دې امله نورې تیوري را منځته شوي دي چې د نوموړې تیوري بشپړه کوونکې دي او په لاندې ډول روښانه کیږي:


د Debye - hukel تیوري

د Debye - hukel تیوري په 1923 کال کې منځته راغله چې په دې تیوري کې د قوي الکترولیټونو محلولونو خواص د

ایونونو تر منځ د الکتروستاتیکي قواوو د عمل په پام کې نیولو سره روښانه شوي دي. د حل کیدونکې مادې مخالف الچارج ایونونه په محلول کې د اوبو د مالیکولونو په واسطه هایدريشن شوي او یو له بل څخه لرې شتون لري؛ خو سره له دې هم په ټینګو محلولونو کې دا ایونونه میل لري ترڅو یو بل جذب کړي، هر څومره چې د حل کیدونکې مادې غلظت ډیر وي، په هماغه کچه د مخالف الچارج ذرو تر منځ د جذب قوه ډیره وي، په دې صورت کې هر ایون دخو نورمخالف الچارج ایونونو په واسطه جذب او چاپیریروي او د محلولونو په جوړښت کې د ذرو ترمنځ نظم راوړي او په محلولونو کې د ایونونو اغیزمن غلظت کم او رښتیا غلظت یې ډیرېږي، په دې صورت کې الکترولیتونه په بشپړه توګه په ایونونو نه توپه کیږي او په کرسټالي شبکه کې شتون لري؛ دغه اغیزمن غلظت د فعالیت په نوم یا دوي. په رښتیا چې فعالیت د محلول رښتینی غلظت دی، لاندې معادله د فعالیت او اغیزمن غلظت اړتیا وړښيي:

$$a = C \cdot f$$

په پورتنی فورمول کې f د فعالیت ضریب، a فعالیت او C رښتیا غلظت وړ ښيي، د فعالیت ضریب څرګنده وي چې په کومه کچه د a فعالیت له تحلیلې غلظت (C) څخه توپیر لري، په رښتیا چې د فعالیت ضریب د رښتیا محلول توپیر له بشپړ ایديال محلولونو څخه وړښيي، که چیرې خپرل شوی غلظت لږ شي، فعالیت ډیرېږي؛ نو په دې صورت کې د فعالیت ضریب یوه ($f \rightarrow 1$) ته نږدې او فعالیت له غلظت سره مساوي کیږي، د فعالیت د ضریب فزیکي مفهوم له تر سره شوي کار سره چې په هغه کې د ایديال محلول د یوې مادې کچه له بدلون سره مخامخ کیږي، اړیکه لري. د فعالیت میتود او یا د فعالیت ضریب د ترمودینامیک له ټولو قوانینو څخه د ګټې اخیستنې امکان چې د قوي الکترولیتونو رښتیاو محلولونو خواص روښانه کوي، د فعالیت ځایونه د غلظت پرځای برابروي؛ دیلګې په ډول: د کتلې د عمل قانون په رښتینو محلولونو کې په لاندې ډول دی:



$$K = \frac{AK^+aA}{aKA} = \frac{ckfk.CAFA}{ckafka}$$



دریم څپرکي

د څپرکي موضوع : د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا

1- د تدریس وخت 8 درسي ساعتونه

د لوست سرلیکونه	د درسي ساعتونه	گڼه
د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا	یو درسي ساعت	1
د کیمیاوي تعاملونو د چټکتیا اندازه کول	یو درسي ساعت	2
د کیمیاوي تعاملونو په چټکتیا باندې اغیز من لامل	یو درسي ساعت	3
د تودوخې اغیزه په کیمیاوي تعاملونو باندې	یو درسي ساعت	4
د ارهینوس معادله	یو درسي ساعت	5
د Collision نظریه یا د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضیه	یو درسي ساعت	6
کتلستونه	یو درسي ساعت	7
د څپرکي لنډیز او پوښتنې	یو درسي ساعت	8

2. د څپرکي پوهنیزې موخې

- زده کوونکي دې پوه شي چې کیمیاوي تعاملونه په بیلابیلو چټکتیاوو سره ترسره کېږي او د شرایطو تابع دي.
- زده کوونکي دې درک کړي چې په کیمیاوي تعاملونو کې شرایط او کتلستونه بنسټیز رول لوبوي.
- د شرایطو برابرولو او کتلستونو په کارولو سره دې بیلابیل تعاملونه ترسره کړای شي.





3. د څپرکي پوښتنو ته ځوابونه


1- الف ، 2- د ، 3- الف ، 4- ج ، 5- د ، 6- ج ، 7- ب ، 8- الف

9- د ، 10- الف

تشریحي پوښتنو ته ځوابونه

1- د لاندېنيو تعاملونو د لومړنيو مصرف شوو موادو نسبي چټکتیا او د محصولاتو لاسته راټولنه ولیکئ





حل:

$$V = \frac{-1\delta[C_2H_6]}{2\delta t} = \frac{-1\delta[O_2]}{7\delta t} = \frac{\delta[CO_2]}{4\delta t} = \frac{1\delta[H_2O]}{6\delta t} \quad \text{الف -}$$



$$V = \frac{-1\delta[HOCl]}{2\delta t} = \frac{1\delta[HF]}{2\delta t} = \frac{\delta[O_2]}{\delta t} \quad \text{ب -}$$

$$V = \frac{-1\delta[PH_3]}{4\delta t} = \frac{-1\delta[P_4]}{\delta t} = \frac{\delta[H_2]}{6\delta t} \quad \text{ج -}$$

$$V = \frac{-1\delta[N_2]}{\delta t} = \frac{1\delta[H_2]}{3\delta t} = \frac{\delta[NH_3]}{2\delta t} \quad \text{د -}$$

$$V = \frac{-1\delta[H_2CO_3]}{2\delta t} = \frac{-1\delta[O_2]}{\delta t} = \frac{-\delta[CO_2]}{2\delta t} = \frac{1\delta[H_2O]}{6\delta t} \quad \text{ه -}$$

2- د هایدروجن پراکساید د تعامل میخانیکیت د I^- د کتلست شتون کې په لاندې ډول دی:



د پورتنۍ تعامل د چټکتیا معادله ولیکئ.

حل:

$$V = k_1[H_2O_2][I^-]$$

3- له دې پاملرنې سره چې د اوبو پراس یو بې ضرره محصول دی، د هایدروجن گاز د سفینو د سون موادو په توګه په فضا کې

کارول کیږي، د $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$ معادلې په پاملرو سره لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ:

الف- د $[O_2]$ ، $[H_2]$ او $[H_2O]$ او د وخت پر بنسټ چټکتیا یې ولیکئ.

ب- که چیرې $O_2(g)$ د لږښت چټکتیا $0.23 \frac{mol}{L \cdot s}$ وي: د H_2O تولید به څومره وي؟


حل:

$$V = \frac{1}{2} \frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t} \quad \text{الف -}$$

$$V = -\frac{\Delta[O_2]}{\Delta t} = \frac{1}{2} \frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t} \Rightarrow \frac{1}{2} \frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t} = 0.23 \frac{mol}{L \cdot s} \quad \text{ب -}$$

$$V = \frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t} = 2 \cdot 0.23 \frac{mol}{L \cdot s} \Rightarrow V = \frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t} = 0.46 \frac{mol}{L \cdot s}$$

4- د لاندې تعامل د فعالولو انرژي محاسبه کړئ:



په $25^\circ C$ تودوخه کې د چټکتیا ثابت $K = 3.4 \cdot 10^{-5} s^{-1}$ دي. او په $55^\circ C$ تودوخه کې د هغه چټکتیا

ثابت $K = 1.5 \cdot 10^{-3} s^{-1}$ دی.

دځلورم سؤال حل:

$$\left. \begin{array}{l} E_a = ? \\ T_1 = 25^\circ C = 298K \\ T_2 = 55^\circ C = 328K \end{array} \right\} \begin{array}{l} \log \frac{K_1}{K_2} = \frac{E_a}{2.30 \cdot R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \\ \log \frac{3.4 \cdot 10^{-5}}{1.5 \cdot 10^{-3}} = \frac{E_a}{2.30 \cdot 8.31 j \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} \left(\frac{1}{328K} - \frac{1}{298K} \right) \\ \log 2.25 \cdot 10^{-2} = \frac{E_a}{19.113 j \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} (0.00305K - 0.003356K) \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} K_1 = 3.4 \cdot 10^{-5} \cdot sec^{-1} \\ K_2 = 1.5 \cdot 10^{-3} \cdot sec^{-1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} -1.65 = \frac{E_a}{j \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}} (-3 \cdot 10^{-4}) \\ \frac{-1.65 j \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}{-3 \cdot 10^{-4}} = E_a / 19.13 \end{array}$$

$$\frac{-1.65 j \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}{-3 \cdot 10^{-4}} = E_a / 19.113$$



$$E_a = 5.5 Kjou / mol \cdot 19.113 kjo / mol = 105.12 kjou / mol$$

-5

$$\left. \begin{array}{l} T_1 = 300K \\ T_2 = 310K \\ K_1 = 1 \\ K_2 = 3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \log \frac{K_1}{K_2} = \frac{E_a}{2.30 \cdot R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \\ \log \frac{1}{3} = \frac{E_a}{2.30 \cdot R} \left(\frac{1}{310K} - \frac{1}{300K} \right) \\ -0.4772 = \frac{E_a}{2.30 \cdot 8.31 j / mol \cdot K} (0.003226K - 0.003333K) \\ -0.4772 = \frac{E_a}{19.113 j / mol \cdot K} (-1.07 \cdot 10^{-4} K) \end{array}$$

$$E_a = \frac{-0.4772 \cdot 19.113 j / mol}{-1.07 \cdot 10^{-4}} = 8.52 \cdot 10^4 j / mol$$

6- د $NO_2(g) + CO(g) \longrightarrow NO(g) + CO_2(g)$ تعامل میخانیکیت په لاندې ډول دی:



د تعامل د چټکتیا معادله ولیکئ:

حل: دا چې د تعامل چټکتیا له لومړي پړاو له ورو تعامل سره ټاکل کېږي؛ نو:

$$V = K1[NO_2]^2$$

عملي تجربې هم دا د سرعت معادله تایید وي.

7- د زیاتو تعاملونو فعال کوونکو انرژي د $E^0 = 60 kjou / mol$ تر $E^0 = 250 kjou / mol$ پورې ده چې د یوې کیمیاوي

اړیکې په حدود کې شتون لري، د هر لس درجو تودوخې په زیاتدو، د $300k$ تر $310K$ پورې، د تعامل د چټکتیا بدلون له انرژي سره په لاندې ډول دی.



په څه نا څه توگه چټکتیا دوه ځله زیاتیږي. $E^0 = 60 \text{ kJoul / mol}$

په څه نا څه توگه چټکتیا پنځه ویشته ځله زیاتیږي. $E^0 = 250 \text{ kJoul / mol}$

نو چې د تعاملونو د فعال کونکو انرژي $E^0 = 65 \text{ kJoul / mol}$ ده، د تودوخې د زیاتیدل له 273 K څخه تر 298 K پورې، د تعامل د چټکتیا بدلون دوه ځله زیاتیږي.


- 8

زمان S	غلظت [A]	$\log[A]$	$1/[A]$	
0	10	1	0/1	
10	7/95	0/9	0/126	
20	6 /31	0/8	0/1585	
30	5/0	0/70	0/2	
40	3/93	0/6	0/25	
50	3/16	0/5	0/32	
60	2/5	0/4	0/4	
70	1/9	0/3	0/53	



دا چې د غلظت او د وخت د معکوس تړون گراف یو مستقیم، نو تعامل له دویم درجه معادلې څخه پیروي کوي، نو معلومیږي چې معادله یې په لاندې ډول ده:

$$V = K[A]^2$$



لومړی لوست

د درسي کتاب مخ: 36


د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د کيمياوي تعاملونو چټکتيا
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - يقين دې ترلاسه کړي چې د کيمياوي تعاملونو چټکتيا په صنعت او طبابت کې بنسټيز رول لري. - کيمياوي تعاملونه دې په لنډه موده کې تر سره کړای شي.
3- د تدريس میتود		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او بيلابيل گرافونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، دحاضری وخت په اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: څه وخت شيدې په مستو بدلېږي؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. د کيمياوي تعاملونو د چټکتيا په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي او د هغوی څرنگوالی دې روښانه کړي. د بيلابيلو کيمياوي تعاملونو د ډولونو چارټونه دې د زده کوونکو د گروپونو په واسطه برابر او په ټولگي کې دې دهغوی مطلبونه روښانه کړي. د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، دهغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د کيمياوي تعاملونو د چټکتيا په اړه ورکوي يادداشت او زده دې کړي. - د بيلابيلو کيمياوي تعاملونو د ډولونو د چارټونو په جوړولو کې دې فعاله برخه واخلي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

کیمیاوي کینیتیک (Chemical Kinetics) هغه پوهه ده چې د تعامل چټکتیا، د یو تعامل میخانیکیت او د لومړنیو موادو د بدلونونو لوري په محصولاتو کې ټاکي، لاندینی شکل د زده کړې مطلبونه په کیمیاوي کینیتیک کې وړښيي:



د کیمیاوي تعاملونو پرمختګ

په کیمیاوي تعامل کې تعامل کوونکي مواد یو له بل سره متقابل عمل تر سره کوي، د تعامل محصول منځته راوړي، په دې صورت کې ویل کېږي چې تعامل د پرمختګ په حال کې دی.

څرنګه چې روښانه ده، ترمودینامیک د کیمیا د علم یوه بله څانګه ده چې د تعامل کوونکو او د تعامل د محصولو د انرژۍ د سطحې د ټاکلو په اړه او همدارنګه د انټروپي د بدلون په اړه د تعامل د سرته رسیدو امکان او د تعامل د بهیر د لورې وړاندوینه کوي؛ خو د تعاملونو د چټکتیا په اړه کوم معلومات نه شي وړاندې کولای؛ د همدې لامل له کبله ده چې ترمودینامیک د تعاملونو د ترسره کیدو د امکان وړاندوینه کوي چې د کینیتیک له کبله د هغوی د سرته کیدو لاره نه شته؛ نو له دې امله ترمودینامیک او کیمیاوي کینیتیک یو د بل بشپړوونکي دي؛ یا په بل عبارت، د دې لپاره چې یو کیمیاوي تعامل په ښه او لازمه توګه ترسره شي، پکار ده چې لاندینیو دوو شرطونو باندې پوهه ترلاسه شي:

1- د ترمودینامیک له کبله دې د تعامل د ترسره کیدو شرایط برابر شي.


2- د کینیتیک له کبله دې د لازمو شرایطو او د پام وړ سرعت لرونکي وي.

لومړی مثال: د موټرونو د بادۍ زنگ وهل د دواړو اړخونو له مخې خپرو:

ترمودینامیک: دا تعامل باید ترسره شي او د ترسره کیدو امکان یې په $\Delta G < 0$ کې دی.

کیمیاوي کینیتیک: که چیرې د تعامل د ترسره کیدو امکان وي؛ نو په کومه چټکتیا به ترسره شي؟

د زنگ وهلو چټکتیا د تعامل په شرایطو پورې اړه لري:



نوموړې تعامل ممکن خو ورځې او شپې به دوام وکړي چې د تعامل د چاپیریال شرایط (تیزابي چاپیریال د مالګو شتون او نور) د تعامل چټکتیا ټاکي.

دویم مثال : د الماس تبدیل په گرافیت باندې مطالعه کوو:

ترمودینامیک: د الماس تبدیل په گرافیت باندې تر سره کیدای شي ($\Delta G < 0$) :



ترمودینامیک: د الماس د تبدیلیدو تعامل په گرافیت ښایي تر سره شي.

کیمیاوي کنټیک : په ډیره چټکۍ سره د الماس د تبدیلیدلو تعامل په گرافیت باندې نه تر سره کیږي.

زمونږ په چاپیریال کې تر سره شوي تعاملونه:

1- کیدای شي په چټکۍ تر سره شي؛ د بیلګې په توګه: د بنزینو سوځیدل، د القلیو او تیزابونو تعامل.

2- کیدای شي ورو تر سره شي؛ د بیلګې په توګه : د اوسپنې زنگ وهل او د خوړو توکو خساکیدل.

3- کیدای شي ډیر ورو تر سره شي؛ د بیلګې په توګه: په اوبو کې دښینې حل کیدل او داسې نور.

کیمیاوي ترمودینامیک

ترمودینامیک د کارولو له کبله یو ډیر پراخ علم دی چې په زیاتو بنسټیزو رشتو؛ په انجینرۍ، زراعت، طب، فارمسي او نورو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، دا علم د انرژي د بیلابیلو شکلونو بدلونونه یو بل ته، تودوخې او کار خپرې، دلته خپله پام کیمیاوي ترمودینامیک ته اړوو او د کیمیاوي بهیرونو تر سره کیدل یانه تر سره کیدل د څیړنې لاندې نیسو. په ترمودینامیک کې د کیمیاوي تعاملونو لپاره اړوند وخت په پام نیول شوی نه دی چې دا مطلب په کیمیاوي کنټیک کې مطالعه کیږي.

په عمومي توګه د ترمودینامیک بنسټ، د هغه درې قانونو جوړکړی دی، د دې قوانینو د مطالعې لپاره اړه ده خو ځینې اصطلاحات په پیل کې مطالعه کړو:

سیستم (*System*): د مادي توکو له مجموعې څخه عبارت دی چې د کومو وسیلو په واسطه هغه له چاپیریال څخه جلا شوي وي.

شاوخوا چاپیریال: د سیستم د شاوخوا د فضا له پاتې برخې څخه عبارت دی چې ټول مواد په کې شامل دي.

له چاپیریال سره د اړیکو د ځانګړتیاوو له کبله ، سیستم یې په لاندې دریو ډولونو ویشلی دی چې خلاص، تړلی، او له بیل سیستم څخه عبارت دی .

فاز: د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دی چې یوشان فزیکي او کیمیاوي خواص لري او دلیدلو وړ یوې سطحې په واسطه له نورو برخو څخه جلا شوی دی.

جسم: هغه مواد چې د هغوی عمومي شکل د پام وړ نه وي او په فضا کې یې ټاکلی ځای نیولی وي، د جسم په نامه یادېږي.

کامپنینټ *Compenent*: کامپنینټ یا جوړونکې ماده ،د سیستم له یوې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم په برخو کې شامل وي؛ د بیلګې په ډول : کنگل او د اوبو براسونه په یو لوبښي کې د هتروجن سیستم ډول دی چې د دریو فازونو او یو کامپنینټ څخه جوړ شوی دی.



د سیستم حالت : سیستم دوه حالت لري چې له اګر یګاتي حالت او ترمودینامیکي حالت څخه عبارت دی، ترمودینامیکي حالت په ترمودینامیکي مفاهیمو ټاکل کیږي.

د تودوخې توازن: که چیرې د A, B, C سیستمونه شتون ولري او د هغوی هر یو یې T_A, T_B, T_C تودوخه ولري، د تماس په وخت کې د دې سیستمونو ترمنځ د تودوخې د توازن حالت منځته راځي، که د A سیستم له B سره او د B سیستم له C سره په تماس کې شي په دې صورت کې د هغوی ترمنځ د تودوخې توازن تړل کیږي؛ یعنې:

$$T_B = T_C \quad , \quad T_A = T_B$$

له ویلو دې پاتې نه شي دا چې تودوخه او گرمي تل له تودو توکو څخه سپړو توکو ته تیرېږي؛ د تودوخې توازن د ترمودینامیک له صفر قانون څخه عبارت دی او د هغه ثبوت په لاندې ډول دی:

که چیرې د A سیستم د B له سیستم سره د تودوخې د توازن په حالت کې وي، په دې حالت کې A له C سره هم د تودوخې د توازن په حالت کې شتون لري؛ یعنې:

$$(A \approx B) \quad , \quad (B \approx C) \quad , \quad (A \approx C)$$

$$T_A = T_B = T_C$$

د تودوخې توازن د ترمودینامیک د صفر قانون په نوم یادېږي.

تودوخه او فشار: تودوخه او فشار د سیستم د خاصیت په نوم یا دوي. د سطحې په یو واحد باندې د قواوو واردول له فشار څخه عبارت دی چې د سیستم او دهغه د چاپیریال ترمنځ عمل ورښيي؛ یعنې که چیرې سیستم د چاپیریال سره د توازن په حالت کې شتون ولري؛ په دې صورت کې د سیستم د ننه او باندیني فشار او چاپیریال فشار یې له بل سره مساوي دی. تودوخه یو مطلق مفهوم دی چې په ساده ډول هغه روښانه کولی نه شو. که چیرې دوه سیستمه بیلایله تودوخه ولري؛ نو د دې دوو سیستمونو ترمنځ د تودوخې د کچو توپیر د هغوی د تودوخې د توپیر په نوم یا دوي، د ترمودینامیک په علم کې د تودوخې له مطلقه درجې څخه کار اخیستل کیږي، د مطلقه تودوخې د درجې او د ساتنې گراد د درجې ترمنځ اړیکه په لاندې ډول ده:

$$T_K = T_{0C} + 273.15$$

تودوخه او کار: تودوخه، کار او انرژي سره یوشان دي، د تودوخې بیلاییل شکلونه په کار تبدیلېږي؛ خو بشپړه تودوخه په کار نه تبدیلېږي. تودوخه په Q او کار په A سره ښيي. که چیرې له خپل شاوخوا چاپیریال سره د موادو ورکړه ونه لري؛ خو د تودوخې راکړه او ورکړه ولري (تړلی سیستم)؛ نو په دې حالت کې په سیستم کې بې ترتیبه حرکت لیدل کیږي او اضافي تودوخه له سیستم څخه چاپیریال ته لیږل کیږي او د سیستم انرژي ټیټېږي؛ خو که سیستم کار تر سره کړي؛ نو په سیستم کې حرکت په ستونزو من ډول ترسره او سیستم چاپیریال ته تودوخه ورکوي چې دا عمل د سیستم د حرکت لامل په نا منظم ډول او د کار د لیږلو لامل کیږي.

لومړی قانون د انرژۍ د پایښت له قانون څخه عبارت دی، له دې قانون سره سم کیدای شي انرژي له یو شکل څخه بل شکل ته بدلون ومومي؛ خو له منځه نه ځي د انرژۍ سیستم کولای شي په بیلایلو شکلونو بدلون ورکړي. د یو سیستم د انرژۍ د بدلونونو د ټاکلو دوی لارې شته دي:

۱-د انرژۍ دننه کول یا اېستل: که چیرې په سیستم کې د (Q) په کچه تودوخه اضافه شي، د هغه انرژي له E_1 څخه E_2 ته بدلون مومي، کله چې د سیستم تودوخه ډیره شي او سیستم کار ترسره نه کړي؛ نو د انرژۍ د پایښت له قانون سره سم لرو چې:

$$Q = \Delta E = E_2 - E_1$$

په پورتنۍ معادله کې Δ بدلون ښيي؛ خو که چیرې بدلونونه ډیر کوچني وي، هغه په σ ښيي.

۲- د چاپیریال او سیستم ترمنځ د انرژي او کار د راکړو ورکړو دویمه لاره داسې ده چې کار تر سره کیږي، که چیرې کار د تودوخې له راکړې ورکړې څخه پرته ترسره شي ($Q = 0$)، چاپیریال په سیستم باندې د W په کچه کار تر سره کړی وي؛ نو په دې صورت کې په سیستم باندې (د انرژي د پایښت د قانون پریښت) د تر سره شوي کار د معادلې کچه، د هغه په انرژۍ کې زیات والی راځي؛ یعنې:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = W$$

که چیرې په عین وخت کې سیستم ته کار او تودوخه ورکړل شي؛ نو په دې صورت کې د انرژۍ د پایښت له قانون سره سم د دې سیستم د انرژیکي بدلونونه په لاندې ډول دي:


$$\Delta E = E_2 - E_1 = Q + W$$

$$\Delta Q = \Delta U_1 + A \quad 1.$$

پورتنۍ معادله د ترمودینامیک د لومړي قانون ریاضیکي بڼه ده.

د ترمودینامیک لومړی قانون: د نړۍ انرژي ثابته ده.

د ترمودینامیک دویم قانون: د نړۍ انټروپي تل په ډیریدلو ده.



دویم لوست


د درسي کتاب مخ: 38چ

د مطلوبونو سرليکونه		د مطلوبونو شرح
1- د لوست موضوع		د کيمياوي تعاملونو د چټکتيا اندازه کول
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د کيمياوي تعاملونو د اندازه کولو چټکتيا دې زده کړي . - يقين دې تر لاسه کړي چې د کيمياوي تعاملونو چټکتيا تر ممکنه حده ټاکل کيدای شي . - د کيمياوي تعاملونو چټکتيا دې وټاکلی شي .
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته ، تباشیر، کیمیاوي مواد د تعاملونو لپاره او د کروماتوگرافي دستگاه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د وخت په کورنۍ د ندې کتل او د تیر لوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: د کروماتوگرافي په اړه معلومات لری؟
1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي . - د کیمیاوي تعاملونو د چټکتيا د ټاکلو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي . - د څو بیلگو په ورکولو دې د کیمیاوي تعاملونو چټکتيا زده کوونکو ته روښانه کړي . - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ورکړي . - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي . - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي .		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري . - هغه بیلگې چې ښوونکي یې د کیمیاوي تعاملونو د چټکتيا په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي . - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه وړاندې کړي . - کورنۍ دنده دې تر سره کړي .

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت

په یو زړه وړونکي تعامل کې چې د برومین د محلول او فارمیک اسید تر منځ په ثابت تودوخه کې تر سره کیږي، د هغه بهیر داسې دی چې د برومین په سور رنگو او یو باندې د فارمیک اسید بې رنگه محلول ورزیاتوي، په لومړي سر کې به لاسته راغلی محلول سور رنگ ولري او وروسته کم رنگه کیږي:



بې رنگه بې رنگه بې رنگه سور رنگه

د تعامل په پرمختګ سره به محلول په بشپړه توګه بې رنگه شي.

د Br_2 او $HCOOH$ 1.5 molar او 2 مولره محلول جوړ کړئ او لاندې کړنې تر سره کړئ:

1- Br_2 او $HCOOH$ 1.5 مولره په ټاکلې کچه یوځای کړئ، د بې رنگه کیدو وخت یې یادداشت کړئ.

2- د Br_2 او $HCOOH$ 1.5 مولره محلول په یوه ټاکلې کچه سره یوځای کړئ او د هغه د بې رنگ کیدو د وخت موده یادداشت او لاندې پوښتنو ته ځوابونه وړاندې کړئ.

1. په پورتنیو دوو یاد شوو حالتونو کې منځنۍ چټکتیا ومومئ، ایا دا چټکتیاوې یوله بله سره توپیر لري؟

2. د تعامل منځنۍ چټکتیا د HBr د تولید په بنسټ په لاس راوړئ.

3. د غلظت او د تعامل د وخت ګراف د Br_2 د مصرف لپاره او د HBr د تولید لپاره رسم کړئ.

ځواب: د عملي تجربو په ترسره کولو سره به د دې پوښتنو ځوابونه تر لاسه شي.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د تعاملونو درجې

د صفر درجې تعامل: که چیرې د تعامل چټکتیا د یو تعامل کوونکي د بدلون له کبله هڅه کوونکې نه وي، د هغه اړوند تعامل د درجې له امله صفر دی. د لوړ فشار په شتون کې د طلا په سطحې کې د N_2O تجزیه د N_2O په غلظت پورې تړلې نه ده او د هغه تجزیه په ثابت چټکتیا سره ترسره کیږي:

$$\text{چټکتیا} = \frac{d[A]}{dt} = K$$

په پورتنۍ معادله کې د بدلون کوونکو په ځای پر ځای کیدو سره تر لاسه کیږي چې:

$$d[A] = -K \cdot dt$$


که د وروستۍ معادلې انتګرال و نیول شي، له صفر څخه تر t د وخت په چاپیریال کې پایله اخیستل کیږي چې:

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} d[A] = -K \int_0^t dt$$

$$[A]_t - [A]_0 = -kt$$

په پورتنۍ معادله کې $[A]_0$ او $[A]_t$ په وار سره د A غلظت د تعامل د پیل په وخت او t وخت کې دی. که چیرې د $[A]$ د

غلظت گراف د وخت په بنسټ د صفر درجې د تعامل لپاره رسم شي، په پایله کې به نیغه لیکه د K له میل او د $[A]_0$ له پیل سره ترلاسه کیږي:



شکل : د غلظت بدلون د وخت په تیردو سره

لومړۍ درجه تعامل

که چیرې تعامل (محصول $A \rightarrow$) د لومړۍ درجې تعامل له ډلې څخه وي، په دې صورت کې لیکلی شو:

$$1 \dots\dots\dots \frac{d[A]}{dt} = K[A] = \text{چټکتیا}$$

$$2 \dots\dots\dots \frac{d[A]}{[A]} = kd$$

د ریاضیکي اړیکو پر بنسټ کیدای شي چې دویمه (2) معادله حل شي، د دې معادلې د حل لپاره په کارده چې د نوموړو معادلو له طرفینو څخه له صفر تر t وخت تر منځ او د A لومړنۍ غلظت او د $[A]_0$ غلظت او د t په وخت کې د A غلظت د $[A]_t$ انتگرال ونیول شي:

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{d[A]}{[A]} = - \int_0^t K dt$$

$$\ln [A]_t - \ln [A]_0 = -Kt$$

څرنګه چې $\ln X = 2,303 \log X$ دی:

$$3 \dots\dots\dots \log [A]_t - \log [A]_0 = \log \frac{[A]_t}{[A]_0} = - \frac{Kt}{2,303}$$

$$4 \dots\dots\dots \log [A]_t = \left(-\frac{K}{2,303}\right)t + \log [A]_0$$

4 څلورمه معادله د نیغ خط له معادلې ($y = ax + b$) سره ورته ده چې په هغه کې $\log [A]_t = y$ او $t = X$ دی.

$a = \frac{K}{2,303}$ (د ثابت کمیت د زوایې ضریب) $b = \log [A]_0$ یعنې د نیغ خط د پریکړې ځای له $3y$ محور سره دی.


دا چې ($y = ax + b$) دی؛ پردې بنسټ که چیرې د غلظت لوګارتم له وخت سره یو نیغ خط وی، نو په دې حالت کې تعامل د لومړۍ درجې د تعاملونو له ډلې څخه دی.

د $CH_3 - NH = C$ مرکب تبدیل په استونیتریل، له لومړۍ درجې تعامل څخه دی چې د الف او ب گراف په شکل کې

لیدل کیږي، په دې شکل کې د خط میل مساوي په $-2.22 \cdot 10^{-5} s^{-1}$ دي، او د څلورمې (4) معادلې په پام کې نیولو سره دی.

$$\text{د خط میل} = \frac{K}{2,3} = 2.22 \cdot 10^{-5} s^{-1}$$

$$K = 2.3 \cdot 2.22 \cdot 10^{-5} = 5.11 \cdot 10^{-5} s^{-1}$$



شکل: الف- د فشار بدلونونه له وخت په تیریدو سره ، ب- د فشار د لوگارتیم بدلونونه له وخت په تیریدو سره پام وکړئ : هغه تعاملونه چې په غازي فاز کې تر سره کیږي، په دې صورت کې کیدای شي د غلظت پر ځای له جزئي فشار څخه ګټه واخیستل شي.

دویمه درجه تعامل : له لومړنۍ مادې له کبله د دویمې درجې تعاملونو د چټکتیا معادله په لاندې ډول ده:

$$\text{چټکتیا} = \frac{d[A]}{dt} = K[A]^2 \text{-----1}$$

د دوو بیلابیلو مادو لپاره د دویمې درجې د تعاملونو د چټکتیا معادله په لاندې ډول ده:

$$\text{چټکتیا} = K[A][B] \text{-----2}$$


په لومړۍ (1) معادله کې د dt او $[A]^2$ په ځای پر ځای کیدلو سره او د معادلې له طرفینو څخه د انتیګرال په نیولو سره کیدای شي چې لاندې معادله ترلاسه شي :

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{-d[A]}{[A]^2} = K \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = Kt \text{-----3}$$

نو د دریمې معادلې په پام کې نیولو سره، د غلظت معکوس $\frac{1}{[A]}$ ، د t وخت پر بنسټ ګراف یو نیغ خط دی، له دې کبله هغه لاره چې د لومړۍ درجې تعاملونه له دوهمې درجې تعاملونو څخه بیلوي دا ده چې که د غلظت لوگارتیم د وخت پرتاسب ګراف، یو نیغ خط وي تعامل لومړۍ درجه دی او که د غلظت معکوس د وخت پرتاسب ګراف، یو نیغ خط وي تعامل دویمه درجه دی.


مثال : په لاندې جدول کې د NO_2 له تجزیې څخه لاسته راغلي معلومات په $300^\circ C$ تودوخې کې را ټول شوي دي، روښانه یې کړئ چې دا تعامل لومړۍ درجه او یا داچې دویمه درجه تعامل دی:




جدول: NO_2 له تجزیې څخه د لاسته راغلو پایلو په هکله معلومات.

وخت په ثانیه	غلظت په مولر NO_2	$\log[NO_2]$	$\frac{1}{[NO_2]M^{-1}}$
صفر	0.01	-4.6	100
50	0.0079	-4.8	127
100	0.0065	-5.0	154
200	0.0048	-5.2	208
300	0.0038	-5.4	263

حل : د تعامل د درجې د موندلو لپاره ، د NO_2 د غلظت د لوگارتیم گراف او د NO_2 د غلظت معکوس ، د وخت پر بنسټ رسم کو:




شکل الف : د غلظت د لوگارتیم گراف د وخت پر بنسټ ب - د غلظت معکوس د وخت پر بنسټ



شکل : د فشار د بدلونونو او د وخت پر بنسټ د ایزونتریل گراف

څرنگه چې له پورتنی گراف څخه ښکارېږي، د غلظت معکوس گراف د تعامل په بنسټ د دویمې درجې معادلې له چټکتیا څخه پیروي کوي او هم له دې گراف سره سم $K = 0.543.M^{-1}Sec^{-1}$ ؛ یعنې سرعت $V = K[NO_2]^2$ دی.




د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د کيمياوي تعاملونو په چټکتيا باندې اغيزمن لاملونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - پوه دې شي چې کوم اغيزمن عوامل د کيمياوي تعامل په چټکتيا کې بنسټيز رول لوبوي. - يقين دې تر لاسه کړي چې تودوخه، فشار، د موادو فزيکي حالتونه او د هغوی غلظت د کيمياوي تعاملونو په چټکتيا کې رول لري. - د اغيزمنو لاملونو په پام کې نيولو سره دې د تعاملونو چټکتيا وټاکلی شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته او تباشیر، اوسپنه، اوبه او پوتاشیم کلوراید.
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، وخت په دقیقه د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انګېزې رامنځته کول: که چیرې سولیدلي یوم د څو ورځو لپاره په 5 بڼ کې پاتې شي په هغه کې به کوم بدلون ولیدل شي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		وخت په دقیقه
د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه		وخت په دقیقه
- د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي. - د هغواغیزمنو عواملو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي کوم چې د کیمیاوې تعاملونو د چټکتیا لامل کیږي. - د زده کوونکو په ډلو دې څو تعاملونه تر سره کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د کیمیاوې تعامل په چټکتیا کې د اغیزمنو لاملونو په اړه وړاندې کوي، یادداشت او په ډله ییز کار کې دې فعاله ونډه ولري. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت

لاندې شکلونه د لرگیو سوځیدل ښیي، د لرگیو په دې شکلونو کې به دکوم یو سوځیدل ډیر چټک وي؟
خپلې لیدنې له دلایلو سره روښانه کړئ؟



ځواب

په الف حالت کې: څرنگه چې د لرگي د ښاخونو د تماس سطحه د تعامل د بل جز؛ یعنې اکسیجن سره لږ ده؛ نو پردې بنسټ تعامل ورو (بطي) دی.

د ب په حالت کې: څرنگه چې د لرگي د ښاخونو د تماس سطحه د تعامل له بل جز؛ یعنې اکسیجن سره لږ څه زیاته ده؛ نو پردې بنسټ د تعامل امکان یې ډیر دی.

د ج په حالت کې: څرنگه چې د لرگیو د ښاخونو د تماس سطحه د تعامل د بل جز؛ یعنې اکسیجن سره ډیر ده؛ نو پردې بنسټ تعامل چټک دی.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د عمر نیمایي اوږدوالی: د عمر نیمایي اوږدوالی د عمر نیمایي اوږدوالی $\left[\frac{1}{2}\right]$ له هغه وخت څخه عبارت دی چې په هغه کې د لومړنیو موادو له نمونې څخه نیمایي برخه یې تجزیه کیږي یا په بل عبارت هغه موده چې د تعامل بهیر نیمایي ته رسیږي، د تعامل د عمر له نیمایي اوږدوالي څخه عبارت دی. که د عمر د اوږدوالي قیمت $\left(t \frac{1}{2}\right)$ په لاندې معادله کې ځای پر ځای شي، پوه به شو چې:

$$\log \frac{\frac{1}{2}[A]_0}{[A]_0} = \left(-\frac{K}{2.3}\right)t \quad , \quad \log \frac{1}{2} \frac{[A]_0}{[A]_0} = \left(\frac{-K}{2.3}\right)t \frac{1}{2}$$

$$\log \frac{1}{2} = \left[\frac{-K}{2.3}\right] \frac{t}{2} \quad , \quad t \frac{1}{2} = \frac{-2.3 \log \frac{1}{2}}{K} = \frac{0.693}{K}$$

په لومړیو درجو تعاملونو کې د لومړنیو موادو غلظت په $\frac{0.693}{K}$ مودې کې ښایي نیمایي تعامل ته ورسېږي، د لومړنیو موادو د

عمر نیمایي اوږدوالی د درسي کتاب په مثال کې (د میتایل ایزونتریل تعامل) د لاندې شکل په گراف کې وړاندې شوی دی. د میتایل ایزونتریل د لومړني فشار د عمر نیمایي اوږدوالی 13320sec دی. په 26640sec وخت کې د میتایل ایزونتریل فشار

$\frac{1}{4}$ برخه یې کمیږي.

د لومړنيو درجو تعاملونو ځانګړتيا دا ده چې په مساوي وختونو کې غلظتونه يې په يو ټاکلي نسبت کمېږي.

د عمر نيمايي اوږدوالی له مفهوم څخه د راديو اکتيفو موادو په هستوي او چاودندونکو تعاملونو کې ډير کار اخیستل کېږي .


مثال : له لرګي څخه جوړ شوي پخواني لوبښي ترخپرنې لاندې نيول شوي دي او په پايله کې جوته شوي ده چې په دې لوبښي کې د $^{14}_6C$ کچه 15.1% ده، د $^{14}_6C$ د عمر نيمايي اوږدوالي 5760 کاله دی ، د دې لوبښي د تاريخي لرغونتيا موده محاسبه کړئ.

حل : لومړی د K ثابت د $^{14}_6C$ د چاودنې تعامل لپاره په لاس راوړو:

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{K} \quad , \quad K = \frac{0.693}{5760} = 1.203 \cdot 10^{-4}$$

$$\log \frac{[A]}{[A]_0} = \left(\frac{K}{2.3} \right) t \quad , \quad \log \frac{15.1}{100} = \frac{t \cdot 1.203 \cdot 10^{-4}}{2.303}$$

$$t = 15717.5 \text{ year}$$



شکل: د ایزونیتریل د فشار بدلونونه د وخت په پرتله



څلورم لوست

د درسي کتاب مخ: 44

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د تودوخې اغيزه په کيمياوي تعاملونو باندې
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - په کيمياوي تعاملونو باندې د تودوخې د اغيزې په اړه دې هر اړخيز معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې تودوخه په کيمياوي تعاملونو او د هغوی په چټکتيا نېغه اغيزه لري. - بيلا بيل تعاملونه دې په بيلا بيلو تودوخو کې تر سره کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشير، د بيلا بيلو موادو لپاره په بيلا بيلو تودوخو کې کيمياوي تعاملونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکني، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړه فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضري اخېستل، د وخت په کورنۍ د ندې کتل او د تير لوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول : په کيلې باندې د کار بايد د تيرې اچول د هغې په پخولو کې څه اغيزه لري؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - په کيمياوي تعاملونو باندې د تودوخې د اغيزې په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - څو کيمياوي تعاملونه دې د زده کوونکو ډلو ته وټاکي چې هره ډله يې په بيلا بيلو تودوخو کې تعاملونه تر سره کړي. - د لوست د متن دې مفهوم زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکې دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې په کيمياوي تعاملونو باندې د تودوخې د اغيزې په اړه ورکوي، يادداشت او زده دې کړي. - په ډليز کار کې دې فعاله برخه واخلي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.




7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته .

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د تعامل د چټکتيا د ټاکنې پړاو :

د F_2 او NO_2 د گازونو تر منځ تعامل په پام کې نيسو:



په يوه سطحي ليدنه کې په نظر راځي چې د پورتنی تعامل د چټکتيا معادله له دريمې درجې سره په لاندې ډول ده:

$$V = K.[NO_2]^2 [F_2] \text{-----2}$$


(وړاندوينه شوې چټکتيا)

تجربو ښودلې ده چې پورتنی تعامل دويمه درجه دی او د تعامل چټکتيا له لاندې معادلې سره سمون لري:


$$V = K.[NO_2][F_2] \text{-----3}$$

(چټکتيا د تجربې پايلو په بنسټ)

په دې بنسټ د تعامل ميخانيکيت په لاندې ډول دی:



(ورو پړاو)



(چټک پړاو)

تجربې ښودلې ده چې د تعامل لومړی پړاو ورو او د هغه دويم پړاو ډير چټک دی؛ نو پردې بنسټ د لومړي پړاو چټکتيا

(ورو) د تعامل ټاکوونکې ده او تعامل د دويمې درجې تعامل له ډول څخه دی:

$$V = K_1.[NO_2][F_2] \text{-----6}$$

(چټکتيا)

که کيمياوي تعامل په څو پړاوونو کې ترسره شي، ډير ورو پړاو د کيمياوي تعامل د چټکتيا (Rate determining)

ټاکوونکی دی او د تعامل د چټکتيا معادله د چټکتيا د ټاکوونکو پړاوونو په پام کې نيولو سره ليکل کيږي.

نوموړی وروستی تعامل په ميخانيکيت کې $(NO_2 + F \xrightarrow{K_2} 2NO_2F)$ د منځني حد په توگه پيژندل شوی دی. تعامل تر

هغه وخته بهير مومي چې د منځني حد د جوړېدو چټکتيا او د لگښت چټکتيا سره مساوي شي. په دې صورت کې به د

غلظت منځنی حد ثابت پاتې شي، د پورتنی مطلب په پام کې نيولو سره د منځني حد د غلظت بدلونونه د وخت د بدلون په

نسبت صفر کيږي:

$$\frac{d[F]}{dt} = 0 \text{-----7}$$

دارنگه نژدې والي ته دپای (ختم) حالت (Steady state) وايي. د همدې نژدې والي په مرسته کيدای شي چې د F لپاره

وليکل شي چې:

$$\frac{d[F]}{dt} = K_1[NO_2][F_2] - K_2[F][NO_2] = 0 \text{-----8}$$

د لومړي پړاو په معادله کې په $NO_2 + F_2 \xrightarrow{K_1} 2NO_2F + F$ ، څرنگه چې F توليد شوی دی، د هغه علامه مثبت او

په دويم پړاو کې د $NO_2 + F \xrightarrow{K_2} 2NO_2F$ معادلې کې، څرنگه چې F په لگښت رسيدلی؛ نو د هغه علامه منفي ده

له اتمې (8) معادلې څخه کيدای شي وليکل شي :

$$K_1[NO_2][F_2] = K_2[F][NO_2] \text{-----} 9$$

$$[F] \frac{K_1}{K_2} [F_2] \text{-----} 10$$

په اړوند معادله کې د $[F]$ د غلظت د کچې د ځای پر ځای کیدلو، د NO_2F د تولید په چټکتیا چې د دوو پړاوونو د چټکتیا له مجموعي څخه تر لاسه کیږي، پایله ترسره کیږي چې:

$$V = K_1[NO_2][F_2] \text{-----} 11$$



له لومړۍ (1) معادلې څخه د تعامل چټکتیا عبارت ده له:

$$V = \frac{1}{2} \frac{d[F]}{dt} = K_1[NO_2F] = \frac{1}{2} \{K_1[NO_2][F_2]\} + \{K_2[NO_2][F]\} \text{-----} 12$$

که چېرې د F قیمت په وروستۍ معادله کې وضعه شي، تر لاسه کیږي چې:

$$V = \frac{1}{2} \left\{ K_1[NO_2][F_2] + K_2[NO_2] + \frac{K_1[F_2]}{K_2} \right\} = K_1[NO_2][F_2] \text{-----} 13$$



لومړۍ مثال: د هایدروجن پر اکساید د تجزیوي تعامل میخانیکیت د I^- د کتلست په شتون کې په لاندې ډول دی:



د پورتنۍ تعامل د چټکتیا معادله ولیکئ.

$$V = K_1[H_2O_2][I^-] \text{خواب:}$$


دویم مثال: د $NO_2(g) + CO(g) \longrightarrow NO(g) + CO_2(g)$ د تعامل میخانیکیت په لاندې ډول دی:



حل: څرنگه چې د چټکتیا معادله د تعامل د بطني (ورو) پړاو په بنسټ ټاکل کیږي؛ نو:

$$V = K_1[NO_2]^2$$

دا پورتنۍ معادله د عملي تجربې په واسطه هم ثبوت کیږي.



پنجم لوست

د درسي کتاب مخ: 45

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د ارهينوس معادله
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د ارهينوس معادله دې د هغه له نظرياتو سره چې د چټکتيا په اړه ورکړي دي، زده دې کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د کيمياوي تعاملونو چټکتيا د تودوخې له درجې سره نېغه اړيکه لري. - د ارهينوس د نظرياتو او معادلو پرينسپ دې کيمياوي تعاملونه تر سره کړای شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او د تعامل لپاره لومړني مواد
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: ولې د اورلګیت د پلټې د سر د مېلو په پایله کې اور لګېږي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. د ارهينوس د معادلې او د کيمياوي چټکتيا د معادلو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. د کيمياوي تعاملونو د چټکتيا او تودوخې تر منځ اړیکې دې د څو مثالونو په ورکولو سره زده کوونکو ته روښانه کړي. د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.
د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه		د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکې دې یادداشت او په پام کې ولري. د هغه معلومات چې ښوونکي د ارهينوس د معادلې او د کيمياوي تعاملونو د چټکتيا په اړه وړاندې کوي یادداشت او زده دې کړي. د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه وړاندې کړي. د کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د فعال کولو دانرژۍ محاسبه


کله چې په کيمياوي تعاملونو کې د لومړنيو موادو غلظت سره يو شان وي، د چټکتيا د ثابتې کچې قيمت د بيلابيلو ضريبونو تابع دی چې د لاندې معادلې په واسطه محاسبه کيدای شي:

$$K = Ae^{-E_a/RT}$$

پورتنۍ معادله د ارهينوس په نامه مشهوره ده چې په هغې کې T مطلقه تودوخه، R دگازونو ثابت، E_a د فعالولوانرژي ده او هغه ثابت دی چې د چټکتيا ارزښت ته دلگيدو له شمير سره اړيکه ورکوي.

په اتموسفير کې د اوزون د قشر نړۍ کيدل

د اوزون (O_3) ماليکولونه د ځمکې د ستراتوسفير په نوم د اتموسفير په پورتنۍ قشر کې شتون لري چې د تودوخې او رڼا د لگيدو د اغيزې په پايله کې د اکسيجن له ماليکولونو څخه ترلاسه کيږي. د اکسيجن ماليکولونه د نورد فوتو نونو د اغيزې په پايله کې چې دا څپې د مناسب اوږدوالي لرونکې دي، د اکسيجن په اتومونو تجزيه کيږي:



د اکسيجن منځ ته راغلي اتومونه په پورتنۍ ډول سره، د اکسيجن له نورو ماليکولونو سره تعامل کوي او اوزون جوړوي:




که څه هم د اتموسفير په هره برخه او ارتفاع کې کيدای شي په لږه کچه اوزون وموندل شي؛ خو اتموسفير ټول اوزون له 90% څخه ډير له 15 تر 50 کيلومترو د ځمکې د سطحې څخه په لوړه ارتفاع کې (ستراتوسفير) شتون لري چې د اوزون په قشر شهرت لري. د اوزون غلظت په دې قشر کې $1-3PPm$ دی.

د اوزون قشر د قوي نوري تشعشع (ماورای بنفش uv) په وړاندې چې د فضا څخه د ځمکې په لور لگيږي، د يو سپر په توگه عمل کوي او د ځمکې په سطحه کې ژوندي موجودات د دې وړانگو له گواښ څخه ژغوري.




شکل: د اوزون کرښه په اتموسفير کې

د اوزون هر ماليکول د ماورای بنفش د وړانگو په پايله کې د اکسيجن په يو اتوم او د هغه په يو ماليکول تجزيه کيږي، دا لاسته راغلې ذرې بيرته يوې له بلې سره ښکلي او د اوزون ماليکول جوړوي:




پورتني تعاملونه په پرله پسې ډول او د ماورای بنفش د وړانگو د جذب لامل گرځي، اوزون څرخه په لاندې ډول ده :



شکل : د اوزون څرخیدل

ځینې عوامل کولای شي د اوزون قشر له منځه یوسي، هغه عوامل چې د اوزون د جوړیدو په څرخې کې خنډ را منځته کوي او د اوزون لیکه له منځه وړي، ځینې مرکبونه دي چې د هغوی بیلگې کیدای شي کلوروفلورو کاربنونه یا CFC وویل شي چې د اوزون د څرخېدلو د گډوډۍ لامل کیږي.





د ماورای بنفش وړانگو د عمل په پایله کې د ستراتوسفیر په طبقه کې د CFC مالیکولونه تجزیه کیږي او د کلورین رادیکالونه جوړیږي چې له اوزون سره د لاندې معادلي سره سم تعامل کوي:



لاسته راغلی $ClO \bullet$ په هوا کې د اکسیجن له شته اتومونو سره تعامل کوي او بیرته د کلورین په رادیکال تجزیه کیږي.



د کلورین رادیکال څرخیدل بیا تکرار وي، له دې امله د کلورین هر اټوم 100000 د اوزون مالیکولونه له منځه وړي:



نور رادیکالونه؛ لکه: NO او OH - او نور هم د اوزون طبقه وروسته له تعامل څخه له منځه وړي.



شپږم لوست

د درسي کتاب مخ: 47


د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د Collision نظريه يا د تعامل کوونکو موادو د ذرو د ټکرونو فرضيه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د ټکرونو، د لومړنيو موادو د ټکرونو د ډولونو او د تعامل د محصول په جوړېدو کې د هغوی د اغيزې په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د لومړنيو مواد ټکر د تعامل د محصول په جوړېدو کې بنسټيز رول لري. - د لومړنيو موادو د ټکرونو د رامنځته کولو وړتيا دې ولري او د هغوی له امله دې د تعاملونو چټکتيا او ميخانيکيت ته ډيروالي وروبخښي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او د تعامل لپاره لومړني مواد
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکنې پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضري اخېستل، د کورنۍ وخت په دقیقه د نډې کتل او د تير لوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: ايا مواد له ټکرونو څخه پرته يو له بل سره تعامل کوي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونې)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - په کيمياوي تعاملونو کې د لومړني موادو ټکرونو د څرنگوالي په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - د څو مثالونو په ورکولو دې د تعاملونو د چټکتيا اړيکه د لومړنيو موادو د ټکرونو سره زده کوونکو ته روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکې دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د کيمياوي تعاملونو د لومړنيو موادو د ټکرونو د څرنگوالي په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت

په $NOCl_{(g)} + Cl_{(g)} \longrightarrow NO_{(g)} + Cl_{2(g)}$ تعامل کې کیدای شي له شکل سره سم دوه ټکرونه رامنځ ته شي، تاسې د کیمیاوي نه رامنځ ته شوي تعامل او یا د کیمیاوي تعامل ترسره کیدل په منطقي د لیلونو سره وایئ .




حل : څرنگه چې په شکل کې لیدل کیږي، د دویم ټکر لپاره مناسب لوری شتون نه لري، نو له دې امله تعامل نه ترسره کیږي؛ خو په لومړي ټکر کې اتومونه په مناسب لوري کې یو له بل سره ټکر کوي، نو تعامل ترسره کیږي.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات


د تعامل میخانیکیت

د یو کیمیاوي تعامل توزین شوې معادله، د تعامل کوونکو موادو او د تعامل محصول رانښیې؛ خو د تعامل د څرنگوالي په اړه معلومات نه شي ورکولای. هغه پروسه چې تعامل د هغې په واسطه ترسره کیږي، د تعامل د میخانیکیت په نوم یادېږي. کیمیاوي تعاملونه د میخانیکیت له کبله په دوو عمومي ډلو ویشل شوي دي چې د یو پړاو یزو او څو پړاو یزو له تعاملونو څخه عبارت دي.


ځینې تعاملونه په یوه پړاو کې ترسره کیږي؛ د بیلگې په ډول: NO او O_3 په لاندې ډول په یوه پړاو کې یو له بل سره تعامل کوي:





په ځینو تعاملونو کې (د میتایل ایزونتریل د تعامل په شان) ورته مالیکولونه یو له بل سره ټکر کوي او په پایله کې د خپل جوړښت د بدلون وړ انرژي تر لاسه کوي:




پورتنی تعامل ته یو پړاو یز بنسټیز تعامل وایي. ډیر تعاملونه یو پړاو یز نه دي او په ساده میخانیکیت سره نه ترسره کیږي؛ خو څو مالیکولونه یو له بل سره ټکر کوي او تعامل تر سره کوي؛ د بیلگې په ډول :



دپورتني معادلې پنځه نوموړو ذرو (د Br^- دوه موله، د H^+ دوه موله او H_2O_2 يو مول) په يو وخت کې يوې له بلې سره ټکر نه دی کړی او عملاً دا تعامل په دوو پړاوونو کې تر سره کېږي چې د تعامل کوونکو درې جزونه يو له بل سره ټکر کوي:




ځينې تعاملونه په پرله پسې پړاوو کې تر سره کېږي؛ د بيلگې په ډول:






وړوستی تعامل لومړی درجه تعامل دی او د هغه د چټکتيا معادله په لاندې ډول ده:

$$\text{چټکتيا} = kN_2O_5$$



د پورتني تعامل پړاونه په لاندې ډول دي:




($N_2O_5^*$ د اړوند انرژي لرونکی يو ماليکول د انرژيکي خنډ له تيريدو لپاره دی)




له پورتنیو تعاملونو څخه هريو يې د عنصري يا بنسټيز تعامل (*Elementary Reaction*) په نوم يادوي. تعاملونه په مونو ماليکولي او يا څو ماليکولي هم ډلبندي شوي دي؛ د بيلگې په ډول:



دوه ماليکولي تعاملونه د لومړيو موادو د دوو ماليکولونو له تعاملو څخه عبارت دي:



92

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

خپل ځان وازموي

روښانه کړئ چې له لاندې تعاملونو څخه په کوم یو کې هوموجن کتلست او په کوم یو کې هتروجن کتلست په کار ورل شوی دی؟

الف - د پوتاشیم کلوریت تجزیه د MnO_2 په شتون کې.

ب - د هایدروجن پر اکساید تجزیه د اوسپنې د (II) ایونونو په شتون کې.

ج - د N_2O د گاز تجزیه د طلا په سطحه کې.

ځوابونه

الف - هوموجن کتلست

ب - هتروجن کتلست

ج - هتروجن کتلست

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

په کیمیاوي تعاملونو کې د کتلستونو عمل


کتلستونه په لاندې دوو میخانیکیتونو کې د کیمیاوي تعاملونو د چټکتیا د زیات والي لامل ګرځي.

۱- فعالوونکې انرژي کمه وي، که چیرې فعالوونکې انرژي صفر شي، ټول ټکرونه د تعامل دسرته رسیدلو لامل ګرځي.



۲- د اړهینوس د معادلې ($A = ZP$) سره سم، د کتلستونو په زیاتوالي سره د ټکرونو شمیر (Z) هم زیاتېږي او د کار ټکرونو کچه (P) هم زیاتېږي او د کیمیاوي تعامل د چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي.

کتلستونه څه ډول د کیمیاوي تعامل لوري ته بدلون ورکوي؟

هغه تعامل چې د کتلستونو په شتون کې تر سره کېږي د تعامل د مخې (مسیر) یا ځانګړې عمل لري او له هغه تعامل څخه توپیر لري کوم چې له کتلست څخه پرته تر سره کېږي؛ دیلګې په ډول: یو تعامل چې له کتلست څخه پرته، د X او Y د لګیدو له امله تر سره کېږي:




د کتلستونو په شتون کې، تعامل دیلا بیلو عملونو سره په دوو پړاوونو کې تر سره کېږي:



په دې تعامل کې C کتلست دی، څرنگه چې لیدل کېږي، د تعامل په دویم پړاو کې کتلست بیا تولید او بیرته د تعامل په بهیر کې وردننه کېږي چې د کتلست د څرخیدو په نوم یادېږي. چې له دې امله د کتلست یو مالیکول، د تعامل د محصولو څو مالیکولونه جوړوي. د کتلستونو دا عمل په صنعت کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی. د لږو کتلستونو په شتون کې ډیر محصولات لاسته راوړي؛ له دې ځایه پایلې ته رسیږو چې کتلستونه د کیمیاوي تعاملونو نوی لوری پرانيزي او خپل کار تر سره کوي. د تعاملونو مخه (مسیر) د کتلستونو په شتون کې د فعالوونکې انرژۍ ته کمه اړتیا ده؛ خو پرته له کتلست څخه، تعاملونه

د فعالوونکې ډیرې انرژي ته اړتیا لري، لاندې گراف وگورئ:



شکل: پرته له کتلتست څخه د تعاملونه د فعالوونکې انرژي

له پورتنی گراف څخه کولای شئ لاندې مهم ټکي په لاس راوړئ.

1- ΔH (د انتلیپی بدلون) ثابت دی، د هغو تعاملونو لپاره چې په هغوی کې کتلتستونه برخه لري او په هغه تعاملونو کې چې کتلتستونه برخه نه لري، یو شان دی.

2- د کتلتستونو اغیزه د کیمیاوی تعاملونو د تگ او راتگ په لوري کې یو شان ده یعنې د تعامل د فعالوونکې انرژي مخامخ ($E_{a,f}$) او معکوس ($E_{a,r}$) په عین کچه کمیږي.





څلورم څپرکی

موضوع : کیمیاوي تعادل

1- د تدریس وخت (9 درسي ساعتونه)

د لوست سرلیکونه	د درسي ساعتونه	گڼه
رجعي تعادل او د تعادل حالت	یو درسي ساعت	1
کیمیاوي تعادل	یو درسي ساعت	2
د کتلې د عمل قانون	یو درسي ساعت	3
په تعادل کې اغیزمن عاملونه، د غلظت اغیزه	یو درسي ساعت	4
د حجم بدلونونه یا د فشار اغیزه، د تودوخې اغیزه، د کتلست اغیزه	یو درسي ساعت	5
ایوني تعادل، د اوبو تولیدونه، د ایونایزیشن ثابت	یو درسي ساعت	6
د گاډو (یوځای) ایون اغیزه	یو درسي ساعت	7
په تعامل کې محاسبې، د امونیا د تولید په صنعت کې د کیمیاوي تعادل په پام کې نیولو اهمیت	یو درسي ساعت	8
د څپرکي لنډیز او پوښتنې	یو درسي ساعت	9

2- د څپرکي ښوونیز اهداف:

- زده کوونکي دې پوه شي چې کیمیاوي تعادل څه شی دی او په تعادل کې کوم عاملونه اغیزه لري؟ په تعادل کې محاسبې او د کیمیاوي تعادل د رعایت اهمیت دې د امونیا د تولید په صنعت کې زده کړي.

- زده کوونکي دې درک کړي چې کیمیاوي تعادل د کیمیاوي تعاملونو څرنګوالی روښانه کوي او په دې تعادل کې بیلایل عاملونه اغیزه لري.

- زده کوونکي دې اغیزمن عاملونه په کیمیاوي تعادل کې وټاکي او بیلایل فکتورونه دې په کیمیاوي تعادل کې په ګوته کړي.

3- د څپرکي د پوښتنو ځوابونه





دلومړنی پوښتنې ځواب:



$$0.02 \text{ mol} / L \quad 0.027 \text{ mol} / L \quad 0.027 \text{ mol} / L$$

$$K_c = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]} = \frac{\frac{0.32 \text{ mol}}{12L} \cdot \frac{0.32 \text{ mol}}{12L}}{\frac{0.21 \text{ mol}}{12L}} = 0.04 \text{ mol} / L$$


د دویمې پوښتنې ځواب:



الف: د تعامل په لومړۍ او دویمه معادله کې، تعادل د تودوخې له ډیریدو سره سم، ښي لورته تر سره کیږي، د تودوخې له ډیریدو سره د تعامل چټکتیا هم ډیرېږي.

په دریمه او څلورمه معادله کې، د تودوخې له ډیریدو سره سم تعادل کین لورته تر سره کیږي، د تودوخې په ډیریدو سره د تعامل چټکتیا کمېږي.

ب: د تعامل په دریمه معادله کې د فشار په ډیریدو سره، د تعادل ثابت بدلون نه کوي؛ ځکه چې په تعامل کې جامد ایوډین شتون لري، د فشار ډیریدل د هغه پر چټکتیا کوم اغیز نه لري:




$$K_c = \frac{[I_2][H_2]}{[HI]^2} = \frac{0.1 \text{ mol} \cdot 0.1 \text{ mol}}{[1 \text{ mol} - 0.1 \text{ mol}]^2} = \frac{0.01 \text{ mol}}{[0.9]^2} = \frac{0.01 \text{ mol}}{0.81 \text{ mol}} = 0.01235$$

4- د تعادل له منځته راتلو سره، د یوه رجعي تعامل د تگ او راتگ د تعاملونو چټکتیا سره مساوي کیږي چې د تعامل کونکو موادو او د تعامل د محصول غلظت ثابت پاتې کیږي؛ د چټکتیا دا مساوي والی او د غلظت ثابت والی یا تر هغه وخت پورې په خپل حال پاتې کیږي چې تر څو د کوم عامل په واسطه په تعادل کې یې بدلون رامنځ ته نه شي.

که چیرې کوم عامل د یوه سیستم د تعادل د بدلون لامل شي، نوموړی سیستم هغه لوري ته مخه او ځای پر ځای کیږي چې د مزاحم عمل پر وړاندې مقابله وکړي او د نوموړي عامل اغیزه له منځه وړي او یا یې د کمښت لامل شي، له دې امله په نوموړي سیستم کې یو نوی تعادل رامنځ ته کیږي، د غه روښانتیا او وجه په لومړي ځل د فرانسوي کیمیا پوه لي شاتلیه له خوا روښانه شوه او نن ورځ د لي شاتلیه د اصل په نوم یادېږي.

د لي شاتلیه اصل په صنعتي تولیداتو کې بنسټیز رول لوبوي؛ د بیلگې په توګه: امونیا په ننني صنعت کې ډیره د اهمیت وړ ماده ده چې په کیمیاوي سرو، چاودیدونکو موادو او په نورو کیمیاوي صنعتونو کې ورځنې کار اخیستل کیږي. کیمیا پوهانو هڅه کړې ده چې نوموړې ماده د نایتروجن او هایدروجن له نیغ تعامل څخه ترلاسه کړي. لومړی عالم چې کولای شول امونیا د نایتروجن او هایدروجن له نیغ تعامل څخه ترلاسه کړی، هابر (Haber Process) له جرمني څخه وو. د دې امله د غه تعامل د هابر په نوم یادېږي، د غه تعامل د تعادلي تعاملونو له ډلې څخه دی:



که چیرې د NH_3 په تولیدي عملیه کې سیستم ته ډیره تودوخه ورکړل شي، تعادل کین لورته یعنې د N_2 او H_2 گازونو جوړیدلو ته بدلون کوي. ښکاره ده چې د امونیا په صنعتي تولید کې زیار ایستل کیږي تر څو د تعادل لوری ډیر ښی خواته وي. د دغه غوښتنې د لاس ته راوړلو لپاره په کار ده چې په سیستم باندې په ډیره کچه فشار او په لږه کچه تودوخه وارده شي. په صنعت

کې د هابر (Haber Process) عملیه ډیره دود ده چې په مرسته یې د امونیا د ډیر تولید لپاره اړونده تودوخه $400 - 500^{\circ}\text{C}$ او د 200atm په شاوخوا کې فشار ټاکل شوی دی.

5- د $2\text{B(g)} + \text{C(g)} \rightleftharpoons 2\text{A(g)}$ گازي تعادل ته پام وکړئ، خلورموله A په مصرف رسیدلې چې په پایله کې د 1mol په کچه د C مرکب په فلاسک کې جوړېږي، د تعادل ثابت یې محاسبه کړئ.

6- حل: $2\text{A(g)} \rightleftharpoons 2\text{B(g)} + \text{C(g)}$

$$K_c = \frac{[\text{B}]^2[\text{C}]}{[\text{A}]^2} = \frac{[1\text{mol}]^2[1\text{mol}]}{[4\text{mol}-1\text{mol}]^2} = \frac{1\text{mol}^3}{[3\text{mol}]^2} = 0.11$$

6- $\alpha = 0$ ده، په داسې حال کې چې $\alpha \rightarrow 1$ نږدې (تقرب) شي، الکترولیت قوی دی، که چیرې الکترولیت کمزوری وي، $0 < \alpha < 1$ ده او که $K_c = 10^{-1} - 10^{-2}$ وي، الکترولیت قوي دی؛ خو که چیرې $K_c = 10^{-2} - 10^{-3}$ وي، الکترولیت

کمزوری دی؛ ځکه چې د تیزابونو قوت د هغوی د توپيرونو پربنسټ ټاکل کېږي، پر دې بنسټ کیدای شي ولیکل شي چې :

(a) $K_a = 6.4 \cdot 10^{-5}$: (Benzoic acide) کمزوری تیزاب

(b) $K_a = 4.5 \cdot 10^{-4}$: (Nitrous acide) منځنۍ تیزاب

(c) $K_a = 1.6 \cdot 10^{-4}$: (Formic acide) منځنۍ تیزاب

(d) $K_a = 1.1 \cdot 10^{-2}$ (Chlorous acide) منځنۍ تیزاب

(e) $K_a = 2.1 \cdot 10^{-9}$ (Hypobromous acide) کمزوری تیزاب

7- $(\text{H}_5\text{O}_2^+, \text{H}^+)$ او $\text{HC}_7\text{H}_5\text{O}_2$ غلظت د 0.5M اسیتیک اسید په محلول کې وټاکئ. $K_a = 6.4 \cdot 10^{-5}$.

ځواب:



0.5molar 0.5molar α 0.5molar

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{6.4 \cdot 10^{-5}}{0.5}} = 1.1314 \cdot 10^{-2}$$

$$\alpha = 1.1 \cdot 10^{-2}$$

$$[\text{H}^+] = C\alpha = 0.5 \cdot 1.1314 \cdot 10^{-2} = 6 \cdot 10^{-3} = 5.657 \cdot 10^{-3}$$

$$[\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_2^-] = C\alpha = 0.5 \cdot 1.1314 \cdot 10^{-2} = 6 \cdot 10^{-3}$$

8- د $2\text{CO(g)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}_2(\text{g}) + \text{heat}$ کیمیاوي معادلې ته پام وکړئ او د لاندې فکتورونو اغیزه پرې روښانه کړئ.

a- د کتلست کارول

b- د تودوخې د درجې ډیرول

c- د تعامل د لوښي د حجم لږول



d- په لوبښي کې د He د گاز د ننه کول او د هغه اغیزه د CO_2 پر غلظت باندې، په داسې حال کې چې د تعامل د ظرف حجم ثابت پاتې شي.
 ځواب:

الف: - که چیرې په $2CO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2CO_2(g) + \text{heat}$ تعامل کې کتلست ورزیات شي، کتلست د فعالونکې انرژۍ د کمښت لامل کیږي او د خنثی کیدو د تعامل چټکتیا ډیروي. کتلستونه په رجعي تعاملونو کې د دواړو خواوو انرژي یو شاته راټیټوي، خو د تعامل په ثابت کې کوم بدلون نه شي رامنځ ته کولای.


ب: څرنگه چې لیدل کیږي، نیغ تعامل — یو اگزوترمیک (**Exothermic**) او د هغه معکوس تعامل انډوترمیک (**Endothermic**) تعامل دی. د لي شاتیلې د اصل له مخې، که چیرې د سیستم د تودوخې درجه بدلون ومومي، تعادل هغه خوا ته بدلون کوي چې د بدلون کوونکي فکتور اغیزه لږ کړي، که چیرې د سیستم د تودوخې درجه لوړه شي، د لي شاتیلې د اصل له مخې، د تودوخې د درجې د ټیټیدو لپاره، پر سیستم باندې حاکم تعادل کین لوري (لومړنیو موادو) ته بدلون مومي.
 ج: - کله چې پر غازي سیستم له شته فشار څخه لږ څه کم شي، تعامل هغه خواته تر سره کیږي کوم چې د گازو مولې ضریبونه د کیمیاوي معادلې په هماغه لوري کې ډیر وي.

د پورتنیو یاد شوو څرگندونو سره سم، کله چې د سیستم حجم لږېږي؛ یعنې ډیر فشار پرې را وړل شي، تعادل په کیمیاوي معادله کې د $CO(g) + O_2(g)$ جوړیدو لوري ته بدلون مومي؛ نو څرنگه چې په پورتنۍ توزین شوې معادله کې لیدل کیږي، د محصول ضریب کوچنی دی.

د: - څرنگه چې د CO_2 پر غلظت باندې په یوه لوبښي کې د He د گاز اچول په داسې حال کې چې د تعامل د لوبښي حجم ثابت وساتل شي، د لوبښي د حجم یوه برخه د He گاز نیولې او د CO_2 د گاز حجم کم شوی؛ له دې امله د تعامل تعادل ښي لوري ته؛ یعنې په معادله کې د CO_2 جوړیدلو لوري ته ادامه مومي.
 9- لاندې معادلې د هغوی له ثابتونو سره ورکړل شوې دي:



د لاندې کیمیاوي معادلې د K_C قیمت د پورته ورکړ شویو قیمتونو په پام کې لرلو سره لاس ته راوړئ:




حل:

$$K_a = \frac{K_1}{K_2} = \frac{4.9 \cdot 10^4}{1.0 \cdot 10^{14}} = 4.9 \cdot 10^{-10}$$

10- د هایدريت شوو مالگو په اړه معلومات لرئ او پوهیږئ چې د دغو مالگو په بلوري جوړښت کې په ټاکلي کچې د اوبو مالیکونه شتون لري. د نیل توتیا مرکب ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) چې 5 مالیکوله کرسټالي اوبه لري، په پام کې نیسو. د غه مرکب چې رنګ یې اسماني شین دی، د تودوخې په ورکولو سره خپل د اوبو مالیکولونه له لاسه ورکوي اوبه یو سپین رنګه پودرو باندې اوږي. که چیرې دغه سپین رنګه مالګه په لمد هوا کې کیښودل شي، څه ډول بدلون به د هغې په رنګ کې رامنځ ته شي؟ ایا له $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ څخه د پنځه مالیکولو اوبو لرې کول، یو رجعي تعامل دی، کله چې $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ ته


تودوخه ورکړل شي، خپلې کرسټالي او به له لاسه ورکوي او په CuSO_4 باندې اوږي او په لمد هوا کې بیرته $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ته اوږي؛ نو یو رجعي تعامل دی:



11- د سودیم فارمیت (NaCHO_2) 0.02mol محلول 0.05M HCHO_2 له یو لیتر محلول سره جوړ شوی دی. د دې په پام کې لرلو سره چې د محلول په حجم کې هېڅ بدلون نه دی راغلی، د H^+ د ایون غلظت په نوموړي محلول کې لاس ته راوړئ.

$$K_a = 1.6 \times 10^{-4}$$

حل:



$$x \quad x \quad 0.5 - x \quad \text{د تعادل لومړی غلظت}$$

$$(x + 0.02)\text{mol/L} \quad x\text{mol/L} \quad (0.5 - x)\text{mol/L} \quad \text{د تعادل دویم غلظت} \quad -2$$

-3

$$4- K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CHO}_2^-]}{[\text{HCHO}_2]} = 1.6 \cdot 10^{-4}$$

$$5- \frac{(x)(x + 0.02)}{(0.5 - x)} = 1.6 \cdot 10^{-4}$$

څرګنده ده چې د فارمیک اسید د ټوټه کیدو کچه لږ او هغه په X باندې ښودل شوې ده؛ نو د X له جمع کولو او منفي کولو څخه کولی شو چې د معادلې په دواړو خواوو کې ډډه وکړو:

$$\frac{0.02x}{0.5} = 1.6 \cdot 10^{-4} \Rightarrow x = 1.6 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{0.5}{0.02} \Rightarrow$$

$$[\text{H}] = 1.5 \cdot 10^{-3}$$

$$\text{pH} = 2.4$$

-12

حل:

$$\alpha = 0.72\%$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}}$$

$$\alpha = 7.2 \cdot 10^{-3}$$

$$K_a = \alpha^2 C \Rightarrow (7.2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 0.5$$

$$K_a = 2.6 \cdot 10^{-5}$$

-13

حل :

a) $0.03M \text{ HNO}_3$

$$[H^+] = 0.03M < pH = -\log 0.3 = 0.52$$

b) $[H^+] = 0.001N \text{ H}_2\text{SO}_4 \bullet 2 = 2 \bullet 10^{-3} \Rightarrow pH = -\log 2 \bullet 10^{-3}$

$$pH = 2.69$$

c) $[OH^-] = 10^{-1}$, $pOH = -\log[OH^-]$, $pOH = -\log 10^{-1} \Rightarrow pOH = 1$

$$pH + pOH = 14 \text{ , } pH + 1 = 14 \Rightarrow pH = 14 - 1 \Rightarrow pH = 13$$

d) $[OH^-] = 2 \bullet 4 \bullet 10^{-4} \Rightarrow pOH = -\log 8 \bullet 10^{-4}$


$$pOH = 3.1$$

$$pH + pOH = 14 \Leftarrow \Rightarrow pH = 14 - pOH = 14 - 3.1$$

$$pH = 10.9$$

14- د خوابونو د جدول د تشو ځايونو سم ډكول:

pOH	pH	$[OH^-]$ و mol/L	$[H^+]$ و mol/L	تيزاب يا القلی
7	7	$1.0 \cdot 10^{-7}$	$1.0 \cdot 10^{-7}$	x تيزاب
3	11	$1.0 \cdot 10^{-3}$	10^{-11}	0,01N NaOH
10.45	3.55	$1.43 \cdot 10^{-11}$	$7.0 \cdot 10^{-4}$	x تيزاب
12.4	1.6	$3.96 \cdot 10^{-13}$	$2.52 \cdot 10^{-2}$	x تيزاب



لومړۍ لوست


د درسي کتاب مخ: 56

د مطلبونو شرح		د مطلبونو سرليکونه
رجعي تعاملونه او د تعادل حالت		1- د لوست موضوع
له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د رجعي تعاملونو په اړه دې معلومات تر لاسه او د رجعي والي په مفهوم دې پوه شي. - يقين دې تر لاسه کړي چې زیاتره کیمیاوي تعاملونه رجعي دي او تعامل هغه وخت رجعي نه دی چې د تعامل محصول تبشیدونکې او یا رسوب کوونکې ماده وي. - د تعادلي حالتونو په پام کې نیولو سره، د اړتیاوې بیلابیل محصولاتو دې لاس ته راوړلی شي.		2- د زده کړې موخې - پوهنیزې - ذهنیتي - مهارتي
مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي		3- د تدریس میتودونه
کتاب، قلم، تختې تباشیر او د محلولونو بیلابیل ډولونه		4- د تدریس اړین مواد او توکي
شفاهي او لیکنی، پوښتنې او ځوابونه		5- د ارزونې میتود
وخت په دقیقه	لومړنۍ فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: که چیرې شین رنګ لرونکې نیل توتیا ته تودوخه ورکړل شي کوم رنګ به غوره کړي او ولې؟	6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه
وخت په دقیقه	د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه	6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه) - د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي. - د رجعي تعاملونو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. - د رجعي والي مفهوم، تعادل حالت او فزیکي تعادل دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - د څو پوښتنو په کولو سره دې لوست و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.
40	- د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې د رجعي تعاملونو، تعادل د حالت او فزیکي تعادل په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ووايي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.	

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فکر وکړئ

لاندې شکلونه هغه پېښې ورنښي چې د اوبو براس په یوه سر تړلې لوبښي کې ترسره کېږي ، لاندې شکلونو ته په ځیر وگورئ او وړاندې شوو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ:



(3-4) شکل : داوږد تولید او براس حالتونه په بیلابیلو وختونو کې

- 1- په پاسنیو شکلونو کې په پیل کې په کوم یوه سر تړلې لوبښي کې یوازې د براس عملیه تر سره کېږي؟ ځواب: په 1 شمیره کې
 - 2- په کوم شکل کې ، د ایشیدو چټکتیا د براس له چټکتیا څخه لږ ده ؟ ځواب : په 3 شمیر کې
 - 3- په کوم شکل کې ، د براس چټکتیا د تراکم له چټکتیا سره یوشان شوی دي ؟ ځواب : په 3 شمیر شکل کې
 - 4- ایا د براس او تراکم د چټکتیاوو د یو شانته کولو لپاره د لوبښي شتون حتمي دی ؟ ځواب : هو
 - 5- په کوم شکل ، د براس فشار خپلې ثابتې ټاکلې کچې ته رسیدلی ؟ ځواب : په 3 شمیر شکل کې
 - 6- ایا د اوبو د براس د فشار ثابت پاتې کیدل د براس او تراکم د ډیریدو معنی لري ؟ ځواب : هو
- عمومي ځواب : د تعادل په حالت کې ، د اوبو د براس کچه او د اوبو د مایع کتله ثابتې پاتې کېږي؛ خو د اوبو بیا رامنځ ته کیدل او براس په یوه مایکروسکوپیک حالت سره لا ادامه مومي ، دغه تعادل د دینامیکي تعادل (Dynamic Equilibrium) په نوم یادېږي.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د کیمیاوي تعادل په اړه عمومي معلومات


کیمیاوي تعاملونه تر یوه ټاکلې حده پورې تر سره کېږي چې دغه ټاکلې حد ته د تعادل حالت وايي؛ یا په بل عبارت کیمیاوي پېښه تر هغه حده پورې پرمخ ځي چې تر څو تعادل رامنځ ته شوې نه وي. د تعامل پرمختګ له ځینو شرطونو سره تړون لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په ځانګړو شرایطو کې د تعامل په پرمختګ کې ځانګړې اهمیت لري ، په ځانګړې توګه دا شرایط په کیمیاوي آزمایشونو کې د موادو په سنتیز ، په لابراتوارونو ، تولیدي کارخانو ، د گازونو ، مایعاتو او د جامداتو په انحلالیت کې له ځانګړې اهمیت څخه برخمن دي. د اهمیت وړ پوښتنه چې په دې اړه مطرح کېږي داده چې یو تعامل تر کومه حده پرمخ ځي ؟ د دې پوښتنې د روښانه کولو لپاره ، لاندې بیلګه وړاندې کوو:

یو لوبښی چې د نیونکې لرونکې (ګیرا) مخ په واسطه په دوو برخو ویشل شوی دی ، په پام کې نیسو ، د دواړو برخو تودوخه یو شان ده؛ خو د یوې برخې فشار له بلې برخې له فشار څخه ډیر دی ؛ نو که چیرې ګیرا لرې کړل شي تر څو صفحه وڅوڅیږي ، په دې حالت کې به څه پېښه منځته راشي؟ صفحه دومره حرکت کوي چې تر څو د دواړو برخو فشار سره

مساوي شي؛ دلته دواړه گازونه د تعادل حالت ته رسېږي، په دې بېلگې کې په لومړي سر کې یو غیر متعادل سیستم شتون درلود چې د صفحې د خوځېدو له امله فشار او تودوخه په دواړو برخو کې د ورځې د حرکت له امله تعادل ته رسېږي؛ نوله دې کبله کیدای شي پایله ترلاسه شي چې د صفحې خوځېدل په سیستم کې د تعادل د رامنځ ته کیدو لامل شوی دی. دغه تعادل یو فزیکي تعادل دی چې د فشار د مساوي کیدو له امله رامنځ ته کېږي. بل ډول تعادل هم شتون لري چې د تودوخې تعادل څخه عبارت دی، دا تعادل له تاوده جسم څخه سوړ جسم ته د تودوخې دتللو له امله منځته راځي او د دوخې تلل تر هغې مودې ترسره کېږي چې د تودوخې تعادل منځته راشي، دتودوخې دا تعادل د فزیکي تعادل له ډول څخه دی. له پورتنیو څرگندونو څخه دا پایله ترلاسه کېږي، کوم فزیکي بدلونونه چې دیوه سیستم په بیلابیلو برخو کې رامنځ ته کېږي، د سیستم د نوموړو برخو ترمنځ د تعادل لپاره دي. کله چې د سیستم د برخو ترمنځ تعادل منځ ته راځي، د سیستم میکروسکوپیک خواص؛ یعنې فشار، حرارت او داسې نور بدلون نه مومي، د سیستم وروستی حالت د هغه د تعادل ټکی دی. کیمیاوي او فزیکي تعادل څه ناڅه یو له بل سره ورته دي؛ خو د دوی ترمنځ توپیر دا دی چې په کیمیاوي تعادل کې د موادو کیمیاوي خواص او د موادو کیفیت بدلون کوي، لومړني مواد د تعامل پر محصولو بدلون مومي او د دوی ترمنځ تعادل رامنځ ته کېږي. ولې سیستمونه غواړي چې د برخو ترمنځ یې تعادل رامنځته شي؟ باید وویل شي چې ټول بدلونونه په یو سیستم کې کوم چې د بهرنیو عواملو له مرستې څخه پرته رامنځ ته کېږي، د سیستم د پايښت لپاره ترسره کېږي او د سیستم پایښت ترلاسه کوي.

مهم مطلب: ترڅانگړو شرایطو لاندې، د تعادل حالت، له غیر تعادلي حالت څخه چې تر نوموړو شرایطو لاندې وي، پایښت یې زیات دی؛ نو له دې کبله د سیستمونو طبیعي تمایل د یوه باثباته حالت د موندلو لپاره دا دی چې د تعادل د حالت په لور د حرکت په درشل کې دی ترڅو د تعادل حالت ولري.


په کیمیاوي سیستمونو کې د تعادل ډول میخانیکي دی، د دینامیکي تعادل د رامنځ ته کیدو د روښانه کیدو لپاره، په یوه لوبښي کې اوبه واچوئ او سربوښ یې په سر کېږدئ، په دې صورت کې که چیرې د اوبو غلظت د هغې په مایع حالت کې وځیرل شي، و به لیدل شي چې د اوبو د براسو غلظت د مایع په سطحه کې پرله پسې زیاتېږي؛ یعنې تبخیر (براس) ترسره شوی دی:




خو د وخت په تیریدو سره د مایع په سطحه کې د اوبو د براس د غلظت د ډیریدو چټکتیا کمېږي، په یوې شېبې کې داسې حالت ته نږدې شي چې د اوبو د براس غلظت بدلون نه کوي، ثابت پاتې کېږي، دې ټکي ته د براس او مایع د فازونو ترمنځ د تعادل ثابت وایي او دا تعادل هغه وخت ممکن دی چې د مایع د ویلې کیدو او براس کیدو د عملیې چټکتیا سره یوسان شیبې، د دینامیکي تعادل په مفهوم دی.

په کیمیاوي تعاملونو کې تعادل هغه وخت رامنځ ته کېږي چې د لومړنیو موادو د بدلون چټکتیا د تعامل په محصول او د محصولو موادو بدلون چټکتیا په لومړنیو موادو سره مساوي شي.

څرنګه چې د تعادل په حالت کې د تعامل میل دواړو لورو ته یوشان دی؛ له دې امله غلظتونه او د اجزاوو فشارونه ثابت پاتې کېږي، د تعادل په ټکي کې لږڅه لومړني مواد په سیستم کې پرته له تعامل څخه پاتې کېږي چې په ځینو حالتونو کې د ټاکلو وړ نه دي، په دې حالتونو کې ویل کېږي چې تعامل په ښه توګه ترسره شوی دی؛ د بیلګې په توګه: د کتلست په شتون کې د دوو مولو هایدروجن او د یومول اکسیجن له تعامل څخه، لاندې چټک تعامل ترسره کېږي:



پورتنی تعامل به تر هغه وخته پایښت ولري چې تر څو لاندې تعادل نه وي رامنځ ته شوی:



دا چې ویل کیږي: هایډروجن او اکسیجن په پوره ډول سره تعامل کړی دی او اوبه یې جوړې کړې دي؛ خو یو لږه کچه یې په سیستم کې پرته له تعامل څخه پاتې شوې ده.

$$K = \frac{[N_2O_4(g)]^2}{[NO_2(g)]^2}$$

دویم لوست

د درسي کتاب مخ: 57

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		کيمياوي تعادل
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - کيمياوي تعادل او د هغه مهم خاصيتونه دې زده کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې کيمياوي تعادل د تعادل په حالت کې څرگنده شواهد؛ لکه: په خپل سر بدلون، په پر له پسې توگه د تعامل رجعت او ديناميکي توازن په رجعي تعاملونو کې ښيي. - د کيمياوي تعادل د ځانگړتياوو په پام کې نيولوسره دې په گوته شوی محصول لاس ته راوړلای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تختې او تباشير
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوس ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: که چيرې N_2O_5 له H_2O سره تعامل وکړي کوم مرکب جوړيږي؟ وخت په دقیقه 5
1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
- د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د کيمياوي تعادل په اړه دې معلومات ورکړي. - د څو بيلگو په ورکولو سره دې د کيمياوي تعادل ځانگړتياوې روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ورکړي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د کيمياوي تعادل د ځانگړتياوو په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه وويي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
وخت په دقیقه 40		


7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.


8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

په کيمياوي تعاملونو کې تعادل


د دې مطلب د څپرلو لپاره لاندې عمومي تعامل په پام کې نيسو:





فرض کړئ چې په يوه لوبښي کې لږڅه د A او B گاز شتون لري او د کومې وسيلې په مرسته کيدای شي چې د دې گازونو د غلظت بدلون وليدل شي. کيدای شي چې په لاندې شکل کې وليدل شي، ددې شکل پر بنسټ د وخت په تيريدو سره د ټولو موادو غلظت بدلون مومي، تعامل د t_0 په وخت پيل او په t_1 موده کې د A او B غلظت کميږي او د C او D غلظت زياتيږي (په دې تعامل کې د C او D د توليد شوې غلظت نسبت 1:1 دی)، د t_2 په موده کې د A او B غلظت کميږي او د C او D غلظت لاهم زياتيږي؛ خو د t_2 په موده کې د بدلون چټکتيا د t_0 له مودې څخه کمه ده. په t_3 موده کې د موادو غلظتونه بدلون نه مومي. په t_0 موده کې تعامل ښي لوري ته پر مختگ کوي:



څرنگه چې په t_1 موده کې د C او D کچه ډيره جوړه شوې ده، نو رجعي تعامل هم ترسره شوی دی:




کله چې تعامل ښي لوري ته ترسره کيږي، د A او B کچه کميږي، د تعامل چټکتيا ورو او د بيرته گرځيدو (معکوس) تعامل چټکتيا زياتيږي، له t_3 څخه په مخکې موده کې چټکتيا له ښي خوا په پر له پسې توگه کميږي او د معکوس تعامل چټکتيا يې پرله پسې زياتيږي او په t_3 مودې کې دا دواړه چټکتياوي سره يوشان کيږي چې تعادل رامنځ ته کيږي؛ په دې حالت کې د لومړنيو موادو او د تعامل د محصول ترمنځ د ډيناميکي تعادل منځ ته راځي:



شکل: تعادل ته د تعامل نږدې کيدل


تعادل کيدای شي په بيلابيلو لارو رامنځ ته کړل شي، د دې مطلب د روښانه کولو لپاره کيدای شي لاندې تعامل په پام کې ونيول شي:



په پاسني تعامل کې د تعادل د راوستلو يوه لاره دا ده چې د تعامل کوونکو موادو د مولونو مساوي کچه (د هر ډول تعامل

کونکو موادو یومول (په لوبني کې اچول کېږي او انتظار ایسل کېږي ترڅو غلظتونه ثابت شي، لاندې د (الف) شکل وگورئ. د څیړنې دویمه تگلاره به دا وي چې د یومول په کچه د CO_2 او H_2O په لوبني کې واچوو، د غلظت بدلونونه د (ب) په شکل کې په لاندې ډول ښودل شوي دي. په دې حالت کې تعامل کین لوري ته مخه کوي، د ټولو موادو وروستی تعادلي غلظت په دې حالت کې یوشان دی، لاندې د ج شکل هغه مواد ور ښیي چې په لوبني کې د CO_2 او H_2 د بیلابیلو کچو ورزیاتول، د تعادل د رامنځ ته کیدو لامل کېږي په دې حالت کې په لوبنی کې د CO_2 او د H_2O د مولو کچه ډیرېږي؛ خو په دې تعادل کې د الف او ب گراف یو له بل سره توپیر لري.

دریمه تگلاره په لاندیني شکل کې په لاندې ډول ښودل شوي ده: په دې تگلاره کې د CO_2 او H_2 مساوي کمیتونه په لوبني کې اچول شوي دي او هم د CO اضافي کچه ور زیاته شوې ده، دلته د تعادل په حالت کې دمحصولو موادو نوی غلظتونه تر لاسه کېږي. له اصولو سره سم کیدای شي چې په هر تعامل کې د تعامل کونکو موادو او د لاسته راغلو موادو دغلظت پر بنسټ کیدای شي چې تعادل رامنځ ته شي؛ خو په دې شرط چې په مخلوط کې باید د لومړنیو موادو او یا د تعامل دلاسته راغلو موادو لږڅه کچه شتون ولري.



شکل: د تعادل د منځ راتلو بیلابیلې تگلارې

$$\frac{[C][D][A]}{[A_2][B]} = K$$

دریم لوست

د درسي کتاب مخ: 58

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د کتلې د عمل قانون او تعادل
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د غلظت اغیز او د هغه اړیکه د کتلې د عمل له قانون او د تعادل له ثابت سره زده کړي. - یقین دې تر لاسه کړي چې د تعامل کوونکو موادو او د تعاملونو د محصولو غلظت د تعادل له ثابت او د کتلې د عمل له قانون سره اړیکه لري. - د کیمیاوي تعاملونو د تعادل ثابت دې په لاس راوړي او د هغه پرنسپ دې نور تعاملونه تر سره کړای شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توک		کتاب، قلم، تختې او تباشیر
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنۍ پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخیستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگیزې رامنځته کول: د اوبو د تجزیې د تعادل په ثابت باندې پوه هیري؟
1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي.		د ښوونکي څرګندونو ته دې څیړشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري.
د کیمیاوي تعاملونو د تعادل د ثابت او د کتلې د عمل د قانون په اړه دې معلومات ورکړي.		د تعادل د ثابت او د کتلې د عمل د قانون په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي.
د څو تعاملونو د تعادل ثابت دې د مثالونو پرنسپ تر لاسه کړي.		د تعادل د ثابت په اړوند بیلګې چې ښوونکي یې وړاندې کړي، هغوی ته ورته بیلګې دې ورکړي.
لوست دې د څو پوښتنو په کولو روښانه کړي.		د لوست په مفهوم دې پوه شي.
زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب ورکړي او کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فکر وکړي:

$$\text{الف: } K = \frac{[NH_3]^2}{[H_2]^3[N_2]} = 3.6 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot 10^{-2} \cdot L^2$$

ب: د پورتنۍ تعادل ثابت او د هغه د معکوس تعامل د تعادل ثابت هم شتون لري.

ج:


$$K = \frac{[H_2]^3[N_2]}{[NH_3]^2} = \frac{1}{3.6 \cdot 10^8 \text{ mol}^2 \cdot L^2}, K = \frac{[H_2]^3[N_2]}{[NH_3]^2} = \frac{1}{K}$$

$$\frac{1}{K} = 2.8 \cdot 10^{-9} \frac{\text{mol}^2}{L^2}$$

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

کنیتیک او تعادل

د سیستمونو د حرکت پریښت، کیدای شي د یوه سیستم تعادل روښانه کړل شي، د تعادل په حالت کې د رجعي تعاملونو د مستقیم او معکوس تعاملونو چټکتیا یوشان ده؛ پر دې بنسټ د رجعي تعاملونو د تعادل د ثابت د مستقیم او معکوس تعامل د چټکتیا تر منځ اړیکه شتون لري، دغه اړیکه کیدای شي د یو پراويزه بنسټیز تعامل په مرسته ترلاسه کړل شي:



په پورتنۍ معادله کې K_1 او K_2 د مستقیم او معکوس تعامل د چټکتیا ثابت دی چې د هغوی چټکتیا عبارت ده له:

$$V_1 = K_1 \frac{[A][B]}{t}$$


$$V_2 = K_2 \frac{[C][D]}{t}$$

د تعادل په حال کې د مستقیم او معکوس تعامل چټکتیا سره یوشان ده؛ نولیکلای شو چې:

$$K_1 \frac{[A][B]}{t} = K_2 \frac{[C][D]}{t}$$


$$\frac{[C][D]}{[A][B]} = \frac{K_1}{K_2} = K$$

د پاسنۍ معادلې کینڅو خوا د تعامل وتونکې برخه ده؛ نو پورتنۍ کنیتیکي معادلې په اثبات رسوي چې د یو پراويزو تعاملونو وتونکې برخه (خارج قسمت) یو ثابت کمیت دی. د نورو تعاملونو لپاره هم کیدای شي چې د تعادل ثابت یا د تعامل وتونکې برخه لاس ته راوړو:




پورتنۍ تعامل کولی شي په لاندې دوو پراوونو کې تر سره شي:

لومړي پړاو:



دویم پړاو:



د تفصیلي توازن (principle of detailed balancing) د اصل له مخې، که چیرې څو پړاويز تعامل د تعادل په درشل کې وي، هر پړاو یې د تعادل په حال کې دی؛ په دې معنا چې د تعادل په حال کې د لومړیو او دویمو پړاونو لپاره ممکن ولرو چې:

پړاو

لومړی

$$K_1[A]^2 = K_{-1}[A_2]$$

$$\frac{[A_2]}{[A]^2} = \frac{K_1}{K_{-1}}$$


$$K_2[A_2][B] = K_{-2}[C][D][A]$$

دویم پړاو:

$$\frac{[C][D][A]}{[A_2][B]} = \frac{K_1}{K_{-2}}$$

څرنگه چې د دوو ثابتو د ضرب حاصل له دریم سره مساوي دی؛ یعنې $K = \frac{K_1}{K_2}$ کېږي؛ نو:

$$\frac{[C][D][A]}{[A_2][B]} = K$$



څلورم لوست

د درسي کتاب مخ: 60

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		په تعادل کې اغيزمن عوامل، د غلظت اغيزه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - په کيمياوي تعادل کې دې د غلظت او بهرنیو عاملونو داغيزې په هکله پوه شي. - يقين دې تر لاسه کړي چې په کيمياوي تعادل کې غلظت او بهرنی عاملونه بنسټيز رول لري. - د غلظت د چمتو کولو او د شرايطو د رامنځ ته کولو په مرسته دې په کيمياوي تعاملونو کې تعادل رامنځ ته کړای شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تختې، تباشیر او تعامل کوونکي مواد
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په اخیستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرو لوستونو ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: د دوو گرامو له تعامل څخه څومره محصول لاسه راځي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
وخت په دقیقه	40	- د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي. - په کيمياوي تعادل کې دې د غلظت او بهرنیو عاملونو په اړه دې معلومات ورکړي. - د څو معادلو په واسطه دې په کيمياوي تعادل کې د غلظت او د بهرنیو عاملونو اغيز روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي. - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې په کيمياوي تعادل کې د غلظت او بهرنیو عاملونو د اغيز په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - د استحصال هغه معادلې چې ښوونکی یې روښانه کوي، یادداشت او په خپله دې هم څو تعاملونه تر سره کړي. - د لوست په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب کړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.


7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت

په یو لوشی کې چې 10 L ثابت حجم لري، په 727°C تودوخه کې لاندې تعادل رامنځ ته کیږي:



په پوره پاملرنې سره شکل ته وگورئ:



په غور سره د پاسني شکل له لیدو څخه وروسته، لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ:

الف:- لاندې جدول پوره کړئ؟

غلظتونو مجموعه	$[\text{SO}_2(\text{g})]$	$[\text{O}_2(\text{g})]$	$[\text{SO}_3(\text{g})]$	
				تعادلي غلظتونه په لومړي حالت کې
				تعادلي غلظتونه په دویم حالت کې

ب: په کوم بالون کې غلظت ډیر شوی دی؟

ج: له نوموړو بالونونو څخه د کوم یوه بالون غلظت کوم چې تمه کیده، لږ دی؟ له دغې موضوع څخه څه پایله اخلي؟

د: $\text{SO}_2(\text{g})$ په زیاتولو سره تعادل کومې خوا ته رامنځ ته کیږي؟ ایا دغه ځای په ځای کیدنه د تعادل پر ثابت باندې کوم اغیز لري؟

ه: درجعي تعاملونو چټکتیا د $\text{SO}_3(\text{g})$ په زیاتولو سره څه بدلون مومي؟ د دغه بدلون په پام کې لرلو سره، د ځای په ځای کیدو له مخې نوی تعادل وټاکئ؟

جواب

الف -

دغلظتونو مجموعه	[SO ₂ (g)]	[O ₂ (g)]	[SO ₃ (g)]	
1.16mol	0.32mol	0.16mol	0.68 mol	تعادلي غلظتونونه په لومړي حالت کې
2.27mol	0.54mol	0.27mol	1.46mol	تعادلي غلظتونونه په دويم حالت کې

ب- په دويم بالون کې غلظت (2.27mol) له لومړي بالون (1.16mol) څخه زيات دی .

ج- په لومړي بالون کې د غلظت زياتوالی دانتظار په خلاف، کم دی.

د- د SO₃(g) د زياتولو، تعادل کين خواته؛ يعنې د [SO₂(g)] او [O₂(g)] په جوړېدو منځته راځي او په نوي ځای پرځای کيدو سره د تعادل ثابت کوچنی کيږي.

ه- د SO₃(g) په زياتولو، د تعامل دبیرته گرځيدو چټکتيا زياتيږي؛ خو دتللو چټکتيا کميږي، دنوي تعادل د منځته راتلولو د تعامل چټکتيا به سره مساوي وي .

و- د SO₃(g) په زياتولو سره، د تعامل د وتلو برخې ثابت (دخارج قسمت ثابت) کميږي؛ ځکه د SO₃(g) غلظت چې د وتلو برخې د ثابت په مخرج کي شتون لري، زياتيږي، څرنگه چې په هـ فقرې کې وويل شول، د SO₃(g) په زياتولو سره، د تعامل دبیرته گرځيدو چټکتيا زياتيږي، دنوي تعادل د منځ ته راتلو لوری کين خواته ادامه لري.

8- د بنوونکي لپاره اړين معلومات

په تعادلي سيستم کې د غلظت اغيزه: د کاربن تتراکلورايد او د ايودين مشبوع محلول داسې په پام کې نيول شوی چې په هغه کې د جامد ايودين کچه هم وي، شتون ولري، که چيرې لږ څه د کاربن تتراکلورايد په محلول کې ورزيات شي، کوم ډول بدلون به په سيستم کې وليدل شي؟


د کاربن تتراکلورايد په زياتيدو سره د سيستم تعادل گډوډ کيږي؛ ځکه د حل کوونکي په زياتيدو سره د حل شوي مادې کچه ټيټيږي؛ يعنې په دې حالت کې گډوډ شوي تعادل، دعمل مخالف لوري ته تر سره کيږي؛ نود تعادل حالت ته دسيستم د رسيدلو لپاره، اړه ده تر څو لږ څه ايودين ورته زيات شي چې د ايودين غلظت له تعادلي حالت سره مساوي شي؛ يعنې:

$$[I_2] = K$$

خو د حل کوونکي د زياتيدو په پايله کې دايودين کچه کميږي، لامل يې دحل کوونکي د حجم ډيريدل په محلول کې دی:

$$[I_2] < K$$

د تعادل په حالت کې د ايودين غلظت بايد له K سره يوشان وي:



په دې معنا چې تعامل له کين لوري څخه چپ لوري ته تر سره شي، دا مطلب دلې شاتليه (Henry lechatelier) د اصل په نوم ياديږي.


که چيرې په يو تعادلي سيستم کې داغيزمنو عواملو څخه يو يې (په تعادل کې ښکېل مواد) بدلون ومومي، سيستم دهغه مخالف لوري ته بدلون مومي.

مثال : د باریم سلفیت ($BaSO_4$) حلیدل په اوبو کې:



که چیرې په پاشني سیستم کې لږ څه Na_2SO_4 ورزیات شي، څه ډول بدلون به په کې راڅرګند شي؟

څرنگه چې سودیم سلفیت په پوره توګه پوټه کیږي، له دې امله د SO_4^{2-} د ایونونو غلظت ډیرېږي:



دلي شاتلیه له اصل سره سم، د جامد باریم سلفیت ($BaSO_4$) د حل کیدو تعادلي سیستم په اوبو کې بدلون کوي؛ ځکه چې

د سیستم له اجزاوو څخه د یوه غلظت زیات شوی دی؛ له دې امله سیستم د هغه مخالف لوري ته پرمخ ځي او د هغه لوري

داسې دی چې د باریم ایون ($Ba^{2+}(aq)$) له SO_4^{2-} ایون سره تعامل کوي او باریم سلفیت ($BaSO_4$) جوړوي.

د سودیم سلفیت له ورزیاتولو څخه مخکې، د ایونونو د ضرب حاصل د تعادل له ثابت سره مساوي دی؛ یعنې:



د سودیم سلفیت په ډیریدو سره لاندې اړیکه رامنځ ته کیږي:



$$[SO_4^{2-}] = [SO_4^{2-}]_{for[BaSO_4]} + [SO_4^{2-}]_{for[Na_2SO_4]}$$

باید د (SO_4^{2-}) او $Ba^{2+}(aq)$ غلظت کم شي چې تر څو د هغوی د ضربولو حاصل له K سره مساوي شي؛ له دې امله د

باریم سلفیت رسوب، سیستم د تعادل لوري ته لېږدوي. د $Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = K$ معادله د متساوي الاضلاع د

ګراف په بڼه وښودل شوې ده. په دې ګراف کې د باریم سلفیت دستگاه د ټکو په څیر (0 ټکي) وښودل شوې ده؛ خو د سودیم

سلفت په ډیریدو سره، سیستم اړ دی تر څو چې د اوږد محور په لور افقي بدلون ځانته غوره کړي (لکه: د a ټکو لیکو په

شان) که چیرې سیستم دڅه مودې لپاره په خپل حالت پریښودل شي، د سیستم بدلون د b ټکو د لیکو (خط) په شکل له


1+ میل لري، نوموړی ګراف ښیي چې د (SO_4^{2-}) د ایونونو غلظت څو ځلې د (Ba^{2+}) د ایونونو له غلظت څخه ډیر دي؛ خو

له هغې کچې څخه کم دی کوم چې هغه یې د سودیم سلفیت له زیاتولو څخه وروسته لري. دا مطلب په ګازي سیستمونو کې


هم سمون لري:

هنري لی شاتلیه په (1850-1934) میلادي کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه، فزیک پوه او ساختماني انجنیر وه، نوموړي

په کال (1884) م کې کیمیاوي تعادل رامنځ ته کړ او له علم او صنعت سره یې مینه درلوده.



هنري لی شتلی (۱۸۵۰-۱۹۳۶)



پنجم لوست

د درسي کتاب مخ: 64

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح	
1- د لوست موضوع		د فشار اغيز يا د حجم بدلونونه، د تودوخې اغيز، د کتلست اغيز.	
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د فشار يا د حجم بدلونونو، د تودوخې او کتلستونو د اغيزو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د فشار يا د حجم ، تودوخې او کتلست د اغيزو له امله د سيستم تعادل هم بدلون مومي. - د حجم، تودوخې او کتلست له بدلون سره دې د تعادل لوري وټاکلای شي.	
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایش، توضیحي او عملي	
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تختې، تباشیر او د بدلونونو د گرافونو موډلونه	
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه	
6- په ټولگي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړنی فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخیستل، وخت په دقیقه دقیقه د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول : که چیرې په کیمیاوي تعاملونو کې حجم، تودوخه او کتلست بدلون وکړي، د تعادل لوری به کومې خواته بدلون ومومي؟	
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه	
د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي. د څو مثالونو په ورکولو دې د فشار، تودوخې او کتلست په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکړي. لوست دې د څو پوښتنو په کولوسره وازوي. زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د ښوونکي څرگندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د حجم، د کتلست او تودوخې په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - هغه بېلگې چې ښوونکی یې د فشار د اغيز او تودوخې، حجم او کتلست د بدلون په اړه وړاندې کوي زده کوونکی یې باید زده کړي. د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب ورکړي او کورنۍ دنده دې تر سره کړي.	

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته .

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات


د اصطلاحاتو تعريف :

سیستم : هغه شی یا شيان چې له خپل چاپیریال څخه د یوې پردې په واسطه بیل شوي وي ، د سیستم په نوم یادېږي.
کتلست : هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي ، د تعامل د چټکۍ لامل کېږي؛ خو په خپله نه مصرفېږي، دا مواد د کتلست په نوم یادېږي.

معلومات

د فشار د بدلون اغیزه: یوه هغه لاره چې په مرسته یې کیدای شي د یوه گازي سیستم کوم چې د تعادل په حالت کې وي، فشار ته یې په ثابته تودوخه کې بدلون ورکړي ، د سیستم د حجم له بدلون څخه عبارت دی ؛ د بېلګې په توګه : د یوه سلنډر د حجم د بدلون پرنسټ کیدای شي چې د هغه فشار ته بدلون ورکړل شي ، ښکاره ده چې د حجم په کمیدو سره، فشار زیاتېږي او د هغه په زیاتیدو سره یې فشار کمیږي.

مثال: په ثابته تودوخه کې د $N_2(g)$ ، $H_2(g)$ او $NH_3(g)$ گازونو تعادلي مخلوط چې په یوه لیتره لوښي کې شتون لري، په بل دوه لیتره لوښي کې اچول کېږي، د دې په پایله کې به دا لاندنې تعادل کومې خواته بهیر و مومي:




ځواب : کله چې د گازونو مخلوط لوی لوښي ته ولیږدول شي، په دې حالت کې فشار کمیږي او په پایله کې تعادل د فشار د برابرولو لپاره د گاز د ډیرو مولونو په خوا کې زیاتېږي، په رښتیا چې د NH_3 یوه کچه په $H_2(g)$ او $N_2(g)$ تجزیه کېږي، یا په بل عبارت د تعادل کین لوري ته رامنځ ته کېږي.


په تعادل کې د تودوخې اغیز : په عمومي توګه که چیرې تودوخه ډیره شي، تعادل په هغه خواوو کې رامنځ کېږي چې تودوخه یې جذب کړې، د تودوخې د کمیدو په صورت کې، تعادل به په هغه خوا کې رامنځ ته شي چې تودوخه ازاده شي.
که چیرې د تودوخې جذب کوونکی تعامل (اندوترمیک) سوړ کړل شي، تعادل به کومې خوا ته رامنځ ته کېږي؟ د K کچه به کوم بدلون ومومي؟

که چیرې د تودوخې جذب کوونکی تعامل (اندوترمیک) سوړ شي ، تعادل به په هغه لوري کې رامنځ ته شي چې تودوخه یې ازاده شي. په دې صورت کې د K کچه زیاتېږي.

انزایم (طبعي کتلستونه) : انزایمونه د متجانسو کتلستونو ځانګړې نمونې دي چې په طبیعت کې شتون لري. انزایمونه په حیواناتو ، نباتاتو او انسانانو کې د پیچلو تعاملونو دسر ته رسولو شونې برابرې چې هر تعامل په ځانګړي انزایم پورې اړه لري، زایمونه په معمولي توګه د حیاتي کیمیا مهم پروتینونه او مرکبات دي. پروتینونه د امینو اسیدونو له پولیمیرایزیشن څخه ترلاسه کېږي، چې فورمول یې په لاندې ډول دی:




شل ډوله فعاله بيولوژيکي امينو اسيدونه شتون لري چې د هغوی له پولي ميراييزشن څخه پروتينونه لاسته راځي:



د انسانانو بدن ځانگړو پروتينونو ته اړتيا لري، د خوړو موادو پروتينونه د هغوی په جوړونکو امينو اسيدونو باندې تجزيه کيږي او د انسانانو د بدن په حجرو کې بيا د اړتياوړ پروتينونو باندې اوږي، دا عمل په حجرو کې د انزايمونو په واسطه تر سره کيږي او پرته له انزايمونو څخه د پروتينونو تجزيه د اوبو د ماليکولو په واسطه ډيره وړو تر سره کيږي.

د تجزيه کوونکو انزايمونو له ډلې څخه يو هم کاربوکسي پيپتايډاز- A (Carboxy Peptidase -A) دی چې د هغه په هسته کې د جستو عنصر شتون لري.

د کاربوکسي پيپتايډ- A جوړښت چې له 307 امينو اسيدونو څخه جوړ شوی دی، دغه انزايم په خپلو سوريو کې پروتين ځای په ځای کړي دي او د Zn^{2+} ايون د $C=O$ له گروپ سره اړيکه تړلې ده چې د کاربونيل گروپ قطبي کوي او د څنگ پيپتايډي اړيکې (C-N) د پرې کيدو لامل کيږي.



شپږم لوست
د درسي کتاب مخ: 66

د مطلبونو شرح		د مطلبونو سرليکونه
ايوني تعادل، د اوبو ايونونو توليد، د ايوناييزيشن ثابت.		1- د لوست موضوع
له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي:		2- د زده کړې موخ
- د ايوني تعادل، د اوبو د ايونونو د توليد او د ايوناييزيشن د ثابت په اړه دې معلومات ترلاسه کړي.		- پوهنيزې
- يقين دې ترلاسه کړي چې زياتره تيزابونه، القلي او مالګې په اوبلنو محلولونو کې په ايونونو ټوټه کيږي او ايونونه رامنځ ته کوي.		- مهارتي
- د ايوناييزيشن عمليه دې تر سره او د ايوناييزيشن ثابت دې لاس ته راوړلای شي.		- ذهني
مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي		3- د تدريس میتودونه
کتاب، قلم، تخته، تباشير د ايوناييزيشن د ثابت جدولونه		4- د تدريس اړين مواد او توکي
شفاهي او ليکنې پوښتنې او ځوابونه		5- د ارزونې میتود
وخت په دقیقه	لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوست ارزونه	6- په ټولګي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه
5	د انگېزې رامنځته کول: ايا خالصې اوبه بريښنا تيروي.	
وخت په دقیقه	د زده کوونکو د زده کړې فعاليتو	1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)
40	- د ښوونکي څرګندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د ايوني تعادل، د اوبو د ايونونو د توليد، د ايوناييزيشن د ثابت په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - په عملي تجربو کې دې برخه واخلي. - د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب ورکړي او کورنۍ دنده دې تر سره کړي.	- د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د ايوناييزيشن د عمليې او د اوبو ايوناييزيشن په اړوند دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - په تجربې سره دې د اوبو د ټوټه کيدو عمليه زده کوونکو ته وروښيي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته .

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د اصطلاحاتو تعريف

- ايونايژيشن (Ionization): په بيلابيلو ايونونو باندې د يو مرکب تجزيه، د ايونايژيشن د عمليې په نوم ياديږي.

معلومات: څرنگه چې پوهيږئ، دلي شاتليه له اصل سره سم، د $MA(s) \rightleftharpoons M^+(aq) + A^-(aq)$ په تعادلې تعامل کې د $A^-(aq)$ او $M^+(aq)$ په ډيريدو سره، تعادل د $MA(s)$ د جوړيدو خواته رامنځ ته کيږي، له لاندې مثال سره روښانه کيږي چې د سرب کلورايد د تودوخې په $25^\circ C$ درجه کې حليدل مساوي له $1/6 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ دي، دلي شتليه له قانون سره سم، د Cl^- له ډيريدو سره، د سربو انحلايت کميږي او تعادل رامنځ ته کيږي.

مثال: د AgI انحلايت د NaI په 0.1 molar محلول کې د تودوخې په $25^\circ C$ درجه کې محاسبه کړئ.


حل: په دغه مثال کې د I^- د ايون د شتون له امله چې له NaI څخه لاسته راغلی دی، د Ag^+ او I^- غلظت سره مساوي نه دی. که چيرې د AgI د انحلايت کچه د NaI په 0.1 m/L محلول کې X فرض کړو، په دې صورت کې د ايونونو لپاره د تعادل په حالت کې لرو چې:

$$[I] = X + 0.1 \text{ molar} \text{ او } [Ag^+] = X \text{ د } AgI \text{ انحلايت کچه}$$

د هغه د تعادل معادله په لاندې ډول ده:

$$K_{sp} = [Ag^+][I^-] = X(0.1 \text{ molar} + X) = 8.3 \cdot 10^{-17}$$

څرنگه چې د X کميت ډير کوچنی دی؛ له دې امله له هغه څخه د 0.1 molar په مقايسه کولی شو تری تير شو؛ نو:



صفر د NaI 0.1 molar محلول داجزاوو غلظت وړاندې له زیاتولو څخه 0.1 molar

X د NaI 0.1 molar محلول داجزاوو غلظت وروسته له زیاتولو څخه $0.1 + X$

اود سیستم تعادل

نو د AgI انحلايت د NaI په 0.1 mol محلول کې د تودوخې په $25^\circ C$ کې $X = 8.3 \cdot 10^{-16}$ دی او په اوبو کې د AgI د انحلايت په مقايسه (په $25^\circ C$ تودوخه کې په خالصو اوبو کې د AgI حليدل $9.1 \cdot 10^{-9}$ دی) سره په تقريبي توگه 10^7 ځلې ټيټ دی په پورتنیو معادلو کې K_{sp} د کم حل کيدونکو موادو د ايوني غلظت د ضرب د حاصل ثابت دی او د موادو حل بدل وړښي.

$$Q = [Ag^+]_o [Cl^-]_o > K_{sp}$$

اووم لوست

د درسي کتاب مخ: 70

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د گډايون اغيز
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د گډايون عمل او په تعادل کې د هغه د اغيزې په هکله دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د ايونايښتن په عمليه او تعادل کې گډايون نيغه اغيزه لري. - د گډايون عمل دې د ايونايښتن په تعادل کې په عملي توگه ومومي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تختې، تباشیر او دالکترولیتو بیلابیل محلولونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په اخیستل، د کورنۍ دندې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول د Na_2SO_4 او $CaSO_4$ مالگو تر منځ کوم گډايون شتون لري؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکي څرگندونو ته دې څیړشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د ايوني تعادل او د هغه د اغيزې او د گډايون په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - په عملي تجربو کې دې ونډه واخلي. - د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب ورکړي او کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ وليکي. - د گډايون او د ايونايښتن په تعادل کې د هغه د اغيزې په اړه دې هراړخیز معلومات ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه


د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

پر انحلاليت باندې د گډه ايون اغيزه

څرنګه چې مووليدل، د يوه تعادل د انحلاليت د ضرب حاصل ثابت دی، د يوه ايوني مرکب رسوب په يوه محلول کې هغه موده جوړېږي چې د همدې مادې K_{sp} د انحلاليت له ثابت څخه لوی وي. که چېرې د $AgCl$ په مشبوع محلول کې د $[Ag^+]$ او $[Cl^-]$ ايونو د انحلاليت له ثابت K_{sp} سره مساوي وي، رسوب نه جوړېږي، سر بير پر دې، د هغوی ساده سټکيومټري $[Ag^+] = [Cl^-]$ ده؛ خو دغه تعادل په ټولو محلولونو کې منځته نه راځي.

که فرض کړو، دوه داسې محلولونه مو مطالعې تر لاندې نيولي چې دوه حل شوې مادې کوم چې گډه ايون په کې شتون لري چې عبارت له $AgCl$ او $AgNO_3$ څخه دي. د $AgCl$ د تجزيې په ډيريدو کې، د لاندې عمليې په لړ کې د نقرې گډه ايون د محلول په مجموعي غلظت باندې اغيز لري:



که چېرې د $AgCl$ په محلول کې لږڅه $AgNO_3$ ورگډ شي، د $[Ag^+]$ د ايون غلظت په محلول کې ډيرېږي او د انحلاليت ثابت د انحلاليت د ضرب د حاصل له ثابت څخه ډيرېږي:

$$Q = [Ag^+][Cl^-] > K_{sp}$$

د تعادل د بيا رامنځ کيدو لپاره، د $AgCl$ يوه کچه به د محلول په ښکتنې برخې کې رسوب وکړي، د لي شاتليه د وړاندې شوي لارې له مخې، کله چې د انحلاليت ثابت له K_{sp} سره مساوي شي، د گډه ايون د اغيزې په پايله کې، د $(AgCl)$ د مالګې د انحلاليت کچه په محلول کې ټيټېږي. د يادولو وړ ده چې په دې حالت کې د $[Ag^+]$ غلظت د $[Cl^-]$ له غلظت سره يوشان نه دی او د تعادل په حالت کې $[Ag^+] > [Cl^-]$ دی.

مثال: د $AgCl$ انحلاليت د $AgNO_3$ په $6.5 \cdot 10^{-3} M$ محلول کې په $\frac{g}{L}$ محاسبه کړئ.

حل او پايله: دغه پوښتنه په محلولونو کې د گډه ايون له اغيزې سره اړيکه لري، څرنګه چې وويل شول، د محلول د K_{sp} په کميت کې د گډه ايون شتون اغيزناک برېښي چې دلته په $AgCl$ پورې اړه لري.


لومړی پړاو: په نوموړي محلول کې (د دواړو $AgCl$ او $AgNO_3$ مالګو) بنسټيز ايونونه، عبارت له Cl^- او Ag^+ دي.

دويم پړاو: $AgNO_3$ يوه قوي برېښنا تيرونکې ماده ده چې په بشپړه توګه په ايونونو ټوټه کېږي:



$$6.5 \cdot 10^{-3} M \quad 6.5 \cdot 10^{-3} M$$

د $AgCl$ د مولري انحلاليت ثابت د $AgNO_3$ په محلول کې د S توري په واسطه ښودل او د محلول د غلظت بدلونونه په لاندې ډول لنډ روښانه کوو:



دریم پړاو:

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$1.6 \cdot 10^{-10} = (6.5 \cdot 10^{-3} \text{M} + S)(S)$$

څرنګه چې AgCl څه ناڅه نه حل کیدونکی ماده ده، له بلې خوا د Ag^+ ایون چې د AgNO_3 حل کیدونکې مالګې څخه تر لاسه کیږي، د AgCl حلیدل کمه وي. S باید له $6.5 \cdot 10^{-3}$ څخه کوچنی وي، له دې امله $S + 6.5 \cdot 10^{-3} \approx 6.5 \cdot 10^{-3}$ دی، له دې ځایه لیکلای شو چې:

$$1.6 \cdot 10^{-10} \approx 6.5 \cdot 10^{-3} S$$

$$S = 2.5 \cdot 10^{-8} \text{M}$$

څلورم پړاو: د تعادل په حال کې:

$$[\text{Ag}^+] = (6.5 \cdot 10^{-3} + 2.5 \cdot 10^{-8}) \text{M} \approx 6.5 \cdot 10^{-3} \text{M}$$

$$[\text{Cl}^-] = 2.5 \cdot 10^{-8} \text{M}$$

له بلې خوا زمونږه اټکلول دریم پړاو ته ګرځول دي؛ نو له دې امله د Cl^- ټول ایونونه له AgCl څخه په لاس راغلي دي. د AgNO_3 په محلول کې د تجزیه شوې AgCl برخه له $2.5 \cdot 10^{-8}$ سره مساوي ده.

همدارنګه پوهیږو چې د AgCl یومول 143.4g دی، مونږ کولای شو چې د AgCl حلیدل په لاندې توګه محاسبه کړو:

$$\text{AgNO}_3 \text{ په محلول د } \text{AgCl} \text{ حلیدل} = \frac{2.5 \cdot 10^{-8} \text{mol AgCl}}{1 \text{L soln}} \cdot \frac{143.4 \text{g AgCl}}{1 \text{mol AgCl}} = 3.6 \cdot 10^{-6} \text{g/L}$$

توضیح: د AgCl حلیدل په خالصو اوبو کې $1.9 \cdot 10^{-3} \text{g/L}$ دی، له دې کبله د هغې لږ حلیدل د AgNO_3 په شتون کې $3.6 \times 10^{-6} \text{g/L}$ دی.

الڦلی	فورمول	(K_b)
امونیا	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$	$1.8 \cdot 10^{-5}$
انیلین	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O}$	$4.6 \cdot 10^{-10}$
هایډرازین	$\text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$	$9.8 \cdot 10^{-7}$

اتم لوست

د درسي کتاب مخ: 71

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		په کيمياوي تعادل کې محاسبې، د امونیا په صنعت کې د کيمياوي تعامل په پام کې نيولو اهميت
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د کيمياوي تعاملونو د تعادل ثابت په محاسبه کولو او په صنعت کې د امونیا په توليد د کيمياوي تعاملونو باندې دې پوه شي. - يقين دې ترلاسه کړي چې د تعادل ثابت په کيمياوي تعاملونو کې د تعادل څرنگوالی ښيي. - د بيلابيلو کيمياوي تعاملونو د تعادل ثابت دې محاسبه کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او الکتروليت بيلابيل محلولونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او ليکنی پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخيستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوسټ ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: په صنعت کې د ډير فشار له امله د امونیا توليد ډيرېږي او که لږېږي؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
- د لوست سرليک دې د تختي پرمخ وليکي. - د تعادل د ثابت د محاسبې او د هغه د لارو په اړه دې هراړخيز معلومات ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د تعادل د ثابت د محاسبې په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - د عملي تجربو په تر سره کولو کې دې برخه واخلي. - د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب ورکړي او کورنۍ دنده دې تر سره کړي.


7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

په غیر متجانسو سیستمونو کې تعادل

د محلول - رسوبي سیستم تعادل : د کم حل کیدونکو الکترولیتونو په مشبوع محلولونو کې ($BaSO_4$) چې له جامد فاز سره د لگیدو په حالت کې شتون لري، په یوه موده کې په هغوی کې دوه بهیره پر مخ ځي چې یو له بل سره مخالف لوري لري، له یوې خوا د اوبو قطبي مالیکولونه د Ba^{+} له کټیون او د SO_4^{-} له انیون سره چې د کرسټالي شبکې په جوړښت کې شتون لري، پر ټاکلي لوري کې ځای نیسي او هغوی را چاپیره وي او له هایدریشن څخه ازاده شوې انرژي هغو د $BaSO_4$ له کرسټالي شبکې څخه جلا کوي او د هغوی محلول جوړوي، له بلې خوا د Ba^{2+} او SO_4^{2-} هایدریت شوي ایونونه د هغوی د مختلف الجارج ایونونو له خوا چې لا هم په کرسټالي شبکه کې شتون لري، جذب کیږي او په پایله کې له هایدریتی قشر څخه بیلېږي او بیرته جامدې کرسټالي شبکې ته جذبېږي. د تعادل په حالت کې د دواړو بهیرونو چټکتیا سره مساوي کیږي؛ نو دلته جوړ شوی غیر متجانس سیستم کیدای شي په لاندې معادلو وښودل شي:



په محلول کې د ایونونو لېږدول او د هغه برعکس بهیر (د کرسټالي جامد فاز په جوړښت کې د ایونونو بیرته ننوتل) یوازې د کرسټالي مادې پر سطحه تر سره کیږي چې د جامدې مادې کمیت ثابت دی، په دې حالت کې د کتلې د عمل د قانون پربنسټ، د تعادل حالت د هغه ایونونو د غلظت د ضرب له حاصل سره مساوي دی کوم چې ورته اړه لري او ثابت کمیت دی:

$$K = \frac{[Ba^{+2}][SO_4^{2-}]}{[BaSO_4]}$$

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$$

په وروستی معادلې کې K_{sp} د حلیدو د ضرب د حاصل (Solubility Product) ثابت دی او د غیر متجانس تعادل د ثابت د حلیدو د ضرب حاصل ورښيي او د لږ حل کیدونکو مالګو جامد فاز او د هغوی له مشبوع محلول څخه جوړ شوی دی. د $BaSO_4$ د حلیدو د ضرب حاصل په $25^\circ C$ کې ($K_{sp} = 1.1 \cdot 10^{-10}$) دی.

د لږ حل کیدونکو الکترولیتونو د K_{sp} په پوهیدو سره کیدای شي چې دهغوی حلیدل محاسبه کړل شي چې د mol/L یا g/L واحد په واسطه ټاکل کیږي او په S سره ښودل کیږي. د دوه ایوني (Binary) لږ حل کیدونکو الکترولیتونو؛ لکه : $AlPO_4$, $BaSO_4$, $AgCl$ حلیدل چې په S سره ښودل کیږي، د نوموړو ایونونو د هر یو غلظت سره یوشان دی او د S عین قیمت لري؛ خو د دوی د ضرب د حاصل ثابت په لاندې ډول دی:

$$K_{sp} = S^2, \quad S = \sqrt{K_{sp}}$$

د بیلګې په ډول

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = 1.05 \cdot 10^{-5} \text{ mol / L}$$

$$S = \sqrt{1.1 \cdot 10^{-10}} = 1.05 \cdot 10^{-5} \text{ mol / L}$$

$$S = 233 \text{ g / mol} \cdot 1.05 \cdot 10^{-5} \text{ mol / L} = 2.45 \cdot 10^{-3} \text{ g / L}$$

مناقشه

1- که چیرته د لږ حل کیدونکو ایونونو د انحلالیت د ضرب حاصل د K_{sp} ایونونو د غلظت د ضرب د حاصل له ثابت څخه کوچنی وی: نور سوب رامنځ ته کیږي.

2- که چیرې د لږ حل کیدو ایونونو د انحلالیت د ضرب حاصل له K_{sp} سره مساوي وي، په دې صورت کې مشبوع محلول او رسوب رامنځ ته کیږي.

3- په داسې حال کې چې د لږ حل کیدونکو الکترولیت ایونونو د انحلالیت د ضرب حاصل له K_{sp} څخه لوی وي، رسوب رامنځ ته کیږي، رسوب کیدل هغه وخت درېږي چې د لږ حل کیدونکو الکترولیتونو ایونونو د انحلالیت د ضرب حاصل له K_{sp} سره مساوي شي.

دهابر پروسه : د امونیا په صنعت کې د تعادلي تعاملونو کارونه:

له NH_3 څخه د کیمیاوي سرې، چاودیدونکو موادو، صنعتي کیمیاوي موادو او د یخچال په جوړولو کې کار اخیستل کیږي، فریتس هابر و توانید چې په لابراتوار کې امونیا (NH_3) تولید کړي وه، د دغه عالم په ویاړ پر دغه تعامل د هابر د پروسې نوم کیښودل شو، نوموړی تعامل د تعادلي تعاملونو یوه ښه نمونه ده:



د هابر په پروسه کې، د گاز د مولونو کچه د تعامل په دواړو خواوو کې یوشان نه ده، هیله کیږي چې فشار به کولای شي چې تعادل رامنځ ته کړي، د دې په پام کې نیولو سره چې د گاز دوه موله د تعامل د محصولو په خوا کې او د گاز څلور موله د تعامل کوونکو موادو په خوا کې شتون لري.

د فشار ډیریدل د امونیا NH_3 د ډیر تولید لامل کیږي له دې کبله د هابر پروسه هغه وخت شونې ده چې په لوړو فشار کې تر سره شي. څرنګه چې د هابر پروسه یوه اګزترمیټک پروسه ده؛ نو د تودوخې ټیټوالی ښایي تعامل یې د امونیا (NH_3) د تولید لوري ته ځای پرځای کړي؛ خو د تودوخې د درجې ټیټدل د رجعي تعامل د چټکتیا د کمیدو لامل کیږي؛ نو په ټیټه تودوخه کې د امونیا تولید تر سترګو کیږي، سربیره له دې تعادل دومره ورو رامنځ ته کیږي چې په عمل کې د امونیا لاسته راوړل شونې نه دی؛ له دې امله دا عملیه په لوړې تودوخې کې تر سره کوي.

کتلستونه تعادل په چټکۍ سره رامنځ ته کوي، په ریښتیا چې کتلست مرسته کوي ترڅو په ټیټه درجه کې ډیره زیاته او ارزانه امونیا تولید شي. د هابر د پروسې له ښیګڼو څخه یوه هم د تعامل له محیط څخه د امونیا ایستل د گازي امونیا د مایع کولو له لارې وو چې په دې عمل سره تعادل د امونیا د تولید لوري ته پرمختګ کوي او په دې حالت کې N_2 او H_2 نه ضایع کیږي.

د هابر پروسې په 1918 کال کې د نوبل جایزه واخیستله.

جرمینانو په 1913 کال کې د امونیا د صنعتي تولید ترڅنګ د چاودیدونکو موادو په ترلاسه کولو هم بریالي شول چې دوی یې په لومړي نړیوال جنګ کې بریالیتوب ته هیله من کړل.



څپرکی پنځم

د څپرکی موضوع : د تیزابونو او القلي اوبلن محلولونه
د تدریس وخت : 9 درسي ساعتونه





گڼه	د سرلیکونو سرلیکونه	درسي ساعت
1	د تیزابونو او القليو تعريف	يو درسي ساعت
2	د گيلبرت لیوس د نظريې پر بنسټ د تیزابونو او القليو تعريف	يو درسي ساعت
3	د اوبو تيزابي او قلوي خواص	يو درسي ساعت
4	د تيزابيت معيار - pH	يو درسي ساعت
5	د تیزابونو او القليو قوت	يو درسي ساعت
6	کمزوري او قوي تيزابونه، کمزوري او قوي القلي	يو درسي ساعت
7	د کمزورو تيزابونو ټوټه کيدل	يو درسي ساعت
8	د ايونايښن سلنه، د ټوټه کيدو ثابتونه او د القليو ايونايښن	يو درسي ساعت
9	د څپرکي لنډيز او تمرين	يو درسي ساعت

2- د څپرکي پوهنيزې موخې

- زده کوونکي دې د تیزابونو او القليو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
- درک دې کړي چې تیزابونه او القلي په صنعت او طبابت کې مهم مرکبونه دي.
- تیزابونه او القلي دې یو له بل څخه توپیر کړي او هغوی دې لاسته راوړلی شي.


3- د څپرکي پوښتنو ته ځوابونه

-1





-4



5- څرنگه چې اوبه یو ډیر کمزوری الکترولیت او امفوتریک مرکب دی او په کمه کچه په ایونونو توپه کېږي چې برېښنا بڼه نه تیروي، که چېرې د تودوخې په 25°C کې له یولیترو اوبو څخه د برېښنا جریان تیر شي، 10^{-7} mol/L د هایدروجن ایونونه (H^+) او په همدې کچه د OH^- تولیدیږي.

که چېرې په یوه اوبلن محلول کې د تیزابي خواصو لرونکی مرکب حل شوی وي، څرنگه محلول د تیزابي محلول په نامه یادېږي او که په یوه محلول کې د هایدروجن ایونونه (H^+) زیاده وي، ویل کېږي چې محلول تیزابي دی او دهغه تیزابیت د هغه تیزاب شتون پورې اړه لري چې په کې حل شوی دی؛ نو تیزابیت صفت دی.

6- که چېرې په اوبلن محلول کې هغه مرکبونه چې د القلیو خواص ولري، حل شوي وي، دا ډول محلول د قلوي محلول په نوم یادېږي او که چېرې د OH^- آیونونه په یو اوبلن محلول کې زیات شتون ولري، ویل کېږي چې محلول قلوي دی او قلوبت یې د هغه مرکب په حلیدو پورې اړه لري کوم چې په کې حل دی؛ نو قلوبت صفت دی.

-7

$$\begin{array}{l} a) \quad [H^+][OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{5 \cdot 10^{-5}} = 2 \cdot 10^{-10} \\ [H] = 2 \cdot 10^{-10} \\ b) \quad [H^+][OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{3.2 \cdot 10^{-9}} = 3.125 \cdot 10^{-6} \\ [H] = 3.125 \cdot 10^{-6} \\ c) \quad [H^+][OH^-] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} = 1 \cdot 10^{-9} \\ [H^+] = 1 \cdot 10^{-9} \end{array}$$

8- څرنگه چې د H^+ د ایونونو غلظت د OH^- له ایونونو څخه ($[H^+] = 2 \cdot 10^{-5}$) زیات دي، د هغه PH په لاندې ډول موندل کېږي:

$$\begin{aligned} pH &= -\log 2 \cdot 10^{-5} = -(\log 2 + \log 10^{-5}) \Rightarrow pH = -(0.3 - 5 \log 10) \\ pH &= 4.7 \end{aligned}$$

-9

تيزابي دي که قلوي	pOH	pH	$[OH^-]$	$[H^+]$
قلوي	4.875	9.125	$1.33 \cdot 10^{-5}$	$7.5 \cdot 10^{-10}$
تيزابي	9.444	4.556	$3.6 \cdot 10^{-10}$	$2.78 \cdot 10^{-5}$
قلوي	5.75	8.25	$10^{-5.75}$	$10^{-2.25}$
قلوي	5.70	8.3	$10^{-5.7}$	$10^{-8.3}$

-10

$$\alpha = \sqrt{\frac{Kb}{C}} = \sqrt{\frac{6.4 \cdot 10^{-4}}{0.075}} = 9.34 \cdot 10^{-2}$$

$$\alpha = 9.34 \cdot 10^{-2}$$

$$[OH^-] = C \alpha = 0.075 \cdot 9.34 \cdot 10^{-2} = 6.54 \cdot 10^{-3} \text{ mol / L}$$


$$[OH^-] = 6.54 \cdot 10^{-3} \text{ mol / L}$$

$$[OH^-][H^+] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{6.54 \cdot 10^{-3}}$$



$$[H^+] = 1.53 \cdot 10^{-12}$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log 1.53 \cdot 10^{-12} = 11.8$$


-11



12- الف : غبټلي تيزابونه د هغه تيزابونو ډول دی چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړ توګه ټوټه کېږي او آیونونه جوړ وي:




ب - د HCl په 0.5molar محلول کې د H^+ د آیونونو کچه د همدې تيزاب له غلظت سره مساوي ده؛ ځکه غبټلی الکترولیت دی چې په بشپړ ډول ټوټه کېږي:



$$0.5 \text{ mol / L} \quad 0.5 \text{ mol / L} \quad 0.5 \text{ mol / L}$$

$$[H^+] = 0.5 \text{ mol / L}$$

-13



$$2g / 0.6L \quad 0.5mol/L + 0.5mol/L$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{2g}{30g/mol} = 0.06mol$$

$$C_M = \frac{moles}{L} = \frac{0.06mol}{0.6L} = 0.1molar$$

خرنگه چې $LiOH$ غښتلی القلي ده؛ نوځکه په بشپړه توګه ټوټه کېږي او $[OH^-] = 0.5molar$ دي؛ نو:

$$pOH = -\log[OH] = -\log 0.5molar = 0.3$$

$$pH + pOH = 14 \Rightarrow pH = 14 - pOH = 14 - 0.3 = 13.7$$

-14

$$\alpha = \sqrt{\frac{Kb}{C}} = \sqrt{\frac{6.3 \cdot 10^{-5}}{0.05}} = 1.26 \cdot 10^{-1}$$

$$\alpha = 1.26 \cdot 10^{-1}$$

$$[H_3O^+] = C\alpha = 0.05 \cdot 1.26 \cdot 10^{-1} = 6.3 \cdot 10^{-3} mol/L$$

$$[H_3O^+] = 6.3 \cdot 10^{-3} mol/L$$

$$[C_7H_5O_2^-] = C\alpha = 0.05 \cdot 1.26 \cdot 10^{-1} = 6.3 \cdot 10^{-3} mol/L$$

$$[C_7H_5O_2^-] = 6.3 \cdot 10^{-3} mol/L$$

$$[HC_7H_5O_2] = C - C\alpha = 0.05molar - 6.3 \cdot 10^{-3}molar$$


$$[HC_7H_5O_2] = 0.0437molar$$

15-د برونستید له نظره یو تیزاب کولای شي پرتون ورکوونکی او یوه القلی کولای شي پرتون اخيستونکی عمل وکړي، د


برونستید هر تیزاب د برونستید د مزدوجې القلي لرونکی دی او برعکس د برونستید هره القلی برونستید د مزدوج تیزاب

لرونکې ده، د برونستید تیزابونه الکتروني خلا لري.


- 16



$$Kb = \frac{[(CH_3)_2NH_2^+][OH^-]}{[(CH_3)_2NH][H_2O]}$$







$$K_b = \frac{[HCO_3^-][OH^-]}{[CO_3^{2-}][H_2O]}$$



$$K_b = \frac{[\text{HCHO}_2][\text{OH}^-]}{[\text{CHO}_2^{1-}][\text{H}_2\text{O}]}$$

-17



18- الف - د K^+ او Ca^{2+} د ايونونو ترمنځ د پوتاشيم ايون تيزابي اولن محلول جوړوي ځکه د هغه ايني شعاع کوچنی ده د OH^- اينيون په اساني سره جلا کولای شي.


ب - د Fe^{2+} او Fe^{3+} د ايونونو ترمنځ Fe^{2+} له Fe^{3+} څخه ښه تيزابي اولن محلول جوړکړی دی؛ ځکه ايون يې کوچنی دې او د OH^- اينيون په اساني سره جلا کولای شي.

ج - د Al^{3+} او Ga^{3+} له پرتلې څخه معلومېږي چې د Al^{3+} د Ga^{3+} له ايون څخه ښه تيزابي اولن محلول جوړوي؛ ځکه نوموړي ايون کوچنی ايني شعاع لري او OH^- په اساني سره جلا کولای شي.

$$\left. \begin{array}{l} \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^- \\ 1000\text{mL} \qquad 10^{-7}\text{mol} \\ 1\text{mL} \end{array} \right\} \begin{array}{l} n = \frac{1\text{mL} \cdot 10^{-7}\text{mol}}{10^3\text{mL}} \\ n \qquad n = 10^{-10}\text{mol} \end{array}$$

- 19

- 20



$$\begin{array}{lcl} 22.4L & 64g & m = \frac{64g \cdot 3.9L}{22.4L} \\ 3.9L & m & m = 11.143g \end{array}$$

$$V_{\text{solution}} = V_{\text{solute}} + V_{\text{solvent}} = 1L + 3.9L = 4.9L = 4900mL$$

$$C_M = \frac{m \bullet 1000mL \bullet \text{molar}}{M \bullet V} = \frac{11.143g \bullet 1000mL \text{molar}}{64g \bullet 4.900mL}$$

$$C_M = 0.355\text{molar}$$

خرنگه چې H_2SO_4 غښتلی تیزاب دی، په بشپړه توګه ټوټه کیږي؛ نو له دې امله د هایدروجن د ایون (H^+) غلظت د تیزابونو له عمومي غلظت سره مساوي دی؛ نو لیکلای شو چې:

$$[H_2SO_3] = [H^+] = 0.355\text{molar}$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log 0.355\text{molar}$$

$$pH = 0.45$$



د تعامل د بهیر لوری ښیي خواته دی؛ ځکه $\bar{F}^-(aq)$ غلښتې القلی ده چې پروتون ځان خواته کش کولی شي.

-22

$$\begin{aligned} pH &= 5.12 & pH &= \log[H^+] \\ [H^+] &= ? & 5.12 &= -\log[H^+] \\ \log[H^+] &= -5.12 & \Rightarrow [H^+] &= 10^{-5.12} \\ [H^+] &= \frac{1}{10^{5.12}} = \frac{1}{10^{\frac{512}{100}}} = \frac{1}{10^{\frac{128}{25}}} = \frac{1}{\sqrt[25]{10^{128}}} = \end{aligned}$$

-23

$$a) \quad OH^- = 5.25 \times 10^{-9} M$$

$$[OH^-][H^+] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{5.25 \cdot 10^{-9}} = 1.9 \cdot 10^{-6}$$

$$b) \quad OH^- = 8.3 \cdot 10^{-3} M$$

$$[OH^-][H^+] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{8.3 \cdot 10^{-3}} = 1.2 \cdot 10^{-12}$$

$$c) \quad OH^- = 3.6 \cdot 10^{-12} M$$

$$[OH^-][H^+] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{3.6 \cdot 10^{-12}} = 2.7 \cdot 10^{-3}$$

$$d) \quad OH^- = 2.1 \cdot 10^{-8} M$$

$$[OH^-][H^+] = 10^{-14} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{[OH^-]} \Rightarrow [H^+] = \frac{10^{-14}}{2.1 \cdot 10^{-8}} = 4.7 \cdot 10^{-7}$$

- 24

$$C = 0.5m$$

$$pH = ?$$

$$Ka = 4.9 \cdot 10^{-10}$$


$$\alpha = \sqrt{\frac{Ka}{C}} = \sqrt{\frac{4.9 \cdot 10^{-10}}{0.5}} = 3.13 \cdot 10^{-5}$$

$$[H^+] = C \alpha = 0.5 \cdot 3.13 \cdot 10^{-5} = 1.565 \cdot 10^{-5}$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log 1.565 \cdot 10^{-5} = 4.8$$

$$pH = 4.8$$

25- کله چې د HCN په 0.2molar محلول باندې 0.1molar NaOH محلول ور زیات شي، د دې محلول 0.1molar د NaOH محلول په واسطه خنثی او 0.1molar یې پاتې کیږي؛ نوله دې امله د HCN د غلظت کچه په لاندې ډول تر لاسه کیږي:



$$0.2m \quad 0.1m \quad 0.1m$$

$$1000mL \quad 0.1m \quad n = \frac{100mL \cdot 0.1mol}{1000mL} = 0.01mol$$

$$100mL \quad n$$

$$V = 100mL + 200mL = 300mL = 0.3L$$

$$C_M = \frac{0.01mol}{0.3L} = 0.03molar$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{Ka}{C}} = \sqrt{\frac{1.5 \cdot 10^{-5}}{0.03}} = 2.236 \cdot 10^{-2}$$

$$[H^+] = C \alpha = 0.03 \cdot 2.236 \cdot 10^{-2} = 0.068 \cdot 10^{-2}$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log 6.7 \cdot 10^{-4}$$

$$pH = 3.174$$



-26


$$pH = 5$$

$$[H^+] = 10^{-5}$$

$$[H^+] = C \alpha, \alpha = \frac{[H^+]}{C} = \frac{10^{-5}}{10^{-1}} = 10^{-4}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{Ka}{C}}, K_a = C \alpha^2 \Rightarrow K_a = 10^{-1} \cdot \langle 10^{-4} \rangle^2 = 10^{-9}$$






لومړی لوست

د درسي کتاب مخ: 78

د مطلبونو شرح		د مطلبونو سرليکونه
د تيزابونو او القليو تعريف		1- د لوست موضوع
له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د تيزابونو او القليو خواص، جوړښت او په ځانگړتيا دې پوه شي. - يقين دې ترلاسه کړي چې تيزابونه او القلي ځانته ځانگړي خواص لري او دا خواص د هغوی له جوړښت سره اړيکه لري. - د تيزابونو او القليو دخواصو په پام کې نيولو سره دې، هغوی يو له بل څخه توپير کړای شي.		2- د زده کړې موخې - پوهنيزې - ذهني - مهارتي
مناقشه، نمايشی، توضيحي او عملي		3- د تدريس میتودونه
کتاب، قلم، تخته، تابشير، د تيزابونو او القليو بيلابيل ډولونه.		4- د تدريس اړين مواد او توکي
پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)		5- د ارزونې میتود
وخت په دقیقه	لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوست ارزونه	6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه
5	د انگېزې رامنځته کول: ليمو تريو دې يا خوږ؟	
وخت په دقیقه	د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه	1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)
40	- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د تيزابونو، القليو او د هغوی د جوړښت په اړه ورکوي، يادداشت او زده دې کړي. - د نمايشی تجربو په سرته رسولو کې دې فعاله ونډه واخلي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.	- د لوست سرليک دې د تخته پرمخ وليکي. - د تيزابونه او القليو د تعريف، جوړښت او خواصو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - په نمايشی تجربو سره دې د تيزابونو او القليو تر منځ توپير زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

حل يې کړئ : د القليو او تيزابونو مزدوجې جوړې په لاندې تعامل کې نښاني کړئ:



په پورته تعامل کې CN^- القلي ده او دهغې مزدوج تيزاب HCN دی ؛ همدارنگه H_2O تيزاب دی ، دهغه مزدوج القلي OH^- ده.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د برونستيد تيزابونه او القلي

د برونستيد له نظره يو تيزاب کولای شي پروتون ورکړي او يوه القلي کولای شي چې پروتون اخيستونکی عمل ترسره کړي ، د برونستيد هر تيزاب د برونستيد مزدوج القلي لري او برعکس د برونستيد هره القلي د برونستيد مزدوج تيزاب لرونکې ده.

په اوبو کې تيزابي او القلي خواص او د هغې د pH بڼه: اوبه امفوتریک خاصيت لري چې هم د برونستيد د تيزاب په بڼه او هم د برونستيد د القلي په بڼه عمل کوي ، په 25°C تودوخه کې د H^+ او د OH^- غلظت دواړه يو له بل سره مساوي دي او هريو يې 10^{-7} mol/L دی ، د محلولونو د pH بڼه د هغوی تيزابيت ښيي ، که چيرې د يو محلول pH کوچنی او د هغې د $[\text{H}^+]$ غلظت لوی وي ، د محلول تيزابيت لوړدی.

د تيزاب او القلي د ايوناييزيشن ثابت : غښتلي تيزابونه او غښتلي القلي په بشپړ توگه ايوناييزيشن کيږي ، کمزوري تيزابونه او کمزوري القلي په ډيره کمه کچه په ايونونو توپه کيږي ، د تيزابو، د مزدوجې القلي او د $[\text{H}^+]$ غلظت کيدای شي د هغوی د تعادل پر بنسټ محاسبه کړل شي چې په تعامل کې د تعادل له ثابت څخه عبارت دی.

د مالگو او اکسايډونو تيزابي او القلي خواص: مالگې له اوبو سره تعامل کوي ، مرکبونه جوړوي ، د مالگې او اوبو دا متقابل عمل د هايډروليز په نوم ياديږي ، د مالگو د کتيونونو او انيونونو د خواصو په پام کې نيولو سره کيدای شي چې د هايډروليز د محيط د pH وړاندیز وشي.

اکسايډونه له اوبو سره تعامل کوي ، د تعامل په پايله کې يې د اړوند تيزابونو او القليو محلولونو جوړوي.


د ليويس تيزابونه او القلي :

د تيزابونو او القليو ډير عام تعريف عبارت دی له : تيزابونه هغه مواد دي چې د الکتروني خلا لرونکي دي او د نورو موادو جوړه ازاد الکترونونه ځان خواته جذبوي او القلي هغه مواد دي چې خپل ازاد جوړه الکترونونه نورو موادو ته ورکوي. برونستيد تيزابونه پروتون ورکونکي او القلي يې د پروتون اخيستونکې مادې په توگه تعريف کړي دي ، دا تعريفونه په عمومي ډول د تيزابونو ، القليو د خواصو او د هغوی له تعاملونو سره سمون لري.

د تيزابونو او القلي گانو مزدوجې جوړې:


د برونستيد د تيزابونو او القليو د تعريف پراختيا ښيي چې تيزابونه پروتون ورکونکي مواد او القلي پروتون اخيستونکي مواد

دي ، د هر تيزاب انيون د هغه مزدوجه القلي ده، که يو تيزاب خپل هايډروجن له لاسه ورکړي، دهغه مزدوجه القلي لاسته راځي ، که چيرې يوه مزدوجه القلي هايډروجن ايون جذب کړي د هغه مزدوج تيزاب جوړېږي. د برونستيد له نظريې سره سم هر تيزاب مزدوجه القلي لري او هره القلي خپل مزدوج تيزاب لري؛ د بيلگې په ډول : د Cl^- ايون د HCl د تيزاب مزدوجه القلي ده، H_2O د H_3O^+ د تيزاب مزدوجه القلي ده، د اسيتيک اسيد د ايوناييزيشن معادله په لاندې ډول ده.



د مزدوجې القلي فورمول تل د هايډروجن يو اتوم لري او يو يا څو منفي چارج لري، همدارنگه د مزدوج تيزاب فورمول يو يا څو مثبت چارجونه لري.


په پورتنۍ فورمول کې دو جوړې مزدوجه القلي او 1،2 مزدوجه تيزاب ښودل شوي دي. داسيټات ايون (CH_3COO^-) دسرکې د تيزاب (CH_3COOH) مزدوجه القلي ده. د HCl اود CH_3COOH ايوناييزيشن د برونستيد د تيزابونو او القليو بيلگې دي. د برونستيد تعريف مونږ ته اجازت راکوي تر څو امونيا ته يو القلي مرکب ووايو؛ ځکه دا مرکب پروتون اخيستونکى دى:



دلته NH_4^+ د NH_3 د القلي مزدوج تيزاب دى او OH^- د H_2O مزدوجه القلي ده .

په يادې ولړۍ: هغه اتوم کيدای شي د برونستيد د القلي په توگه ومنل شي چې ازادې الكتروني جوړې ولري او د H^+ ايون په ځان باندې نصب کړي.

په لنډه توگه، که چيرې مونږ NaOH ته پام وکړو، خيال به وکړو چې دا مرکب القلي نه دى؛ ځکه پروتون په ځان نښولى نه شي ، څرنگه چې NaOH يو الکتروليت دى، د محلول په حالت کې په بشپړه توگه ايوناييزيشن کيږي ، دا چې د يوې غښتلې القلي او پروتون اخيستونکې په بڼه عمل کوي؛ نو له دې امله د برونستيد يوه القلي ده:




له دې امله دا چې موږ NaOH او نورو هايډوڪسايډنو ته القلي وايو، په رښتيا چې مونږ په هغوی کې د (OH^-) گروپ شتون په پام کې نيسو کوم چې د هغوی له ايونايښن څخه لاسته راځي.




بوهانس برونسټيډ
1879- 1947

مثال : د القليو او تيزابونو مزدوجې جوړې ، د امونيا او هايډروجن فلورايد په تعامل کې له لاندې معادلې سره سم په گوته کړئ:




حل او پايله :

داچې امونيا NH_3 له NH_4^+ څخه يو اتوم هايډروجن او يو مثبت چارج کم لري ، همدارنگه F^- له HF څخه يو اتوم هايډروجن کم او يو منفي چارج لري، له دې امله د هغوی مزدوجی جوړې عبارت دي له :




تمرين (پورته مثال ته ورته) : په لاندې تعامل کې د القلي او تيزاب مزدوجې جوړې ښيي:



د هايډرونيټ H_3O^+ د ايون فورمول ښيي چې دا ايون د يو ماليکول اوبو او له يو هايډريت شوي پروتون څخه جوړ دی او پروتون کولای شي د اوبو له ډيرو ماليکولونو سره يوځای شي، پيچلي (مغلق) ماليکولونه جوړکړي چې د هغوی بيلگه کيدای شي $H_5O_2^+$ او $H_9O_4^+$ ورکړل شي؛ په هر صورت مونږ تل د هايډرونيټ ايون په کار وړو .

د محاسبو د کار د اسانتيا او ساده والي لپاره ، د هايډريت ايون په ځای H^+ او يا H_3O^+ ليکل کيږي. زياتره د محلولونو د غلظت په ښودلو کې د H^+ يا H_3O^+ ايون ليکي.




دویم لوست

د درسي کتاب مخ: 80

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د تيزابونو او القليو تعريف د گيلبرت ليويس له نظره
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د گيلبرت ليويس د نظريې پر بنسټ دې د تيزابونو او القليو په تعريف پوه شي. - يقين دې ترلاسه کړي چې د گيلبرت ليويس له نظره: هره الکترون اخيستونکې ماده تيزاب او الکترون ورکوونکې ماده القلي ده. - د ليويس تيزابونه او د ليويس القلي دې وپيژني او هغوی دې يو له بل څخه توپير کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایش، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر ی د تيزابونو او القليو بيلابيل ډولونه.
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او لیکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخیستل، د وخت په دقیقه دقیقه د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه . د انگېزې رامنځته کول : ایا امونیا القلي ده او یا دا چې تيزاب دی؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه :
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي.		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري.
- تيزابونه دې د ليويس د نظريې پر بنسټ روښانه او تشریح کړي.		- هغه معلومات چې ښوونکی يې د تيزابونو او القليو د تعريف په اړه د گيلبرت د نظر پر بنسټ ورکوي، یادداشت او یاد ته دې وسپاري.
- د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.		- د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.
- لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.		- کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
- زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		


7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

د فعالیت حل :



د هایدروجن هغه اټوم چې د هایدروکساید په گروپ کې له اکسیجن سره اړیکه لري، د بې ځایه کیدو وړ هایدروجن دی، ځکه د هایدروجن او اکسیجن اړیکه په دې گروپ کې قطبي ده، په دې تعامل کې الکول تیزابي عمل کوي او هایدروجن یې د سودیم په واسطه تعویض کیږي:

حل یې کړئ




حل: په پورتنۍ معادله کې H_2CO_3 تیزاب دی چې د پروتون ورکونکي په توګه یې عمل کړای دی، په داسې حال کې چې HCN القلي او د H_2CO_3 مزدوج تیزاب دی، HCN تیزاب او دهغه مزدوجه القلي CN^- ده.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات


د لیویس تیزابونه او القلي

امریکايي عالم لیویس (Lewis - G - N) دا لاندې تعریف یې د تیزابونو او القلیو لپاره فورمول بندي کړی او ویلي یې دي: القلي هغه مواد دي چې کولای شي د الکترونونو ازادې جوړې له لاسه ورکړي او تیزابونه هغه مواد دي چې د موادو ازادې الکتروني جوړې ځانته اخلي؛ د بیلګې په ډول: د امونیا د پروتونیشن په تعامل کې، د امونیا مالیکول د القلي په توګه عمل کړی کوم چې لیویس هغه تعریف کړی دی او خپله ازاده الکتروني جوړه یې پروتون (H^+) ته چې د لیویس له نظره د تیزاب په توګه عمل کوي، له لاسه ورکوي، د لیویس له نظره د تیزابو او القلیو تعامل یو بل ته د ازادو الکتروني جوړو ورکول او اخیستل، د مالګې او اوبو د جوړیدو لامل نه کیږي. د القلیو او تیزابونو لپاره د لیویس تعریف د نورو علماو له تعریفونو څخه ډیر کارول کیږي؛ ځکه د القلیو او تیزابونو د تعاملونو سره بېرته څو نور تعاملونه هم ترسره کیدای شي چې دا تعاملونه د نورو علماوو د تیزابونو او القلیو په تعریفونو کې نه په سترګو کیږي.



د کاربن ډای اکساید هایدريشن د کاربونیک اسید په جوړیدو کې په لاندې ډول دي:



د لیویس د نظریې پر بنسټ درک شول چې: په لومړي سر کې د اوبو د مالیکول د اکسیجن د اټوم یوه جوړه ازاد الکترونونه د کاربن ډای اکساید مالیکول ته ورکړي دي، دلته د کاربن - اکسیجن د اړیکې د پای الکتروني جوړه د اکسیجن اټوم ته لیږدول کیږي او د کاربن په اټوم کې تش اوربیتال منځته شوی چې د اوبو د مالیکول د اکسیجن د اټوم ازاده الکتروني جوړه په همدې تش اوربیتال کې ځای پر ځای کیږي، د نوموړي تعامل میخانیکیت لاندې لیدل کیږي:



نو له دې امله H_2O د لیویس القلی او CO_2 د لیویس تیزاب دی، په وروستي پړاو کې د اکسیجن له اتوم څخه چې مثبت چارج لري، یو پروتون جلا او په هغه کسین باندې کوم چې منفي چارج لري، ځای پر ځای کیږي، په پایله کې H_2CO_3 لاسته راځي:



لنډيز

تیزابونه تل پروتون ورکونکي دي او القلي تل پروتون اخيستونکي دي، هر تیزاب مزدوجه القلی او هره القلی مزدوج تیزاب لري (د برونستید نظریه). د محلولونو د محیط د تیزابیت معیار، د هغوی له pH څخه عبارت دی او pH په 25°C کې د هایدروجن د ایون غلظت (یومول په یولیترا کې) منفي لوگارتیم دی. د تیزابي محلول $\text{pH} < 7$ ، د القلي محلول $\text{pH} > 7$ او د خنثی محلول $\text{pH} = 7$ دی. اوبلن محلولونه چې لاندې لیکل شوي، قوي تیزابونه دي؛ ځکه په بشپړه توګه ایونایزیشن کیږي چې HNO_3 او H_2SO_4 ، HCl ، HBr ، HI دي. زیاتره تیزابونه کمزوري دي او کمزوری الکترولیت هم دی.

غښتلي القلي د القلیو او ځمکنیو القلیو د ګروپونو د هایدروکسایدونو (پرتله له بیرلیم هایدروکساید) څخه عبارت دي؛ ځکه دوی په خپل او بلن محلول کې په بشپړه توګه په آیونونو ټوټه کیږي. K_a د تیزابونو د ایونایزیشن ثابت او K_b د القلیو د ایونایزیشن ثابت ښيي.


د تیزابونو د خاصیت د ټاکلو لپاره د ایونایزیشن د سلنې له لارې څخه ګټه اخېستل کیږي. د کمزورو تیزابو محلول چې نری وي، د ایونایزیشن ښه سلنه لري، د دوو او دڅو پروتونو د تیزابونو مالیکولونه د یوه پروتوني تیزاب له مالیکولونو څخه

ډیرایونایزیشن کیږي. د یو تیزاب او د هغه د مزدوجې القلی د ایونایزیشن د حاصل ضرب ثابت ، د اوبو د ایونونو د غلظت د ضرب حاصل له ثابت سره مساوي دی:

$$K_a \cdot K_b = K_w$$

ډیرې مالګې غښتلې الکترولیت دي او په بشپړه توګه په ایونونو ټوټه کیږي. د مالګې د ایونونو تعامل له اوبو سره د هایډرولیز په نوم یادېږي چې د تیزابي یا القلي محیط د رامنځته کیدو لامل ګرځي. هغه مالګې چې کمزورو انیون یا دکمزورو تیزاب مزدوجہ القلی لري ، د هایډرولیز په پایله کې یې د محلول القلي محیط منځ ته راځي او د کتیون په کمزور والي یا دکمزورو القلی دمزدوج تیزاب په شتون کې دمحللول محیط تیزابي دی.

کوچني فلزي ایونونه چې لوړ چارج لري ؛ لکه: Al^{3+} او Fe^{3+} هایډرولیز کیږي او د هغوی د هایډرولیز محیط تیزابي دی. اکسایدونه په تیزابي اکسایدونو ، القلي اکسایدونو او په امفوتریک اکسایدونو ډله بندي کیږي. د لیویس له نظره ، هره هغه ماده چې د نورو موادو جوړه الکترانونه واخلي، له تیزاب څخه عبارت دي او القلي هغه مرکبونه دي چې جوړه الکترانونه له لاسه ورکوي. په عمومي توګه د لیویس تیزابونه الکترون اخیستونکي دي او اړینه نه ده چې د هغوی د مالیکولونو په جوړښت کې د هایډروجن د اتوم شتون حتمي وي.



دریم لوست

د درسي کتاب مخ: 83

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح	
1- د لوست موضوع		د اوبو تيزابي او القلي خواص	
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي:	
- پوهنيزي		- د اوبو تيزابي او القلي خواص دې زده کړي.	
- ذهني		- يقين دې تر لاسه کړي چې د اوبو تيزابي او القلي خواص د هغې په ځانگړي جوړښت پورې اړه لري.	
- مهارتي		- د اوبو تيزابي او القلي خواص دې و ټاکلی شي.	
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایش، توضیحي او توضیحي	
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر، مقطري اوبه او ښودونکی	
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او لیکنی)	
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه	لوړمړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه
		5	د انګېزې رامنځته کول: د خالصو اوبو په اړه معلومات لری؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه	
- د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي.		- د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري.	
- د اوبو د تيزابي او د القلي خواصو په اړه دې هر اړخیز معلومات وړاندې کړي.		- هغه معلومات چې ښوونکی یې د اوبو د تيزابي او القلي خاصیت په اړه ورکوي یادداشت او زده دې کړي.	
- له بیلابیلو معرفونو دې سره د اوبو تيزابي او القلي خواص وټاکي او زده کوونکو ته دې روښانه کړي.		- له بیلابیلو معرفونو سره چې ښوونکی د اوبو تيزابي او قلمي خواص ارزوي، زده کوونکي دې هم عملي وکړي.	
- د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ورکړي.		د لوست په مفهوم دې پوه شي.	
- لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.	
- زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- کورنۍ دنده دې تر سره کړي.	

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د تمرین حل :

$$[H^+][OH^-] = 10^{-14} \text{ mol}^2 / L^2$$

$$[1.3 \text{ mol} / L][OH^-] = 10^{-14} \text{ mol}^2 / L^2$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{1.3} = 7.7 \cdot 10^{-15}$$

$$[OH^-] = 7.7 \cdot 10^{-15}$$

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د ځمکې کره د شمسي منظومې یوازینۍ سیاره ده چې د اوبو کچه په کې زیاته ده ، د اوبو د شتون له امله په دې سیاره کې حیوانات او نباتات ژوند کوي.

د اوبو اهمیت د اورگانیزم په حیاتي فعالیتونو کې د هغې په برخې اخیستنې پورې اړه لري، ټول بیوشیمیکي فعالیتونه د اوبو په شتون کې ترسره کېږي.

ټولې ژوندۍ فعالې حجرې 60 – 80% اوبه لري، د یو ژوندي نورمال بالغ انسان په اورگانیزم کې چې کتله یې 70Kg وي، له 45 تر 50 لیتره اوبه شتون لري چې 3.5 لیتره یې په 5L وینه کې ، 10.5L لیتره یې په لمفاوي غدو او د حجرو باندیني اوبه جوړوي او نورې پاتې اوبه د حجرو په دننه کې دي.

د اوبو فزیکي او کیمیاوي خواص د بیولوژیکي پروسو ډیرې ځانګړتیاوې ټاکي. په عمومي توګه د خواړو د هضم ، د میتابولیزم د عملیې، د وینې د تولید او دنسجونو دستیز دا ټولې پروسې په اوبلنو محلولونو کې او د اوبو په فعاله برخې اخیستنې سره ترسره کېږي. اوبه د عضوي او غیر عضوي موادو ښه حل کیدونکې ماده ده، له دې امله زهرجن او فاضله مواد له اورگانیزم څخه د اوبو په واسطه د محلول په بڼه وځي. هغه اوبه چې د بدن څخه د خولو په بڼه د پوستکې له لارې براسیږي، د بدن د تودوخې درجه ثابته او نورماله ساتي. او ښکې چې د سترګو د قرینې د لمدو ساتلو او له سترګو څخه د دورو او خاورو د ویستلو دنده ترسره کوي، 99% یې اوبه دي.


د اوبو کچه په هغو نسجونو کې ډیره زیاته ده چې د هغوی دندې په اورگانیزم کې مهمې او اړینې وي؛ د بیلګې په ډول: شوکي نخاع 69.7%، د دماغ پوښ 83.3%، زړه 79.3%، کولمې 77%، سږي 71.1%، توری 76% د وینې سپین کرویات 70%، پوستکي 72%، یڼه (ځیګر) 60%، ارتباطي نسجونه 79.6%، کریندوکي 55% او سکلیت 22% اوبه لري.

د اوبو فزیکي او کیمیاوي خواص د بیولوژیکي جریانونو څرنگوالی روښانه کوي.


اوبه غولونکې خواص، د ایشیدو لوړه تودوخه، ټوټه کولو او د ښه بیلولو وړتیا لري او د لږې تودوخې د تیرولو د ځانګړتیا له ځانه ښيي، د براس تودوخه یې زیاته ده.

د اوبو په مالیکول کې د هایډروجن او اکسیجن تر منځ اړیکه ډیره قطبي ده، د هغې ډای پول مومنټ $6.1 \cdot 10^{-30} \text{ Cb} \cdot m$

دی چې د اوبو د مالیکول د دې مثبت او منفی پای پول مومنت کچه د اوبو د مالیکولونو د لوري ورکولو لامل یو د بل په واسطه کیږي تر څو ځان په یوه سطحه کې وساتي . د اوبو مالیکول له خپلو نورو څلورو مالیکولونو سره هایدروجنی اړیکې جوړوي او د تترایدرال جوړښت لري چې د هغوی د ولانسی اړیکو زاویه 104.5° ده. د هایدروجنی اړیکې انرژي $20 - 25 \text{ KJ/mol}$ ده او 10 ځلي د کوولانټ له اړیکې څخه کمزوري او کمه انرژي لري؛ خو دواندروالس له اړیکې څخه څو وارې غښتلې ده، د اوبو لوړ کثافت په 4°C کې دی چې 1 g/mL دی. د اوبو په جامد حالت (کنگل) کې هایدروجنی اړیکه نا منظمه ده او له همدې امله دی چې په کنگل کې یې ډیرې خالیګاوې شتون لري، د کنگل کثافت د مایع اوبو په پرتله لږ دی:




شکل : د اوبو د مالیکولونو تر منځ هایدروجنی اړیکې



شکل : د اوبو د مالیکولونو او فارمیک اسید د مالیکول تر منځ هایدروجنی اړیکې

اوبه د اکسیدیشن- ریدکشن په پروسو کې فعاله برخه لري، بیلابیل مرکبونه هایدرولیز کوي او د هغوی آیونونو ته هایدراتیږي پوښ وربخښي چې داجوړښت د آیونونو دپایښت لامل کیږي.



څلورم لوست

د درسي کتاب مخ: 85


د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		pH - د تيزابيت معيار
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - pH - د تيزابيت د معيار په اړه دې هر اړخيز معلومات تر لاسه کړي . - يقين دې تر لاسه کړي چې په محلولونو کې د هايډروجن د ايونونو غلظت د هغوی د خواصو د روښانتياوو بنسټيز فکتور دی . د محلولونو pH دې محاسبه کړای شي .
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایشی، توضیحي او توضیحي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او pH - meter
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول : دوينې کوم معاینات پیژنئ؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتون (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		وخت په دقیقه
د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه		وخت په دقیقه
- د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي . - pH - د تيزابيت د معيار په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي، د هغوی د محاسبو فورمول دې وليکي . - د څو محلولونو pH دې محاسبه کړي ، د هغوی لارې دې زده کوونکو ته زده کړي . - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي . - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي .		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري . - هغه معلومات چې ښوونکی يې د pH - د تيزابيت د معيار په اړه وړاندې کوي يادداشت او زده دې کړي . - د څو محلولونو pH دې محاسبه کړي . - د لوست په مفهوم دې پوه شي . - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي . - کورنۍ دنده دې تر سره کړي .

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه


د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د pH کمیت د محلولونو د محیط د تیزابیت د فعال معیار په توګه: د کمزورو تیزابونو په محلولونو کې؛ د بیلګې په ډول: د سرکې د تیزابو عمومي تیزابیت له فعال تیزابیت سره مساوي نه دی؛ خو له هغه څخه زیات دی؛ ځکه د سرکې تیزاب په بشپړه توګه په ایونونو نه پوټه کیږي له دې امله د $[H^+]$ غلظت په محلول کې لږ لیدل کیږي:



عمومي
د تیزابي محلولونو عمومي تیزابیت د تیتريشن په وسیله ټاکل کیږي، د فعال تیزابیت ټاکل چې په محیط کې له $[H^+]$ سره اړیکه لري، په بیلابیلو میتودونو سره ټاکل کیږي، قوي تیزابونه په محلولونو کې په بشپړه توګه په ایونونو پوټه کیږي؛ نو دلته د تیزابونو



د عمومي تیزابیت او فعال تیزابیت تر منځ ټاکلی سرحد په طبابت کې بنسټیز رول لري.

ځکه پوټه شوي مالیکولونه او د هایدروجن ایونونه $[H^+]$ بیلابیل فزیالوژیکي فعالیتونه لري؛ د بیلګې په ډول: د انسانانو د معدې په عصاري کې بیلابیل ډول تیزابونه له بیلابیلو قوتونو سره شتون لري، خو هغه فعالیت یوازې $[H^+]$ ایون چې له تیزابونو څخه جلا شوی دی، له ځانه ښيي، له دې کبله د pH د نیغې ټاکنې او د معدې د عصاري د تیتريشن له د pH د ټاکنو پایلې سره یوشان نه دي:

$$PH = -\log aH^+ = -\log CH^+ \cdot fH^+$$

$$POH = -\log aOH^- = -\log COH^- \cdot fOH^-$$


په تیزابي او القلي محلولونو کې pH او pOH کیدای شي هغه وخت محاسبه شي چې دمحلولونو غلظت، د پوټه کیدو ثابت او دهغوی د پوټه کیدو درجه مونږ ته معلومه وي. د تیزابي او القلي محلولونو pH او pOH د هغوی د ایونونو له فعالیت سره اړیکه لري.

د قوي تیزابونو او قوي القلیو په نږو (رقیقو) محلولونو کې غلظت او فعالیت له یو بل سره مساوي دی؛ نو له دې امله لیکلای شو:

$$pOH = -\log COH^- \quad \text{او} \quad pH = -\log CH^+$$

د کمزورو تیزابونو او کمزورو القلیو د محلولونو د pH او pOH د محاسبو لپاره اړه ده ترڅو له غلظت څخه سربیره باید دالکترولیتو د پوټه کیدو ثابت او دپوټه کیدو دثابت درجه مونږ ته معلومه وي؛ ځکه په دې حالت کې؛ یعنی په دارنگه محلولونو کې د ایونونو کچه د تیزابونو او یا القلیو له غلظت څخه څو ځلې کمه ده؛ نو له دې امله د کمزوري الکترولیت محلولونو د pH او pOH د محاسبې لپاره کیدای شي د لاندې فورمولونو په واسطه په لاس را وړل شي. لاندې معادله په

پام کې نيسو:



$$H^+ = C\alpha \Rightarrow PH = -\log C\alpha$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} \text{ د بلی خوا ده؛ نو:}$$

$$pH = -\log C \sqrt{\frac{K_a}{C}} = -\log \sqrt{K_a C}$$


$$pH = -\log (K_a C)^{\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} \log (K_a C)$$

$$pH = -\frac{1}{2} (\log K_a + \log C)$$

$$pH = \frac{1}{2} (-\log K_a - \log C)$$

$$pH = \frac{1}{2} pK_a - \log C$$

په پورتنۍ وروستۍ اړیکې کې K_a او C په پرله پسې توګه د پوښه کیدو ثابت او د تیزابونو غلظت ښیي، د القلیود POH د محاسبې لپاره په لاندې توګه عمل کيږي:



$$POH = \log C\alpha$$

$$POH = \log C\alpha$$

$$POH = \log C \sqrt{\frac{K_b}{C}} = \log \sqrt{K_b \cdot C}$$

$$POH = \log (K_b C)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log (K_b C)$$


$$POH = \frac{1}{2} (\log K_b + \log C)$$

$$POH = \frac{1}{2} pK_b - \frac{1}{2} \log C$$

$$pH + pOH = 14 \text{ دا چې دې نو:}$$

$$pH = 14 - pOH$$

$$pH = 14 - \left(\frac{1}{2} pK_b - \frac{1}{2} \log C \right) \text{ یا } pH = 14 - \frac{1}{2} pK_b + \frac{1}{2} \log C$$



د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د تيزابونو او القليو قوت
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د تيزابونو او القليو د قوت په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې تيزابونه او القلي بيلابيل قوتونه لري. - تيزابونه او القلي دې د هغوی د قوت په بنسټ سره توپير کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایش، توضیحي او توضیحي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير د تيزابونو او القليو بيلابيل ډولونه
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ وخت په دقیقه 5 اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: څه رنگه کيدای شي چې کمزوري او قوي تيزابونه او القلي يو له بل څخه توپير کړل شي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي.		د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري.
د تيزابونو او القليو د قوت په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي.		- هغه معلومات چې ښوونکی يې د تيزابونو او القليو د قوت په اړه وړاندې کوي يادداشت او زده دې کړي.
د تيزابونو او القليو د قوت په هکله دې څو بيلگې زده کوونکو ته ووايي.		- د تيزابونو او القليو د قوت بيلگې چې ښوونکی يې وړاندې کوي، بايد زده کوونکي هغه زده کړي.
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.		- د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.
د لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.		- کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د ارهينوس (Arrhenus) په نوم عالم په 1887 کال کې د الکترولیتو او نه الکترولیتو محلولونو د کالیکاتیفو خواصو تر منځ توپیر، د الکترولیتکي انفکاک د تیورۍ پر بنسټ چې خپله یې وړاندوینه کړې ده، روښانه کړل، د دې تیوري بنسټیز ټکي په لاندې ډول دي:

1- الکترولیتونه هغه مواد دي چې په حل کوونکي کې د حل کیدلو په وخت کې په چارج لرونکو ایونونو ټوټه کیږي، دایونونو کمیت او چارج یې د ټوټه شوو موادو په خواصو پورې اړه لري.


2- کیدای شي چې الکترولیت مواد په بشپړه توګه په ایونونو ټوټه نه شي، د هغوی د مالیکولونو د ټوټه کیدو درجه (α) د الکترولیتونو د کیفیت څرنګوالي روښانه کوي.

د ټوټه کیدو درجه په محلولونو کې د الکترولیت مادې د ټوټه شوو مالیکولونو کچه پر مالیکولونو له مجموعي کچې څخه عبارت ده:

$$\alpha = \frac{N_i}{N}$$

3- د الکترولیتونو د ټوټه کیدو تیوري د الکترولیتو د ټوټه کیدو درجه (α) د محلولونو له مقداري ځانګړتیاوو څخه خیال کوي، که چیرې ماده غیر الکترولیت وي، $\alpha = 0$ ده، که د ټوټه کیدو درجه یو ته تقریب ($\alpha \Rightarrow 1$) وکړي، الکترولیتونه غښتلي دي، که چیرې الکترولیتونه کمزوري وي، $0 < \alpha < 1$ ده.

د الکترولیتونو بله ځانګړتیا د هغوی د ټوټه کیدو له ثابت څخه عبارت ده، د غلظت، د ټوټه کیدو د درجې او د ټوټه کیدو د ثابت تر منځ اړیکه د استوالد Ostwood په نوم عالم و موندله، نوموړي د CH_3COOH کمزوري تیزاب ټوټه کیدل یې د دې څیړنې لپاره وکارول، د دې تیزاب د ټوټه کیدو معادله په لاندې ډول ده:



د کتلې د عمل قانون په دې معادلې کې ترسره کوو:

$$K = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3 - \text{COO}^-]}{[\text{CH}_3 - \text{COOH}]}$$

که د CH_3COOH لومړنۍ غلظت C او د هغوی د ایونونو غلظت C α وي؛ نو په دې صورت کې دا تیزاب په بشپړه توګه نه دی ټوټه شوی؛ خو هغه K په لاندې ډول تر لاسه کیدای شي:

$$K = \frac{C\alpha \cdot C\alpha}{C - C\alpha} = \frac{C^2\alpha^2}{C(1 - \alpha)} = \frac{C\alpha^2}{1 - \alpha}$$

پورتنۍ معادلې د الکترولیتو د ټوټه کیدو ثابت، د ټوټه کیدو د درجې او غلظت تر منځ اړیکه تړلې ده، څرنگه چې لیدل کیږي د ټوټه کیدو درجه له غلظت سره معکوسه اړیکه لري، د کمزورو الکترولیتونو د ټوټه کیدو درجه $\alpha \ll 1$ ده؛ نو له دې کبله د پورتنۍ معادلې په مخرج کې له هغې څخه تیرونه وشي، په دې صورت کې لیکلای شو:

$$K = C\alpha^2$$

$$\alpha^2 = \frac{K}{C}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K}{C}}$$


پورتنی معادله د استوالد د معادلې په نوم یاده شویده او د کتلې د عمل د قانون ځانگړی حالت دی. د کتلې د عمل قانون د کیمیاوي تعاملونو د تعادل ثابت رابښي او د تعامل د محصول د غلظتونو د ضرب حاصل د تعامل کوونکو موادو د غلظتونو د ضرب پر حاصل باندې له تقسیم څخه عبارت دی.

د ارهینوس د الکترولیتکي انفکاک تیوري د محلولونو په تیوري کې مهم رول تر سره کړی دی؛ نوموړې تیوري د نه تېنټیدونکو الکترولیتو موادو د محلول د اسموتیک فشار زیاتوالی، د کنگل کیدو د درجې ټیټیدل او د ایشیدو د درجې لوړیدل یې د نه تېنټیدونکو غیر الکترولیتو موادو له محلولونو څخه روښانه او تشریح کړل او د هغوی توپیر یې روښانه کړ، سربیره له دې نوموړې تیوري د هایدريشن د تودوخې ثبات، د غښتلو القلیو په واسطه د غښتلو تیزابونو د خنثی کولو تودوخه، د بفره محلولونو خواص، د الکترولیتونو ځینې پراويز ټوټه کیدل د مالگو هایدولیز او نور یې روښانه کړل.

د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

تمرین : د لاندې تعامل لوری د هغو تیزابونو او القلیو د قوت د پرتلو له کبله وټاکئ کوم چې په هغې کې شامل دي (د درسي کتاب 2-5 جدول څخه گټه واخلي)






حل : د درسي کتاب له 2-5 جدول په پام کې نیولو سره، CH_3COO^- یوه غښتلې القلی او CH_3COOH یې مزدوج کمزوری تیزاب دی، او همدارنګه H_2S یو کمزوری تیزاب او د هغه مزدوج القلی HS^- قوي القلی ده.



8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات

ضعیف تیزابونه

د تعادل په حالت کې ، د کمزورو تیزابونو په اوبلن محلولونو کې نه ایونایزیشن شوي مالیکولونه هم شته چې دوی په H_3O^+ او د هغه په مزدوجې القلی لږ بدلون مومي ؛ د هغوی بیلګې عبارت له: CH_3COOH , HF او د امونیم NH_4^+ ایون دي. تیزابونه بیلابیل تیزابي قوتونه لري ، د تیزابونو د ایونایزیشن وړتیا، د هغوی د تعادل ثابت ټاکي، په دې هکله په راتلونکي څپرکي کې معلومات ورکول کېږي. هغه څرګندونې چې د غښتلو تیزابونو په اړه ورکړل شوي دي ، د غښتلو القلیو په هکله کوم چې له فلزي هایډروکسایډونو څخه عبارت دي، هم سمون لري چې د هغوی بیلګې د لومړي ګروپ عنصرونو القلی ؛ لکه: KOH او د ځمکنیو القلیو عنصرونو ؛ لکه: $Ba(OH)_2$ دي، دوی غښتلي الکترولیتونه دي چې په اوبو کې په ایونونو ټوټه او ایونایز کېږي:




که چیرې د اکسی اسیدونو جوړښت د القلیو سره پرتله کړو ، ویه مومو چې دواړه مرکبونه د OH^- ګروپونه لري:




که چیرې HNO_3 له $NaOH$ سره پرتله کړو، لیدل کېږي چې دواړه د OH^- ګروپ لري، څرنگه چې سودیم د اکسیجن په پرتله کمزوری الکترونيگاتیف عنصر دی (سودیم یو الکتروپوزیټیف عنصر دی) له دې امله د دې دوو عنصرونو تر منځ ګډ الکترونونه اکسیجن ته لېږدول کېږي چې د Na^+ او د OH^- ایونونو لرونکی ایونیک مرکب جوړېږي ؛ خو د HNO_3 په


مرکب کې نایټروجن الکترونیکاتیف عنصر دی چې نایټروجن او اکسیجن په اړیکه (N – O) په N – O – H کې زیاتره کولانسی بڼه لري؛ له دې امله دا مرکب د OH⁻ ایون له لاسه نه ورکوي، دلته پرځای یې د هایدروجن او اکسیجن (O – H) اړیکه ډیره قطبي کیږي او په پایله کې یې پروتون (H⁺) له لاسه ورکوي. کمزوري القلي هم د کمزورو تیزابونو په شان کمزوري الکترولیتونه دي، امونیا یو کمزوري القلي ده چې په اوبو کې په لږه کچه ایونایزیشن کیږي:




- د درسي کتاب د 88 مخ په (5-2) جدول کې ځینې تیزابونه او د هغو مزدوجې القلي د قوت په پام کې نیولو سره پرله پسې لیکل شوي چې د هغوی د زده کړې لپاره لاندې ټکي د اهمیت وړ دي:
- که چیرې یو تیزاب غښتلی وي . د هغه مزدوجه القلي د لیدلو وړ قوت نه لري.
- H_3O^+ یو غښتلی تیزاب دی چې په اوبلن محلول کې شتون درلودلی شي، له H_3O^+ څخه غښتلی تیزاب د اوبو سره تعامل کوي، H_3O^+ او د هغه مزدوجه القلي جوړوي؛ د بیلگې په ډول: HCl چې له H_3O^+ څخه یو غښتلی تیزاب دی، له اوبو سره تعامل کوي چې په پایله کې H_3O^+ او Cl^- جوړوي:



له H_3O^+ څخه ډیر کمزوري تیزابونه له اوبو سره په ځنډ (بطي) ډول تعامل کوي؛ په پایله کې H_3O^+ او د هغه مزدوجه القلي جوړوي؛ د بیلگې په ډول:





اووم لوست

د درسي کتاب مخ: 89


د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د قوي او کمزورو، تيزابونو ټوټه کيدل
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د کمزورو تيزابونو د تفکيک په اړه معلومات تر لاسه کړي . - يقين دې تر لاسه کړي چې کمزوري تيزابونه په بشپړ ډول نه تفکيک کيږي . - د کمزورو تيزابونو د تفکيک ثابت او د تفکيک درجه محاسبه کړای شي .
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایش، توضیحي او توضیحي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير، د قوي او کمزورو تيزابونو او القلیو نموني
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخيستل، د کورنۍ د ندې کتل او د تیرلوست ارزونه . - کورنۍ دنده دې تر سره کړي . د انگېزې رامنځته کول : آیا د سرکې تيزاب په اوبلن محلول کې ټوټه کيږي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		وخت په دقیقه
د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه		وخت په دقیقه
- د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د کمزورو تيزابونو، د تفکيک په اړه دې معلومات ورکړي. - د کمزورو تيزابونو د ټوټه کيدو ثابت او د ټوټه کيدو درجه دې محاسبه کړای شي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري - هغه معلومات چې ښوونکی يې د کمزورو تيزابونو د ټوټه کيدو په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - هغه بيلگې چې ښوونکی يې د کمزورو تيزابونو د ټوټه کيدو په اړه ورکوي تحليل دې کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه وړاندې کړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

مشق او تمرین: د $[AH] = 0.2 \text{ molar}$ محلول د نه ټوټه شوو مالیکولونو $[H^+]$ او $[A^-]$ د ایونونو غلظت محاسبه کړئ.

$$K_a = 2.7 \cdot 10^{-4}$$

حل:



$$0.2 \text{ mol / L} \qquad 0.2 \text{ mol / L} \alpha \qquad 0.2 \text{ mol / L} \alpha$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{2.7 \cdot 10^{-4}}{0.2}} = \sqrt{13.5 \cdot 10^{-4}} = 3.7 \cdot 10^{-2}$$

$$\alpha = 3.7 \cdot 10^{-2}$$



$$[H^+] = C \alpha = 0.2 \cdot 3.7 \cdot 10^{-2} = 7.4 \cdot 10^{-3}$$

$$[A^-] = C \alpha = 0.2 \cdot 3.7 \cdot 10^{-2} = 7.4 \cdot 10^{-3}$$


$$[AH] = C - C \alpha = 0.2 - 7.4 \cdot 10^{-3} = 0.1926$$

8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات


غښتلي تیزابونه په اوبلن محلول کې په بشپړ ډول ټوټه کیږي او د هایډرونیوم ایون جوړوي:



کمزوري تیزابونه په اوبو کې په بشپړه توګه نه ټوټه کیږي او له لاندې معادلې سره سم له اوبو سره تعامل کوي:



د هغوی د تعاملونو ثابت په لاندې ډول دی:



$$K' = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA][H_2O]}$$

په نږدې محلولونو کې د اوبو د مالیکولونو غلظت ثابت پاتې کیږي چې 55.5 mol/L دی؛ نو له دې امله لیکلای شو چې:

$$K'[H_2O] = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} = K$$

په دې فورمول کې K د تیزابو د تعادل ثابت او یا د ایونایزیشن د ثابت په نوم یادوي چې په K_a هم ښودل کیږي او د تیزابونو

قوت رانښيي، هر څومره چې K_a کوچنی وي، همدومره تیزاب کمزوری دی او د K_a په لرلو سره کیدای شي چې د H_3O^+


غلظت په کمزوري تیزابي محلول کې وموندل شي.

جدول: د ځينو دوو او يا څو بنسټيزو تيزابونو ايونايښن او د هغوی مزدوجې القلي په 25°C کې:

د تيزاب نوم	فورمول	جوړښتيز فورمول	Ka	مزدوجه القلي	Kb
سلفوريك اسيد	H ₂ SO ₄	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{S}-\text{O}-\text{H} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	ډير لوي	HSO ₄ ⁻	ډير کوچنی
د هايډروسلفيت ايون	HSO ₄ ⁻	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{S}-\text{O}^- \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	1.3·10 ⁻³	SO ₄ ²⁻	7.7·10 ⁻¹³
اگزاليك اسيد	C ₂ H ₂ O ₄	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \parallel \quad \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \end{array}$	6.5·10 ⁻²	C ₂ HO ₄ ⁻	1.5·10 ⁻¹³
هايډرو اکزالات	C ₂ HO ₄ ⁻	$\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \parallel \quad \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{C}-\text{C}-\text{O}^- \end{array}$	6.1·10 ⁻⁵	C ₂ O ₄ ²⁻	1.6·10 ⁻¹⁰
سلفورس اسيد	H ₂ SO ₃	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{S}-\text{O}-\text{H} \end{array}$	1.3·10 ⁻²	HSO ₃ ⁻	7.7·10 ⁻¹³
هايډروسلفورايت	HSO ₃ ⁻	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{S}-\text{O}^- \end{array}$	6.3·10 ⁻⁸	SO ₃ ²⁻	1.6·10 ⁻⁷
کاربونيك اسيد	H ₂ CO ₃	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \end{array}$	4.2·10 ⁻⁷	HCO ₃ ⁻	2.4·10 ⁻⁸
د هايډروکاربونيتو ايون	HCO ₃ ⁻	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}-\text{O}-\text{C}-\text{O}^- \end{array}$	4.8·10 ⁻¹¹	CO ₃ ²⁻	2.1·10 ⁻⁴
هايډروسلفوريك اسيد	H ₂ S	H-S-H	9.5·10 ⁻⁸	HS ⁻	1.1·10 ⁻⁷
ايون هايډروجن سلفايد	HS ⁻	H-S ⁻	1.0·10 ⁻¹⁹	S ²⁻	1.0·10 ⁵
فاسفوريك اسيد	H ₃ PO ₄	$\begin{array}{c} \text{O}-\text{H} \\ \\ \text{H}-\text{O}-\text{P}-\text{O}-\text{H} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	7.5·10 ⁻³	H ₂ PO ₄ ⁻	1.3·10 ⁻¹²
ډای هايډرو فاسفوريك ايون	H ₂ PO ₄ ⁻	$\begin{array}{c} \text{O}^- \\ \\ \text{H}-\text{O}-\text{P}-\text{O}-\text{H} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	6.2·10 ⁻⁸	HPO ₄ ²⁻	1.6·10 ⁻⁷
هايډرواسفوريك ايون	HPO ₄ ²⁻	$\begin{array}{c} \text{O}^- \\ \\ \text{H}-\text{O}-\text{P}-\text{O}^- \\ \parallel \\ \text{O} \end{array}$	4.8·10 ⁻¹³	PO ₄ ³⁻	2.1·10 ⁻²

H₂SO₃^{*} هيڅکله په خالصه بڼه شتون نه لري، د اوبلن محلول په بڼه ليدل کېږي، د هغه د ايونايښن ثابت K_a لاندې

بهر پورې اړه لري:





** د HS⁻ د ايونايښن ثابت ډير کوچنی دی چې د هغه ټاکل ستونزمن دی، په جدول کې دهغه په اړه ليکل شوي رقمونه اټکل شوي دي.


په تيرو لوستونو کې ويل شوي دي، که چيرې په دوو پروتوني تيزابونو کې K_{a1} > K_{a2} وي؛ نو د [H⁺] د ايون غلظت په تعامل

کې د ایونایزیشن په لومړي پړاو پورې اړه لري. همدارنگه د هغوی د مزدوجو القلیو غلظت د ایونایزیشن دویم پړاو د کچې له امله له K_{a2} سره مساوي دی.


فاسفوریک اسید ډیر مهم خو پروتوني تیزاب دی چې د هایډروجن په دریو ایونونو ایونایزیشن کيږي:



$$K_{a1} = \frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]} = 7.5 \cdot 10^{-3}$$




$$K_{a2} = \frac{[H^+][HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]} = 6.2 \cdot 10^{-8}$$



$$K_{a3} = \frac{[H^+][PO_4^{3-}]}{[HPO_4^{2-}]} = 4.8 \cdot 10^{-13}$$

خرنگه چې مو ولیدل، فاسفوریک اسید کمزوری خو پروتوني تیزاب دی؛ نو له دې امله د هغوی د ایونایزیشن ثابت په دویم او دریم پړاو کې پرله پسې کوچنی کیږي؛ نوموړې ویلای شو، هغه محلول چې فاسفوریک اسید لري، د نه ایونایز شوو تیزابونو غلظت په کې زیاتیږي او هم د $[H^+]$ او $[H_2SO_4]$ غلظت په دې محلولونو کې لیدل کیږي.



د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د ايونايښن سلنه، د تفکيک ثابتونه او د القليو ايونايښن
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د القليو د ايونايښن په سلنې او د ايونايښن په ثابت دې پوه شي. - يقين دې ترلاسه کړي چې د القليو د ايونايښن سلنه او د ايونايښن ثابت د تيزابونو او القليو ځانگړتياوې رابښي. - د کمزورو القليو د ايونايښن سلنه او د ايونايښن ثابت دې محاسبه کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشی، توضیحي او توضیحي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير د کمزورو القليو نمونې
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول : د کومو فکتورونو په بنسټ غښتلي او ضعيف تيزابونه او القلي کيدای شي يو له بل څخه توپير کړای شي ؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		وخت په دقیقه
د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه		وخت په دقیقه
- د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د کمزورو القليو د ايونايښن سلنه، د ټوټه کيدو ثابت او ايونايښن په اړه دې هراړخيز معلومات ورکړي. - د کمزورو القليو د سلنې د موندلو او د ايونايښن د ثابت په هکله بيلگې دې زده کوونکو ته حل کړي او د زده کوونکو په واسطه دې تمرين کړي. د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د کمزورو القليو د ايونايښن سلنې او د ټوټه کيدو د ثابت په اړه ورکوي، يادداشت او زده دې کړي. - د کمزورو القليو د ايونايښن د سلنې او ټوټه کيدو ثابت په اړه د ښوونکي ورکړل شوې بيلگې دې تمرين کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.


7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8- د ښوونکي لپاره اړين معلومات


د القلیو او د هغوی د مزدوجو تیزابونو د ایونایزیشن د ثابت ترمینځ اړیکه

د تیزابو د ایونایزیشن د ثابت او د هغوی د مزدوجو القلیو د ایونایزیشن د ثابت ترمنځ ډیره مهم اړیکه په لاندې ډول ده: په دې اړه د اسیتیک اسید کمزوري تیزاب د بیلگې په توګه په پام کې نیسو:



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3 - \text{COO}^-]}{[\text{CH}_3 - \text{COOH}]}$$

له اوبو سره د $\text{CH}_3 - \text{COO}^-$ مزدوج القلی په لاندې توګه تعامل کوي:





د نوموړې القلی د ایونایزیشن ثابت کیدای شي په لاندې ډول ولیکل شي:

$$K_b = \frac{[\text{CH}_3 - \text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3 - \text{COO}^-]}$$

د دې دوو وړاندې شوو پورتنیو ثابتو د ضرب حاصل په لاندې ډول دی:

$$K_a \cdot K_b = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3 - \text{COO}^-]}{[\text{CH}_3 - \text{COOH}]} \cdot \frac{[\text{CH}_3 - \text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3 - \text{COO}^-]}$$

لاسته راغلې بیلګه به په لومړي سر کې حیرانوونکې په پام کې راشي؛ خو وروسته به پوه شي چې دا معادلې حیرانوونکې نه دي، سمې اود پوهې وړ دي. لومړۍ او دویمه (1) او (2) معادله په لاندې ډول مطالعه او دهغوی ایوني غلظت د ضرب د حاصل ثابت او په خپل سر ایونایزیشن یې گورو:




پورتنۍ بیلګه د کیمیاوي تعادل قانون روښانه کوي. کله چې د دوو معادلو له جمعه کولو څخه دریمه معادله لاسته راځي، دلته د دریمې معادلې لپاره د تعادل ثابت د دوو جمع شوو معادلو د تعادل د ضرب له حاصل څخه عبارت دی، نو له دې امله د تیزابو

$$K_a \cdot K_b = K_w \quad \text{او د هغو د مزدوجی القلي د جوړو لپاره لاندې معادله سمه ده:}$$

د پورتنیو معادلې څخه لاسته راځي چې:

$$K_a = \frac{K_w}{K_b} \quad \text{و} \quad K_b = \frac{K_w}{K_a}$$

د پورتنیو معادلو پر بنسټ کولای شو چې د کمزورو تیزابو د تعادل ثابت (K_a کوچنی) او د غښتلې مزدوجې القلی د تعادل ثابت (K_b لوی) او د هغوی برعکس محاسبه او د هغوی نیمګړتیاوې تر لاسه کړو.



شپږم څپرکي

د څپرکي موضوع : د تيزابونو او القلیو تعاملونه

1- د تدریس وخت : 6 درسي ساعتونه

گڼه	د لوست سرلیکونه	درسي ساعتونه
1	د تيزابونو او القلیو تعاملونه او د مالگو جوړېدل	یو درسي ساعت
2	د تيزابونو تعاملونه له فلزونو سره	یو درسي ساعت
3	د تيزابونو او القلیو د خنثی کولو تعاملونه	یو درسي ساعت
4	د عضوي تيزابونو تعاملونه له القلیو سره، خنثی جوړونه او تودوخه	یو درسي ساعت
5	تیتريشن، د تیتريشن معرفونه	یو درسي ساعت
6	د څپرکي لنډيز او د څپرکي تمرین	یو درسي ساعت

2- د څپرکي پوهنیزې موخې

- زده کوونکي دې د تيزابونو او القلیو په اړه معلومات ترلاسه کړي.

- زده کوونکي دې درک کړي چې د تيزابونو او القلیو له تعامل څخه د مالگو په نامه ډیر مهم مرکبونه لاسته راځي.

- زده کوونکي دې د تيزابونو بیلابیل تعاملونه له القلیو او نورو موادو سره تر سره کړای شي.


3- د څپرکي پوښتنو ته ځوابونه

1- د، 2- د، 3- ج، 4- ج، 5- د، 6- الف، 7- ج، 8- ج، 9- الف، 10- ج

د تشریحي پوښتنو ځوابونه

1-الکترولیز: د برېښنا د بهیر په واسطه د مرکبونو تجزیه، د الکترولیز په نوم یادېږي؛ د بیلگې په ډول: که چېرې د برېښنا بهیر له

اوبو څخه تیر کړي، اوبه له لاندې معادلې سره سم په هایډروجن او اکسیجن تجزیه کېږي:



2-د خنثی کولو تعامل



یو ډیر مهم دوه گونی تعویضي تعامل عبارت له تيزابونو خنثی کول د القلي په واسطه او د هغه برعکس تعامل دی چې د مالگو

او اوبو لامل کېږي؛ د بیلگې په ډول :




د خنثی کولو تعاملونه په اوبلن محیط کې ترسره کېږي، کله چې تيزابونه او القلي په اوبلن محیط کې شتون ولري،

په اوبو کې حل کېږي او په ایونونو تبدیلېږي؛ د بیلگې په ډول:




کله چې دواړه پورتنی محلولونه سره مخلوط کړل شي، لاندې تعامل ترسره کېږي:




-3

$$\left. \begin{array}{l} V_2 = 200\text{mL} \\ C_1 = 2\text{m} \\ V_2 = 100\text{mL} \\ C_2 = ? \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_1C_1 = V_2C_2 \\ C_2 = \frac{V_1C_1}{V_2} \\ C_2 = \frac{200\text{mL} \cdot 2\text{m}}{100\text{mL}} = 4\text{m} \end{array}$$

-4





$$K_c = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{In}^-]}{[\text{H}_2\text{O}][\text{HIn}]}$$



$$K_c = \frac{[\text{HIn}][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}][\text{In}^-]}$$

-5





-6


$$\begin{array}{ll} V_1 = 10\text{mL} & V_1C_1 = V_2C_2 \\ C_1 = ? & C_1 = \frac{V_2C_2}{V_1} \\ V_2 = 25\text{mL} & C_2 = \frac{25\text{mL} \cdot 0.4\text{m}}{10\text{mL}} = 1\text{m} \\ C_2 = 0.4\text{m} & \end{array}$$

7- ساده تعويضي تعاملونه


په دې ډول تعاملونو کې د مرکب له مالیکول څخه یو عنصر یې د ورته عنصر په واسطه بې ځایه کېږي. تعويضي تعاملونه زیاتره په اوبلن محیط کې ترسره کېږي:



په پورتنیو عمومي تعاملونو کې X, B, A او y عنصرونه دي، AX او By مرکبونه وربښي. زیاتره فعاله فلزونه له تیزابي محلولونو سره (د بیلگې په ډول: کلوراید اسید او سلفوریک اسید) تعامل وکړي د هایدروجن گاز او مالګه جوړوي:



8- امینونه له عضوي تیزابونو (الکولونو ته ورته) سره تعامل کوي، مرکبونه جوړوي چې د امیدونو په نوم یادېږي، امیدونه هم په طبیعت کې شته او هم په ترکیبي بڼه له لومړنیو موادو څخه په مصنوعي ډول لاسته راځي:



-9

$$V_1 = 10mL$$

$$V_1 C_1 = V_2 C_2$$

$$C_1 = ?$$




$$C_1 = \frac{V_2 C_2}{V_1}$$

$$V_2 = 5mL$$

$$C_2 = \frac{5mL \cdot 0.2m}{10mL} = 0.1m$$

$$C_2 = 0.2m$$

- 10





د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د تيزابونو او القليو تعاملونه، د مالګې جوړېدل
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د تيزابونو او القليو او د مالګو جوړېدل دې په ښه توګه زده کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د تيزابونو او القليو له تعامل څخه مالګې جوړېږي. - تيزابونه او القلي دې يو له بل سره تعامل ورکړای شي او مالګې دې په لاس راوړلې شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او د تيزابونو او القلي بيلابيل ډولونه.
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولګي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، وخت په دقیقه د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: که چیرې په لیمو باندې د صابون اوبه واچول شي، کوم بدلونونه به ترسترګوشي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		وخت په دقیقه
د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه		40
- د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي. - د تيزابونو او القليو د تعاملونو او د مالګې د جوړېدو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - د تيزابونو او القليو تر منځ توپير دې زده کوونکو ته دپوهانو د تعريفونو پر بنسټ روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرګندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د تيزابونو او القليو د تعاملونو په اړه وړاندې کوي يادداشت او زده دې کړي. - د تيزابونو او القليو د تعامل څو معادلي دې وليکي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.


7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنې نه شته .

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

مالګې: تيزابونه له القليو سره تعامل کوي، مالګه او اوبه جوړوي، همدارنګه تودوخه هم ازادېږي چې د دې تودوخې کچه د قوي تيزابونو او د قوي القليو په تعاملونو کې 13.7 Kcal/mol ده او د خنثي کولو د تودوخې په نوم ياديږي.

الف- د قوي تيزابونو او له قوي القليو تعاملونه:




د پورتنۍ تعامل ميخانيکيت په لاندې ډول دی :




د خنثي کولو په وخت کې د Na^+ او د Cl^- ايونونه په عملي ډول برخه نه لري او په تعامل کې کوم کار نه ترسره کوي.

ب - د ضعيف تيزاب تعامل د قوي القلي سره


په اوبلن محلول کې د کمزورو تيزاب زياته کچه پرته له ټوټه کيدو پاتې کېږي او نه تفکيک کېږي، که چيرې د کمزورو تيزاب فورمول په HA په پام کې ونيسو، بنسټيز تعامل چې په محلول کې د غښتلي القلي د زياتيدو له امله ترسره کېږي، په لاندې ډول په دی:



په پورتنۍ تعامل کې د پروتون ليردول ترسره کېږي، هغه نور تعاملونه چې په محلول کې ترسره کېږي، په لاندې ډول دي:





وروستی تعامل له لومړني تعامل څخه څو ځلي کم ترسره کېږي؛ د بيلګې په ډول: د سوډيم هايډروکسايډ سره د اسيتيک اسيد تعامل:





د 0.1 molar محلول په تعامل کې تعادل 99.96% ښي لوري ته ترسره کېږي.

ج- د غښتلي تيزاب او ضعيف القلي تعامل


په اوبلن محلول کې د کمزورو القليو زياته کچه پرته له ټوټه کيدو پاتې کېږي، نه ټوټه کېږي، که چيرې د کمزورو القليو فورمول له B سره په پام کې ونيسو، بنسټيز تعامل چې په محلول کې ترسره کېږي، د پروتون د نيغ ليزدول او د هايډرونيټم ايون له جوړېدلو څخه عبارت دی چې په وروستيو پړاوونو کې د هايډرونيټم ايون په القلي اغيزه کوي، د تعامل معادله يې په لاندې ډول ده:




په دې حالت کې د تيزابونو او القليو تعامل او د اوبو او القليو تعامل هم بايد په پام کې ونيول شي؛ دا تعامل د کميت له کبله ډير لږ ترسره کېږي:




مثال: د هایدروکلوریک اسید په واسطه د امونیا خنثی کول: د هایدروکلوریک اسید او یلن محلول د H_3O^+ او Cl^- ایون لري چې محلول کې یې لاندې تعامل ترسره کیږي:




د - دضعیف تیزاب او کمزوري القلي تعامل: په دې ډول تعامل کې د تیزابونو او القلیو تر منځ تعامل په نیغ ډول تر سره کیږي.



تعامل ښی لورې ته تر سره کیږي؛ خو په وړاندینې کچه به نه وي؛ د بیلگې په ډول: د اسیتیک اسید او امونیا تعامل:



په $0.1molar$ محلول کې تعامل 99.4% په ښي لوري ترسره کیږي.



دویم لوست

د درسي کتاب مخ: 103



د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د تيزابونو او د فلزونو تعامل
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د تيزابونو او فلزونو ترمنځ د تعامل لارې او ميخانيکيت دې زده کړي. - يقين دې ترلاسه کړي چې تيزابونه د فلزونو سره تعامل کوي او مالگې جوړوي. د تيزابونو دخواصو په پام کې نيولو سره دې ، هغوی دې د فلزونو بيلابيلو ډولونو سره تعامل ورکولای وشي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشير ، د فلزونو او د تيزابونو څو نمونې
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکني)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضري اخېستل، وخت په د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوست ارزونه . د انگېزې رامنځته کول : د معدې تيزاب څه رنگه کمېږي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه):		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي. - د تيزابونو او فلزونو د تعامل په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي او د تعاملونو څو معادلې وليکي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د تيزابونو او فلزونو د تعامل په اړه وړاندې کوي يادداشت او زده دې کړي. - څو تعاملونه دې زده کوونکي هم تر سره کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته .



8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

له فلزونو سره د تيزابونو تعاملونه: فعاله فلزونه د تيزابونو له محلولونو سره تعامل کوي، هايډروجن ازاد او مالګه جوړوي. بيلابيل تيزابونه له فلزونو سره يوشان تعامل نه کوي د مالګې تيزاب له فعاله فلزونو (هغه فلزونه چې منفي ارجاعي پوتنسيال لري) سره تعامل کوي، د کلورايد مالګې جوړوي او هايډروجن هم ازاده وي:





سلفوريک اسيد له فلزونو سره په دوو ميخانيکيتونو تعامل تر سره کوي:

1- د فلزونو سره د سور او رقيق سلفوريک اسيد تعامل: د دي تيزاب عمل دهايډروکلوريک اسيد په شان دی؛ يعنی له فعاله فلزونو (منفي پوتنسيال لرونکي) سره تعامل کوي، د سلفيتو مالګې جوړوي او هايډروجن ازادوي:




2- له فلزونو سره د تاوده او غليظ سلفوريک اسيد تعامل: تاوده او غليظ سلفوريک اسيد پرته له سرو زرو او پلاتين څخه له زياتو فلزونو سره تعامل کوي، د سلفيتو مالګې، سلفر ډای اکسايډ او اوبه جوړوي:





له فلزونو سره د نايټريک اسيد تعامل درې ډوله دی:



1- له فلزونو سره د غليظ نايټريک اسيد تعامل: دا ډول تيزاب پرته له سرو زرو او پلاتين څخه له نورو ټولو فلزونو سره تعامل کوي، د نايټريت مالګه، د NO_2 خرمایي رنگه ګاز او اوبه جوړوي:




2- د نري نايټريک اسيد تعامل له فلزونو سره: دا ډول تيزابونه پرته له سرو زرو او پلاتين څخه له ټولو فلزونو سره تعامل کوي، د نايټريت مالګې، د NO بې رنگه ګاز او اوبه جوړوي.



د ډيرو نريو نايټريک اسيد تعامل له فلزونو سره: دا ډول تيزابونه يوازې له فعالو فلزونو او هم له امونيا سره تعامل کوي، د امونيم نايټريت مالګه او اوبه جوړوي، د دي فلزونو بيلګې له او سپني، جست، کليسم او مګنيزيم څخه عبارت دي.





دریم لوست

د درسي کتاب مخ: 104


د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د تيزابونو او القليو د خنثی جوړونې تعاملونه او د مالگو جوړېدل
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د خنثی کولو تعاملونه دې د هغوی له میخانیکیت سره زده کړي. - یقین دې تر لاسه کړي چې تیزابونه او القلي یو له بل سره تعامل کوي، مالگې او اوبه جوړوي. - تیزابونه او القلي دې یو له بل سره تعامل ورکړي شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشیر د بیلابیلو تیزابو او القليو ډولونه
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهی او لیکنی)
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړنی فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخیستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: ایا کیدای شي چې تیزابونه د مالگې په واسطه خنثی کړل شي؟
1-6 د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي. - د خنثی کولو د تعاملونو او د هغوی د میخانیکیت په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. - د خنثی کولو تعاملونه دې د څو بیلګو په ورکولو سره روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیر شي، د هغوی مهم ټکې دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې د خنثی کولو د تعاملونو په اړه وړاندې کوي یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي د ورکړل شوو بیلګو په پام کې نیولو سره دې د مطلبونو په اړه زده کوونکي هم څو بیلګې ورکړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د فعالیت پوښتنو ته ځوابونه

1- که چیرې د شیرینۍ په پخولو کې د شیرینۍ شربت ($NaHCO_3$) زیات وي، نرمه شیرینۍ لاسته راځي، د شیرینۍ د شربت د لېروالي په صورت کې به سخته شیرینۍ تر لاسه شي.

2- د پورتنیو تعاملونو د معادلو لیکل:





8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

په معدې کې تیزابونه: د معدې عصاره (شیره) یو تیزابي محلول دی چې د معدې د مخاطي پوښ له غدو څخه ترشح کیږي، د معدې د عصاري (شیرې) pH له یو څخه تر دوو پورې دی چې د هغې غلظت 10 ځلی د لیمو له تیزاب څخه زیات دي، له همدې امله د کانگو (استفراق) خوند یې تیزابي او تیز دی.

هغه تیزاب چې د معدې له دیوالو څخه ترشح کیږي، د HCl له غښتلي تیزاب څخه عبارت دی چې د معدې د عصاري 5% برخه یې جوړه کړې ده چې وظیفه یې د بکتریاوو د ودې مخنیوی او د خوړو هضم دی. په معدې کې څه رنگه تیزاب جوړیږي؟

په لاندې شکل کې د انسان د معدې تصویر ښیي، د معدې شاوخوا د یو مخاطي پوښ په واسطه پوښولی شوی دی چې په هغه کې د وینې رگونه شتون لري، د انسان په بدن کې د موادو د سوځیدو وروستی محصول کاربن ډای اکساید دی چې له اوبو سره تعامل کوي، کاربونیکیک اسید جوړوي، د کاربونیکیک اسید د تفکیک په پایله کې د H^+ ایون جوړیږي:




پورتنۍ تعامل د وینې په پلازما کې ترسره کیږي، په دې صورت کې د H^+ ایون د انزایمونو په واسطه معدې ته لیږول کیږي، د منفي او مثبتو چارجونو د تعادل له کبله د Cl^- د ایونونو مساوي کچه هم د وینې له پلازما څخه معدې ته ځي، حجرې په معمولي ډول د نوموړو ایونونو وینې ته د بیرته تګ اجازت نه ورکوي.

د خوړو د موادو خوړل د معدې په دننه کې د H^+ د ایونونو د ترشح لامل کیږي، د دې ایونونو ډیره کمه برخه د معدې په شاوخوا کې پاتې کیږي او د وینو د بهیدو لامل ګرځي، په هر دقیقه کې د نیم میلیون په شاوخوا کې حجرې په معدې کې له منځه ځي او نوې حجرې جوړیږي، یوه سالمه معده په څه ناڅه ډول وروسته د هرو دریو ورځو په شاوخوا کې یوځل بیارغول کیږي، که چیرې د معدې د تیزابو کچه زیاته شي، د H^+ د ایونونو یوه کچه د وینې پلازما ته بیرته ګرځي چې ممکن د معدې د پوښ د راټولیدو لامل وګرځي چې درد، پړسوب او د وینې بهیدل رامنځته شي.

په عمومي توګه د معدې د ترشح کچه د خوړو د موادو په ډولونو او کچې پورې اړه لري کوم چې په معدې کې دننه کیږي، سره له دې چې د معدې عصاره په طبیعي ډول ډیره تیزابي ده؛ خو ډیر خوړل او عصبي کیدل د هغه د زیاتوالي لامل کیږي او د

هاضمې گلوویدل منځته راځي.


د معدې د تیزابونو او هایدروجن د ایونو د غلظت د کمولو یو لاره د انټی اسید (*Antiacides*) دواوو خوړل دي ، انټی اسیدونه د HCl یوه برخه خنثی کوي؛ د بیلگې په ډول :




لاندې جدول ځینې انټی اسیدونه ښيي:

د انټی اسید کیمیاوي نوم	سوداگرۍ نوم	فورمول
کلسیم کاربونیټ	<i>Alka-2</i>	$CaCO_3$
سودیم بای کاربونیټ	<i>Alka-seltzer</i>	$NaHCO_3$
مگنیزیم کاربونیټ	<i>Bufferin</i>	$MgCO_3$
مگنیزیم هایدروکساید	<i>Milk of magnesia</i>	$Mg(OH)_2$
دای هایدروکسی المونیم سودیم کاربونیټ	<i>Roloids</i>	$Al(OH)_2 NaCO_3$

په نوموړو تعاملونو کې د کاربن ډای اکساید د تولید کچه د معدې د دننه گازونو فشار زیاتوي او د ارګي کولو لامل کیږي، د مگنیزیم له مرکبونو څخه ګټه اخیستنه نورې ناروغۍ رامنځته کوي؛ نو له دې امله د هغوی د زیاتې ګټې اخیستنې څخه دې ځان و ساتل شي.





د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د القليو سره د عضوي تيزابونو تعامل ، خنثی جوړونه او تودوخه
2- د زده کړې موخې پوهنيزې ، ذهني او مهارتي		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - له القليو سره دې د عضوي تيزابونو تعامل ، خنثی کولو او د تودوخې منځ ته را تللو په هکله دې هر اړخيز معلومات ترلاسه او هم دې د هغوی د تعامل لارې زده کړي. - يقين دې ترلاسه کړي چې د عضوي تيزابونو او القليو تر منځ متقابل عمل شته دی او يو بل خنثی کوي. - په عملي توگه دې د عضوي تيزابونو تعامل د القليو سره تر سره کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير د تيزابونو او القليو بيلابيل ډولونه
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکني)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، وخت په دقیقه دقیقه د کورنۍ د نډې کتل او د تير لوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول : که چیرې په اسيتيک اسيد باندې لږ څه سوډيم هايډروکسايډ ورزيات شي، څه به وشي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د عضوي تيزابونو او د القليو د تعامل په هکله ، د خنثی کولو او تودوخې په اړه دې هر اړخيز معلومات ور کړي په تجربې بڼه دې هغوی ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د عضوي تيزابونو او القليو د تعاملونو، خنثی کيدو او تودوخې د توليد په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي . - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست د متن پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د عضوي تيزابونو کيمياوي خواص


د عضوي تيزابونو تعاملونه چې د هغوی په تيزابي گروپ پورې اړه لري، په دوو لارو ترسره کېږي، يوه لاره يې دا ده چې د هايډروجن او اکسيجن ($-O-H$) تر منځ اړيکه پرې او پروتون (H^+) توليد کېږي، بله دا چې د کاربن او اکسيجن ($C-O$) تر منځ اړيکه پرې شوي ده او $O-H$ جوړېږي، ځينې وخت د تيزابونو مشبوع هايډروکاربوني زنځير هم پرې کېږي او هم د غير مشبوع هايډروکاربونونو د زنځير جمعې تعاملونه هم ترسره کېږي:

د $O-H$ د اړيکې د پرې کيدو له امله تعاملونه


که چېرې د $-COOH$ گروپ د هايډروجن اتوم د H^+ د ايون په بڼه جلا شي، په پايله کې د مالگې انيون راځي چې د هغه په ترکيب کې تيزابي انيون شتون لري او د تيزابي انيون د $-Oic$ وروستاړی د هغه په مالگې کې د ate په وروستاړي تعويض کېږي او د تيزاب کلمه په بشپړ توگه لرې کېږي؛ د بيلگې په ډول: (CH_3COO^-) ايون د استيت په نوم ياديږي.

د مالگو جوړېدل

کاربوکسليک اسيدونه له فعالو فلزونو سره تعامل کوي، په پايله کې مالگې جوړې او H_2 ازاديږي:



carboxylic acid salt



formic acid sodium sodiumformate

مثال:

په ټاکلو شرايطو کې 48g مونو اسيد د مکنيزيم له فلز سره تعامل کوي چې 8.96L د هايډروجن گاز ازاديږي، د


کاربوکسليک اسيد ماليکولي فورمول به کوم وي؟

حل: د ازادشوي هايډروجن د مولونو کچه تر لاسه کوو:

$$1mol H_2 \quad 22.4L$$

$$n \quad 8.96L \quad n = \frac{1mol \quad 8.96L}{22.4L} = 0.4mol$$

د تعامل معادله په لاندې ډول ده:



$$2mol \quad 1mol H_2 \quad n = \frac{0.4mol \quad 2mol}{1mol} = 0.8mol$$

$$n \quad 0.4mol$$

څرنگه $n = \frac{m}{M}$ دی: نو لرو چې:

$$M = \frac{m}{n} = \frac{48g}{0.8mol}$$

$$M = 60g/mol$$

په دي صورت کې د نوموړي تيزاب فورمول عبارت دي له :

$$C_n H_{2n+1} COOH = 12n + 1 \cdot 2n + 1 + 12 + 32 + 1 = 60$$



$$14n = 60 - 46 = 14 \quad n = \frac{14}{14} = 1$$

$$n = 1 \quad CH_3COOH$$

نو د تيزاب فورمول له CH_3COOH څخه عبارت دی.

د عضوي تيزابونو د خنثی کولو تعاملونه


کاربوکسلیک اسیدونه د غیر عضوي تيزابونو په شان له القلیو سره تعامل کوي، مالګه او اوبه جوړوي. څرنګه چې عضوي تيزابونه کمزوري تيزابونه دي، له القلیو سره د هغوی تعامل، مالګه او اوبه جوړوي چې د همدې مالګې او د اوبو محلول د القلیو خواصو لري؛ ځکه دا مالګه د اوبو په واسطه هایدرولیز کېږي، کمزوری تيزاب او غښتلې القلي جوړېږي:



ایستریفیکشن (د ایستر جوړېدل)

د ایستریفیکشن په تعاملونو کې د تيزابونو د $-OH$ ګروپ د الکولو له H^+ سره یوځای کيزي چې اوبه جوړوي او د اسایل ګروپ $(R - \overset{O}{\underset{\text{C}}{\parallel}})$ د الکواکساید $(R - O -)$ ګروپ سره ایستر جوړوي، دا تعامل د سلفوریک اسید په شتون کې

چې د کتلست په توګه دنده لري، تر سره کېږي:





پنځم لوست

د درسي کتاب مخ: 106

د مطلوبونو سرليکونه		د مطلوبونو شرح
1- د لوست موضوع		تيتريشن، د تيتريشن معرفونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د تيتريشن او د تيتريشن د معرفونو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د تيتريشن د عمليې پر بنسټ، د اړتيا وړ مواد لاسته راغلي او د تيتريشن معرفونه د دې عمليې بشپړېدل وړښيي. - د تيتريشن عمليه دي په ښه توگه تر سره کړي او اړوند معرفونه دې په کار يو پلي شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشير، تيزابونه او اړوند معرفونه.
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکني)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضري اخېستل، وخت په دقیقه د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: که چيرې د فينول فتالين څو څاڅکې په 5 خالصو اوبو کې واچول شي، په اوبو کې به کوم بدلون وليدل شي ؟
1-6 : د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		وخت په دقیقه
د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه		40
- د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - تيتريشن او د تيتريشن دښودونکو (معرفونو) په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - د څو مثالونو په ورکولو دې تيتريشن او د تيتريشن معرفونه، زده کوونکو ته روښانه کړي . - د لوست د متن مفهوم زده کوونکو ته ورکړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د تيتريشن او د تيتريشن معرفونو په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ورکړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته .

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د تيزابونو - القليو انديکاتورونه


د تعادل ټکي له هغه ټکي څخه عبارت دی چې په محلول کې د ورزيات شوو OH^- مولونو شمير د H^+ د لومړنيو ايونونو له مولونو سره مساوي دی.

په تيتريشن کې د تعادل د ټکي د ټاکلو لپاره بايد پوه شو چې په کومه کچه القلي د فلاسک په دننه کې چې د تيزاب ټاکلې کچه په کې شتون لري د هغه دخشۍ کولو لپاره د بيوريت له لارې ورزياته شوي ده، دې موخې ته د رسيدلو لپاره يوه لاره د تيزاب - القلي د ښودونکو د محلول څوڅاڅکي اچول په هغه تيزاب کې دي کوم چې د القلي په واسطه تيتريشن کيږي.

په معمولي توگه يو ښودونکی کمزوری عضوي تيزاب او يا کمزورې عضوي القلي ده چې په ښکاره ډول د خپل ايونايژيشن او غير ايونايژيشن په بڼه بيلابيل رنگونه لري. دا دوه بڼې د هغه محلول په pH پورې اړه لري کوم چې په هغه کې ښودونکی (معرف) حل شوی دی، د تيتريشن د پای ټکي هغه وخت ليدل کيږي چې ښودونکی خپل رنگ ته بدلون ورکړي، په هر صورت ټول ښودونکي په عين pH کې رنگ نه بدلوي؛ نو له دې امله په ټاکلې تيتريشن کې د ښودونکي ټاکل له تيزاب - القلي خاصيت سره (کيدای شي قوي او کمزوری وي) کوم چې په تيتريشن کې په کار وړل کيږي، اړيکه لري. د تيتريشن په عمليه کې د صحيح معرفو په ټاکلو سره کولای شو د پای ټکي د تعادل د ټکي د ټاکلو لپاره په کار يوسو، دا مطلب به لاندې ووينو:

په دې ځای کې يو پروتوني تيزاب کوم چې په HIn ښودل شوی دی، وپه يې گورو:

د يو اغيزناک تيزابي ښودونکي HIn په مقابل کې د هغی مزدوجه القلی؛ يعنې In^- بايد په محلول کې ښکاره او روښانه رنگ ولري. د تيزاب ايونايژيشن په کوچنی انټروال کې په لاندې معادله کې گورو:



که چيرې ښودونکی منځنی تيزاب وي، د هغه تعادل دلي شاتليه له اصل سره سم کين لوري ته بدلون موندلی وي، د ښودونکي ښکاره او واضح رنگ ښيي چې HIn ايونايژيشن شوي نه دی، له بلې خوا په منځني قلوي محيط کې تعادل ښي لور ته بدلون کوي او د محلول رنگ د هغه له مزدوجې القلي (In^-) څخه سرچينه اخېستې ده. له جزئيات څخه په تيريدو سره کولای شو د لاندې غلطتونو له امله د انديکاتورو د رنگ وړاندوينه وکړو:

د تيزاب HIn رنگ روښانه دی: $\frac{[\text{HIn}]}{[\text{In}^-]} \geq 10$


د مزدوجې القلی $[\text{In}^-]$ رنگ روښانه دی: $\frac{[\text{HIn}]}{[\text{In}^-]} \geq 10$

که چيرې $[\text{HIn} \approx \text{In}^-]$ وي، د محلول رنگ د HIn او In^- د رنگونو له مخلوط څخه عبارت دی.

د يو ښودونکي د پای ټکي په يو ټاکلي pH کې نه ترسره کيږي؛ نو ديوه pH په چاپيريال کې به وي کوم چې دپای په ټکي کې ترسره کيږي. په عمل کې مونږ ښودونکي ټاکو چې د هغوی د پای د ټکي حدود د تيتريشن په منځني کې صعودي لوری ولري؛


نو د هغه معادل ټکی هم لوړ لوري لري، د دې پیچلتیا ښکاره والی به په دې کې وي چې د تعادل د ټکي ټیټ pH هغه وخت لیدل کیږي چې انډیکاتور (ښودونکی) خپل رنگ ته بدلون ورکوي، فینول فتالین د HCl او NaOH په تیتريشن کې ښه ښودونکی دی، فینول فتالین په تیزابي او خنثی محلول کې بې رنگه دی او په القلي محیط کې سور ارغواني رنگ خاڼته غوره کوي، ټاکنې ښيي چې فینول فتالین په $pH < 8.3$ بې رنگه دی؛ خو هغه وخت گلابي رنگ خاڼته غوره کوي چې $pH > 8.3$ وي.

خرنگه چې په لاندې شکل کې لیدل کیږي د pH د منحنی ټیټوالی د تعادل د ټکي په شاوخوا کې له دې امله دی چې د NaOH ور زیاته شوي ټیټه کچه (0.05mL) چې څه ناڅه د یو بیوریت د یوه څاڅکي له حجم سره معادل دی) د محلول د pH د لویو بدلونونو لامل کیږي. په رښتیا کوم شی چې ډیر مهم فکر کیږي، هغه د pH د منحنی د عمودي لوري ټیټوالی دی چې د پای ټکی ورښيي چې په هغه کې فینول فتالین له بې رنگ حالت څخه سور ارغواني رنگ ته بدلون مومي، په هر صورت دا ورښيي چې کیدای شي ښودونکی د تیتريشن د تعادل د ټکي د ټاکلو لپاره په کار یوړل شي.



شکل : د غښتلي القلي په واسطه د غښتلي تیزاب د تیتريشن منحنی، د میتایل رید او فینول فتالین د معرف په شتون کې. د تیزابونو او القلیو ډیر معرفونه په رنگه موادو کې پټ دي؛ د بیلگې په ډول: که چیرې سور رنگه کرم په وړو ټوټو تبدیل او په ایشیدلو اوبو کې یې واچوو، رنگه ځوښا به ترلاسه شي چې د دې ځوښا بیلابیل رنگونه دموادو په بیلابیلو pH کې لیدل کیږي.

په لاندې جدول کې د تیزابونو او القلیو د بیلابیلو ښودونکو نومونه لیکل شوي دي چې زیاتره د تیزابونو القلیو په تیتريشن کې په کار وړل کیږي او د هغوی ټاکل به په کارولو کې د تیتريشن شوو تیزابونو او القلیو په ځانګړتیاوو پورې اړه لري.



شکل: په محلولونو کې د ځینې انډیکاتورونو رنګونه

لڼ	رنګ		ښودونکي
	د القليو ښودونکي	د تيزابونو ښودونکي	
1.2-2.8	ژېر	ژېر	Thymol blue
0.3-6.4	بنفش	سور	Bromophenol blue
1.3-4.4	ژېر	نارنجي	Methyl orange
2.4-6.3	ژېر	سور	Methyl rede
4.8-6.4	سور	ژېر	Chlorophenol blue
6.0-7.6	اوبو بخن	ژېر	Bromothemol blue
7.2-8.8	سور	ژېر	Cresol red
8.3-10.0	ګلابي ته ورته	بي رنګه	Phenol phtalein



اووم خپرکی

د خپرکي موضوع : له کيمياوي تعاملونو څخه د برېښنا توليد

1- د تدريس وخت : 7 درسي ساعتونه

د درسي ساعتونه	د لوست سرليکونه	گڼه
يو درسي ساعت	د برېښنا تيروونکي او نه تيروونکي	1
يو درسي ساعت	کيمياوي تعاملونه چې د برېښنا د رامنځته کيدو لامل گرځي	2
يو درسي ساعت	کيميايي برېښنايي پيل	3
يو درسي ساعت	د پيل محرکه قوه، دستندرد الکترو د پوتنسيال	4
يو درسي ساعت	وچ اولانده پيلونه، د سوځيدو پيل، د پيل په ولتاژ باندې د غلظت اغيزې	5
يو درسي ساعت	د خپرکي لنډيز	6
يو درسي ساعت	د خپرکي تمرين	7

2- پوهنيزې موخې

- زده کوونکي دې پوه شي چې برېښنا څه ډول توليديږي او د برېښنا د توليد سرچېنې کومې دي.

- زده کوونکي دې درک کړي چې برېښنا د ننني صنعت او تمدن د پرمختگ لامل ده .

- زده کوونکي دې کيمياوي انرژي په برېښنايي انرژۍ باندې تبديل کړای شي .

3- د خپرکي پوښتنو ته ځوابونه

1- د الف - 6

2- ج - 7 ب

3- الف - 8




4- ج - 9 الف

5- ج - 10 د



11- ج

تشرېحي پوښتنو ته ځوابونه

د لومړۍ پوښتنې ځواب:



د دويمې پوښتنې حل:






د محرکه قوه د (1-7) جدول پر بنسټ $2\text{I}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{I}_2(\text{s}) + 2e^-$ د 0,49v ده.

د (1-7) جدول پر بنسټ د $2\text{I}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{I}_2(\text{s}) + 2e^-$ ارجاعي محرکه قوه 0,49v ده او Pd^{2+}/Pd , محرکه قوه 0,49V کيږي؛ نو پردي بنسټ د PdCl_4^{2-} هم 0,49v سره سمون لري، د پيل ولتاژ په لاندې ډول محاسبه کيږي:


$$E^\circ = E^\circ_{(\text{anode})} - E^\circ_{(\text{catode})} = -0.40V - (-0.49V) = 0.09V$$

د دريمې پوښتنې حل:



څرنگه چې ليدل کيږي C قوي ارجاع کوونکې ده؛ ځکه فلزونه په A/B/D ارجاع کوي، دا چې D د B^{n+} ايون په B ارجاع کوي؛ نو له دې امله وروسته له C څخه دويمه ارجاع کوونکې ده نو: $\text{C} > \text{D} > \text{A} > \text{B}$ ارجاعي خاصيت دی.

د څلورمې پوښتنې حل:



الف- د MnO_4^- او H_2O_2 د اکسید کيدلو خاصيت له pH سره تړون لري؛ څرنگه چې MnO_4^- په تيزابي محيط کې د ډير غوښتلې اکسید کوونکې خاصيت لرونکې دی او H_2O_2 به تيزابي يا القلي محيط pH کې اکسید کوونکې عمل کوي، په داسې حال کې چې O_2 , Cl_2 او F_2 په هر محيط کې اکسید کوونکې عمل تر سره کوي.

ب- MnO_4^- او H_2O_2 په تيزابي يا القلي pH کې ډير د اکسید کوونکې عمل تر سره کوي، ځکه په تيزابي محيط کې الکترونونه د اکسید شوي څخه ارجاع شوي ته ډير ليردول کيږي.

د پنځمې پوښتنې حل :


الف : هغه مواد چې Fe^{3+} په Fe تبدیلوي، خو Fe^{2+} په Fe نه شي ارجاع کولې، له هغه موادو څخه عبارت دي چې د هغوی ستنډرډ پوټنسیال په (1-7) جدول کې له 0.04 - څخه لوړ دي او د هغوی د ولتاژ علامه مثبت ده.

ب- هغه مواد چې Fe^{3+} په Fe^{2+} ارجاع کولی شي؛ خو Fe^{3+} په Fe نه شي ارجاع کولای، له هغه موادو څخه عبارت دي چې ولتاژ یې له 0.77V څخه ټیټ دی.


ج- څرنګه چې د Zn(s) ولتاژ د لوکوموتیف په جدول کې له Al^{3+} څخه ټیټ دی؛ نو له دې امله د هغوي تعویض پر یو بل په نشي تر سره کیدلی.
د- څرنګه چې په تیزابي محیط کې د Mn^{2+} ارجاعی خواص لږ دي؛ نو له دې امله $\text{O}_2(\text{g})$ په تیزابي محیط نه شي کولای ترڅو Mn^{2+} پر MnO_2 تبدیل کړي.

د شپږمې پوښتنې حل:

الف - د درسي کتاب له (1-7) جدول په لیدو سره، $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}(\text{1molar}) = 0,76\text{v}$ او د پیل د کتود برخې ولتاژ دي او $\text{Fe} = 0,44\text{v}$ $|\text{Fe}^{2+}(\text{1} \cdot 10^{-3} \text{molar})$ مساوي پر 0,76V - دی نو له دې امله لرو چې:



$$E^\circ = E^\circ_{(\text{anode})} - E^\circ_{(\text{catode})} = 0.76V - (-0.44V) = 12V$$



$$\text{Cu(s)} | \text{Cu}^{2+} = -0.52V$$


$$| \text{Cl}^{-} | \text{Cl}_2(\text{1atm})\text{Pt(s)} = 1.37V$$

$$E^\circ = E^\circ_{(\text{anode})} - E^\circ_{(\text{catode})} = -0.52V - (-1.37) = 0.85V$$


7- د درسي کتاب په (1-7) جدول کې د ټاکلې پوټنسیال په مرسته، د لاندې پیل ولتاژ محاسبه کړئ.

حل: د نوم وړې جدول څخه لرو چې $\text{Pt(s)} | \text{Fe}^{2+} | \text{Fe}^{3+} || \text{Cl}^{-} | \text{Cl}_2(\text{g}) | \text{Pt(s)}$ دی.

په (1-7) جدول کې نیمه ارجاعي تعامل او د ارجاع معیاري پوټنسیالونه ټاکل شوي دي، که چیرې د اکسیدیشن د نیمګړي تعامل معادله په کار وړل شوی وي، نو د هغه اړوند معیاري پوټنسیال علامه بدلون کوي:




لاسته راغلې پوټنسیال چې $E^0 = -0.182V$ دی چې غلط دی:



$$E^0 = E^0_{\text{catode}} - E^0_{\text{anode}} = 1.33V - 0.77V = 0.59V \quad \text{په پیل کې:}$$

8- د هغه پیل E° پیدا کړئ چې لاندې تعامل په هغه کې تر سره شوی دی:



حل: د (1-7) جدول څخه په ګټه اخیستنه لرو چې:

$$E^0 \text{Mg}^{2+} / \text{Mg} = -2.37V \quad E^0 \text{Fe}^{2+} / \text{Fe} = -0.44V$$

$$E^0 \text{Ag}^{+} / \text{Ag} = +0.7V$$

الف:

$$E^0 = E^0_{\text{catode}} - E^0_{\text{anode}} = -0.44V - (-2.37V)$$

$$E^0 = +1.93V$$

ب:

$$E^0 = E^0_{\text{catode}} - E^0_{\text{anode}} = +0.8V - (-0.44V)$$

$$E^0 = +1.24V$$

9- د (7-1) جدول څخه په گټه اخیستنه وړاندوینه وکړئ چې د HNO_3 یو مولر محلول کولای د سروزره فلز په ځان کې حل کړي او Cu^{3+} تولید کړي:


حل: د HNO_3 د اکسیدیشن نیمه تعامل به لاندې ډول دي:



د سروزره نیکرې تعامل په لاندې ډول دی:




د پورتنۍ د نیمه تعاملونو د معادلو مجموعه، په حجرو کې د تعامل تر سره کیدل ورنښي:



$$E^0 = 0.96V - 1.50V = -0.544V$$

له هغه ځای څخه چې E^0 منفي ده نو د تعامل محصول په معیار شرایطو کې نه ترلاسه کېږي؛ یعنې د سروزره فلز د شورې د تیزابو په یو مولره محلول کې نه حلېږي او Au^{3+} لاسته نه راځي.



لومړۍ لوست

د درسي کتاب مخ: 114

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح	
1- د لوست موضوع		د برېښنا تیروونکي اونه تیروونکي	
2- د زده کړي موخې:		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي:	
- پوهنيزې		- د برېښنا تیروونکو او د برېښنا نه تیروونکو په اړه دې هر اړخیز معلومات ولري.	
- ذهني		- یقین دې تر لاسه کړي چې جسمونه د برېښنايي تیروني له کبله په تیروونکو او نه تیروونکو ویشل شوي دي.	
- مهارتي		- تیروونکي او نه تیروونکي جسمونه دې یوله بل څخه توپیر کړای شي.	
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي	
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشیر هادي او غیر هادي جسمونه او دالکترو لایز دستگاه	
5- د ارزوني میتود		شفاهي او لیکنۍ پوښتنې او ځوابونه	
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړي فعالیتونه		لوړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، دحاضري اخيستل د کورنۍ دندې کتل او د تیرلوسټ ارزونه.	وخت په دقیقه
		د انگیزې رامنځته کول: ولې د برېښنا مزي د رږ په واسطه پوښوي؟	5
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیموزده کړه او ارزونه)		د زده کوونکي د زده کړي فعالیتونه	وخت په دقیقه
- د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي.		- د ښوونکي څرګندونو ته دې څیړشي، د هغوی مهم ټکې دې یادداشت او په پام کې ولري.	40
- د برېښنا د تیروونکو او نه تیروونکو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي.		- هغه معلومات چې ښوونکي یې د برېښنا تیروونکو او برېښنا نه تیروونکو په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي.	
- د برېښنا تیروونکې او نه تیروونکې جسمونه دې د څو بیلګو په واسطه زده کوونکو ته وروپېژني.		- هغه بیلګې چې ښوونکي یې د برېښنا تیروونکو او نه تیروونکو جسمونو په اړه وړاندې کوي، یادداشت او د هغوی په هکله دې خپله هم څو بیلګې وړاندې کړي.	
- د لوست مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.		- د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.	
- لوست دې د څو پوښتنو په کولوسره و ارزوي		- کورنو دنده دې ترسره کړي.	
- زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.			

7- د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت

- 1- په الکتروډونوکې د آیونونو حرکت په آیونونو پورې اړه لري ، داسې چې مثبت آیونونه دکتودلورته حرکت کوي او منفي آیونونه دانود په لور حرکت کوي .
- 2- لومړي ډول تیروونکي : هغه تیروونکي دي چې ازاد الکترونونه لري او د برېښنا بهیر له ځان څخه نرم او یو شان تیروي ، د هغوی بیلگې کیدای شي د فلزونو مزي (سیمونه) ورکړل شي .
- 3- دویم ډول تیروونکي : هغه تیروونکي دي چې د برېښنا بهیر د ویلې او یا د آیوني محلول په حالت کې له ځان څخه تیروي ، دا ډول تیروونکي چې د برېښنا بهیر د محلول په شکل له ځان څخه د تیروي ، د الکترولیت په نوم هم یادوي .
- 4- بنېښه ، رېر او نور نه تیروونکي (عایق) جسمونه دي ، مسي ، المونیمي او نور مزي (سیمونه) د لومړي ډول تیروونکي دي ، دخوړو مالګي ، دگوګرو تیزاب او د نورو موادو اوبلن محلولونه دویم ډول تیروونکي دي .

8- دښوونکي لپاره اړین معلومات

مواد له اتومونو څخه جوړ شوي دي او هر اتوم ټاکلي او ځانګړي الکترونونو لري ، څرنگه چې برېښنايي انرژي له الکترونونو څخه لاس ته راځي ؛نو له دې امله شوني ده چې کیمیاوي انرژي په برېښنايي او دهغې په برعکس بدلون ومومي .

د الکتروشمي تاریخچه

دګالواني (Luigi Galvani) په نوم عالم غوښتل چې د چوڼګښې جوړښت روښانه کړي ، په دې وخت کې یو بل مطلب ته یې پام شو ، چوڼګښه یې دهغه میز په سر چې په هغه کې یوه برېښنايي وسیله ځای په ځای شوي وه ، خوشې کړه ،دلته په ناڅاپه ډول چا دبرېښنا دستگاه روښانه کړه ، په داسې حال کې چې د جراحي چاقود چوڼګښې د ملا د تیر په عصب کې ایښودل شوی وو ، د چوڼګښې د پښو ټولې عضلي ماهیچې راټولې شوي وې او دا عمل څو واري تکرار شو ، دا ناڅاپي را تولیدنه چې عصبي هیجانونو ته ورته وه ، نوموړی عالم یې د برېښنا جریان د ولتايي پیل په جوړولو بریالی کړ ،ګالواني هغه قوه چې د چوڼګښې د پښو د عضلو د راټولیدو لامل شوي وه ، د حیواني برېښنا په نوم یاده کړه .

د الکساندرو جیوسپي انتونواناستازیوولتا (Alessandro Guhspepe Antonio Anastasio Volta)ایټالیوي عالم په (1745-1827) کال کې دګالواني مخالف و ، نوموړي پوه هڅه وکړه چې ترڅو حیواني برېښنايي تیوري رد کړي ، د دې هڅو په ترڅ کې ولتايي پیل اختراع شو ، د برېښنا د جریان د اندازه کولو واحد د نوموړي عالم په ویاړ د ولت په نوم یاد شوی دی . ولتاچې د فزیک د استاد په توګه د پاوا (pava) په پوهنتون کې دنده درلودله ، دګالواني تجربه یې تکرار کړه ، د ولتا د ویلو په بنسټ ددوو ورته فلزونو له منځ څخه د برېښنا جریان تیریدل چې دچوڼګښې د پښو د غوښو چې د لنډه بل په واسطه سره نښتې وي ، په ناڅاپي توګه د چوڼګښې د پښو د عضلو د راټولیدو لامل شوی دی ، په دې توګه نوموړي پوه لومړي ځل لپاره ثابته کړه چې د برېښنا بهیر له کیمیاوي تعاملونو څخه منځته راځي . ولتا په 1799 میلادي کال کې یو عمودي پیل جوړکړ چې د جست – مس د الکترونونو یا دجست - سپینوزرو څخه جوړشوی وه . له یو بل څخه د فلزي الکتروډونو د جلاکولو لپاره یې د هغو په منځ کې کاغذي پانې چې د مالګو په محلول کې غوټه شوي وي ، کیښودې ، دا دستگاه د ولتايي پیل

(voltaic pile) په نوم ياديږي چې د نننيو قلوي پيلونو پلار دی.




مايکل فرادي (M.Faraday) چې 1868 کال کې دبرېښنا د کيميا په هکله ډيري څيړنې کړې دي ، په لاندې ډول دي:

- 1 - د الکترومقناطيسي القا کشف چې د هغه په واسطه د برېښنا د توليد لومړي مولدونه او موتورونه جوړ شول.
- 2 - د الکترومقناطيسي بنسټيزو قوا نينو کشف
- 3 - په مقناطيسي ساحه کې د قطبي شوو رڼاوو د حرکت د بدلون کشف
- 4 - د پارا مقناطيسي او ديا مقناطيسي خواصو کشف ،

بيکرل: انتوان کيسر بکرل (Antione Cesar Becquerel) (1878 – 1788) له مبالغې څخه پرته د برېښنا د کيميا د علم پلار بلل شوی دی، نوموړي د برېښنا کيميا په لومړنيو څيړنو کې وموندله چې که چېرې دوه پلاټيني الکتروډونه په يوتيزابي محلول کې کيږدو ، د برېښنا نه غوښتونکی جريان توليديږي.

په 1829 کال کې ، کله چې يوې ثابتې تيزاب – قلوي حجري يو ثابت جريان د يوساعت په موده کې په گالوانومتر کې وروښود، بکرل لومړنی ثابت (Constant Current) روښانه کړ او وروسته له هغه ، انگرېزي کيميا پوه د بکرل کرڼه بشپړه کړه .

دانيل: جان فريډريک دانيل (John Frederic Daniell) په 1839 ميلادي کال کې د خپلې تجربې د فلزونو د ويلې کولو په هکله له هغې بترۍ په مرسته چې له اوبو (70) حجرو څخه جوړه شوي وه ، ترسره کړې، نوموړي هغه نيغ جريان چې له ماورای بنفش وړانگو څخه جوړ شوی و ، توليد کړ چې دهغه سترگوته يې هم زيان ورسوه ،د نوموړي دکار پايلو وښودله چې د فلزونو آيونونه د فلزونو له اکسايډونو څخه د فلز - مالګې د محلول په الکتروليز کې (هغه لوبڼی چې د فلزي تيغې او مثبتو فلزي آيونونو لرونکی دی) دبرېښنا جريان ښه تيروي.



دویم لوست

د درسي کتاب مخ: 115

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		کيمياوي تعاملونه چې د برېښنا د را منځته کيدو لامل گرځي
2- د زده کړي موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د کيمياوي تعاملونو ، د برېښنا توليدونکو په اړه هر اړخيز معلومات وړاندې کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې له Redox کيمياوي تعاملونو پرته برېښنا نه توليديږي - د کيمياوي تعاملونو پر بنسټ دې کيمياوي انرژي په برېښنايي انرژۍ تبديله کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه ، نمایشي ، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب ، قلم ، تخته ، تابشیر او موډلونه
5- د ارزوني میتود :		شفاهي او ليکني ، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړي فعالیتونه		لومړني فعالیتونه : دسلام ورکول ، د احوال پوښتنه ، دحاضري اخيستل ، د کورنۍ دندې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگیزې رامنځته کول : ولې ستاسې موبایل پرته له بترۍ نه فعالیږي ؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيموزده کړه او ارزونه)		د زده کوونکي د زده کړي فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تختې برخ وليکي.		د ښوونکي څرگندونو ته دې څیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري.
د کيمياوي تعاملونو په اړه چې د برېښنا د توليد لامل گرځي توضیحات دې ورکړي او دا رنگه تعاملونه دې د څو بیلگو په ورکولو سره روښانه کړي.		- هغه معلومات چې ښوونکی یې د هغو کيمياوي تعاملونو په اړه چې د برېښنا د توليد لامل گرځي، ورکوي، یادداشت او زده دې کړي . - هغه بیلگې چې ښوونکی یې وړاندې کوي، یادداشت او خپله دې هم څو بیلگې ورکړي
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ورکړي.		د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي . د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.
د لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره وارزوي		کورنۍ دنده دې ترسره کوي .
د زده کوونکو ته دې کورني دنده ورکړي .		

7- د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت



په دې تعامل کې کلسیم ارجاع کوونکی دی چې کلورین یې ارجاع کړی دی، نوله دې امله کلورین اکسیدي کوونکی دی.

8- دښوونکي لپاره اړین معلومات

د عنصرنو د اکسیدیشن درجه

د کیمیاوي عنصرنو د ولانسونو په واسطه کیدای شي د کیمیاوي عنصرنو د اړیکو د جوړولو د وړتیا په اړه پوه شي (او یا دا چې په ډیره لوړه معنا د هغوی د وړتیا کچه د کیمیاوي اړیکو په جوړیدو کې درک کړل شي). د ولانس کمیت، د کیمیاوي اړیکو رقمونه ټاکي چې د اتومونو په واسطه تشکیل شوي دي، ولانسونه د اتومونو د الکترونیګاتیوټي د کمیت په توګه چې له ټاکلو اتومونو سره اړیکه ولري، نه شمیرل کېږي اومثبت (+) یا (-) علامه نه لري، ځکه ولانس په مالیکولونو کې د اړیکو شمیرټاکي؛ خو په مرکبونو کې هغه الکترونونه چې کیمیاوي اړیکې جوړه وي، په لوړو الکترونیګاتیوټي اتومونو باندې ځای نیسي او په پایله کې دا اتوم ټاکلی چارج تر لاسه کوي، په دې ترتیب په دې تصور د عنصرنو د اکسیدیشن درجه روښانه او څرګندېږي. په مالیکولونو کې د اتوم د اکسیدیشن درجه په واسطه د ټاکلې اتوم بریښنايي چارج په الکترونیګاتیف عنصر باندې د ولانسي الکترونونو د ځای پرځای کیدلو له امله رامنځته کېږي، د دې ډول شرایطو پر بنسټ وړاندوینه کېږي چې په مالیکول او یا په آیونونو کې د اړیکو د الکترونونو جوړې په ډیر الکترونیګاتیف اتوم پورې اړه لري. د اتوم د اکسیدیشن درجه په (+) او (-) علامو ښودل کېږي، مثبت علامه دهغو الکترونونو له کچې سره سمون لري چې له هغه څخه جلا شوي دي او د منفي اکسیدیشن درجه دهغو الکترونونو کمیت ورښيي چې دعنصر له اتوم سره یو ځای شوي دي.

د اتومونو د اکسیدیشن درجه د ټاکلولپاره په ازاد حالت (عنصري) او په کیمیاوي مرکبونو کې د جدول الکترونیګاتیوټي ځانګړتیا او لاندې موارد دښوونکو په توګه کارول کیدای شي.

1- داکسیجن اتومونه په مرکبونو کې کولای شي د تام او کسري عددو اکسیدیشن درجه له ځانه وروښيي؛ د بیلګې په ډول: د اکسیجن د اکسیدیشن درجه په زیاتره مرکبونو کې -2 ده، په H_2O_2 کې -1، په KO_2 او KO_3 کې په وار سره $-\frac{1}{2}$ او $-\frac{1}{3}$ ده، د اکسي فلوراید په مرکب کې د اکسیجن د اکسیدیشن درجه +2 ده، په ټاکلي ډول په کیمیاوي مرکبونو کې هایدروجن د اکسیدیشن درجه +1 ده؛ خو د فعالو فلزونو په هایدرایدونو (Hydride Metals) کې د هغه د اکسیدیشن درجه -1 ده.

2- د ساده مرکبونو په آیونونو کې د اتومونو د اکسیدیشن مجموعي درجه د هغو د بریښنايي چارج له کمیت او علامې سره مساوي ده؛ د بیلګې په ډول: د HPO_4^{2-} ایون دچارج علامه او کمیت تر لاسه کېږي:

$$+1 + (+5) + (-2 \cdot 4) = 2 -$$

3- که چېرې مالیکول د کوولانټ اړیکې په بڼه او یا د ایوني - کوولانسي اړیکې په بڼه جوړ شوی وي؛ د بیلګې په ډول: $HNO_3, NH_4NO_2, NH_4NO_3, NH_3$ ، د غښتلي الکترونیګاتیف اتوم د اکسیدیشن درجه په (-) علامه او د کمزوري

الکترونیگاتیف خاصیت لرونکو اتومونو په (+) علامه ښودل کیږي. د مرکبونو له لړۍ (سلسلې) څخه د ټاکلو عنصرونو د اکسیدیشن د درجې د پوهیدو لپاره په کارده ترڅو د غوښتل شوي مرکب گرافیکي فورمول ولیکل شي، په نایتروجن لرونکو مرکبونو $NH_3, NH_4OH, HNO_2, HNO_3$ او N_2H_4 کې د نایتروجن د اکسیدیشن درجه په وار سره $-3, -3, +3, +5$ او -2 ده چې د اکسیدیشن دا درجې دهغوی په جوړښتي فورمول کې لیدل کیږي، د عین عنصر (N_2H_4) د اتومونو تر منځ د کیمیاوي اړیکو په شتون کې د هغو الکترونونو جوړې چې هغوی یې سره تړلي دي، د جوړه الکترونونو ویش ترسره کیږي او بیا د هر اټوم د الکترونونو محاسبه ترسره کیږي.

4- هغه مالیکولونه چې د عین عنصر له اتومونو څخه جوړ شوي وي (لکه: N_2, Br_2, Cl_2, H_2 اونور)، د دې عنصرونو د اتومونو د اکسیدیشن درجه د هغوی په مالیکولونو کې صفر ده؛ ځکه دهغوی په مالیکول کې د دې اتومونو تر منځ د الکتروني جذب قوه شتون نه لري او ګډ الکترونونه د دواړو اتومونو د هستو تر منځ شتون لري؛ د بیلګې په ډول: دهایدروجن په مالیکول ($H:H$) کې او کلورین په مالیکول ($Cl:Cl$) کې د اکسیدیشن درجه صفر ده؛ خو د هغوی covalence (کوولانسی) د جوړه الکترونونو د کمیت په پام کې نیولو سره له یوه سره سمون لري.

5- په زیاتو عضوي مرکبونو کې کیمیاوي اړیکې کمزورې قطبي ځانګړتیا لري، د کاربن د اټوم یو ځای کیدل له نورو اتومونو سره؛ د بیلګې په ډول: له فلورین، اکسیجن، کلورین، نایتروجن او نور چې د عضوي مرکبونو په سکلیټ کې شتون ولري، د کاربن او دنوموړو عنصرونو د اتومونو تر منځ د الکتروني پوتنسیال د بدلونو لامل کیږي او د هغوی پولارتي (قطییت) د هغوی تر منځ د اړیکو په جوړیدو کې زیاتېږي، د اتومونو د اکسیدیشن درجه په هغوی کې د قطبي کوولانسی مرکبونو په شان ده.


6- فلزونه په ازاد عنصری حالت کې دخپلې هستې په شاوخوا کې د منظم الکتروني کثافت د ویش لرونکي دي، له دې امله د هغوی د اکسیدیشن درجه صفر منل شوي ده.

7- په آیون کې د ټولو اتومونو د اکسیدیشن د درجې الجبري مجموعه له آیون د چارج سره مساوي ده او د اتومونو د اکسیدیشن د درجو الجبري مجموعه چې د خنثی مرکبونو په جوړیدو کې برخه لري، صفر ده.

8- په کامپلکس مرکبونو کې تل د مرکزي اټوم د اکسیدیشن درجه ټاکل کیږي؛ د بیلګې په ډول: $K_2[Fe(ScN)_5]$ ، $[Ni(NH_3)_5]SO_4$ په مرکبونو کې په وار سره د اوسپنې د اکسیدیشن درجه $+3$ او د نیکل د اکسیدیشن درجه $+2$ ده. د یادولو وړ ده چې د اکسیدیشن د درجې پوهه په ظاهري بڼه را څرګنده شوي ده او تل د غوښتلې اټوم رښتیاڼی حالت په مرکب کې نه شي ښودلی. په ډیرو حالتونو کې د اکسیدیشن درجه د ټاکلي عنصر له ولانس سره مساوي نه ده؛ د بیلګې په ډول: په Methane (CH_4)، فارمیک اسید ($HCOOH$)، میتانول ($CH_3 - OH$)، فارم الډیهایډ (CH_2O) (او کاربن ډای اکسایډ (CO_2)) د کاربن د اتومونو د اکسیدیشن درجه په وار سره $+2, +4, -2, 0$ او $+4$ ده چې له هغوی سره یو ځای په ټولو پورتنیو نوموړو مرکبونو کې د کاربن د اټوم ولانس 4 دی، په ځانګړي ډول د اکسیدیشن درجې د اکسیدیشن - ریدکشن تعاملاتو په مطالعه کې په هراړخیز ډول د ګټې اخیستنې لاندې نیول کیږي.

لاندې جدول د ځنو عنصرنو الکترونیګوتی وړنې:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I	2	3	4	5	6	7	8
H 2,1							
Li 1	Be 1,5	B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0	
Na 0,9	Mg 1,2	Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	
K 0,8	Ca 1,0	Sc 1,3	Ti 1,3	As 2,11	Cr 1,6	Mn 1,6	
Pb 0,8	Zn 1,6	Ga 1,6	Gc 2,0	Nb 1,7	Sc 2,4	Br 2,8	Fe Co Ni 1,6 1,7 1,8
Ag 1,9	Sr 1,0	Y 1,3	Zr 1,5	Sb 1,8	Te 2,1	I 2,6	
Cs 0,75	Cd 1,7	In 1,7	Hf 1,4	-	-	-	Rn Rh Pd 2,0 2,1 2,1
Fr 0,7	Ba 0,9 Hg 1,8 Ra 0,9	La 1,2	Pb 1,6	Bi 1,8	Po 2,3	At 2,2	Os Ir Pt 2,1 2,1 2,1



دریم لوست

د درسي کتاب مخ: 116

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		کيميايي برېښنايي پیل
2- د زده کړي موخې :		له زده کونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي: - د برېښنايي پیلونو په اړه دې هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي . - یقین دې ترلاسه کړي چې پیلونه د برېښنا مولد دي . - له پیلونو څخه دې برېښنا لاسته را وړلی شي .
3- د تدریس میتودونه		مناقشه ، نمایشي ، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب ، قلم ، تخته ، تباشیر او موډلونه
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی ، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه : دسلام ورکول ، د احوال پوښتنه ، دحاضري اخيستل د کورنۍ دندې کتل او د تیرلوست ارزونه . د انگیزې رامنځته کول: آیا کیمیايي برېښنايي پیل مولدلی دی ؟
وخت په دقیقه		5
1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کونکو د زده کړې فعالیتونه
وخت په دقیقه		40
د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي .		- د ښوونکي څرګندونو ته دې څیړشي، د هغوی مهم ټکې دې یادداشت او په پام کې ولري.
د کیمیايي برېښنايي د پیل په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي او دهغوي ډولونه دې د مثالونو سره روښانه کړي		- هغه معلومات چې ښوونکي یې د کیمیاوي برېښنايي پیلونو په اړه وړاندې کوي یادداشت او زده دې کړي.
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته وښايي.		- د ښوونکي وړاندې شوو مثالونو په پام کې نیولو سره دې زده کوونکي هم په دې اړه معلومات ورکړي.
لوست دې دڅو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.		- د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي .
زده کوونکو ته دې کورني دنده ورکړي .		- د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي .
		- زده کوونکي دې کورنۍ دنده ترسره کړي.




7- د لوست د متن د پوښتنو ته ځوابونه



د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8- دښوونکي لپاره اړين معلومات

څرنگه چې د لسم ټولگي په کيمياکې يادونه شوې ده، د اکسیديشن - ريډکشن په يو تعامل کې الکترونونه د اکسیديشن شوي له خوا ارجاع شوي خواته لېږدول کېږي، په يو ريډکشن تعامل کې د بريښنا د توليد دڅرنگوالي د درک لپاره MnO_4^- او Fe^{2+} تر منځ تعامل ترڅېړنې لاندې نيسو:




په پورتنۍ تعامل کې Fe^{2+} اکسیدي او MnO_4^- ارجاع شوی دی، د دې مطلب دښه روښانه کولو په خاطر د هغوی د تعامل نیمگړې معادلې لیکو:



څرنگه چې پورته لیدل کېږي، د بایلل شوو او اخیستل شوو الکترونونو د مساوي کولو لپاره د اکسیديشن د تعامل له نیمگړې معادله سره د 5 عدد ضرب شوی دی.

که چېرې MnO_4^- او Fe^{2+} دواړه په يو محلول کې شتون ولري، د هغوی د ټکرونو په پایله کې له MnO_4^- څخه الکترونونه Fe^{2+} ته لېږدول کېږي، دلته هغه انرژي چې د تعامل په پایله کې لاسته راځي، په تودوخې بدلون مومي او گټور کار نه تر سره کېږي. څه رنگه کیدای شي چې دا انرژي په گټورکار بدلون ومومي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی، که چېرې اکسیدي کوونکي له ارجاع کوونکي څخه جلا شي، انرژي په گټورکار بدلون مومي، په دې صورت کې اړه ده تر څو د ارجاع کوونکي د باندېني قشر الکترونونه اکسیدي کوونکي ته ولېږدول شي، په دې حالت کې بريښنايي جریان چې د الکترونونو له حرکت څخه په سیم (مزي) کې تولیدېږي، په نیغه توگه د يو بريښنايي وسیلې له منځ څخه؛ د بیلگې په ډول: د بريښنا له موتور څخه تیرېږي او کار ترسره کېږي، لاندې شکل په پام کې ونيسي.



شکل: بريښنايي جریان

له پورتنۍ تعامل سره سم الکترونونه کولای شي چې په مزو کې جریان ومومي او Fe^{2+} څخه MnO_4^- ته ولېږدول شي، کله چې دستگاه له لاندې شکل سم وتړل شي، د الکترونونو بهیر نه لیدل کېږي، ولې؟ دپام وړ لیدنې ښيي، کله چې د لاندې

دستگاه دوه بیلابیلې برخې د یو سیم په واسطه یوه له بلې سره یو ځای شي، شیبیز جریان تړل کیږي او بیا درېږي، لامل یې دا دی چې الکترونونه بیرته د دستگاه له کینې برخې څخه بنی برخې ته خوځي، د الکترونونو کثافت په بنی برخې کې ډیر او منفي چارج یې زیاتېږي، خود دستگاه کینه برخه مثبت چارج ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په دې شرایطو کې د الکترونونو بهیر لا ترسره شي، انرژي ته اړتیا ده؛ نو له دې امله د الکترونونو بهیر په چټکۍ سره درېږي؛ خو دا ستونزه په اسانۍ سره حل کیږي، داسې چې باید د دواړو لوبښو محلولونه یو له بل سره اړیکه ولري ترڅو د دوو محلولونو تر منځ د آیونونو ورکړه او راکړه ترسره شي او محلولونه د دستگاه په دواړو خواوو کې خنثی وي، د دواړو محلولونو تر منځ اړیکه د مالګې په پل (Salt bridge) (د u په شان لوله چې دهغې په منځ کې یوه الکترولیته ماده شته ده) تړل کیږي، لاندې شکل وګوري:




شکل: د دوو محلولونو په منځ کې اړیکې د شبکه لرونکي یو مالګین پل Salt bridge په واسطه

په دواړو لارو، پرته له دې چې محلولونو سره مخلوط شي، د دواړو محلولونو تر منځ آیونونه بهیر پیدا کوي. کله چې د آیونونو تر منځ اړیکه تړل کیږي، څرخ بشپړېږي، الکترونونه له اکسیدي شوي څخه ارجاع شوي ته بهیر مومي او دا الکترونونه له یو محلول څخه بل محلول ته ځي ترڅو چې محلولونه خنثی وي.

د پورتنیو نوموړو ځانګړتیاوو سره جوړه شوي دستگاه، یوه الکتروشیمي حجره د ګالوانی له ډولونو څخه ده چې کیمیاوي انرژي په بریښنايي انرژي تبدیلوي او هغه حجره چې بریښنايي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلوي، د الکترولیز حجرې په نوم یادېږي چې په اتم څپرکي کې مطالعه کیږي.

هغه تعاملونه چې په یوه الکتروشیمیاوي حجره کې ترسره کیږي، د محلولونو او الکتروډونو د لګیدو په ځای کې دي، په دې معنا چې په همدې ځای کې د الکترونونو لیږدونه ترسره کیږي، هغه الکتروډ چې په هغه کې د اکسیدیشن عملیه ترسره کیږي د انود په نوم یادېږي او هغه الکتروډ چې په هغه کې د ارجاع کیدو عملیه ترسره کیږي، د کتود په نوم یادېږي.



خلورم لوست

د درسي کتاب مخ: 117

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د پيل محرکه قوه ، دستنرد الکترو پوتنسيال
2- د زده کړي موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي. - د پيل محرکه قوه ، د ستندرد الکترو پوتنسيال دې زده کړي . - يقين دې ترلاسه کړي چې د برېښنايي چارج لېږدونه په يوه برېښنايي ساحه کې د کار له سرته رسولو سره يوځای ده . - د برېښنا د ټاکلې کچې په واسطه دې د ترسره شوي کار کچه محاسبه کړای شي .
3- د تدريس میتودونه		مناقشه ، نمایشي ، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب ، قلم ، تخته ، تباشير ، الکترو لیتونه ، الکترو دونه او د برېښنا سرچېنې
5- د ارزوني میتود		شفاهي او ليکني ، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړي فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول ، د احوال پوښتنه ، دحاضری وخت په دقیقه اخيستل، د کورنۍ دندې کتل او د تیرلوست ارزونه . د انگیزې رامنځته کول : برېښنايي کار څه شی دی ؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکي د زده کړي فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي . د پيل د برېښنايي محرکې قوې ، د ستندرد الکترو د پوتنسيال په اړه دې هر اړخيز معلومات وړاندې او د کار د ترسره کيدو ميخانيکيت دې روښانه کړي. $W=q.v$ فورمول دې زده کوونکو ته روښانه کړي. لوست دې د څو پوښتنو په کولوسره و ارزوي . زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکې دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د پيل د محرکې قوې ، د ستندرد الکترو د پوتنسيال په اړه وړاندې کوي يادداشت اوزده دې کړي . ($W=q.v$) فورمول په بنسټ دې د برېښنا کار ترلاسه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ورکړي. د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي کورنۍ دنده دې ترسره کوي.

7- د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8- دښوونکي لپاره اړين معلومات

د حجرې الکتروموتور قوه (Cell potential)


دگالواني حجرې یوه برخه له ارجاع کیدونکي څخه جوړه شوې ده چې الکترونونه له هغه ارجاع کوونکي څخه کوم چې د حجرې په بله برخه کې ځای لري، خپل خواته کش کوي، هغه قوه چې دالکترونونو د بهیر لامل په څرخې کې کېږي، د حجرې د پوتنسیال یا (E_{Cell}) یا د الکتروموتور قوې (Electromotor force) په نوم یادېږي، د برېښنا د پوتنسیال واحد په ولټ (volt) ټاکل کېږي، یو ولټ د یو ژول کار معادل دی چې د برېښنا اندازه د یو کولمب (coulomb) په کچه الکترون له انود څخه کتود ته لېږدول وي.

څه رنگه کیدای شي چې د حجرې پوتنسیال وټاکل شي؟


د حجرې د پوتنسیال د کچې د ټاکلو له لارو څخه یوه یې هم له ولټ متر څخه گټه اخیستنه ده چې له یو ټاکلي مقاومت څخه د برېښنا د جریان د تیریدلو له امله کار ترسره کوي، که چېرې برېښنا له ولټ متر څخه تیره شي، د حجرې د انرژۍ یوه برخه د اصطکاک په واسطه په تودوخې تبدیلېږي او له منځه ځي. له دې امله د معمولي ولټ متر د حجرې پوتنسیال دهغې له واقعي پوتنسیال څخه ټیټ ښیي، د دې ستونزې د حل لاره به دا وي چې باید د حجرې پوتنسیال مخکې له دې څخه چې د برېښنا بهیر له هغه څخه تیر نه شي، وټاکل شي.

نوي ولټ مترونه، یومخ لري چې د بیلابیلو ولتاژونو په واسطه کوم چې له باندنيو سرچینو (د حجرې د پوتنسیال د لورې خلاف) څخه قوه تر لاسه کوي، درجه بندۍ شوی دی.

هغه ولتاژ (چې پوتنسیومتر نومېږي) چې دا دستگاه ښیي، داسې تنظیم شوی دی چې باید هیڅ جریان له څرخې (دوران) څخه تیر نشي. په دې حالت کې د حجرې پوتنسیال د کچې له لحاظ معادل دي؛ خو د لوري له کبله په پوتنسیومتري کې خلاف ښودل شوی دی او دا کچه د حجرې د واقعي پوتنسیال معادل ده، په اوسني وخت کې دیجیټالي ولټ مترونه طرحه شوي دي چې ډیره لږه اندازه هم را ښیي او کار هم د دوی په واسطه په اسانۍ تر سره کېږي:



شکل: دیجیټلي ولټ متر



پنځم لوست

د درسي کتاب مخ: 123

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		وچ او لاندې پیلونه ، د سوځیدو پیل ، د پیل په ولتاژ د غلظت اغیزې.
2- د زده کړې موخې		له زده کونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - دو چو اولندو پیلونو ، د سوځیدو پیل او د پیل په ولتاژ باندې د غلظت داغیزې په اړه دې هر اړه خیز معلومات ورکړي - یقین دې تر لاسه کړي چې وچ او لاندې پیلونه ، د سوځیدو پیل او نور پیلونه د ننني صنعت بنسټ جوړه وي . - له پیلونو څخه دې سمه گټه و اخیستلی شي .
3- د تدریس میتودونه		مناقشه ، نمایشي ، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب ، قلم ، تخته ، تباشیر او د پیلونو بیلابیل ډولونه .
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکني پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول ، د احوال پوښتنه ، د حاضري وخت په دقیقه اخیستل د کورنۍ دندې کتل او د تیرلوست ارزونه دانگیزې رامنځته کول: د موبایلونو فعالیت د کومو سرچینو په بنسټ ولاړ دی؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه د مفاهیمو زده کړه او ارزونه		د زده کوونکي د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي		د ښوونکي څرگندونو ته دې ځیر شي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري.
د وچو اولندو پیلونو ، د سوځیدو پیل او د پیل په ولتاژ باندې د غلظت د اغیزې په اړه دې هراړه خیز معلومات ورکړي.		د وچو اولندو پیلونو ، د سوځیدو پیل او د پیل په ولتاژ باندې د غلظت د اغیزو په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي.
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي		د هغه بیلگې چې ښوونکی ورکوي ، زده کوونکي دې هغه زده کړي.
لوست د څو پوښتنو په طرحه کولو سره وارزوي		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي او کورنۍ دنده دې ترسره کړي.
زده کوونکو ته دې کورني دنده ورکړي .		


7- د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8- دښوونکي لپاره اړين معلومات


د حجرې په پوتنسيال باندې د غلظت اغيزه

د يوو لسم ټولگي په درسي کتاب کې په معياري شرايطو کې حجره روښانه شوې ده ، دلته په پوتنسيال کې د غلظت اغيزه څيړل کيږي . په معياري شرايطو کې (په معياري شرايطو کې غلظتونه يو مولر دي) اړوند تعامل په لاندې حجره کې په پام کې نيسو:





دلته د حجرې پوتنسيال $1.37V$ دی، که چيرې د (Ce^{4+}) غلظت له يو مول څخه زيات وي ، د حجرې پوتنسيال به څومره وي؟ د (Ce^{4+}) د غلظت په زياتوالي، د تعامل د محصول د ډيرو منځته راتلو لامل گرځي او په پايله کې د حجرې د الکترونونو د هڅولو قوه (Electro motor force) زياتيږي او د حجرې پوتنسيال هم زياتيږي، د بله خوا له محصولاتو څخه د کوم يوې زياتوالی $(\text{Cu}^{2+}/\text{Ce}^{4+})$ د تعامل د پرمختگ خنډ گرځي؛ نوله دې امله د حجرې پوتنسيال ټيټيږي چې لاندې بيلگه دامطلب ښه روښانه کوي.

مثال : په حجرې تعاملونو کې په پوتنسيال باندې د غلظت د اغيزو څيړل:



څيړنه وکړئ چې آیا په لاندې پيلونو کې $\varepsilon^{\circ}_{\text{Cell}}$ له $\varepsilon^{\circ}_{\text{Cell}}$ څخه لوی او يا کوچنی دی؟




ځواب : الف - له محصولاتو څخه د يوه دغلظت زياتوالی د يو مولر په کچه، د تعامل د پرمختگ لامل گرځي؛ نوله دې

امله به $\varepsilon^{\circ}_{\text{Cell}}$ له $\varepsilon^{\circ}_{\text{Cell}}$ څخه لږوي ($\varepsilon_{\text{Cell}} < 0.47$)

ب- د تعامل کوونکو څخه د يوه د غلظت زياتوالي، د يو مولر په کچه، د غلظت د پرمختگ عامل کيږي؛ نو له دې

امله $\varepsilon^{\circ}_{\text{Cell}}$ له $\varepsilon^{\circ}_{\text{Cell}}$ څخه به ډيروي ($\varepsilon_{\text{Cell}} > 0.47$) .



اتم خپرکی

موضوع: برېښنايي تجزيه د تدريس وخت: 7 درسي ساعتونه

گڼه	د لوست سرليک	درسي ساعتونه
1	الکتروليتيکي پيلونه، د ويلې شوې خوړو مالګې الکتروليز	يو درسي ساعت
2	په اوبلنو چاپېريالونو کې د الکتروليز تعاملونه	يو درسي ساعت
3	د خوړو مالګې الکتروليز	يو درسي ساعت
4	د سلفوريک اسيد د محلول الکتروليز	يو درسي ساعت
5	د ځمکې لاندې فلزي کتودونو ساتنه او ملمع کول	يو درسي ساعت
6	د الکتروليز مقداري قانون يادفاري قانون، تخليص (نگه کول، راپستنه او د فلزونو توليد	يو درسي ساعت
7	د څپرکي لنډيز او پوښتنې	يو درسي ساعت

2. د څپرکي ښوونيزې موخې:

- زده کوونکي دې د برېښنايي تجزيې (الکتروليز) په اړه هر اړخيز معلومات ترلاسه کړي او په کارولو دې پوه شي.
- زده کوونکي دې درک کړي چې برېښنايي تجزيه (الکتروليز) ډېر اهميت لري او د ټکنالوژۍ د پرمختګ عامل ده.
- زده کوونکي بايد د برېښنايي تجزيې (الکتروليز) په مرسته فلزونه ملمع (پوښ) کړای شي او د اړتيا وړ مواد دې د الکتروليز په مرسته لاس ته راوړي شي.


3. د څپرکي د پوښتنو ځوابونه

1- الف، 2- ب، 3- الف، 4- ج، 5- الف، 6- الف، 7- الف، 8- ج، 9- د

د تشرېحي پوښتنو ځوابونه

1- د لاندې مثال سره کيدای شي لومړۍ پوښتنې ته ځواب ورکړل شي:

د تودوخې په 801°C درجه کې د خوړو د مالګې بلوري شبکه په ويلي کېدو پيل کوي او د ويلې کېدو د عمليې تر پايه پورې تودوخه په خپل حال پاتې کېږي. د سوديم کلورايد ويلې شوي بڼه په ښه توګه د برېښنا تېرېدو ته اجازت ورکوي؛ که چېرې د اوسپنې په يوه لوبښي کې کاربني الکتروډ د انود په توګه کېښودل شي او د لوبښي فلز د کتود په توګه وکارول شي، که د هغوی په منځ ويلې شوې مالګه شتون ولري؛ نوکه دلته انود او کتود د برېښنايي جريان سرچينې سره وصل شي، د سوديم ايون (Na^+) کتود او د کلورين (Cl^-) ايون د انود خواته ځي. د سوديم ايونونه د لوبښي د اوسپنې له دېوال څخه چې کتود دی، الکترون اخلي او د سوديم په اتومونو بدلون مومي چې په ژېړ رنگه برېښنايي وړانګو د بخړکوبه بڼه راڅرګندېږي، دغه وړانګې د سوديم او اکسيجن د تعامل په پايله کې رامنځ ته کېږي؛ د بېلګې په توګه: د خوړو د مالګې له الکتروليز څخه په 800°C تودوخې په شاوخوا کې د کلورين د ګاز او د سوديم د فلز ويلې شوی حالت د لاندې معادلې سره سم استحصالېږي:



ددې پر بنسټ ویلای شو چې:





الف- مثبت ایونونه د کتود خواته او منفي ایونونه د انود خواته ځي.

ب- په کتود کې ارجاعي تعاملونه او په انود کې اکسیدېشن تعاملونه ترسره کېږي.

ج- له انود څخه الکترونونه وځي او په کتود کې الکترونونه دننه کېږي.

2- د MgCl_2 د مالګې ویلې شوې بڼه په لاندې ډول ټوټه کېږي، د انود او کتود خواته جریان مومي:

الف:





ب: د ویلې شوې MgCl_2 له الکترولیز څخه د کلورین ګاز او فلزي مګنیزیم لاسته راځي، په داسې حال کې چې د دې مالګې د

محلول له الکترولیز څخه القلي محیط منځته راځي چې د کلورین ګاز او د $\text{Mg}(\text{OH})_2$ محلول لاسته راځي.


3- که چېرې KBr الکترولیز شي، په کتود کې د پوتاشیم فلز او په انود کې برومین Br_2 تر لاسه کېږي.

د $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ د مالګې له الکترولیز څخه، په انود کې د لاندې دوه اکسیدېشن تعاملونو امکان شته دی:




دا چې د ترمودینامیک له نظره، د اوبو د اکسیدېشن تعامل له NO_3^- سره په اسانۍ تر سره کېږي او باید اکسیجن تولید شي؛ خو

برعکس HNO_3 لاسته راځي؛ ځکه په الکترونو کې تعاملونه په ډیره لوړه سطحه پیچلی دي:



4- لاندی شکل ته پام وکړئ، ځواب ووايئ چې په حجره کې کوم تعاملونه تر سره کېږي؟





حل: څرنگه چې په شکل کې لیدل کېږي، نا خالصه مواد چې مس هم په هغوی کې شتون لري، په انود کې شتون لري، د الکترولیز د عملیې په تر سره کیدلو سره، نا خالصه مواد د کوچینو ذرو او یا یونونو په بڼه الکترولیت محلول ته د ننه کېږي او مس چې دهغه خالص کیدل یې موخه ده، پر هغه کتود چې ورسره یوشان دی، رسوب کوي. د کاپرسلفیت تیزابي محلول د الکترولیت په توګه کارول شوی دی.



5- ځواب: کله چې الکتروډ د جامد سرب بروماید په مالګه کې د ننه کېږي، برېښنا جریان نه رامنځ ته کېږي او ګروپ هم نه روښانه کېږي؛ ځکه د سرب بروماید دوهم ډول تیرونکې دی، په ویلې شوي او یا اوبلن محلول په حالت کې د برېښنا تیرونکې دی، د هغه ایونونه او الکترونونه په دې حالتونو کې د حرکت په حال کې نه دي.

6- د خوړو مالګې الکترولیز.


د خوړو د مالګې په الکترولیز کې، په انود کې دوه د اکسیدیشن تعاملونه په لاندې ډول شوني دي:





د ترمودینامیک پر بنسټ د اوبو د اکسیدیشن تعامل له Cl^- اکسیدیشن څخه په آسانی تر سره کېږي او باید اکسیجن منځته راشي؛ خو برخلاف کلورین آزادېږي؛ ځکه د الکتروډونو تعامل ډیر پیچلی دي:




په 801°C تودوخه کې د خوړو مالګې بلوري شبکه په ولیکیدو پیل کوي او د ولیکیدو د عملیې تر پایه تودوخه ثابته پاتېږي. د خوړو ویلي شوي مالګه په ښه توګه د برېښنا جریان ته د تریدو اجازه ورکوي. که چېرې د الکترولیز فلزي لوښي الکتروډ کاربوني میله د انود په توګه شتون ولري او د لوښي فلز د کتود په توګه وکارول شي او د هغو تر منځ ولي شوي د خوړو مالګه ځای پر ځای شي، که کتود او انود د برېښنا سرچینې سره ونښلول شي د سودیم آیون Na^+ به کتود او د کلورین آیون (Cl^-) به انود ته ولاړشي، د سودیم ایونونه له فلزي کتود څخه الکترونونه تر لاسه او په فلزي سودیم بدلون نومي او د برېښنايي جرقه به په زیر رنګ معلوم شي، دا وړانګي د سودیم او د اکسیجن تعامل له امله منځ ته راځي؛ د بلګې په توګه: له ویلي شوي خوړو مالګې (8000°C په تودوخې په شاوخوا) څخه د کلورین ګاز او د سودیم فلز د لاندې معادلې سره سم تر لاسه کوي.



7- د $\text{Na}^+, \text{Sn}^{2+}, \text{Cl}^-, \text{SO}_4^{2-}$ ایونونه د انود او پلاتینې کتود پر منځ کې الکترولیز کېږي، د برښنا د جریان له تیریدو څخه به دا لاندې کوم تعامل تر سره شي؟
حل:



د اتم سوال حل: د ایوډین ایون (I^-) یو مولره محلول د الکترولیز په بهیر کې دا لاندې محصولونه جوړېږي:



$$m_1, m_2, m_3 = ?$$

$$q = I \cdot t$$

$$I = 15\text{Am}$$

$$q = 15\text{Am} \cdot 3600\text{sec} = 54000\text{cb} = 0.56\text{f} \quad \text{9-}$$

$$t = 1\text{h} = 3600\text{sec}$$

$$q = ?$$

$$1\text{f} - 29.5\text{g} \quad m_1 = \frac{29.5\text{g} \cdot 0.56\text{f}}{1\text{f}} = 16.52\text{g} \quad \text{الف -}$$

$$0.56\text{f} - m_1 \quad 1\text{f} - 254\text{g} \quad m_2 = \frac{254\text{g} \cdot 0.56\text{f}}{1\text{f}} = 14.1986\text{g} \quad \text{ب -}$$

$$0.56\text{f} - m_2 \quad 1\text{f} - 9.33\text{g} \quad m_3 = \frac{9.3\text{g} \cdot 0.56\text{f}}{1\text{f}} = 5.225\text{g} \quad \text{ج -}$$

$$0.56\text{f} - m_3$$

-10

$$V = ?$$

$$V = h \cdot s = 50\text{cm}^2 \cdot 0.01\text{cm} = 0.5\text{cm}^3$$

$$h = 0.1\text{mm}$$

$$s = 50\text{cm}^2$$

$$q = I \cdot t = 0.050\text{mA} \cdot 271080\text{sec} = 13554\text{cb} = 0.14\text{f}$$

$$I = 50\text{mA}$$

$$t = 75.3\text{h} = 271980\text{sec}$$

$$1\text{f} - 31.7\text{g} \quad m = \frac{0.14\text{f} \cdot 31.7\text{g}}{1\text{f}} = 4.453\text{g}$$


$$q = ?$$

$$0.14\text{f} - m$$

$$m = ?$$

$$d = \frac{m}{V} = \frac{4.453\text{g}}{0.5\text{cm}^3} = 8.91\text{g/cm}^3$$

$$d = ?$$



لومړی لوست

د درسي کتاب مخ: 130

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو تشرېح
1- د لوست موضوع		الکترولیټیکي پیلونه، د خوړو د مالګې د ویلې کېدو الکترولیز
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هېله کېږي چې د لوست ورکولو په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي: - د الکترولیټیکي پیلونو د کار په څرنگوالي او د خوړو د مالګې د ویلې کېدو په الکترولیز باندې دې پوه شي. • یقین دې ترلاسه کړي چې الکترولیټیکي پیلونو او د خوړو د مالګې د ویلې کېدو الکترولیز حیاتي مواد دي. • د الکترولیټیکي پیلونو او د خوړو د مالګې د ویلې کېدو د الکترولیز څخه دې کار واخلي.
3- د تدریس مېتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي بېلابېل ډولونه
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او د پیلونو بیلابیل ډولونه
5- د ارزونې مېتود		شفاهي او لیکني پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: سلام اچول، د حال پوښتنه، حاضري اخېستل، دکورنۍ دندې کتل، د تېر لوست پوښتنه، د تېر او نوي لوست ترمنځ ارتباط ورکول. د انگېزې را منځ ته کول: که سوډیم ته اړتیا وي، څه باید وکړل شي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه:
وخت په دقیقه	40	- د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د الکترولیټیکي پیلونو او د خوړو د مالګې د ویلې کېدو د الکترولیز په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - هغه تجربې چې ښوونکی یې د الکترولیټیکي پیلونو او د خوړو د مالګې د ویلې کېدو د الکترولیز په اړه ترسره کوي، یادداشت او دوی دې هم ترسره کړي. - د ښوونکي پوښتنې ځواب او کورنۍ دنده دې ترسره کړي.



7. د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8. د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د الکترولیز د دستگاه ځانګړتیاوې

یوه دستگاه د لاندې شکل سره سمه عیاره او په هغې کې ولت متر د برېښنا د جریان په لوری ږدو، مولده دستگاه کېدای شي پایښت لرونکی ولتاژ ولري؛ خو د $0V$ او $6V$ په انټروال کې ولتاژ تولید وي. په دې صورت کې غواړو د دستگاه د تجربې ځانګړتیاوې $I = f(u)$ لاس ته راوړو. تر هغې پورې چې د u محرکه قوه له $1.8V$ څخه کمه وي، د الکترولیز په لوبښي کې ځک نه لیدل کېږي او د جریان شدت په څرخه کې نه ترسترګو کېږي، که چېرې ولتاژ لوړ ($E' \geq 1.8V$) کېږي، هغه ته د دننې مقاومت محرکه قوه ویل کېږي. له څرخې څخه د برېښنا د جریان شدت له تېریدو له امله د اکسیجن او هایدروجن ځک په کتود او انود کې ترسترګو کېږي.

د تېرې شوي برېښنايي جریان شدت وروسته له $E' > 1.8V$ څخه په خطي بڼه له عمودي محور سره د 75° زاوې ته نږدې زیاتېږي، د لاندې شکل سره سم د U محرکه قوه د الکتروډونو په څوکو کې $U = E' + rl$ ده:



I هغه وخت خنثی کېږي چې $U = E'$ مساوي شي، په دې حالت کې په دستگاه کې $U = E' = 1.8V$ وي؛ یعنې محرکه قوه له $1.8V$ باید ډېره وي ترڅو د دستگاه دننې مقاومت صفر شي، اوس دغه محرکه قوه د پوتانشیل له نورمال جوړو سره پرتله کوو:

$$\varepsilon = \varepsilon^\circ(O_2 / H_2O) = \varepsilon(H_3O^+ / H_2O) = 1.23V$$

$$U > E' = 1.23V$$


په ټول الکترولیز سپستمونو کې عمومي قاعده داسې ده چې له دوو الکتروډونو سره وصل شوې محرکه قوه تل باید له هغو جوړو له پوتانشیل سره یوشان یا ډېره وي کوم چې په الکتروډونو کې اکسیدي یا ارجاع کېږي، په دې ځانګړي حالت کې (د سلفوریک اسید د محلول په الکترولیز کې) ددې دواړو ترمنځ توپیر په انود کې د اوبو د اکسیدېشن تعامل د ورو کېدو له امله

$$n = E' - \varepsilon \cong (O_2 / H_2O) = \varepsilon(H_3O^+ / H_2O) = 1.23V \quad \text{دی:}$$


په دې فورمول کې n اضافي ولتاژ (overvoltage) دی.

خه ناخه د سمندر د اوبو 2.7% برخه سوديم کلوراید جوړه کړې ده. په صنعت کې سوديم د برېښنايي تجزيې له لارې د ډانز په پیل (Dawn's-cell) کې ترلاسه کوي، د ډانز پیل یو الکترونيکي پیل دی چې د لومړي ځل لپاره په 1921 کال کې د دوپونت (DuPont) شرکت له خوا جوړ او د کارولو وړ وگرځېد، په دغه پیل کې د گرافيتي انود او د اوسپنې کتود په مرسته خالص فلزي سوديم تر لاسه کوي.


د سوديم فلز په ازاد ډول په طبیعت کې نه موندل کېږي؛ خو د هغه بېلابېل کيمياوي مرکبونه په طبیعت کې استحصال شوي دي. سوديم په مرکبونو کې د Na^+ په څېر شتون لري او دغه څېړنې ښيي چې سوديم یو فعال عنصر دی او بېلابېل تعاملونه ترسره کولای شي. ځاني تعامل په چټکۍ سره ترسره کوي او اکسېدېشن کېږي او د $[Na^+]$ په ايون باندې اوږي؛ ددې له مخې د سوديم د فلز د لاس ته راوړلو لپاره پکار ده چې ډېره انرژي مصرف شي؛ د بېلگې په توگه که چېرې زمونږ موخه د $NaCl$ څخه د سوديم د فلز لاسته راوړل وي، باید لاندې تعامل د هغې معکوس لوري ته په خپل سر ترسره شي.




څېړنو ښودلې ده چې د $NaCl$ د توبوخي تجزيې پروسې لپاره د ډېرې تودوخې شتون ته اړتیا ده چې کېدای شي د $4267^\circ C$ (د ځمکې د کرې د بهرنۍ طبقې له تودوخې څخه لږ) په شاوخوا کې وي، ښکاره ده چې ددې درجې تودوخې برابرول نه شونی دی. د سوديم د تولید لپاره د ویلي شوي سوديم کلوراید د الکترولیز یوه ښه لاره ده. د ډانز په پیل کې ترسره شوي تعاملونه په لاندې ډول روښانه کېږي:



د سوديم د صنعتي تولید په پروسه کې کلورین گاز هم په لاس راځي، خالص سوديم کلوراید ($NaCl$) $801^\circ C$ کې ویلي کېږي، د $CaCl_2$ ورزیاتول د هغه د ویلي کیدو دتودوخې درجه کابو $587^\circ C$ ته راټیټېږي:





دویم لوست

د درسي کتاب مخ: 132

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو تشرېح
1. د لوست موضوع		په اوبلنو محيط کې د الکترولیز تعاملونه
2. د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هېله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي: - د الکترولیتيکي پیلونو او د خوړو د مالګې د ویلې کېدو د الکترولیز په اړه دې معلومات ترلاسه کړي. - یقین دې ترلاسه کړي چې الکترولیتيکي پیلونه او د خوړو د مالګې د ویلې کېدو الکترولیز په صنعت کې بنسټیز رول لري. - د موادو د الکترولیز له لارې دې خپل د اړتیا وړ شيان ترلاسه کړای شي.
3. د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4. د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او د الکترولیز پیلونو بېلابېل ډولونه
5. د ارزونې میتود		شفاهي او لیکنی پوښتنې او ځوابونه
6. په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: سلام اچول، د حال پوښتنه، حاضري اخېستل، د وخت په دقیقه کې کورنۍ دندې کتل، د تېر لوست پوښتنه، د تېر او نوي لوست تر منځ اړیکه تړل. د انگېزې را منځ ته کول: ایا پرته له مالګې څخه اوبه به الکترولیز شي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. - دخوړو د مالګې د ویلې شوې ښې الکترولیز دې د څو بیلګو په ورکولو سره روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو وازروي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیر شي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د خوړو د مالګې د ویلې شوي ښې د الکترولیز په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - هغه بیلګې چې ښوونکی یې د مالګې د ویلې شوي ښې د الکترولیز په اړه وړاندې کوي، یادداشت دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي او کورنۍ دنده دې ترسره کړي.

7. د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د درس په متن کې سؤال نه شته دی.


8. د ښوونکي لپاره اړین معلومات

په اوبلو محلولونو کې الکترولیز تعاملونه



د اوبلو محلولونو په الکترولیز کې، نه شي کیدای ترڅو په کتود او انود کې د تعاملونو وړاندوینه وکړل شي؛ ځکه د اوبو په مالیکولونو کې کېدای شي د اکسېدېشن او رېډکشن تعاملونه تر سره شي؛ د بېلګې په توګه: که چېرې د پوتاشیم نایټرېټ اوبلن محلول الکترولیز شي، د الکترولیز محصول به د هایدروجن او اکسېجن ګاز وي. څرنگه چې په شکل کې لیدل کېږي، اوبه په کتود کې ارجاع کېږي:




په انود کې اوبه اکسیدې کېږي:




که چېرې د انود او کتود په نږدې خواو کې د اسید - قلوي له ښودونکو څخه کار واخېستل شي، درنګونو بدلون رابښي چې د کتود د شاوخوا محلول قلوي او د انود د شاوخوا محلول تېزابي دی چې د اوبو د الکترولیز له امله یې دا ځانګړتیا ترلاسه کړې ده. کله چې په کار ده ترڅو د لاسه ورکړل شو او د اخېستل شوو الکترونونو شمیر سره مساوي شي، په کتود کې ارجاعي تعامل د انود د تعامل په پرتله چې د اکسېدېشن تعامل دی، دوه برابره وي:





د دوو نیمګړو تعاملونو د جمعې په حاصل کې، د اوبو د مالیکول ضریبونه سره جمع کېږي:



د اوبو د الکترولیز مجموعي تعامل په لاندې ډول دی:





کېدای شي پوښتنه رامنځ ته شي چې په دې تعامل کې د پوتاشیم نایټرېټ ونډه څه ده؟ ځکه د NO_3^- او K^+ په ایونونو کې کوم بدلون نه ترسترګو کېږي. د اوبو په جوړېدو کېدو کې د هایدروجن او اکسېجن ترکیبي تعامل په خپل سر تعاملونو څخه دی چې د ازادې انرژۍ په کمیدو سره ترسره کېږي؛ نو له دې امله له دغو محصولاتو څخه د سون په حجره کې د برېښنا د تولید لپاره کار اخېستل کېږي؛ خو د هغه معکوس تعامل په خپل سر نه ترسره کېږي، یوازې د الکترولیز په حجره کې د برېښنا د جریان په واسطه ترسره کیدل یې شونی دی:





باید یادونه وشي چې پورتنی پوتانشیلونه د H^+ په یو مولره محلول کې د انود او د OH^- په یو مولره محلول کې د کتود د شتون د فرض کولو پر بنسټ لاس ته راغلي دي. (په خالصو اوبو کې $[OH^-] = [H^+] = 10^{-7}$ دی). د حجرې وروستی محصول $2,067V -$ دی.

په عمل کې، که چېرې د الکترولیز حجرې پلاتیني الکتروډونه د برېښنا د منبع لوړ ولتاژ؛ د بېلګې په توګه: $6V$ بطري سره هم وصل شي، کوم تعامل به ونه لیدل شي؛ ځکه خالصې اوبه په ډېره لږه کچه ټوټه کېږي، د برېښنا جریان لږ تېروي او لږ اکسیدي یا ارجاع کېږي؛ له دې امله معلومېږي چې KNO_3 په نوموړي الکترولیز کې اړونده دنده لري. د KNO_3 (یا دکوم بل الکترولیټ) شتون په محلول کې د الکتروډونو شاوخوا د برېښنا له لحاظه خنثی ساتي. که چېرې په الکترولیز کې KNO_3 شتون نه درلود، د کتود پر شاوخوا به H^+ او د انود پر شاوخوا به OH^- را چاپېره شوی وای او مثبت ایونونه به په کتود او منفي ایونونه به په انود کې شتون نه درلود، د اوبو الکترولیز به ناشونی وای. کله چې KNO_3 په اوبو کې حلېږي، د K^+ ایونونه کتود ته ځي او هلته د اوبو له الکترولیز څخه حاصل شوي OH^- سره یوځای کېږي، همدارنګه د NO_3^- ایونونه هم د انود خواته ځي او د H^+ له ایونونو سره یوځای کېږي، په دې حالت کې د یوشان چارجونو کمیت د محلول په ټولو برخو کې شتون لري. د الکترولیز د تعاملونو د پایلې وړاندوینه یو ستونزمن کار دی؛ ځکه تعاملونه د الکتروډونو پر سطحه باندې ډېر پېچلې دي؛ په ځانګړې توګه په داسې حالت کې چې د تعامل محصول هم اکسیجن وي او هم هایدروجن وي. تعامل په الکتروډونو کې لاهم پېچلی دی؛ د بېلګې په توګه: د $NaCl$ په الکترولیز کې، کېدای شي په انود کې دوه ډوله لاندې اکسیدیشن تعاملونه ترسره شي:





د ترمودینامیک (د تعامل $\Delta G'$ په پام کې نیول) له نظره د اوبو اکسیدېشن د Cl^- له اکسیدېشن څخه ساده دی، داسې اټکل کېږي چې د اکسیجن ګاز به جوړ شي؛ خو د تعامل د پېچلتیا له کبله په الکتروډونو کې د کلورین ګاز جوړېږي (که چېرې د $NaCl$ محلول ټینګ وي)؛ ددې پر بنسټ که چېرې د ترمودینامیک له نظره په انود کې د تعامل محصول اکسیجن وي، د تعامل دا عامل نه راڅرګندېږي؛ ځکه کېدای شي نور پېچلي تعاملونه ترسره شي:




د خوړو د مالګې د ټینګ (غلیظ) محلول الکترولیز په صنعت کې ډېر کارول کېږي.

څرنګه چې وویل شول، په الکتروډونو کې د تعاملونو وړاندوینه ستونزمنه ده؛ خو د الکترولیز د تجربې اطلاعاتو پر بنسټ کېدای شي د بلې مالګې د تعامل د الکترولیز په اړه وړاندوینه وکړل شي؛ د بېلګې په توګه: کله چې د $CuBr_2$ محلول الکترولیز کېږي، د مسو فلز د کتود دپاسه رسوب کوي او د انود د شاوخوا محلول ځانته ژېړ- نارنجي رنګ غوره کوي، دغه لیدنې څرګندوي چې د مسو فلز په کتود کې ارجاع شوی دی او د بروماید ایونونه په انود کې اکسیدي کېږي:






په حجره کې تعامل په لاندې ډول دی:



د يوه ځانگړي ايون عمل په محلول کې، د الکترولیز په حجره کې د اکسېدېشن - رېډکشن په عمل کې، د ايونونو د توليد له اصلي سرچينې سره کومه اړيکه نلري، که چېرې مو د $CuBr_2$ الکترولیز محلول پېژندلی وي، کيدای شي د هغو محلولونو د الکترولیز وړاندوينه وکړل شي کوم چې د Cu^{++} يا $2Br^{-}$ ايونو درلودونکی وي. څرنگه چې په کتود کې Cu^{++} ارجاع شوی او $2Br^{-}$ په انود کې اکسیدې کېږي؛ له دې امله د بلې هرې يوې مالگې ايونونه په پورتنۍ بڼه ارجاع او رېډکشن شي.



دریم لوست درسي کتاب مخ: 134



د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو تشریح
1- د لوست موضوع		د خوړو د مالگې الکترولیز
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هېله کېږي چې د لوست ورکولو په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي: - د مالگو د الکترولیز کولو په لارو دې پوه شي. - یقین دې ترلاسه کړي چې مالگې او په ځانگړې توگه د خوړو مالگه الکترولیز شوې ده او په خپلو لومړنیو موادو تجزیه کېږي. - د خوړو مالگه دې الکترولیز کړای شي او د هغې اجزاوې دې لاس ته راوړي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او د خوړو مالگه او د الکترولیز حجره
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکني، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولگي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: سلام اچول، د حال پوښتنه، حاضری اخېستل، د کورنۍ وخت دندې کتل، د تېر لوست ارزونه. د انگېزې را منځ ته کول: د خوړو مالگه د برېښنا جریان تېرولای شي او که نه؟ دندې دقیقه 5
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. - د خوړو د مالگې د الکترولیز په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. - د بېلابېلو مالگو د الکترولیز څو بیلگې دې ورکړي. - د لوست متن دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دېد څو پوښتنو کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې څیړشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې دخوړو د مالگې د الکترولیز په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - هغه بیلگې چې ښوونکي یې د مالگو د الکترولیز په اړه وړاندې کوي، زده دې کړي. - د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنې ته دې ځواب ورکړي. - کورنۍ دنده دې ترسره کړي.

7. د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه


فعالیت:

د پوتاشیم نایترېټ او د خوړو د مالګې د الکترولیز له پایلو څخه ګټه اخیستنه، د $Cu(NO_3)_2$ الکترولیز د تعامل د محصول وړاندوینه وکړئ او د حجرې تعامل ولیکئ.

حل: د $Cu(NO_3)_2$ مالګې له الکترولیز څخه، په انود کې د اکسېډېشن دوه لاندې تعاملونه کېدای شي ترسره شي:



ددې په پام کې لرلو سره چې د ترمودېنامیک له نظره دا چې د اوبو اکسېډېشن له $\overline{NO}_3$ څخه په اسانۍ سره ترسره کېږي؛ نو باید اکسېجن تولید شي؛ خو ددې خلاف HNO_3 حاصلېږي، ځکه تعاملونه په الکتروډونو کې خورا پېچلي دي.



8. د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د الکترو فعال موادو الکترولیز: ځینې داسې الکترولیټونه شتون لري چې دوی خپله په لګښت نه رسېږي؛ خو د اوبو الکترولیز ته چټکتیا ورکوي؛ داسې الکترولیټونه هم شته چې په خپله الکترولیز کېږي او فعال دي چې بیلګې یې د قلعي کلوراید د، کاپرسلفېټ او سوډیم کلوراید دي، ځینې یې کولای شو په لاندې ډول مطالعه کړو:


په تېزابي محیط کې د $SnCl_2$ الکترولیز: د الکترولیز دستگاه چې د دوو الکتروډونو څخه جوړه شوې وي، تیاره او په هغې کې د $SnCl_2$ یو مولره محلول چې تېزابي شوی وي، اچوو. وروسته له څه مودې څخه معلومېږي چې د قلعي فلز د کوچنیو دانو په څېر په کتود کې دځانګو او پاڼو ته ورته بڼه باندې رامنځ ته کېږي او د کلورین ګاز د انود له لارې الوزي.

په محلول کې شته مرکبونه: سربېره د اوبو پر مالیکولونو، د Sn^{++} ، Cl^- او د H_3O^+ آیونونه هم شتون لري.



په کتود کې ممکنه ارجاع:



ددې په پام کې لرلو سره چې یو محیط اسیدي دی، په انود کې به لاندې تعاملونه ترسره شي:



د جدول او د عمومي تعریف په پام کې لرلو سره، پورتنی حالتونه بیان شوي دي، له قاعدې سره سم، هغه جوړې په انود کې اکسیدي کېږي چې د هغوی پوتنشیال لږ وي او په کتود کې هغه جوړې ارجاع کېږي چې د هغوی پوتنشیال ډېروي:



خو په دې ځای کې تجربې پایلې له نظري وړاندینو سره سمون نه لري، په عمل کې لیدل کېږي چې قلعي په کتود کې او کلورین په انود کې تولیدېږي. د دغې پېښې روښانتیا ډېره ساده ده؛ په لومړي پړاو کې د جوړو پوتنشیال په انود او کتود کې یو بل ته نږدې وي او دویم دا چې د اوبو اکسېدېشن او ارجاع ډېر ورو دي، په عمل کې باید اضافي ولتاژ $0.6V$ (که چېرې یوازې د اکسېدېشن او رېډکشن لپاره وي) او $0.6V$ (د دواړو حالتونو لپاره) د سېستم دننه د مقاومت د قوې د له منځه وړلو لپاره سېستم ته ورکړ شي:

$$\epsilon = \epsilon_{Cl_2 / Cl^-} - (\epsilon_{Sn^{2+} / Sn})$$


$$\epsilon = 1.36V - (-0.14) = 1.5V$$

که چېرې له الکترولیز دستگاه سره صعودي محرکه قوه وصل شي، وبه لیدل شي چې $SnCl_2$ له $V = 0.6V$ سره سم پیل کېږي؛ له دې امله د الکترولیز د دستگاه د مقاومت حد $E' = 0.6V$ دی، دغه کمیت د نورو جوړو له کمیتونو څخه ډېر ارزښت لري کوم چې په انود او کتود کې اسیدي او ارجاع کېږي.


$$\epsilon = \epsilon_{Cl_2 / Cl^-} - (\epsilon_{Sn^{2+} / Sn})$$

$$\epsilon = 1.36V - (-0.14) = 1.5V$$

هغه محرکه قوه چې مطلوبه دستگاه یې لري، له لاسته راغلې کچې؛ یعنې $1.6V$ څخه ډېره ده، په دې ولتاژ کې اوبه نه اکسیدي او نه ارجاع شوې:



شکل



څلورم لوست

درسي کتاب مخ: 134

د مطلبونو تشرېح		د مطلبونو سرليکونه
د سلفوريک اسيد د محلول الکتروليز		1. د لوست موضوع
له زده کوونکو څخه هبله کېږي چې د لوست ورکولو په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي:		2. د زده کړې موخې
- د سلفوريک اسيد د محلول د الکتروليز په اړه معلومات حاصل کړي.		- پوهنيزې
- يقين دې ترلاسه کړي چې د سلفوريک اسيد محلول الکتروليز کېږي او الکتروليت دی.		- ذهني
- د سلفوريک اسيد د محلول د الکتروليز عمليه دې ترسره کړي.		- مهارتي
مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي		3. د تدريس مېتودونه
کتاب، قلم، تخته، تباشير، سلفوريک اسيد او د الکتروليز لوبښی		4. د تدريس اړين مواد او توکي
شفاهي او ليکنې پوښتنې او ځوابونه		5. د ارزونې مېتود:
وخت په دقيقې	لومړني فعاليتونه: سلام اچول، د حال پوښتنه، حاضري اخېستل، د کورنۍ دندې کتل، د تېر لوست پوښتنه.	6. په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه
5	د انگېزې را منځ ته کول: که چېرې سلفر لرونکې کېښته په اوبو کې واچوو، محلول به يې څرنگه خوند ولري؟	
وخت په دقيقه	د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه	1-6 د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)
40	- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د سلفوريک اسيد د محلول د الکتروليز په اړوند وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - د سلفوريک اسيد الکتروليز چې ښوونکي يې د يوې تجربې په واسطه روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي. خپله دې هم عملي کړي. - د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب ورکړي او کورنۍ دنده دې ترسره کړي.	- د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي. - د سلفوريک اسيد د محلول د الکتروليز په اړه دې معلومات ورکړي. - د سلفوريک اسيد الکتروليز دې د يوې تجربې په واسطه روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.




7. د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

لومړۍ فعالیت:

د متحرکو ایونو آزمایش:

ددې لپاره چې د الکترولیز په عملیه کې د ایونو حرکت وینو، له رنگه ایونونو څخه کار اخیستلای شو.

الف: پوتاشیم پرمنگنات ($KMnO_4$)




د پنس په واسطه د پوتاشیم پرمنگنېټ څو بلوره د فلتر لاند (مرطوب) کاغذ په منځ کې کېږدئ، د برېښنا جریان د 20 دقیقو په مهال له هغه څخه تېر کړئ.

د پوتاشیم ایونونه بې رنگه او د پرمنگنېټ ایونونه په ارغواني رنگ را څرګندېږي. کوم بدلونونه به د فلتر د کاغذ پرمخ وړنې؟ د منګان ایونونه به د کوم الکتروډ خواته ولاړ شي؟ څه فکر کوئ؟ د منګنېټ ایونونه د منفي چارج لرونکي دي او که د مثبت چارج؟ ولې؟

د فعالیت د پوښتنو حل:


په لومړي سر کې پوتاشیم پرمنگنېټ خپل یري او ارغواني رنگ تر سترګو کېږي، که چېرې له منګنېټ ایونونو څخه د شلو دقیقو په موده کې د برېښنا جریان تېر شي، د منګنېټ ایونونه د انود خواته ځي او د پوتاشیم ایونونه د کتود خواته حرکت کوي. د منګنېټ ایونونه منفي چارج لري او د پوتاشیم ایونونه مثبت چارج لري؛ نو ځکه پوتاشیم پرمنگنېټ الکترولیټ دی او له لاندې معادلې سره سم په ایونونو باندې پوټه کېږي:



دویم فعالیت

د مس کرومات ($CuCr_2O_4$)

د ښوونکي په مرسته دستگاه د لاندې شکل سره سم جوړه کړئ. له دستگاه څخه د برېښنا جریان تېر کړئ ترڅو تاسې وکولای شئ الکتروډونو ته نږدې رنگونه ولیدلای شئ. د مسو ایونونه شین (ابي) رنگ لري او د کرومات ایونونه ژېړ رنگ لري.



ځواب:

1- څرنگه چې په انود کې د کرومات ايونونه شتون لري؛ نو ژېر رنگ تر سترگو کېږي.

2- په کتود کې د مسو ايونونه شتون لري؛ نو شين (ابي) رنگ تر سترگو کېږي.

3- په کتود کې مثبت ايونونه جذبېږي.

درېم فعاليت:

له لاندې شکل سره سم سرکېټ جوړ کړئ، زده کوونکي دې حتمي دغه تجربه په خپله ترسره کړي.


1- د الکتروډونو په شاوخوا کې کوم مواد راټولېږي؟

2- له کتود څخه ازاد شوی گاز د لاندې (مرطوب) لټمس په واسطه ازماينېن کړئ، د نوموړي گاز له پېژندلو څخه وروسته د برېښنا جريان پرې کړئ.

1- د لټمس په کاغذ کې به څه پېښېږي؟

2- کوم گاز به ازاد شي؟

3- د الکتروولېز له لوبښي څخه منفي الکتروډ وېاسی او سطحې ته وگورئ، د دغه الکتروډ د سطحې د رنگ د بدلون سبب څه شی دی؟



ځواب:

1- د الکتروډ په شاوخوا کې ايونونه راغونډېږي.

2- د انود له لاري ازاد شوی گاز کلورين دی، چې د لټمس رنگ ته بدلون ورکوي.

3- د لټمس رنگ بدلون کوي.

4- د کلورین ګاز ازادېږي.

8. د ښوونکي لپاره اړین معلومات

1- د الکترون لېږدول (Electron Transfer): د الکترون لېږدول له یوه اټوم څخه بل اټوم ته د Electron Transfer په نوم یادېږي.

2- اکسیدي کوونکي (Oxidizing agent): هغه ماده ده چې د الکترون په اخیستلو اړجاع کېږي، د Oxidizing agent په نوم یادېږي.

3- ارجاع کوونکي (Reducing agent): هغه ماده چې د الکترون په بایللو سره اکسیدي کېږي، د Reducing agent په نوم یادېږي.

4- د اکسیدېشن نمبر (Oxidation Number): د مرکب په مالیکول کې د عنصرونه د اټومونو د قسمي منفي او مثبت چارجونو له کچې څخه عبارت دی.

5- مالګین پل (Salts Bridge): هغه مالګې چې د حجرو د دوو برخو محلولونه سره نښلوي، د مالګین پل په نامه یادېږي.

6- د حجرو الکتروموتوري قوه (Cell Potential): هغه قوه چې د کیمیاوي برېښنايي حجرې په دوره کې د الکترونونو د خوځښت لامل کیږي، د حجرې د پوتنشیال یا د حجرې الکتروموتوري قواوې په نوم یادېږي او په (emf) سره ښودل کېږي.

7- کرښیزه ښودنه (Line Nation): د الکتروکیمیاوي حجرې لپاره د یو ډول سمبولونو لیکل دي چې په هغه کې د انود برخه د دوو عمودي کرښو کینې خواته او د کتود برخه د نوموړو خطونو ښی خواته ځای لري: Anode || Cathode

8- غلظتي حجره (Concentration Cell): هغه الکتروکیمیاوي حجره چې دواړه خواوې یې د یوشان موادو لرونکې وي، خو د غلظت له کبله یو له بل سره توپیر ولري، د غلظتي حجرې په نوم یادېږي.

9- تشه یا مړه بطری (Dead Battery): د بطری یو ډول دی چې په هغې کې د حجرې تعامل سرته رسېدلی او مزو (سیمون) په دننه کې د الکترونونو د تراکم لپاره کومه محرکه قوه شتون نه لري.

10- د ایونونو ټاکوونکي الکتروډونه (Ion Selective Electrodes): هغه الکتروډونه چې د یوه ځانګړي ایون له غلظت سره حساس وي، د ایونونو د ټاکونکو الکتروډونو په نوم یادېږي.

11- لومړي ډول بطری (Primary Battery): هغه حجروي بطری چې د تعامل کوونکو موادو په مصرف رسولو سره غیرفعال شي، په دې نوم سره یادېږي.


12- دویم ډول بطری (Secondary Battery): هغه حجروي بطری چې د برېښنا د معکوسې تیرونې له امله په حجره کې تعامل ترسره او بطری بیرته فعالیږي، په دې نوم سره یادېږي.

13- فرسایش (زنگ وهل) (Gorrosuon): د فلزونو اکسیدي کېدل د فرسایش په نوم یادېږي.


14- زنگ وهل (Rust): د اوسپنې فلز اکساید کیدو ته زنگ وهل وايي.

15- جرياني بطری (Flow Cell Battery): جرياني بطری د اکسېدېشن- رېډکشن بطری يو ډول دی چې له اکسېدېشن - رېډکشن څخه د دوو محلولونو انرژي په بېلابېلو جوړو کې زېرمه کوي.


16- الکترولیز (Electrolysis): په ایونونو باندې د برېښنا په واسطه د یوه مرکب تجزیه کول د الکترو لېز په نوم یادېږي. د سلفوریک اسید جوړول: سلفوریک اسید په صنعت کې د ډېرو مهمو موادو له ډلې څخه دي؛ ځکه د ډېرو نورو موادو د جوړولو لپاره ورځنې کار اخیستل کېږي او کله کله هم د مورني اسید په نوم نومول کېږي. د دغه اسید کلنی مصرف د هر هېواد د صنعت د پرمختګ او ودې د ارزونې یوه ځانګړتیا ده. په 2002 کال کې په امریکایي کارخانو کې کابو 40 میلیونه ټنه سلفوریک اسید تولید شوی وو. سلفوریک اسید له دوو؛ یعنې نږدې کیدو او سربې محافظتي کړنلارو څخه په لاس راځي. نن ورځ د نږدې کیدو کړنلارې څخه ډېر کار اخیستل کېږي او سلفوریک اسید یې نګه (خالص) وي. په دواړو کړنلارو کې SO_2 او SO_3 تحمض کېږي او وروسته H_2SO_4 باندې اوږي. SO_2 د O_2 په شتون کې د ګوګړو له سون او یا د سلفېټ لرونکي معدني ډبرې؛ لکه: پیرېټ د اکسیدیشن کولو او یا د هایدروجن سلفایډ له سوځولو څخه په لاس راځي:




پرتله له کاتالېزاتور څخه د تعامل چټکتیا ډېره کمه ده. په سربې محافظتي (Lead Chamber Proem) کړنلاره کې د نایتروجن ډای اکساید (NO_2) د ګاز له کاتالېزاتور او د نږدې کیدو په کړنلاره کې د ونادیم اکساید (V_2O_5) ورسره د القلي فلزونو د سلفېټ له کاتالېزاتور څخه کار اخیستل کېږي. که څه هم د SO_3 او د اوبو له تعامل څخه سلفوریک اسید حاصلېږي:



خو په عمل او صنعتي مقیاس کې، دغه دواړه مادې یو له بلې سره نه ګډوي؛ ځکه د هغوی تعامل په چټکتیا سره تودوخه ازاده وي او د هغوی ترسره کېدنه ددې لامل کېږي چې د سلفوریک اسید بخار (چې د اوبو بخار او د سلفوریک اسید د کوچنیو څاڅکو لرونکی دی) د ټولې کارخانې فضا نیسي. له دې امله په لومړي پړاو کې د SO_3 یو مول د H_2SO_4 یوه مول سره چې وړاندې جوړ شوي دي، تعامل ورکوي ترڅو پیروسلفوریک اسید (Pyrosulfuric acid) جوړ شي، دغه اسید د جلا کوونکي سلفوریک اسید یا اولیوم (Oleum) په نوم هم یادېږي:



په پای کې هغه ماده چې په سلفوریک اسید کې د SO_3 له حل کیدو څخه لاسته راغلې ده، په اوبو کې حل کېږي. لاس ته راغلی اسید غوړیو ته ورته بې رنګه او بې بویه اسید دی، په $10,5^\circ C$ کې کنگل کېږي او د تودوخې په واسطه تجزیه کېږي چې SO_2 ترې ازادېږي.



پنځم لوست

د درسي کتاب مخ: 137

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو تشرېح
1- د لوست موضوع		ملمع کول او د ځمکې لاندې اوسپنيزو کتودونو ساتنه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هبله کېږي چې د لوست ورکولو په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي: - د پوښولو (ملمع کولو) او د ځمکې لاندې اوسپنيزو کتودونو د ساتنې په هکله دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې ترلاسه کړي چې ملمع او د ځمکې لاندې اوسپنيزو کتودونو ساتنه په صنعت کې مهم رول لري. - د ملمع کولو او د ځمکې لاندې اوسپنيزو کتودونو د ساتنې پر کړنلاره دې پوه شي.
3- د تدريس مېتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تابشير، فلزي کتودونه، الکتروليت مالګې او د برېښنا سرچنې.
5- د ارزونې مېتود		شفاهي او ليکنی، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: سلام اچول، د حال پوښتنه، حاضری اخېستل، د کورنۍ دندې کتل، د تېر لوست پوښتنه. د انگېزې را منځ ته کول: د سپينو زرو قاشوغې له سپينو زرو څخه جوړې شوې دي او يا که د سپينو زرو په واسطه ملمع شوي ده؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
د لوست سرليک دې د تختې پر مخ وليکي. - د ملمع او د ځمکې لاندې فلزي کتودونو د ساتنې په اړه دې معلومات ورکړي. - د څو بيلګو په ورکولو سره دې ملمع کول د ځمکې لاندې فلزي کتودونو ساتنه دې روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د ښوونکي څرګندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د ملمع کولو او د ځمکې لاندې فلزي کتودونو د ساتنې په اړه ورکوي، يادداشت او زده دې کړي. - هغه بيلګې چې ښوونکی يې ورکوي، زده دې کړي. - د ښوونکي پوښتنې ته دې ځواب او کورنۍ دنده دې ترسره کړي.
وخت په دقيقه	40	



7. د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

د درس په متن کې پوښتنه نه شته.

8. د ښوونکي لپاره اړين معلومات



د اوسپنې زنگ وهل:

د اکسېجن عنصر ډېر فعال او اکسيدي کوونکی دی، څرنگه چې کولای شي نجیبه فلزونه، لکه: سره زر، پلاتین، پلاډیم په خپل سر توگه اکسيدي کړي. د اکسېجن د همدې فعالیت له امله دی چې فلزونه اکسيدي کېږي چې ښې بېلگې یې د اوسپنې زنگ وهل او د فلزونو پوډه کیدل او تخریب دی. د فلزونو له منځه تلل د اکسېدېشن په واسطه د زنگ وهل په نوم یادېږي. نور عوامل هم د فلزونو د ويجاړیدلو لامل کېږي. ځینې فلزونه د اوبو او اسیدي محلولونو سره د مخلوط کېدو پرمهال ويجاړېږي، که چېرې د اوسپنې یوه ټوټه د اوبو له یوه څاڅکي سره یوځای شي، د اکسېدېشن او ارجاع تعامل ترسره کېږي:



دا دوه تعاملونه د اوسپنې د ټوټې په دوو بېلابېلو برخو کې ترسره کېږي:

الکترونونه د فلز له ذرنې برخې او د انود له خوا څخه د کتود خواته حرکت کوي (دنده جریان - الکتروني هدایت)؛ په داسې حال کې چې ایونونه په اوبو کې (بهرنۍ دوره - ایوني هدایت) جریان موندلی، برېښنايي دوره بشپړه کېږي، له دې امله پرته له اوبو څخه نوموړې دوره نیمگړې ده او زنگ وهل نه ترسره کېږي. د اوسپنې ایونونه له اوبو څخه له تېرېدو وروسته د $Fe(OH)_2$ په بڼه رسوب کوي او دغه رسوب هم اکسيدي کېږي چې $Fe(OH)_3$ (فیریک هایډروکساید) مرکب جوړوي یا ویلی شو چې د اوسپنې زنگ رامنځ ته کېږي:



د اوسپنې له ويجاړیدو مخنیوی: د فلزونو د خرابیدلو څخه د مخنیوی لپاره، په ځانگړې توگه د اوسپنې لپاره،


بېلابېلې پخوانۍ کرنلارې شتون لري چې عبارت له: د اوسپنې رنګول، د تېلو دپایپونو د بهرنۍ سطحې قیر کول او د فلزي لوبښو ملع کول دي، دا یو ډول کرنلارې دي چې فلزونو ته ساتونکي پوښ ورکوي او فلزونه د اکسېجن، اوبو (رطوبت) او ایونونو له عمل څخه په امن کې ساتي.

ډېرې مهمې کرنلارې چې د فلزونو د ساتلو لپاره ورځنې کار اخلي، هغه د ملع او د فلزي کتودونو د ساتلو لارې دي چې په لاندې ډول روښانه کېږي:


که چېرې دوه فلزونه چې یو له بل سره په اړیکه کې وي، په هوا او لنډه بل کې کېښودل شي، له دغو فلزونو څخه د گلواني یو ډول پیل منځ ته راځي، په دې فلزي پیل کې لږه (E^0) انرژي لري، د انود په توگه کار کوي او کله چې اکسيدي شي، له ويجاړیدل سره مخامخ کېږي؛ خو هغه فلز چې لوړه انرژي (E^0) لري، د کتود په توگه کار کوي، په نوموړي فلز کې هیڅ

ډول ويجاړېدنه نه ترسترگوکيږي.


د ملمع کولو او د اوسپنې د فلزي کتودونو د ساتنې لپاره، داسې عمل کوي چې اوسپنه د يوه فعال فلز؛ لکه: Mg يا Zn سره څنگ په څنگ کيږدي، هغه فلز چې (E^0) يې له اوسپنې څخه کمه وي، د انود په توګه عمل کوي او اوسپنه ساتي، لاندې شکل ته وګورئ، په دې شکل کې چې د اوسپنې سطحه د جستو د نري پوښ په واسطه پوښول شوې ده، د ګلوانيز او سپینې په نوم یادېږي:



کله چې د سپینې اوسپنې پر سطحه باندې توپل یا خرینه تر سترګو شي، په توپل شوي ځای کې یو ګلوانيز پیل جوړېږي، په پیل کې جست (Zn) د انود په توګه، اکسیدي او وېجاړېږي:



د اوسپنې پر سطحه باندې د جست (Zn) د فلز له اکسېدېشن څخه لاسته راغلي الکترونونه د نم په شتون کې اکسېجن ته ورکول کېږي:



په پایله کې د اوسپنې فلز د کتود په څېر عمل کوي او نه وېجاړېږي.

$$f_{\text{res}} = \frac{c}{\lambda} = \frac{\Delta f}{\lambda_2}$$

د مطلوبو سرليکونه		د مطلوبو تشرېح
1. د لوست موضوع		د الکتروليز مقداري قانون يا د فارادي قانون، د فلزونو تخليص، را ايستنه او توليد
2. د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هېله کېږي چې د لوست ورکولو په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي: - د الکتروليز د مقداري قانونه يا د فارادي قانون، د فلزونو د تخليص را ايستني او توليد په اړه دې هر اړخيز معلومات حاصل کړي. - يقين دې ترلاسه کړي چې د الکتروليز د مقداري قانون يا د فارادي قانون، د فلزونو تخليص، را ايستنه او توليد د برق د کيميا بنسټيزه برخه ده او صنعتي ارزښت لري. - د الکتروليز مقداري قانون يا د فارادي د قانون پر بنسټ دې د برېښنا مقداري برخې په اړوند محاسبې عملي کړي او د فلزونو تخليص، را ايستني او توليد دې ترسره کړای شي.
3. د تدريس مېتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4. د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او د ملمع سامانونه
5. د ارزونې مېتود		شفاهي او ليکنې پوښتنې او ځوابونه
6. په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: سلام اچول، د حال پوښتنه، حاضري اخېستل، د کورنۍ دندې کتل، د تېر لوست پوښتنه. د انگېزې را منځ ته کول: د فلزونو را ايستنه او تخليص څه ډول ترسره کېږي؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي. - د الکتروليز قانون او يا د فارادي د قانون، د فلزونو د تخليص، را ايستني او توليد په اړه دې معلومات ورکړي. - د فلزونو د را ايستني او تخليص کړنلاره دې زده کوونکو ته وښايست. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د الکتروليز د مقداري قانون يا د فارادي د قانون، د فلزونو د تخليص، را ايستني او توليد په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - د فلزونو د را ايستني او تخليص په کړنلاره دې پوه شي. - د لوست د متن پر مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب او کورنۍ دنده دې ترسره کړي.

7. د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

د درس په متن کې سؤال نه شته.

8. د ښوونکي لپاره اړين معلومات

فلزونه د برېښنا جریان په ښه توګه تېروي او د فلزونو د الکترونونو ازاد حرکت د برېښنا د تیروولو لامل کیږي. په الکترولیت محلولونو کې ایون د برېښنا د تیروولو لامل کیږي چې په خپل حرکت سره د برېښنا جریان له ځان څخه تېروي. د اکسېدېشن او رېډکشن تعاملونه د الکتروډو په سطحه کې (د الکتروني او ایوني دوو تیروونکو سرحد) ترسره کیږي، له دې امله هغوی د الکتروني تعاملونو په نوم یادېږي.

د فارادي قانون (Law of Faraday)

که چېرې پلاټيني الکتروډونه د مالګې په تېزابي محلول کې ځای په ځای او بیا د برېښنا او د پوتنشیال له توپیر سره ونښلوي، په دې حالت کې د هایډروجن ایون چې مثبت چارج لري، د منفي الکتروډ (کتود) خواته او د کلورین ایون $[Cl^-]$ چې منفي چارج لري، مثبت الکتروډ؛ یعنې انود ته ځي یا په بل عبارت الکترولیز تر سره کیږي، د کلوراید ایون خپل منفي چارج په انود کې له لاسه ورکوي او عنصري ښه غوره کوي. $35.5gr$ کلورین په انود کې او یو ګرام هایډروجن په کتود کې تولیدېږي؛ یعنې د تولید شوو موادو کچه په انود او کتود کې د هغوی له معادلې کتلې سره مساوي ده. دغه مطلب کیدای شي داسې روښانه کړل شي، هغه چارجونه چې له کتود څخه کتیون ته لېږدول کیږي، دهغو مثبتو چارجونو له کچې سره مساوي دي چې د انود په واسطه له انیون څخه اخېستل کېږي، دغه ورکول شوي او اخيستل شوي چارجونه، د کتود او انود په واسطه سره مساوي دي او له یوه الکترون څخه چې د برېښنا لږ کمیت ښیي، عبارت دي. انیون د الکتروډونو او د بهرنۍ برېښنا د دورې (د برېښنا هغه مزی چې دواړه الکتروډونه سره نښلوي) په واسطه خپل چارج چې له الکترون څخه یې سرچینه اخلي، کتیون ته لېږدوي او په پایله کې دواړه ایونونه خنثی کېږي چې دغه مطلب د فارادي د الکترولیز له قوانینو سره سم په لاندې ډول روښانه کېږي:

د فارادي لومړی قانون

په انود او کتود کې د تولید شوو موادو کچه د هغې برېښنا له کچې سره نیغې اړیکه لري کوم چې د الکتروډونو ترمنځ په سرکت کې جریان لري. د یوه اتوم ګرام ($1atom - gram$) هایډروجن او همدارنګه د کلورین د یوه اتوم ګرام یا $6.022 \cdot 10^{23}$ اتومونو د جلا کولو لپاره، د برېښنا یوې ټاکلې کچې ته ($96491Cb$) اړتیا ده، د هایډروجن (H^+) او

کلوراید (Cl^-) هر ایون $1.602 \cdot 10^{-19} Coulomb = \frac{96491}{(6,022 \cdot 10^{23})} = \frac{F}{NA}$ عنصري چارج لري. په لومړي حالت کې

(+) علامه او په دویم حالت کې (-) علامه لري. که چېرې د ګوګرو تېزاب الکترولیز شي، د یو اتوم - ګرام هایډروجن د تولید لپاره 96490 کولمب ته اړتیا ده چې دلته هم د هایډروجن اتوم (H) $1,602 \cdot 10^{-19} Cb$ مثبت عنصري چارج لري، له دې امله د سلفېټ ایون دوه منفي چارجونه لري؛ ځکه د H_2SO_4 مالیکول د چارج له کبله خنثی دی. په عمل کې د یو ایون - ګرام سلفېټ د چارج د خنثی کولو لپاره $2.96490cb$ برېښنا ته اړتیا ده. د پورتنیو یادونو سره سم د $CuSO_4$ د اوبلن محلول په الکترولیز کې د یو اتوم - ګرام Cu د جلا کولو لپاره په کتود کې په کار ده چې $2.96490Cb$ برېښنا په لګښت ورسېږي؛ نو د تعریف له مخې لرو چې:

$$\text{معادله کتله} = \frac{\text{مالیکولي کتله (یا فورمولي کتله)}}{\text{ولانس}}$$

د فارادي دویم قانون: د هغو موادو ټاکلې کچه چې د برېښنا د ټاکلې کچې په واسطه په کتود یا انود کې رسوب کوي او یا ازاد کیږي، د هغوی له معادلې کتلې سره سمون لري.


له دې قانون سره سم د برېښنا د کچې واحد یعنې کولمب (Cb) د برېښنا له هغه کچې څخه عبارت دی چې د الکترولیز په

عملیه کې د $\frac{1}{96491}$ معادل گرام مادې د جلا کولو لپاره؛ د بېلګې په توګه: $0.001118 g = \frac{109 \cdot 170 g}{96490} = \frac{q}{F} \cdot \frac{M}{n} = m$ گرامه

سپینو زرو د جلا کولو لپاره د هغه د مالګې له محلول څخه یې اړتیا ده، په دې فورمول کې q د برېښنا کچه ($q = It$)، I د

برېښنا د جریان شدت ښیي، په یوې ثانیه کې د یو کولمب برېښنا چټکتیا یو امپیر ده، F د فارادي عدد دی، M د

غوښتونکې مادې مالیکولي کتله په گرام ده او n د مولونو شمېر یې ښیي.



نهم څپرکی

دڅپرکي موضوع: فلزونه

1- د تدریس وخت: (9 درسي ساعتونه)

ګڼه	دلوست سرلیکونه	درسي ساعتونه
1	دفلزونو دلاسته راوړ لو لاره	یو درسي ساعت
2	دلومړي اصلي گروپ فلزونه	یو درسي ساعت
3	سودیم	یو درسي ساعت
4	د دویم اصلي گروپ عنصرونه	یو درسي ساعت
5	کلیسم	یو درسي ساعت
6	د دریم اصلي گروپ عنصرونه، المونیم	یو درسي ساعت
7	انتقالي فلزونه، اوسپنه	یو درسي ساعت
8	مس، کرومیم	یو درسي ساعت
9	دڅپرکي لنډیز او تمرین	یو درسي ساعت

2- دڅپرکي پوهنیزې موخې

- زده کوونکی دې پوه شي چې فلزونه کوم ډول عنصرونه دي.





- زده کوونکي دې درک کړي چې فلزونه د هغو عنصرونو له ډلې څخه دي چې ځانگړي خواص لري او په صنعت کې بنسټیز رول لوبوي.



- زده کوونکی دې فلزونه له غیر فلزونو او شبه فلزونو څخه جلا اوهم دې فلزونه دهغوی د ځانگړو خواصو پر بنسټ یوله بل څخه توپیر کړي.

3- دڅپرکي پوښتنو ته ځوابونه

1- ب 2- الف 3- ب 4- ج ، 5- الف ، 6- الف ، 7- د ، 8- ج ، 9- ب 10- د


تشریحي پوښتنو ته ځوابونه






2- د بیلایلو مرکبونو مخلوطونه د کورې د لورې تو دوخې په درجه کې ویلې کیږي او هغوی ټول په ویلې شوې بڼې دي، څرنگه چې له اوسپنې څخه سپک دي؛ نو له دې امله د اوسپنې له ویلې شوي حالت څخه پورته ځای لري. د اوسپنې ارجاع د کاربن مونواکساید او د هغوی د تعامل معادله د کورې په بیلایلو برخوکې په لاندې ډول ده:


د کورې په لوړه برخه کې Fe_2O_3 په Fe_3O_4 بدلیږي:



د کورې په لاندې برخه کې:




د کورې په منځني برخوکې په $1000^\circ C$ تودوخه کې FeO په Fe بدلیږي:




3- د سودیم کیمیاوي خواص


- سودیم د هوا له اکسیجن سره تعامل کوي او خپله فلزي ځلا له لاسه ورکوي:




- سودیم د تودوخې په شتون کې له هایډروجن سره تعامل کوي، سودیم هایډرایډ تولید وي:




- سودیم له هلو جنونو سره تعامل کوي، القلي هایدرونه (د القلي فلزونو مالګې) جوړوي:




- سودیم له تیزابونو سره تعامل کوي، مالګې جوړوي او هایډروجن ازاد وي:



- سودیم له اوبو سره تعامل کوي، القلي جوړوي او د هایډروجن ګاز ازاد وي:




- سودیم او د دې ګروپ نور فلزونه له القلیو سره تعامل نه کوي:



4- کلیم اکساید یا ژوندی چونه (CaO)

چونې له اوبو سره تعامل کړی، د چونې او به (مړه چونه) جوړوي:




$CaO(s) + NaOH(s)$ مخلوط د سودالایم (Sodalime) په نوم یاد وي.

دژوندۍ چوڼې (CaO) دکارولو ځایونه


- د سختو اوبو د نرمولو لپاره.
- د بلیچنگ د پودر د جوړولو لپاره
- چونه د بورې د شیرې د سپینولو لپاره په کاروړي.
- په گازونو او الکولونو کې د اوبو د جذبونکې مادې په توګه کار وړل کېږي.
- چونه د سمټو، بنیښې او $CaCl_2$ په تولید کې کارول کېږي، د شګو، چوڼې او د اوبو مخلوط د سختې چوڼې یا د رطوبت نه تیروونکي په نوم هم یاد وي، که چیرې سمټ له چوڼې سره یوځای شي، داسې ماده ترلاسه کېږي چې واټر پروف (د اوبو عایق) ده.

5- په لابراتوارونو کې سپینه چونه د CO_2 د ټاکوونکې مادې په توګه کارول کېږي.

الف- کلسیم د $CaCl_2$ او CaF_2 د ویلې شوو مخلوط له الکترولیز (دهغوی د ویلې کیدو درجه له فلزي Ca څخه؛ یعنې $840^\circ C$ څخه ښکته راوړل کېږي) څخه لاسته راوړي.




6- د فولادو د جوړولو لومړۍ پړاو د چدن تخلیص دی، نوې لارې چې د بسمر (Bessemer) میتود په نوم یادېږي، دیو تبدیلونکې دستگاه په واسطه ترسره کېږي، دا تبدیلونکې دستگاه د لوپې استوانې په بڼه له فلزي لوښي څخه عبارت ده چې په خپل محور باندې تر 180° درجو پورې تاویدل ترسره کولای شي، دهغې دننۍ دیوال په لومړي سر کې د کلکو موادو په واسطه او بیا د القلي خاصیت لرونکو موادو په واسطه؛ دیبلګې په ډول: د دلو میت په واسطه (Mg او Ca مضاعف کاربونیټ) په واسطه پوښول شوی دی، په دې لوښي کې د 25 ټنو په شاوخوا کې مواد ځایېږي، د تودوخې د اغیزې په پایله کې د لومړي تجزیه کېږي او د MgO او CaO اکسایدونه لاسته راځي، د ویلې شوې او سپنې له مخلوط څخه توده او متراکم شوې هوا تیره شوې ده چې په پایله کې د اوسپنې ناخالصی (سلفر، فاسفورس او سلیکان) په لومړي سر کې په اړوندو اکسایدونو بدلون مومي او بیا له CaO او MgO سره تعامل او مالګې جوړوي چې له اوسپنې څخه سپکې دي چې په ویلې شوې اوسپنې کې لامبو وهي او په پورتنۍ سطحه کې یې ځای پر ځای کېږي. لاندې شکل د بسمر مودرنه تبدیلونکې دستگاه ښیي:



شکل: د بسمر عصري تبدیلونکې دستگاه:


7- دکاتو ډبرې چې د مسو لرونکې دي، ټوټه او په پودرو بې بدلوي، بیا هغه په مایعاتو کې په لامبو وهلو راولي ترڅو مس له کاني ډبرو څخه جلا شي، په دې مخلوط کې لږ څه غوړي هم ورزیاتوي او بیا د مخلوط له دننه څخه هوا تیروي. کاني ډبرې د لامبو په

حالت کې په پورتنۍ برخه ، خاورې او درندې تیرې د لوبني په لاندینۍ برخه کې ځای نیسي، دکانو ډبرې له هوا او غوړیو سره یوځای له پورتنیو سوړیو څخه وځی، په دې برخې کې لږ څه ځانگړې خالصې ډبرې لاسته راځي. لاندې شکل د مسو د تیرو د تخلیص دستگاه راښيي:



شکل : د مسو دکانو ډبرو د ناخالصونو د جلاکولو دستگاه

مس له کاني خالص شوو تیرو څخه چې په پورتنیو لارو تر لاسه شوي دي، کیدای شي په دوو لارو په لاس راوړل شي چې یوه لاره *Pyrometallurgy* او هغه بله یې (*Hydro metallurgy*) یعنې په اوبلن محلول کې حلیدل دي، په لومړي پړاو کې د کان ډبرې له هوا سره مخلوط وي:



په دې صورت کې په زیاته کچه SO_2 لاسته راځي چې په هوا کې خپرېږي او د ځمکې په کره کې ژوند او اود استوگنې د ځای لپاره لوی گواښ رامنځته کوي؛ نو له دې امله باید دا گاز په سلفوریک اسید تبدیل شي.

لاسته راغلی مس سلفایډ (CuS) د قوي اکسیدې کوونکي په واسطه، دبیلگې په ډول: د O_2 په واسطه اکسیدې کیږي او مس په خالص عنصري بڼه ورڅخه جلا کوي:




د هایډرو میتالورجی په دویم پړاو کې کاني ډبرې په سلفوریک اسید کې حل وي او وروسته له دې هغه د ارجاع کوونکو په واسطه چې د هغوی پوتنشیال له $\frac{\text{Cu}^{2+}}{\text{Cu}}$ څخه ټیټ وي ، یوځای کوي، په دې صورت کې خالص عنصري مس په لاس راځي. د الکترولیت په لاره کیدای شي چې مس دهغه له مرکبونو څخه په لاس راشي .

مس د بریښنا د تیروونکي ځانگړتیا لري چې له هغه څخه د بریښنا تیروونکي مزي جوړوي ، د مس او قلعي ښه الیاژ د برنز په نوم یادېږي؛ دبیلگې په ډول: زیاتره په عادي حالات کې په تیزابونو کې نه حلېږي ؛خو په غلیظو قوي تیزابونو کې حلیدل یې شوني دي.

8- د شپږم فرعي گروپ لومړی عنصر کرومیم دی، دا عنصر زیر روښانه رنګ لري چې د زنگ وهلو په مقابل کې کلک دی.

د کرومیم فلز د پوډرو په حالت کې د ترمو دینامیکي له کبله ارجاعي خاصیت لري او په بشپړه توګه په ډیره چټکتیا له اکسیجن سره تعامل کوي؛ خو په فلزي حالت کې دهغه باندینی سطحه د هغه ډاکساید په واسطه پوښل کیږي او دهغه دننه برخه له اکساید کیدلو څخه ساتل کیږي، په دې حالت کې د زنگ وهل په مقابل کې کلک دی.

د کرومیم د Cr^{3+} ایونونه په اوبلن محلول کې هایدرایتي کامپلکس مرکب په لاندې بڼه جوړ وي چې د هغه تیزابي قوه له اسیتیک اسید څخه زیاته ده:



د $PbCrO_4$ مالګه په بیلابیلو لارو ترلاسه کیږي چې له هغې څخه د غوړیو په رنگونو کې ګټه اخیستل کیږي ، له دې رنگونو څخه د موټرو په واټونو او د سرکونو په څلور لارو کې د شپې په مهال د روښانتیا لپاره ګټه اخیستل کیږي ، ددوی په مرسته د موټر د تللو لاره ټاکل کیږي.

9- د لومړي اصلي ګروپ عنصرونه د القلیو فلزونو په نوم یادوي؛ ځکه دهغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه ډیر غښتلي قلوي (Bases) جوړیږي.


د دویم اصلي ګروپ عنصرونه ټول فلزونه دي چې د کیمیا له کبله فعال دي؛ نوله دې امله په طبیعت کې په ازاده توګه نه موندل کیږي . د بیرلیم ډیره مشهور کاني ډبره د (Beryl) په نوم یادیږي چې له $3BeO, Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$ بلورونو څخه جوړه شوې ده، ځینې دا بلورونه خوټنه کتله لري. زمره هم ډبریل د ډولونو له ډلې څخه دي چې د هغه شین رنگ د Cr^{3+} د ناخالصو له شتون سره اړه لري.

څرنګه چې دا عنصرونه د ځمکې په جوړښت کې زیات موندل کیږي او القلي جوړوي، له دې امله د ځمکنیو القلیو په نوم یادېږي.


10 - پوښتنې ته ځواب

دسودیم خواص


- سودیم د تودوخې په شتون کې له هایډروجن سره تعامل کوي، سودیم هایډرایډ جوړوي:




- سودیم له هلوچنونو سره تعامل کوي، دالقلیو هالیدونه (دالقلیو فلزونو مالګې) جوړوي:



- سودیم د تیزابو سره تعامل کوي، مالګه جوړوي او د هایډروجن ګاز ازاد وي:



- سودیم له اوبو سره تعامل کوي، القلي جوړوي او د هایډروجن ګاز ازاد وي:



• سودیم او د دې گروپ نور فلزونه له القلیو سره تعامل نه کوي.




د سودیم لاسته راوړنه

القلي فلزونه د هغو له ډلې څخه سودیم، د هایدروکسایدونو او هالیدونو د ویلې شوي حالت له الکترولایز څخه لاسته راوړي. سودیم په لومړي ځل د یوې په نوم عالم (Sir Humphry Davy) په ۱۸۰۷م کال کې د NaOH د ویلې شوي حالت له الکترولیز څخه لاسته راوړ. دا طریقه د نزولي پروسس د میتود (Down's Process method) یا بنکتنی حجرې (Down's Cell) په نوم یادېږي.


اوس د NaOH پر ځای له NaCl څخه کار اخیستل کیږي. NaCl د تودوخې په 800°C کې ویلې کیږي، دهغې د ویلې کیدلو د درجې د ټیټولو لپاره درې ځله د CaCl_2 په هغې باندې د (۲:۳) ورزیاته وي ترڅو دهغې د ویلې کیدلو درجه 600°C ته راټیټه کړي.

د الکترولیز په عملیې کې انود د گرافیت او کتود له اوسپنې څخه جوړ شوی دی، د دستگاه له پورتنی سوري څخه د NaCl مذابه ورزیاته وي، د کلورین گاز د گرافیت په انود کې ازادیږي او فلزي سودیم په اوسپنیز کتود کې راټولېږي.


سودیم کلوراید د مذابي (ویلې شوي حالت) د الکترولیز تعاملونه په لاندې ډول دي:





د کلسیم خواص: کلسیم له اوبو سره تعامل کوي، کلسیم هایدروکساید او هایدروجن جوړوي، د کلسیم تعامل له اوبو سره له القلي فلزونو څخه ورو ترسره کیږي:



کلسیم له کلورین گاز سره تعامل کوي، کلسیم کلوراید جوړوي:




همدارنگه کلسیم له تیزابونو سره تعامل کوي، د هایدروجن گاز ازادوي:



د کلسیم استحصال


کلسیم د CaCl_2 او CaF_2 د مخلوط (دهغوی د ویلې کیدو درجه د فلزي کلسیم د ویلې کیدو د درجې له ویلې کیدو څخه یعنې له 840°C څخه دې بنکته راوړل شي) د ویلې شوي حالت له الکترولایز څخه لاسته راوړي.

له لاندې شکل سره سم کلسیم (Ca) د او سپنې په کتود کې او دکلورین گاز په گرافیتی انود کې راټولېږي چې یو قیمتي گاز دی:




شکل: د فلزي کلسیم د برابرولو د ستگاه

د کلسیم د لاسته راوړنې نورې لارې د المونیم په واسطه د هغې د اکساید له ارجاع کولو څخه عبارت دي:



د کلسیم له فلز څخه د ځینو الیاژونو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي.



لومړی لوست

د درسي کتاب مخ: 144

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د فلزونو د لاسته راوړلو لارې
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې ترلاسه کړي:
- پوهنیزې - ذهني - مهارتي		- د فلزونو او دهغوی د لاسته راوړنې په بیلابیلو لارو دې پوه شي. - یقین دې ترلاسه کړي چې فلزونو داوسپنې د صنعت د ملاتیر جوړ کړی دی. - فلزونه دې په بیلابیلو لارو تر لاسه کړای شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او دیلا بیلو فلزونو نمونې
5- د ارزونې میتود		شفاهي او لیکني، پوښتنې او ځوابونه
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت به دقیقه
		د انګېزې رامنځته کول: ګول سپڅ څه شی دی؟ او دهغه د کارولو ځایونه کوم دي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي.		د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري.
د فلزونو په اړه دې هراړخیز معلومات ورکړي.		هغه معلومات چې ښوونکی یې د فلزونو په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي.
د فلزونو د برابرولو بیلا بیلې لارې دې روښانه کړي.		فلز لرونکي منرالونه چې ښوونکی یې وپېژني، زده کوونکي دې هغه یادداشت کړي او زده کوونکي دې هم د څو فلزي منرالونو نومونه واخلي.
لوست دې دڅوپوښتنو په کولو سره و ارز وي.		د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي او کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		

7- د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

دلوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8- د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د عناصرو ډله بندي

د عناصرو په ډله بنديو کې بايد درې مهمې مسالې په پام کې ونيول شي چې عبارت دي له:

لومړۍ: له قاعدې سره سم دهر گروپ د لومړيو عناصرو د ابعادو د کوچني والي له کبله دا عناصرونه دخپل گروپ له نورو عناصرو څخه بيل خواص له ځان څخه وربښي؛ دبيلگې په ډول: ليتيم په لومړي اصلي گروپ کې او بيريليم په دويم اصلي گروپ کې دی چې دخپل گروپ له نور عناصرو څخه يې خواص توپير لري او هايډروجن چې د $1s^1$ الکتروني جوړښت لري، د خپل گروپ له نور و عناصرو څخه بيل خواص لري، له دې کبله دا عنصر په جلا ډول د گروپ له نورو عناصرو څخه مطالعه کيږي.

دويم: هغه عناصرونه چې د مندليف په جدول کې يوله بل سره د دياگونال (Diagonal) په بڼه پراته وي، په ځانگړې توگه د I, II او III گروپ عناصرونه او د مندليف د جدول دکين لور عناصرونه يوله بل سره ورته کيمياوي خواص لري.


درېم: د الکترون ورکولو او الکترون اخيستلو خواصو په پام کې نيولوسره کيدای شي چې د عناصرو د زياتو خواصو وړاندوينه وکړل شي. د پاولنگ د الکترون اخيستلو په جدول کې ليدل کيږي چې فلورين ($EN=4$) غښتلی الکترون اخيستونکی عنصر او Cs ډير الکتروپوزتيف عنصر دی؛ نو پردې بنسټ په عمومي ډول: عناصرونه په فلزي عناصرو (د جدول کين لوري عناصرونه) شته فلزي عناصرونه (د جدول منځني عناصرونه) او غير فلزي عناصرونه (د مندليف ښي لوري) ویشل شوي دي.

عمومي معلومات: هغه عناصرونه چې د هغوی د d اوربیتالونه په پرله پسې توگه د الکترونونو په واسطه د ډک کيدو په حال کې دي، د انتقالي عناصرونو (Transational) په نوم ياديږي، دا عناصرونه د مندليف د جدول په منځنۍ برخې کې ځای لري او څرنگه چې مخکې وويل شول: په دې عناصرو کې د d د انرژيکي سوې او ربيټالونه د الکترونونو په واسطه د ډک کيدو په حال کې دي، دا سويه 5 اوربیتالونه لري، 10 الکترونونه دهغې اوربیتالونه ډک کوي؛ نو له دې امله د جدول په منځنۍ برخه کې 10 عمودي ستنې شته دي چې په هر ستنې کې څلور عناصرونه ځای لري، دا ستنې ياگروپونه د فرعي گروپونو $III_B, IV_B, V_B, VI_B, VII_B, VIII_B$ په نوم يادشوي دي، د اوسپنې، کوبالت، نيکل د گروپونو عناصرونه او هم د دې گروپونو د لاندې دورې عناصرونه، پلاتين او نور يې يوله بل سره ورته دي، دا درې ستنې په مجموعي ډول په $VIII_B$ فرعي گروپ کې ځای لري. دوه وروستۍ ستنې د I_B او II_B فرعي گروپونو په نوم ياد شوي دي، د يادولو وړده دا چې د $4f$ د فرعي سويو د اوو اوربیتالونو ډک کيدل د لنتانيم له عنصر څخه پيل شوي دي؛ نوله دې امله د لنتانيم له عنصر څخه وروسته څلوارلس نور عناصرونه په شپږم پيرود کې شته دي چې دهغوی د $4f$ اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه د ډک کيدو په درشل کې دي.

دا چې د f د اوربیتالونو د الکترونونو اړيکه له اړوند اتومونو سره د s او d په اوربیتالونو کې له شته الکترونونو څخه ټينگه ده؛ نو دا 14 عناصرونه د III_B د عناصرو سره ورته دي، له دې امله هغوی له لنتانيم څخه وروسته ځای لري او د لنتانيدونو (Lanthanides) په نوم ياديږي او تل هغوی د مندليف د جدول په ښکتنۍ برخه کې دهغوی د اړوند ځانگړتياوو سره ليکل

کیري.

په اووم پیربود کې هم 14 عنصرونه ځای لري چې د هغوی د 5F فرعي سويې اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه دډک کیدلو په درشل کې دي او له پورتنیو شرایطوسره یوشان د Actinium له عنصر وروسته ځای لري او دعنصرونو یوه ځانگړې سلسله یې جوړه کړې ده چې سره ورته خواص لري ، د عنصرنو دا سلسله هم د Lanthanidis سلسلې په شان د مندلیف د جدول په لاندینی برخې کې لیکل شوي دي او د Actinides په نام یادیري.



د مطلوبونو سرليکونه		د مطلوبونو شرح
1- د لوست موضوع		د لومړي گروپ فلزونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د لومړي اصلي گروپ د فلزونو او د هغوی د فزیکي او کیمیاوي خواص په اړه دې هر اړخیز معلومات ولري. - یقین دې تر لاسه کړي چې د لومړي گروپ فلزونه ځانته ځانگړي خواص لري. د لومړي گروپ عنصرونه دې د خواصو او د جوړښتونو په پام کې نیولو سره و کارول شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او د لومړي گروپ د عنصرونو نمونې
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او لیکنی)
6- په ټولگي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: کاسټک سوډا چې د هغې په واسطه صابون جوړېږي کوم فلزي عنصر لري؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه د مفاهیمو زده کړه او ارزونه		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پرمخ ولیکي. د لومړي گروپ د عنصرونو او د هغوی د فزیکي او کیمیاوي خواصو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. - څو اضافي بیلگې دې د لومړي گروپ د عنصرونو د خواصو په اړه ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د ښوونکي څرگندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکې دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د لومړي اصلي گروپ د عنصرونو د فزیکي او کیمیاوي خواصو په اړه وړاندې کوي یادداشت او زده دې کړي. - د عنصرونو د فزیکي او کیمیاوي خواصو په اړه وړاندې شوې بیلگې دې یادداشت او زده دې کړي. د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د I اصلي گروپ عنصرونه


د لومړي اصلي گروپ عنصرونه د القلي عنصرونو په نوم هم يادوي؛ ځکه د هغوی د اکسایدونو له هايډریشن څخه غښتلي قلوي جوړېږي. دا لاندې جدول د دې گروپ (لومړي اصلي گروپ) د عنصرونو نورمال پوتنسيال ښيي:

د لومړي اصلي گروپ د عنصرونو نورمال پوتنسيال په Me^+/M_e

Li	Na	K	Rb	Cs	Fr
-3.05	-2.71	-2.94	-2.93	-2.92	-2.92

په عمومي ډول د لومړي اصلي گروپ د عنصرونو نورمال پوتنسيال له پورته څخه ښکته خواته کمېږي، د پوتنسيال د قاعدې په بنسټ د Na^+/Na پوتنسيال بايد Li^+/Li څخه ډیروي؛ خو خبره برعکس ده.

د دې گروپ له عنصرونو څخه ښه ارجاع کوونکی سوډيم دی، د عنصرونو د ځينو غیر طبيعي والي چې زیاتره په دویم پیرودکې لیدل کېږي، د گروپونو د لومړيو عنصرونو د اتومونو د حجم د کوچني والي له امله دی، د Li^+/Li د جوړو د نارمل پوتنسيال غیر طبيعي والی کيدای شي د ترمودینامیک په مرسته، د هس په قاعدې او د Na^+/Na په پرتله روښانه کړل شي، که چېرې موخه د الکترونو د پوتنسيالو دکمیتونو له محاسبې څخه وي، کيدای شي چې هغه په دویم پیرودکې د ازادې انرژۍ پر بنسټ او د $-nF\Delta F_o = \Delta G$ معادلې په واسطه په لاس راوړل شي، ثبوت شوې ده چې ولې د Li^+/Li جوړو پوتنسيال له Na^+/Na څخه ټیټ دی؟ خو د دې مسلې د کیفیت پایله په اسانۍ سره د انتلې د بدلون له امله چې په دې پدیده کې بنسټیز رول لري، تر لاسه کېږي، دلته په لنډ ډول د هس دوره (سایکل Hess) د Li^+/Li او Na^+/Na د جوړو لپاره رسم او لیتیم د جوړې غیر طبيعي والی د څیړنې لاندې نیسو:




نا معلومه ΔH یعنې نیغه انتلې د نورو انتلېو له الجبري مجموعې څخه په لاندې ډول تر لاسه کېږي:

$$\Delta H = \Delta H_s + \Delta H_f + \Delta H_{hydron}$$

$$\Delta H(Li) = 159 \text{ kj} + 519 \text{ kj} - 558 = 120 \text{ Kjoule/mol}$$

$$\Delta H(Na) = 107 + 494 - 444 = 157 \text{ Kjoule/mol}$$

$Na^+(aq)$ د ایونایزیشن شوې انرژي کچه 157 Kjoule/mol (هايډریشن شوې) ده، په داسې حال کې چې د $Li^+(aq)$ د ایونایزیشن انرژي 120 KJ/mol ده چې غیر طبيعي ده؛ خو د Na الوتلو انتلې او ایونایزیشن انرژي د Li له اړوندې کچې څخه ټیټه ده چې طبيعي حالت لري او د عنصرونو د الکتروني جوړښت په خواصو پورې اړه لري.



دریم لوست

د درسي کتاب مخ: 150


د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		سودیم
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د سودیم د خواصو او د هغه د لاسته راوړنې د بیلابیلو لارو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - یقین دې تر لاسه کړي چې سودیم څانګړي خواص لري او په بیلابیلو لارو کیدای شي تر لاسه شي. - سودیم دې د بیلابیلو لارو په واسطه په لاس راوړي او وکارولی شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او فلزی سودیم
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهی او لیکنی)
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه.		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخیستل، وخت په دقیقه دقیقه د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انګېزې رامنځته کول: ولې سودیم د تیلو په بوتلونو کې ساتي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		وخت په دقیقه
د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه		40
- د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. - د سودیم، د هغه د کیمیاوي خواصو او د لاسته راوړنې د لارو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکوي. - د سودیم د لاسته راوړنې څو اضافي بیلګې دې ورکړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د سودیم، د هغه د فزیکي او کیمیاوي خواصو او د سودیم د لاسته راوړنې په هکله ورکوي یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي هغه بیلګې چې د سودیم، د هغه کیمیاوي خواصو او د سودیم د لاسته راوړنې په باره کې ورکوي، یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیتونه


سامان او اړتیاوړ مواد: د اوبو ډک تشت، فلزی سودیم، چاقو او پنس.

کړنلاره: د سودیم دوه یا درې ورې ټوټې د چاقو په واسطه پرې کړئ او هغه د پنس په واسطه له اوبو څخه په ډک تشت کې واچوئ. د سودیم په لمبو سوځیدل او د تعامل چټکتیا وگورئ، په دې اړه معلومات ورکړئ.



شکل: د اوبو سره د سودیم تعامل

حل: کله مو چې د سودیم دوه یا درې ورې ټوټې د چاقو په واسطه پرې او هغه د پنس په واسطه د اوبو څخه په ډک تشت کې وردننه کړو، د سودیم په لمبو سوځیدل او د تعامل چټکتیا یې لیدل کیږي چې د هغه د تعامل معادله په لاندې ډول ده:



8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د سودیم ډیر مرکبونه په طبیعت کې شته دي چې په صنعت او طبابت کې بنسټیز رول تر سره کوي، دلته د هغوی د ځینو په اړه معلومات وړاندې کیږي.

سودیم کلوراید

په صنعت کې په عمومي توګه د ګوګړو د تیزابو لګښت په لوړه سطحه کې ځای لري؛ خو په اوسني وخت کې د سودیم کلوراید لګښت ډیر زیات دی. په عمومي ډول سودیم کلوراید له طبیعي کانونو څخه په لاس راوړي، دلته غواړو پوه شو چې ولې د سمندرونو په اوبو کې د مالګو زیاته کچه شته ده؟ په اوبو کې د سودیم د ایون ($Na^+(aq)$) غلظت ډیر ځله له $K^+(aq)$ څخه زیات دی، په داسې حال کې چې د دې دوو عناصرو کچه په طبیعت کې په څه ناڅه توګه یو ډول پراختیا موندلې ده. د سودیم کلوراید د پراختیا موندلو درې لاملونه لاندې لیکل شوي دي:


1- د $K^+(aq)$ حجم له $Na^+(aq)$ څخه لوی دی، د دې ایون لویوالی له دې لامل کیږي چې ترڅو د هغه تعامل د اوبو له مالیکول سره د ایون - ډای پول په بڼه وي او دا عامل په اوبو کې د پوتاشیم د مالګو د نه حل کیدو لامل شوی دی.

2- د سودیم اړیکه په غیرعضوي مرکبونو کې له پوتاشیم څخه کمزورې ده؛ د همدې لامل له امله ده چې د سودیم آیونونه په اسانۍ سره د هغه له مرکبونو څخه جلا او د محلول په بڼه په سمندرونو کې شته؛ په داسې حال کې چې د پوتاشیم د مالګو په وجه کې ډاګر نه ترسترګو کیږي او په هغو ځایونو کې شتون لري چې نباتات په نه وي.

3- بل عامل د ځمکې د سطحې په نباتاتو پورې اړه لري، پوتاشیم د نباتاتو د ودې لپاره یو اړین عنصر دی، نباتات د پوتاشیم په

اڅېستنې کې له اغيزمنو ټاکنولارې په کار وړي، سره له دې چې په اوبو کې د سوډيم د مالگو غلظت د نباتاتو ريشې ته نږدې زيات دی؛ خو نباتات د $K^+(aq)$ (پوتاشيم ايونونه) جذبوي او سوډيم په حل شوي بڼه په اوبو کې پاتې کيدونکي دی چې په پای کې د سمندرونو اوبو ته ليرېډول کيږي.

د قلبي عناصرو په زړه پورې فزيکي خواص د هغوی خپرېدونکي سپکتر دي. کله چې ددې فلزونو په پراسونو کې برېښنايي خلارامنځته شي او يا د هغوی لږ څه مالگه د گازي څراغ په وړانگو واچوو، د ليتيم مالگې يا قوتي سور رنگ او د سوډيم مالگې زير رنگ لري او د پوتاشيم مالگې بنفش رنگ رامنځته کوي:



شکل: د لومړي اصلي گروپ د ځينو فلزونو رنگونه

څلورم لوست

د درسي کتاب مخ: 153

Be	1.5
Mg	1.2
Ca	1.0
Sr	1.0
Ba	0.9
Ra	0.9

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د دويم اصلي گروپ عنصرونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د دويم اصلي گروپ د عنصرونو ، د هغوی د خواصو او جوړښت په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د دويم اصلي گروپ عنصرونه ټول فلزونه دي او ځانته ځانگړي خواص لري. - له فلزي عنصرونو څخه دې په خپل ورځني ژوند کې گټه واخېستلی شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او د دويم اصلي گروپ د عنصرونو نمونې
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهی او لیکنی)
6- په ټولگي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخیستل، د وخت په کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: د چوڼې په جوړښت کې کوم عنصر شامل دي؟
1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تختې پر مخ ولیکي. - د دويم اصلي گروپ د عنصرونو او د هغوی د خواصو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. - د دويم گروپ د عنصرونو ځای دې د مندیلف په جدول کې زده کوونکو ته وټاکي او د هغوی جوړښت دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته بیان کړي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د دويم اصلي گروپ د عنصرونو په اړه وړاندې کوي یادداشت او زده کړي. - د ښوونکي ورکړل شوې بیلگې چې د دويم اصلي گروپ د عنصرونو او د هغوی د خواصو په اړه یې ورکوي یادداشت او زده دې کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د II اصلي گروپ عنصرونه (ځمکنې القلي عنصرونه)

د دويم اصلي گروپ ټول عنصرونو فلزونه دي چې فعال کيمياوي عنصرونه دي ؛ نو له دې امله په طبيعت کې په خالص ډول نه موندل کېږي.


د دويم اصلي گروپ د فلزونو د جوړو پوتنسيال $\frac{2+}{M e / M e}$ د هايډروجن د پوتنسيال لاندې شتون لري (له Be څخه پرته) ؛ نو له دې امله دوی د هايډرونيوم ايونونه ارجاع او هايډروجن ازادوي.

د Be^{2+} ايونونه ډير کوچني او قطبي دي ، د اوبو ماليکولونه ځانته جذبوي او کامپلکس مرکبونه $[Be(H_2O)_2]^{2+}$ جوړوي داچې Be^{2+} ايونونه قطبي دي ؛ نو له دې امله مرکبونه يې ډير زهري خواص لري ، له کولانتې اړيکې سره د BeX_2 په بڼه د بيريليم د مرکبونو جوړېدل ، د بيريليم ځانگړې ځانگړتيا وربښي چې د دې گروپ له نورو فلزونو څخه توپير لري.

بيريليم هايډرايد BeH_2 د هغو ماليکولونو ډول دی چې خطي فضايي جوړښت لري. د Be دوه هايبريد شوي اوربیتالونه چې د $2s$ او $2p$ د اوربیتالونو له خطي ترکيب څخه ترلاسه شوي دي د sp هايبريد اوربیتال دی چې په h_1 او h_2 ښودل کېږي ، د دې دوو اوربیتالونو ننوتنې او پوښښ د هايډروجن $1s_a$ او $1s_b$ له اوربیتالونو سره د اړيکو دوه د ($Bonding$) ماليکول اوربیتالونه له Ψ_1 او Ψ_2 څپو تابع سره جوړوي:

$$\Psi_1 = \lambda_1 h_1 + \lambda_2 1s_a$$


$$\Psi_2 = \lambda_1 h_2 + \lambda_2 1s_b$$



شکل : د دوو اوربیتال ننوتنه (د هايډروجن د اتومونو $1s$ د Be د sp په اوربیتال کې ننوتنه)


د BeH_2 په ماليکول د σ_x او σ_z د اړيکو اوربیتالونو انرژيکي سوې او د اړيکو نه جوړوونکو اوربیتالونو ($Antibonding$) په لاندې لیدل کېږي.

بريليم ډای کلورايد په BeO باندې د کلورين له اغيزې څخه په $600C^\circ$ تر $800C^\circ$ تودوخه کې چې کاربن هم شتون ولري ، په لاس راوړي.



شکل د BeH_2 په مالیکولې اوربیتال کې انرژیکې سويه يي

$BeCl_2$ دبیریلیم هایدراید (BeH_2) ته ورته د لیویس تیزابونو خواص لري، د خپل ډبل ګاونډي $BeCl_2$ مالیکول الکترونونه جذبوي او د BeX_4 څلور مخه جوړښت رامنځته کوي چې څلور سطحې ته ورته زنځیر د لاندې شکل سره سم جوړوي:



شکل : د $BeCl_2$ او BeH_2 جوړښت



پنځم لوست

د درسي کتاب مخ: 154

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		کلسيم
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي:
- پوهنيزې - ذهني - مهارتي		- د کلسيم په هکله ، د هغه د خواصو، لاسته راوړنې او د هغه د مرکبونو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي . - يقين دې ترلاسه کړي چې کلسيم او د هغه مرکبونه مهم مواد دي او په بيلابيلو لارو ترلاسه کيدای شي. - کلسيم او د هغه مرکبونه دې په بيلابيلو لارو لاس ته راوړلی شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير، د کلسيم د لاسته راوړنې د يوې نمايشي تجربې سامان الات
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکني)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضري اخېستل، وخت په دقيقه د کورنۍ د نډې کتل او د تير لوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول : د چونې په اړه معلومات لري ؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه وخت په دقيقه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د کلسيم په هکله ، د هغه د خواصو، لاسته راوړنې او مرکبونو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - د کلسيم د مرکبونو د کارولو څو بيلگې دې ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکې دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د کلسيم او د هغه د خواصو په اړه ورکوي، يادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي ورکړل شوې بيلگې چې د کلسيم د کارولو او د هغه د خواصو په اړه وړاندي شوې دي يادداشت دې کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د کلسيم او د هغه د گروپ د عناصرو ځينې ځانگړې ځانگړتيا

ځانگړتياوې	د اړوندو مرکبونو فورمول	د مرکب نوم
که چيرې د دويم گروپ د عناصرو کاربونيټونه تجزيه شي، د هغوی اکسايډونه ترلاسه کيږي چې له اوبو سره په چټکۍ تعامل کوي او په اړوندو هايډروکسايډونو بدليږي، نوموړي هايډروکسايډونه د قوي القليو خاصيت لري؛ خو بيريليم کلورايد امفوتریک خاصيت لري؛ نوموړی اکسايډ په لوړه تودوخه کې هم با ثباته دی.	MeO	اکسايډونه
که د دويم اصلي گروپ د عناصرو د اکسايډونو هايډریشن شي، د هغوی اړوند هايډروکسايډونه لاسته راځي او هم که چيرې د دې گروپ د عناصرو مالگو ته د سوډيم هايډروکسايډ په واسطه رسوب ورکړل شي، هايډروکسايډونه تر لاسه کيږي. د دويم گروپ د عناصرو هايډروکسايډونه په اوبو کې په لږه کچه حل کيږي (پرته د باريم هايډروکسايډ څخه). د دويم گروپ د عناصرو هايډروکسايډونه امفوتریک خاصيت هم لري؛ خو بيريليم هايډروکسايډ د امفوتریک خاصيت نه لري.	$Me(OH)_2$	هايډروکسايډونه
د دويم گروپ د عناصرو کاربونيټونه د تودوخې په واسطه تجزيه کيږي چې په اکسايډونو او CO_2 کاربن ډای اکسايډ بدلون مومي.	$MeCO_3$	کاربونيټونه
د دويم گروپ د عناصرو بای کاربونيټونه په جامد حالت بې ثباته دي او په اوبو کې ښه حل کيږي.	$Me(HCO_3)_2$	بای کاربونيټ
د دويم گروپ د عناصرو ډير نايټريټونه په لوړه تودوخه کې تجزيه کيږي چې په اکسايډونو او کاربن ډای اکسايډ بدليږي.	$Me(NO_3)_2$	نایټريټونه
د دويم گروپ د عناصرو د قوي تيزابونو مالگې په اوبو کې حل کيږي او د هغوی محلول خنثی دی؛ خو د بيريليم مالگې په اوبلن محلول کې هايډروليز کيږي او امونيم ته ورته ايون جوړوي.	MeA_2	د قوي تيزابونو مالگې

Ruby
(لوت سرخ)Sapphire
(لوت سړ)

ششم لوست

د درسي کتاب مخ: 157

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د دريم اصلي گروپ عنصرونه، المونيم
2- د زده کړې موخ		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د دريم گروپ د عنصرونو او د هغوی له ډلې څخه د المونيم، د هغه د خواصو، لاسته راوړنې او مرکبونو په اړه دې هر اړخيز معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د دريم گروپ عنصرونه او د هغوی له ډلې څخه المونيم په بيلا بيلو لارو تر لاسه کيدای شي . - د دريم گروپ د عنصرونو د هغوی له ډلې څخه المونيم دې په بيلا بيلو لارو استحصال او وکارولی شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او المونيم د لاسته راوړنې لپاره ديوي نمايشي تجربوي سامان الات
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکني)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضري اخېستل، د وخت په کورنۍ د نډې کتل او د تير لوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: زمرد څه شی دی ؟ د هغې په اړه دې معلومات وړاندې کړي .
6-1: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکې دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د دريم اصلي گروپ عنصرونو له هغوی ډلې څخه د المونيم، د هغه د خواصو، لاسته راوړنې او مرکبونو په اړه هر اړخيز معلومات ور کوي، يادداشت او زده دې کړي. - هغه بيلگې چې ښوونکي يې د المونيم د کارولو او د هغه د خواصو په اړه وړاندې کوي يادداشت دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
د ښوونکي د تدريس فعاليتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		- د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. - د کلسيم په هکله ، د هغه د خواصو، لاسته راوړنې او مرکبونو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - د کلسيم د مرکبونو د کارولو څو بيلگې دې ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.


7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

فعالیت


د المونیم تعامل د مالګې له رقیقو تیزابو سره

د اړتیاوړ توکي او مواد: تست تیوبونه، تست تیوب دانې، د خالص المونیم سیم (مزی) او د HCl نری تیزاب.

کړنلاره: په یو تست تیوب کې لږ څه HCl واچوئ او په هغه کې د المونیم مزی وردننه کړئ، د بدلونونو د رامنځته کیدلو لپاره مکس وکړئ او بدلونونه وګورئ، له لیدنو څخه وروسته د تعامل معادله په ګروپي شکل ولیکئ او په خپلو کتابچو کې یې یادداشت کړئ.



شکل : د المونیم تعامل د HCl له مالګې سره




8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات


د دریم اصلي ګروپ د عناصرو اکسایدونه

څرنګه چې بورون غیر فلز دی، د هغه اکسایدونه تیزابي خاصیت لري، له بورون څخه وروسته، په ګروپ کې المونیم شتون لري، د المونیم اکساید امفوتریک او له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی؛ ځکه خالص المونیم له هغه څخه په لاس راوړل کیږي.

کیدای شي چې بوریک اسید (H_3BO_3) د ګوګړو په تیزاب کې د بورکس د تیرو له حلولو څخه په لاس راوړل شي، د مرکب جامد بلوري دی چې په $171^\circ C$ کې ویلې کیږي، د $B(OH)_3$ مالیکول د اوبو د مالیکول د ازادو جوړه الکترونونو په جذبولو سره د لیویس د تیزاب په شان عمل کوي او کامپلکس مرکب جوړوي چې د برونسټیډ د تیزاب خاصیت لري.



د برونسټیډ تیزاب د لیویس تیزاب




بورکس اسید په لرګین موادو کې د اور د پرمختګ خنډ ګرځي؛ د بیلګې په ډول : د کاغذونو د سوځیدو خنډ کیږي.

د اور د خطر د ښکته راوړلو لپاره، له 5% بوریک اسید محلول څخه د کاغذ په خمیره او یا دکورونو د تودوخې په نه تیرونکو

موادو کې گټه اخیستل کېږي.

د غیر فلزونو اکسایدونه له اوبو پرته تیزابونو (د تیزابونو د انهایدارید) (Anhyderid acid) په نوم یادېږي. که د غیر فلزونو اکسایدونه هایدريشن شي، د هغوی اړونده تیزابونه لاسته راځي:




د الکترولیز په لاره د المونیم لاسته راوړنه

المونیم یو له هغو عنصرونو څخه دی چې د ځمکې په جوړېدو کې زیاته برخه لري، له اکسیجن او سیلیکان څخه وروسته په دریمه درجه کې راځي.

المونیم فعال فلز دی چې د کانونو په ډبرو کې موندل کېږي، د کانو دغه تیرې د بوکسیت په نامه شتون لري، ددې عنصر لاسته راوړنه د فلزونو له پاتې شونو څخه ستونزمن کار دی، په 1782 م کال کې لاوازیه وموندله چې المونیم اکساید دومره ثابت او کلک دی چې هیڅ ارجاع کوونکی یې نه شي کولای چې اکسیجن یې له المونیم څخه جلا کړي.

المونیم په 1854 م کال کې د سوډیم له تعامل څخه په گټه اخیستنې کشف شو، المونیم هغه قیمتي فلز دی چې په طبیعت کې لږ موندل کېږي، دریم ناپلیون د خپلو عزتمندو میلمنو د ښه میلمه پالنې لپاره له المونیمي قاشوغو او پنجو څخه گټه اخیستله.

په 1884 میلادي کال کې دوه پوهانو هریو: امریکایي چارلیزمارتین (Charls Martin Hall)، فرانسوی پوه ویل لوی توسن (Herutt, paul Louis Toussaint) دواړو به یو وخت کې د الکترولیز تعامل په واسطه د المونیم فلز لاسته راوړ، نوموړو علماو له کریولیت (Na_3AlF_6) څخه گټه اخیستله چې د دې موخې لپاره یې له اوبلن محلولونو څخه گټه واخیسته؛ خو د المونیم لپاره نه شي کیدای چې د Al^{3+} له اوبلن محلول څخه په الکترولیز کې گټه واخیستل شي؛ ځکه د ارجاعي پوتنسیال له نظره، اوبه د Al^{3+} له ایون څخه ژر ارجاع کېږي.




که څه هم د Al^{3+} اوبلن محلول الکترولیز ناشونی دی؛ خو آیونونه یې کیدای شي د المونیم د مالګې په ویلې کولو سره تر لاسه شي.

د جامد Al_2O_3 د ویلې کیدو درجه له 2050°C څخه زیاته ده چې په عملي توګه د هغه الکترولیز نا شونی دی، خو د Al_2O_3 او Na_3AlF_6 مخلوط د ویلې کیدو تودوخه 1000°C ده چې له هغه د الکترولیز څخه کیدای شي المونیم (Al) لاسته راشي.

المونیم د بوکسیت دکانو له تېرو څخه چې اوبه لرونکی المونیم اکساید او د هغو له ناپاکیو (ناخالص کاني) څخه چې په هغوی کې د اوسپنې، سیلیکان او تیتانیم اکسایدونه شتون لري، په لاس راوړي، په دې صورت کې لومړی د المونیم دکان تیرې په خالص المونیم اکساید بدلوي او د المونیم اکساید د لاسته راوړلو لپاره د سوډیم هایدروکساید د اوبلن محلول څخه گټه اخلي.


څرنګه چې المونیم اکساید امفوتریک خاصیت لري؛ نو له دې امله په قلوي محلول کې حل کېږي:



نور فلزي اکسایدونه چې د المونیم له اکساید سره مخلوط دي او د القلي خاصیت لري، په جامد حالت پاتې کیږي او محلول چې المونیت (NaAlO_2) په کې هم شتون لري، د نورو فلزونو د اکسایدونو له مخلوطونو څخه جلا کوي او هغه په تیزابي کاربن ډای اکساید تبدیلوي چې په دې پړاو کې اوبه لرونکی المونیم اکساید بیا لاسته راځي:




خالص المونیم اکساید ته تودوخه ورکوي ترڅو وچ شي، په دې پړاو کې خالص اکساید له کریولیت سره مخلوط او ویلې کوي، په وروستي پړاو کې د المونیم فلز تولید یږي چې د کاربن په سطحه په لوړه تودوخه کې د خالص المونیم اکساید الکترولیز ترسره کیږي چې په کتود کې د Al^{3+} ایونونه په Al ارجاع کیږي:





د حجرې په لوړه تودوخه، د المونیم فلز لاسته راځي او څرنگه چې د هغه کثافت له المونیم اکساید څخه زیات دی، المونیم د حجرې په لاندینۍ برخه کې رسوب کوي. د اکساید انیون په انود کې اکسیدي کیږي:

د اکسیجن گاز چې له پورتنۍ معادلې سره سم تولید شوی دی، د انود له کاربن سره تعامل کوي او په پایله کې کاربن ډای اکساید جوړیږي:



له دې کبله چې انود په لگښت رسیږي؛ نو باید بیرته ورغول شي، په حجره کې عمومي تعامل په لاندې ډول دی:



شکل: د المونیم داستحصال دستگاه



اووم لوست

د درسي کتاب مخ: 162

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		انتقالي فلزونه، اوسپنه
2- د زده کړې موخ		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د انتقالي عنصرانو اود هغوی له ډلې څخه د اوسپنې، د هغې خواصو، لاسته راوړنو او د هغې د مرکبونو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې انتقالي عنصرونه د هغوی له ډلې څخه اوسپنه او د هغې مرکبونه مهم مواد دي او په بيلابيلو لارو په لاس را تلای شي. - انتقالي عنصرونه د هغوی له ډلې څخه اوسپنه دې په بيلابيلو لارو تر لاسه او و دې کارولی شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر د اسپنې د لاسته راوړنې د یوې نمایشي تجربې سامان الات
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهی او لیکنی)
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، وخت په دقیقه د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول : د حاجی ګګ د کوتل په کان کې کوم فلز شته ؟
1-6: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي. - ښوونکي د انتقالي عنصرانو د هغوی له ډلې څخه د اوسپنې، د هغې دخواصو، لاسته راوړنې او د هغې د مرکبونو په اړه دې هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. - د اوسپنې د مرکبونو د کارولو څو بیلګې دې ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره وارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دننه ورکړي.		د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیر شي، د هغوی مهم ټکې دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې د انتقالي عنصرانو د هغوی له ډلې څخه د اوسپنې، د هغې د خواصو، لاسته راوړنې او د هغې د مرکبونو په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي وړاندې شوی معلومات دې د اوسپنې د کارولو او د هغې د خواصو په اړه وړاندې کوي، یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي او کورنۍ دننه دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

د انتقالي عناصرو ($d - Elements$) عمومي ځانګړتياوې

د انتقالي عناصرو زیاتره یې کلک فلزونه دي چې په جوړښتیزو چارو کې زیات د کارولو ځایونه لري. اوسپنه په فلزي بڼه، مس، و نادیم، نیکل، او منګان د الیاژونو په جوړولو کې بنسټیز رول لري، نوموړي فلزونه د انساني ټولنې د نن ورځې تمدن لامل شوي دي، د انتقالي عناصرو په منځ کې نور فلزونه هم شته چې د نننۍ ورځې پرمخ تللي صنایعو کې بنسټیز رول لوبوي؛ دبیلګې په ډول: د تیتان (Ti) فلز څخه د طیارو د جوړولو په صنعت کې، و نادیم (V) په کیمیاوي تعاملونو کې دکتلست په توګه کارول کېږي، د دې ډول عناصرو په منځ کې قیمتي فلزونه چې د نړۍ د ډیرو هیوادو نو دیپسو باوري پانګه ده، شتون لري او دا فلزونه عبارت له پلاتین، سره زر او سپین زر دي، دنوموړو فلزونو د سطحو د ښایست او د اکساید نه کیدلو (خرابیدلو) په مقابل کې دکلکوا لي له امله د سینګار فلزونو په توګه تري ګټه اخیستل کېږي، دا ټول عناصرونه فلز دي او برېښنا تیروي. سپین زر په عادي شرایطو کې لومړۍ درجه برېښنا تیرونکې دی، دا فلزونه ځلانده دي، د خټک خوړلو وړتیا لري چې په نازکو پاڼو بدلون موندلی شي او ورڅخه سیمونه (مزي) جوړېږي، د هغوی د زیاتو رنګ سپین دی او دهغوی د ایشیدو درجه د لومړۍ او دویم ګروپ د فلزونو څخه لوړه ده؛ خو په دې برخه کې استثنا هم شته ده؛ دبیلګې په ډول: مس سور رنګ چې قهویي ته ورته دی، سره زر ژېړ رنګ او سیماب په STP شرایطو کې مایع حالت لري چې سپڅلی دی.

د d عناصرونه چې د دوره یي جدول په کینې برخې کې شتون لري، د d ګروپونو عناصرونو سره ورته والی لري، د دې ګروپونو عناصرونه ځینې یې زیات الکتروپوزیتیوې ځانګړتیا لري چې زیات مرکبونه لري او د هغوی را ایستل د کانونو څخه ستونزمن دي.

دریم فرعي ګروپ عناصرونه

د دې ګروپ د عناصرو ځینې مهم فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې په لاندې جدول کې لیکل شوي دي:

د دریم فرعي ګروپ د عناصرو فزیکي خواص

عنصرونه	Sc	Y	Li^*	As^{**}
ځانګړتیاوې				
الکتروني جوړښت	$(Ar)3d^1 5s^2$	$(Kr)4d^1 5s^2$	$(Xe)5d^1 6s^2$	$(Rn)6d^1 7s^2$
د ایشیدو درجه	2730	2927	3470	-
د ویلي کیدو درجه	1539	1509	920	1050
کثافت	3.0	4.47	6.17	-
EN	1.3	1.3	1.1	1.1

سکاندیم (Sc) چې لومړۍ انتقالي عنصر دی، په 1937م کال کې کشف شو، دا عنصر ډیر فعاله کیمیاوي عنصر دی چې د

کلسیم غونډې له اوبو سره په اسانۍ تعامل کوي، په لمدو هوا کې د هغه سطحه توره او تیاره تر سترگو کېږي. Sc^{3+} ایون د قوي القلیو؛ لکه: د المونیم هایدروکساید سره تعامل کوي او مرکبونه جوړوي چې کامپلکس هایدرايتي مرکب جوړوي چې د هغوی بیلگه کیدای شي $[Sc(H_2O)_6]^{3+}$ وړاندې کړای شي. دا مرکب د برونستید له نظره تیزاب دی چې د هغه د تیزابیت قدرت له CH_3COOH سره یوشان دی.


د لنتانیدونو د سلسلې 14 عنصرونه چې د لنتانیم په حجره کې ځای لري، د اکسیدیشن نمبر یې 3 + دی او اکسایدونه یې د قلیو ځانګړتیاوې لري، د دې عنصرونو ارجاعي پوتنسیال منفي دی او د هغوی خواص د *IIIB* ګروپ د عنصرونو له خواص سره سمون لري، دا ټول عنصرونه د 3 + اکسیدیشن درجه ځانته غوره کوي او ځینې یې د 2 + او 4 + اکسیدیشن نمبر هم لري د هغوی د 2 + او 4 + د اکسیدیشن نمبرونو د شتون لامل د هغوی د *f* اوربیتالونو په پرله پسې توګه ډک کیدل د الکترونونو په واسطه دي چې په *f* 4 کې د اعظمي حد الکترون د بشپړیدو له امله ترسره کېږي.

د IVB فرعي ګروپ عنصرونه


د څلورم فرعي ګروپ عنصرونه او د هغوی ځانګړې ځانګړتیاوې په لاندې جدول کې لیکل شوي دي:

عنصرونه ځانګړتیا	^{22}Ti	^{40}Zr	^{72}Hf	^{40}Kr
الکتروني جوړښت	(Ne)3d ² 4s ²	(Ar)4d ² 5s ²	(Kr)5d ² 6s ²	(Rn)6d ² 7s ²
د ایشیدو درجه	3260	3580	5400	-
د ویلي کیدو درجه	1668	1852	2222	-
کثافت	4.51	6.49	13.1	-
الکترونیګاتیویټي	1.5	1.4	1.3	-

تیتان سپک فلز دی؛ له دې امله د الوتکو بادۍ له هغه څخه جوړېږي، د پوډه کیدو او خرابیدو په مقابل کې له ځان څخه مقاومت وربښي؛ ځکه د هغه سطحه اکساید پوښوي، د هغه دکانی ډیږي (Ilmenite) له مضاعف اکساید $FeTiO_3$ او روتیل (*Rutile*) څخه چې د TiO_2 د اکساید په بڼه دی، جوړ شوی دی او د هغه د لاسته راوړنې په موخه د هغه د اړوندو اکسایدونو او له قوي ارجاع کوونکو څخه کار اخیستل کېږي چې د تعامل معادله یې په لاندې ډول ده:





د تیتان عنصر په خپل باثباته مرکبونو کې، 4 + اکسیدیشن نمبر لري او د هغه ډیر مهم مرکب TiO_2 دی، دا مرکب زهري نه دی او کلک عنصر دی، له هغه څخه د انځور ګرۍ په رنګونو کې ګټه اخلي. $TiCl_4$ په عادي شرایطو کې مایع او د تودوخې په $136^\circ C$ کې ایشیږي، په لمدې هوا کې هایدرولیز کېږي چې ور څخه لوګی ازادېږي:




له پورتنی تعامل څخه دخبرتیا د مطالبو د لیکلو په موخه له الوتکو د لارې په هوا کې ګټه اخیستل کېږي او خلک خبروي،

د Ti^{3+} ایون له Al^{3+} ایون سره یوشان دی چې د وړوکی توپ او لوړچارج له امله د برونستید د تیزاب خاصیت له ځان څخه ورښيي ، په اوبلن محلول کې اکواکامپلکس $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ جوړوي چې پروتون ورکونکی دی:



تیتان د تیتانیت په نوم مالګې؛ د بیلګې په ډول: $(CaTiO_3)$ او $(BaTiO_3)$ هم لري چې د لاندې معادلې سره سم ترلاسه کېږي:



$BaTiO_3$ جامد مرکب دی او *Piezoelectric* دی ، *Piezoelectric* خاصیت په بلوري شبکې کې د میخانیکي بدلونونو په واسطه د برېښنا منځته راوړل دي ، په رښتیا چې په هغه کې میخانیکي اهتزازونه په برېښنايي نښو بدلیږي.

د ونادیم ګروپ (د V فرعي ګروپ عنصرونه)

په دې ګروپ کې ونادیم (V) (Vanadium) ، نیوبیم (Niobium) ، و تانتالیم Tantalum شتون لري:


لاندې جدول د V فرعي ګروپ د عناصرو خواص روښانه کوي.

5	Vb	23	V	41	Nb	73	Ta	105	Db
50.942	1890	92.906	180.95	180.95	262.11	262.11	262.11	262.11	262.11
1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5	2, 3, 4, 5


و نادیم د ایرو د سپینو زرو بخنه رنگ لري او نرم دی ، دا عنصر د V_2O_5 له ارجاع څخه په لاس راوړي او یا داچې د کلورو ونادیم له ارجاع څخه ترلاسه کېږي ، دلته ارجاع کوونکی منګان دی، دا عنصر د پولادو په جوړولو کې کارول کېږي.

V_2O_5 په کیمیاوي صنعت کې د کتلست په توګه په کارول کېږي چې یوه ژېړ رنگه جامده ماده ده . VO_2^+ ایونونه د کاشي جوړونې او سرامیک جوړونې په صنعت کې په لګښت رسیږي.


V_2O_5 امفوتریک خاصیت لري ، که چیرې V_2O_5 په تیزابي محلول کې حل شي ، په پایله کې د VO_2^+ ایونونه تر لاسه کېږي:



په تیزابي محلولونو کې د VO^{2+} ایونونه پولي میرایزن کېږي چې معادله یې په لاندې ډول ده :



V_2O_5 په القلیو کې حل کېږي او د VO_4^{3-} انیون جوړوي چې دا انیون هم د پولي میرایزن عملیه تر سره کوي:





اتم لوست

د درسي کتاب مخ: 166

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		مس، کروميم
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د مس او کروميم د عناصرونو، د هغوی د خواصو، لاسته راوړنې او مرکبونو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د مس او کروميم عناصرونه او د هغوی مرکبونه مهم مواد دي او په بيلابيلو لارو تر لاسته کيدای شي. - د مس او کروميم عناصرونه دې په بيلابيلو لارو لاسته راوړي او ودې کارولی شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير، مس، کروميم او د هغوی مرکبونه
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهی او لیکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: د مس ديگونه موليدلی دي؟ د هغوی په اړه معلومات لری؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تختې پرمخ وليکي. د مس او کروميم د عناصرونو په هکله، د هغوی د خواصو، لاسته راوړنې او د مرکبونو په اړه دې هر اړخيزه معلومات ورکړي. د مس او کروميم د مرکبونو د کارولو په هکله دې څو بيلگې ورکړي. د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. د لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. د زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکې دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د مس او کروميم د عناصرونو، د هغوی د خواصو، لاسته راوړنې او مرکبونو په اړه وړاندې کوي يادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي ورکړل شوي بيلگې چې د مسو او د هغوی د خواصو په اړه يې ورکوي، يادداشت او زده دې کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه


د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات

په شپږم فرعي گروپ کې د کرومیم (Chromium) موليبدنيوم (Molybdenium)، ولفرام (Tungston) عنصرونه شته چې د هغوی ځينې ځانگړتياوې په لاندې ډول لاندې شوي دي.

الکترونيگاتوټي	کثافت	د ویلې کیدو درجه	د ایشیدو درجه	الکتروني جوړښت	ځانگړتياوې عنصرونه
1.6	7.19	1875	2665	$(Ar)3d^5 4s^1$	C _r
1.8	15.2	2610	5560	$(kr)4d^5 5s^1$	Mo
1.7	19.3	3410	5930	$(Xe)4f^{14} 5d^5 6s^1$	W


د دې گروپ لومړنۍ عنصر کرومیم دی، دا عنصر روښانه ژېړ رنگ لري او د زنگ وهلو په مقابل کې مقاومت لري، د هغه دکان تیرې د اوسپنې او کرومیم مضاعف اکسایدونه لري چې د هغه ارجاع د کاربن په مرسته په برېښنايي قوس کې په لاندې توگه ترسره کېږي:



د IB گروپ عنصرونه (مس، سپین زر او سره زر)

مس (Copperium)

د مسو کیمیاوي فعالیت کم دی او د ځینو ډبرو په سطحه کې په ازاده شتون لري؛ خو د ځمکې د کرې د مسو ډبره برخه د سلفایدونو په بڼه شته چې د هغو کاني ډبرې د چلکو پیرایت ($CuFeS_2$) په نوم یادېږي او د شگو مینځلو له لارو یې له دې تېرو څخه جلا کوي، داسې چې د مسو د کان ډبرو په کوچنیو ټوټو بدلوي او په پوډرو تبدیلوي؛ بیا یې په مایعاتو کې د لامبو وهونکو په بڼه راوړي ترڅو مس د کان له ډبرو څخه جلا شي، په دې مخلوط کې لږ څه غوړي هم اچوي او بیا د دې مخلوط له منځ څخه هوا تیروي، هغه کاني تیرې چې په مایع کې د لامبو په بڼه شتون لري، دلونې په پورتنۍ برخه کې ځای پر ځای کیږي، خاورې او درندې ډبرې دلونې په ښکتنۍ برخې کې رسوب کوي، کاني ډبرې له هوا او غوړیو سره یوځای له پورتنیو سوړیو څخه بیرون وځي، په دې ځای کې څه ناڅه ځانگړې خالصه تیرې تر لاسه کوي، لاندې شکل د مسو د لاسته راوړل د کاني ډبرو دستگاه ښیي.




شکل : د مسو د کاني دبرو د ناخالصونو د جلاکولو دستگاه

د مسو په اړه په درسي کتاب کې زیات معلومات ورکړل شوي دي، دلته د لومړي فرعي گروپ د نورو عناصرو په اړه معلومات ورکول کېږي:


سپین زر: سپین زر په طبیعت کې په فلزي ډول په لږه کچه موندل کېږي چې د مسو او سربو د را ایستلو ترڅنگ ، سپین زر هم له کانونو څخه تر لاسه کېږي.

د سپینو زرو د الکتروډو پوتنسیال هم له هایډروجن څخه پورته ځای لري؛ نو له دې کبله سپین زر د هایډرونیوم (H_3O^+) ایون ارجاع کوي؛ خو سره ه د دې هم HNO_3 سپین زر په ځان کې حلوي او له لاندې معادلې سره سم له هغه سره تعامل کوي:




سپین زر په اوبلو محلولونو کې د Ag^+ ایون په بڼه شتون لري چې نه ارجاع کېږي. دسپینو زرو ټول مرکبونه په اوبو کې نه حل کېدونکي دي (پرتله د $AgNO_3$ او AgF). د سرو زرو مهم تعامل له NO_3^- سره دی چې $AgNO_3$ مرکب جوړوي.

سره زر: د سرو زرو کیمیاوي فعالیت کم دی چې په طبیعت کې په ننگه (خالصه) توګه موندل کېږي، خالصه سره زر ځلا لري، له خپلو الیاژونو څخه کلک دي. دخالصو سرو زرو 24 عیار الیاژ له خپل اړوندو نورو الیاژونو څخه یې ځلا ډیره ده، دسرو زرو د الیاژو کلکوالی او ځلا په بیلابیلو سلنو سره ده؛ د بیلګې په ډول: 10 عیار او 14 عیار دسرو زرو الیاژونه په پرله پسې توګه د $\frac{10}{24}$ او $\frac{14}{24}$ دکتلي برخه یې له سرو زرو څخه جوړه شوي ده. د $\frac{Au^+}{Au}$ جوړو پوتنسیال $1.69V$ او د $\frac{Au^{3+}}{Au}$ جوړو پوتنسیال $1.4V$ دی. د دې په پام کې نیولو سره د NO_3^- / NO الکتروډ پوتنسیال د نایټریک اسید د ارجاعي تعامل له کبله عبارت له:




هیڅ نه حل کېږي او په سلطاني تیزاب کې چې درې برخې یې د HCl ټینګ تیزاب او یوه برخه یې له نایټریک اسید HNO_3 څخه جوړ شوی دی، حل کېږي. په عملي توګه نوی اتومي کلورین چې منځته راغلی دی، د هغه دحل کیدو لامل ګرځي:




د پورتنی تعامل د تعادل ثابت له یو څخه کوچنی دی؛ خو څرنگه چې د Au^{3+} ایونونه په محلول کې پاتې کیدای نه شي او د $[AuCl_4]^{1-}$ کامپلکس په بڼه دی؛ نو تعامل له کینې لوري څخه بڼې لوري ته ترسره کیږي.

د سرو زرو طبیعي اکسیدیشن نمبر (+3) دی او د سرو زرو مرکبونه چې د هغې د اکسیدیشن نمبر 1+ وي، یوازې په اوبلن محلولونو کې کیدای شي شتون ولري، دا مرکبونه د اوبلن کامپلکس په بڼه شتون لري او په چټکتیا سره په Au^{3+} ایون بدلیږي:




$$\frac{[Au^{3+}]}{[Au^{1+}]^3} = 10^{-10}$$

که چېرې د Au^{1+} (یو اټوم-ګرام) په محلول کې شتون ولري په کامپلکس ایونونو بدلون مومي او د تعامل له محیط څخه وځي؛ نو له دې کبله سره زر په اوبلن محلول کې د اکسیجن او د CN^- د ایون په شتون کې په لومړي سر کې په Au^+ بدلون مومي او په چټکۍ سره له CN^- سره تعامل کوي، کامپلکس مرکبونه جوړوي.



له پورتنۍ معادلې سره سم، سره زر د کانو دېږو څخه جلاکوي او په پورتنۍ نوموړي کامپلکس مرکب بدلون مومي، نوموړی کامپلکس د هغه جست په واسطه چې په محلولي محیط کې شتون لري، ارجاع کیږي، په پایله کې سره زر رسوب کوي او د دې محلول له صافولو وروسته لاسته راغلي سره زر په سلطانی تیزابو کې حلوي او په $[AuCl_4]$ یې تبدیلیږي چې د دې کامپلکس د ارجاع کولو په پایله کې خالص سره زر لاسته راځي.



لسم څپرکی

د څپرکي موضوع : غیر فلزي عنصرونه

1- د تدریس وخت (7 درسي ساعتونه)

گڼه	د لوست سرلیکونه	درسي ساعتونه
1	د غیر فلزي عنصرونو ځانګړي خصوصیات، د اووم ګروپ عنصرونه	یو درسي ساعت
2	کلورین	یو درسي ساعت
3	د شپږم اصلي ګروپ عنصرونه، اکسیجن	یو درسي ساعت
4	سلفر	یو درسي ساعت
5	د پنځم اصلي ګروپ عنصرونه، نایټروجن، فاسفورس	یو درسي ساعت
6	د څلورم اصلي ګروپ عنصرونه، کاربن	یو درسي ساعت
7	د څپرکي لنډیز او د څپرکي پوښتنې	یو درسي ساعت

2- د څپرکي پوهنیزې موخې

- زده کوونکي دې پوه شي چې د $ns np$ عنصرونه غیر فلزي خواص لري او ځانته اړونده ځانګړې جوړښت لري.

- زده کوونکي دې درک کړي چې $ns np$ عنصرونه غیر فلزي خواص لري چې په شپږو ګروپونو ویشل شوي او په بیلابیلو چارو کې په کار وړل کېږي.




- غیر فلزي عنصرونه دې له فلزونو او شبه فلزونو څخه توپیر کړي او هغوی دې د خپل ژوند په چارو کې وکارولای شي.

د څپرکي د پوښتنو ځوابونه


1- د، 2- ج، 3- ب، 4- د، 5- الف، 6- د، 7- د، 8- ج، 9- الف، 10- ب، 11- ج.

د تشریحي پوښتنو ځوابونه

1-




2- غیر فلزي عنصرونه هغه عنصرونه دي چې د بانډیني انرژیکې سوبه د P فرعي سوبې اوربیتالونه یې د الکترونونو په واسطه د ډک کیدو په درشل کې دي او د الکترونونو په اخیستو سره خپل بانډیني قشر یې په اتو، الکترونونو پوره کوي. غیر فلزي عنصرونه د پریوډیک جدول په کینه خوا کې ځای پرځای دي.



7- د شپږم گروپ د عنصرونو ځانگړې ځانگړتیا دا ده چې دوی د خپل گروپ له ټاکلي عنصر (اکسیجن) سره تعامل کوي او د مثبت اکسیدیشن نمبر ځانته غوره کوي. د دې عنصرونو گڼه ځانگړتیا د هغوی په الکتروني جوړښت ($ns^2 np^4$) پورې اړه لري، د دې عنصرونو د P فرعي سوبې په اوربیتالونو کې دوه طاقت الکترونونه شتون لري چې دوه ولانسه عمل کوي.

اکسیجن یو ټیپیک غیر فلز دی چې 2% یې اتموسفیر، 45.5% یې ځمکه او 65% د انسان د بدن کتله یې جوړه کړې ده، له ټولو فلزونو او غیر فلزونو (له هیلیم، نیون او ارگون څخه پرته) سره تعامل کوي، د هغوی اړونده اکسایډونه جوړوي.

8- اوزون د اوبو رنګ ته ورته روښانه گاز دی چې په $-111.3^\circ C$ کې په ایشیدو راځي او ډیر زهري دی، اوزون په درې اټومي بڼه د اکسیجن یوه الوتروپي ده. د برېښنا د تولید د ماشینونو ترڅنګ او په هغو ځایونو کې چې د تندر پینه رامنځته کیږي، د اوزون تخریش کوونکې بوی پوزې ته رسیږي، د اوزون په مالیکول کې د اړیکې اوږدوالی د سوپر اکساید (O_2^-) په مالیکولونو کې د اړیکې له اوږدوالي سره یوشان دی، د ساده اړیکو او دوه گونو اړیکې تر منځ منځنۍ حد لري، په دې مالیکول کې د ریزونانس (گرځیدلو) جوړښت چې لاندې لیدل کیږي، پورتنی مطلب روښانه کوي:



اوزون په اوبلنو محلولونو کې د اکسیدي کوونکي په توګه عمل کوي او د هغه ستندرد پوتنسیال $2.07V$ دی.

9- د اکسیجن د کارولو ځایونه: د اکسیجن په نه شتون کې د حیواناتو او نباتاتو د ژوند امکان نه شته، په هغو ځایونو کې چې اکسیجن نه وي، هغه ځای ته خالص اکسیجن د تنفس لپاره له ځانه سره وړي؛ د بیلګې په ډول: په لوړې فضا او د سمندر د اوبو د لاندې برخې اکسیجن په بالونونو کې اچوي او له هغه څخه د تنفس لپاره ګټه اخلي، هغه ناروغان چې اکسیجن په نورمال ډول نه شي تنفس کولی، هغوی ته خالص اکسیجن په مصنوعي ډول ورکوي.


د اکسي استیلین په څراغونو کې د فلزونو د پرې کولو او ولدینګ کولو په موخه هم کار ول کیږي، د الکولو او د اکسیجن له محلول څخه په مصنوعي سپورمکیو کې د سوخیدونکو موادو په توګه کار اخېستل کیږي.

10- د دوره یي جدول د VA اصلي گروپ عنصرونه

په دې گروپ کې نایټروجن (N)، فاسفورس (P)، ارسنیک (As)، انټیمونی (Sb) او بسموت (Bi) شامل دي، د دې گروپ عنصرونه 5 ولانسي الکترونونه لري.

د کوټی په تودوخه کې نایټروجن بې رنګه گاز، فاسفورس د مومو په شان (سپین، سور او تور رنګ) ارسنیک خاورین فولادي رنګ، انټیمونی جامد سپین ابي رنګ او بسموت جامد روښانه رنګ له فلزي څلا سره لري، نایټروجن (N) او فاسفورس (P) مطلق غیر فلزونه، As او Sb شبه فلزونه او Bi غیر فلز دی. د دې گروپ د عنصرونو د باندیني الکتروني قشر جوړښت $ns^2 np^3$ دی، په مرکبونو کې 5+ او 3- د اکسیدیشن نمبرونه ځانته غوره کوي، د درې الکترونونو په اخېستلو د خپل پیږود د نجیبه گاز حالت او د 5 الکترونونو په ورکولو سره د خپل مخکنی پیږود د نجیبه گاز حالت غوره کوي.

11- نایټروجن د کتلست، تودوخې او ډیر فشار په شتون کې له هایډروجن سره تعامل کوي او امونیا جوړوي:




12- د کاربن دوه الوتروپي ډیر ارزښت لري چې له گرافیت او الماس څخه عبارت دي ، گرافیت د زیاتې تودوخې او د فشار په شتون کې په کم وخت کې په مصنوعي الماس تبدیلېږي:


(په خپل سر بهیر) (گرافیت) C → (الماس) C

(تر ډیر فشار لاندې) الماس C → (گرافیت) C

د کاربن الوتروپي نوې بڼه په 1985 م کال کې د انګلیسي څیړو نکو له ډلې په واسطه د هنري کروتو په لارښوونې له پخوانیو ډبرو څخه کشف شوه چې په هغوی کې د کاربن 60% اتومونه سره یوځای شوي او C_{60} مالیکول یې جوړکړی دی چې د فوټبال د توپ او یا د ساکر د توپ بڼه لري او د فولیرنس په نوم یاد شوی دی ، د فولیرنس د کشف له امله د نوموړو پوهانو ډلې په 1994 کال کې د نوبل جایزه واخیسته.



شکل : د کاربن الوتروپي گانې



لومړی لوست

د درسي کتاب مخ: 172

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د غیر فلزي عناصرونو ځانګړي خصوصيات، د اووم اصلي ګروپ عناصرونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د غیر فلزي عناصرونو او د اووم اصلي ګروپ د عناصرونو ځانګړي خصوصيات دې زده کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې غیر فلزي عناصرونه اود اووم اصلي ګروپ عناصرونه غیر فلزونه دي او د طبيعت مهم عناصرونه شميرل کېږي. - غیر فلزي عناصرونه او د اووم اصلي ګروپ عناصرونه دې د ځانګړتيا پربنسټ له فلزونو اوشبه فلزونو څخه توپير کړي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر او د غیر فلزي عناصرونو نمونې
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او لیکنی)
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د وخت په دقیقه کورنۍ د نډې کتل او د تیر لوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: کوم مواد د اوبو په کلورینیشن کې په کار وړل کېږي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. - د غیر فلزي عناصرونو او د اووم اصلي ګروپ د عناصرونو د ځانګړو ځانګړتیاو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. - د غیر فلزي عناصرونو څو بیلګې دې د هغوی د ګروپ په پام کې نیولو سره ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرګندونو ته دې څیړشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې د غیر فلزي عناصرونو او د اووم اصلي ګروپ د عناصرونو په اړه وړاندې کوي یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي ورکړل شوې بیلګې دې چې د غیر فلزي عناصرونو او د اووم اصلي ګروپ د عناصرونو په اړه ور کوي، یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه


د لوست په متن کې پوښتنه نه شته

8 - د ښوونکي لپاره اړين معلومات


د غیر فلزي عناصرو له ډلې څخه یو مهم عنصر هایدروجن دی چې په لومړي گروپ کې له فلزونو سره ډل بندي شوی دی، اړینه ده چې د هغه په هکله معلومات ورکړل شي.

هایدروجن Hydrogen


هایدروجن د طبیعت د هغو عناصرو له ډلې څخه دی چې په طبیعت کې ډیر موندل کیږي او د طبیعت 75% کتله له هغه څخه جوړه شوې ده، د دې عناصر الکتروني جوړښت $1s^1$ دی، درې ایزوټوپونه لري چې له سپک هایدروجن ${}^1_1\text{H}$ (Protium)، ${}^2_1\text{D}$ (Deuterium) او ${}^3_1\text{T}$ (Tertium) څخه عبارت دی، تیریشیم ${}^3_1\text{T}$ رادیو اکتیف دی، د هغه نیم عمر 12.3 کاله دی چې د β وړانګې ور څخه وځي او په ${}^3_2\text{He}$ بدلون مومي:




په طبیعت کې د ${}^2_1\text{D}$ سلنه 0.02% ده چې له ${}^1_1\text{H}$ سره مخلوط دی، له ${}^2_1\text{D}$ ایزوټوپ څخه د عضوي تعاملونو د میخانیکونو په ټاکلو کې ورڅخه گټه اخیستل کیږي، هایدروجن د ځمکې په قشر کې په ازاده بڼه نه موندل کیږي او د کیمیاوي مرکبونو په بڼه شتون لري. هایدروجن په صنعت کې ډیر کارول کیږي، په امریکا کې د هایدروجن 0.3 ټنه په یو کال کې په لگښت رسیږي، د هغه $\frac{1}{100}$ ام برخه یې په فضايي سفینو کې د سون د موادو په توګه او 50% یې د امونیا په جوړولو کې کارول کیږي:



د متیانول د لاسته راوړنې لپاره هم له هایدروجن څخه گټه اخیستل کیږي:




پورتنی تعامل د کنتلستونو؛ لکه: کرومیم، المونیم اکساید او نورو په شتون کې ترسره کیږي، په پورتنۍ لاره میتانول ترلاسه او له هغه څخه د پلاستیک جوړولو په صنعت کې او هم د اسیتیک اسید په مرسته د مصنوعي الیافونو د جوړولو لپاره ورڅخه گټه اخیستل کیږي. له کانونو څخه د مسو په را ایستلو کې هم له هایدروجن څخه کار اخیستل کیږي:



د $\frac{\text{H}^+}{\text{H}_2}$ د جوړو نارمل پوتنسیال صفر دی او د $\frac{\text{Cu}^{2+}}{\text{Cu}}$ پوتنسیال 0.34V دی؛ نو له دې امله د پورتنی تعامل نورمال پوتنسیال 0.34V دی. کاني ډبرې چې له CuO ، CuS جوړې شوې وي، په H_2SO_4 کې حل کیږي، له فلترکولو څخه وروسته لاسته راغلی محلول د هایدروجن له گاز څخه تیروي، په پایله کې Cu^{2+} ارجاع اوپه خالصه توګه ترلاسه کیږي، دا رنگه صنعت د هایدرو میتالورجی په نامه یادېږي. په غذايي صنعت کې د مایع غوړیو تبدیلول په جامدو غوړو، له


هایدروجن څخه گټه اخیستل کیږي:




پورتنی تعامل په 22°C او 100atm فشار شونی دی او هم په دې تعامل کې Ni د کتلست په توګه په کار وړل کیږي.

د هایدروجن صنعتي لاسته راوړنه

د هایدروجن ډیره لویه برخه چې په صنعت کې په لګښت رسیږي، د هغو هایدروکاربنونو له کرکنګ (Caracking) تعامل څخه چې کوچنۍ مالیکولي کتله لري، ترلاسه کیږي، د دې تعامل د ترسره کیدلو لپاره د کتلستونو اود اوبو شتون اړین دی:



په هغو هیوادونو کې چې بریښنايي انرژي ډیره ده، د هایدروجن د مالګو د اوبلن محلول له الکترولیز څخه تر لاسه کوي:



د هایدروجن ځانګړي خواص: د هایدروجن ډیر مهم خواص، د هغه د حجم کوچینوالی دی چې د مرکبونو د مالیکولونو تر

منځ د هایدروجنی اړیکو د تړلو لامل کیږي، د هایدروجن د کټیون ډیر کوچنی حجم ($\frac{1}{10000}$ د خنثی اتوم حجم) هغه ته پي


دا ځانګړي خواص ورڅښکي دي چې په H_3O^+ او NH_4^+ کې د غښتلي تیزابونو په توګه ځان وروښيي.

د هایدروجن مهم مرکبونه: څرنګه چې مخکې وویل شول، هایدروجن د کایناتو (هستیو) جوړونکی دی، ستوري او کهکشانونه 75% له هایدروجن څخه جوړشوي دي، هایدروجن په ټولو ستورو کې شتون لري، د ځمکې په سیارې کې هایدروجن په ترکیبي ډول د اکسیجن او له نورو عنصرونو سره په زیاته کچه موندل کیږي، تر اوسه څه دپاسه 20 میلیونه عضوي مرکبونه ترلاسه شوي دي چې د هغوی د جوړښت بنسټیزې برخې کاربن او هایدروجن دي، هایدروجن څه ناڅه له ټولو عنصرونو سره تعامل کوي؛ خو یوازې له نجیبه گازونو سره تعامل نه شي کولای، لاندې دوه عصري مرکبونو چې له هغوی څخه یو پي هایدروجن دی، مطالعه کوو.

دوه عصري مرکبونه چې له هغوی څخه یو پي هایدروجن دی، په دریو برخو ویشل شوي دي چې مالګین مرکبونه دي چې د هغوی په جوړښت کې ایونونه شتون لري، مالیکولي مرکبونه دي او دریم پي فلزي مرکبونه دي. هایدروجن د I اصلي او II اصلي ګروپونو عنصرونو سره دوه عصري مرکبونه چې هایدرایدونه (Hydrides) نومیږي، جوړوي، په دې مرکبونو کې هایدروجن له انیون په بڼه شتون لري، د III او IV اصلي ګروپونو له عنصرونو سره چې ګډه اړیکې لري، مرکبونه جوړوي، همدارنګه له انتقالي عنصرونو سره فلزي مرکبونو جوړوي.


1- د هایدروجن مالګین مرکبونه (Hydrides)

هایدرایدونه هغه مرکبونه دي چې له هایدروجن څخه، د القلیو فلزونو او د ځمکنیو القلیو له فلزونو څخه جوړشوي دي، په دې مرکبونو کې د هایدروجن د اتوم اکسیدیشن نمبر 1- دی؛ د بیلګې په ډول:




هایدرايدونه (Hydrides) سپين رنگه جامد مرکبونه دي، د دوی د ویلي کیدو درجه لوړه ده چې په دې مرکبونو کې د هایدروجن انیون (H^-) په ټوله بلوري شبکه کې ځانگړې ځای نیسي، په دې انیون کې یو پروتون په دوه الکترونونو اغیزه کوی، د H^- د ایونونو شعاع د هغه کتیون تابع نه ده کوم چې ورسره یوځای شوی دی، په عمومي توگه د هغوی د ایونونو شعاع د $1.81^\circ A$ او $1.36^\circ A$ رقمونو ترمنځ شتون لري.


څرنگه چې په دې مرکبونو کې هایدروجن غواړي ترڅو په چټکۍ سره اضافي الکترون له لاسه ورکړي؛ نو له دې کبله قوي ارجاع کوونکی دی، د هغه ستندرد پوتنسیال $2.25V$ دی:




د H^- ارجاعي وړتیا د سودیم (Na) د ارجاع کولو له وړتیا سره برابره ده؛ نو ځکه د $\frac{H_2}{H^-}$ نورمال پوتنسیال له $\frac{Na}{Na^+}$ سره ورته دی. که چیرې هایدرايدونو ته له اوبو سره تعامل ورکړل شي، د هایدروجن گاز ازادېږي:




د $\frac{H_2O}{OH^-}$ جوړه پوتنسیال عبارت دی له :






که چیرته $\frac{H_2}{H^-}$ جوړه یې د پورته تعامل معکوس له یو بل سره الجبري جمعه شي، ترلاسه کېږي چې :




2- د هایدروجن کوولانت مالیکولي مرکبونه : دا ډول مرکبونه د هایدروجن او غیر فلزونو له تعامل څخه ؛ لکه : کاربن، هلوجن، اکسیجن، نایترجن څخه جوړېږي، له دې مرکبونو د زیاتې برخې مالیکولونه یې گاځي حالت لري چې د هغوی بیلگې کیدای شي $CH_3-CH_3, CH_4, H_2O, NH_3, HCl$ او نور ورکړل شي، دا مرکبونه په عمومي توگه د هایدروجن او غیر فلزونو له تعامل څخه ترلاسه کېږي:




نورمالیکولي مرکبونه کیدای شي چې له تیزابونو او القلیو څخه ؛ لکه : S^{2-} له تعامل څخه ترلاسه شي:



3- د فلزونو هایدرايدونه: دا ډول مرکبونه د بریښنا او تودوخې تیروونکي دي ؛ له دې امله په دې نوم یاد شوي دي، د فلزونو په هایدرايدونو کې د هایدروجن د اټومونو شمیر یو له بل څخه توپیر لري، د هغوی په کرسټلي شبکه کې د هایدروجن اټومونه د شبکې تش ځایونه ډکوي:




خرنگه چې دا مرکبونه په اسانۍ سره **De hydrogenation** کېږي؛ نو له دې امله هغوی د هایډروجن د زیرمې په توګه په وړو او راوړو کې کارول کېږي.



شکل : د مس هایډرایډ (CuH)

دویم لوست

د درسي کتاب مخ: 175



د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		کلورين
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د کلورين او د هغه د فزیکي او کیمیاوي خواصو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې کلورين او د هغه مرکبونه حیاتي او صنعتي ارزښت لري. - د کلورين او د هغه د مرکبونو پر خواصو دې پوه شي، کلورين او د هغه مرکبونه دې په طبابت او صنعت کې وکارولی شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر د کلورين گاز او د کلورين مرکبونه
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او لیکنې)
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: ولې د کلورين تنفس د مرګ لامل کېږي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		وخت په دقیقه
- د لوست سرلیک دې د تخته پر مخ ولیکي. - د کلورين د فزیکي او کیمیاوي ځانګړو خواصو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي او د هغه صنعتي ارزښتونه دې روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه 40
- د ښوونکي څرګندونو ته دې ځیر شي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی یې د کلورين، د هغه د خواصو او هم د هغه د مرکبونو په اړه ورکوي، یادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي ورکړل شوې بیلګې چې د کلورين د خواصو او د هغه د مرکبونو په اړه ورکوي، یادداشت او دوی دې هم څو بیلګې ورکړي. - د لوست په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.		

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د فعالیتونو پوښتنوته ځوابونه

د 177 مخ فعالیت ته ځواب

کله چې د کلورین گاز په رنګونو او پر پاڼو باندې آزمایش کړل شي، کلورین د هغوی رنګ له منځه وړي؛ ځکه کلورین ارجاع کيږي، رنګ او پاڼې اکسیدي کيږي.

- د کلورین د گاز رنګ زیر شین ته ورته رنګ لري.

- د پاڼې شین رنګ بې رنګه کيږي.


د 199 فعالیت ځواب

که چېرې د هغه لوسني په خوله کې چې په آزمایش کې په هغه کې د کلورین گاز راټول شوی دی، رنګه مواد یا شنه پاڼه ورته نژدې شي، هغه اکسیدي او بې رنګه کوي.

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د VII اصلي ګروپ عنصرونه

هلوجنونه په عصري بڼه په مالیکولي شکل موندل کيږي، فلورین او کلورین د گاز حالت لري، برومین مایع حالت او آیوډین په جامد حالت موندل کيږي، د هلوجنونو د الکترونونو مالیکولي جوړښت د اکسیجن په شان دوه اتومي دی، په دې توپیر چې د هغوی په انتي باندینګ اوربیتالو (π_x^* او π_y^*) کې جوړه الکترونونه شتون لري چې د هغوی مالیکول دیامگنتیک دی، لاندې شکل د هلوجنونو د انرژۍ سویه وړښتي:



$$\text{د اړیکو شمیر} = \frac{\sum \delta - \sum \delta^*}{2} = \frac{8-6}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

څرنګه چې له پورتنی فورمول او له معادلې څخه پایله اخیستل کيږي، د X_2 په مالیکول کې د اړیکو شمیر یو سره مساوي


دی.

په طبیعت کې د فلورین او کلورین خپریدل له نورو هلوچنونو څخه زیات دي، زیاتره فلورین په $(Spath fluor) CaF_2$ او په $(Cryolithe) AlF_3$ بڼه شته دي.


داچې فلورین قوي اکسیدي کوونکی دی، نو یوازې د KHF_2 الکترولیز له لارې او یا د محلول په بڼه له HF مایع څخه لاسته راځي.

د هلوچنونو نور مرکبونه د دې کتاب په بیلابیلو څپرکو کې مطالعه شوي دي، دلته د هغوی هلايدونه تر مطالعې لاندې نیسو. په لاندې جدول کې د هایدروجن د هلايدونو خواص د هغوی له ترمودینامیکي ځانګړتیاوو سره روښانه کيږي.

د هایدروجن له هلايدونو څخه HF کمزوری تیزاب دی چې د هغه د پوټه کیدو ثابت په لاندې ډول دی:



د HF د تیزابي خاصیت د ضعیف والي لامل د هغه د مالیکولونو تر منځ د هایدروجنې اړیکې له شتون سره اړیکه لري چې مالیکولونه یې یو له بل سره تړلي دي او د $(HF)_n$ پولیمیرې منځته راوړی دی، د F^- د ایونونو او HF د تعامل د تعادل ثابت کیدای شي په لاندې ډول ترسترګوشي:



ΔH_1 د اوبو ازادولو د انتلپي او د $HX(g)$ د جوړیدو انتلپي ده، ΔH_2 د HX ګازي اړیکې د پوټه کیدو انتلپي او د هغوی تبدیلول په $H(g)$ او $X(g)$ په ګازي اتومونو انتلپي ده، ΔH_3 د H د ایونایزیشن انتلپي او ΔH_4 په X باندې د الکترونونو نښلولو انتلپي او په پای کې ΔH_5 او ΔH_6 په اوبو کې د H^+ او X^- د ایونونو انتلپي ده.

جدول: د هایدروجن هلايدونو د ایونونو د جوړیدلو د انتلپي بیلابیل کمیټونه راښيي:

تیزاب	ΔH_1	ΔH_2 (D)	ΔH_3 (I)	ΔH_4 (-A)	$\Delta H_5 + \Delta H_6$	ΔH_{diss}
HF	48.1	563.4	1318.6	-232.8	-1598.1	-4.2
HCl	17.6	432	1318.6	-349.5	1460.1	-41.9
HBr	20.9	366.3	1318.6	-323.6	-1426.2	-46.0
HI	23.0	298.9	1318.6	-245.1	1382.7	-37.7


په پورتنی جدول کې ΔH د HX د ټوټه کیدو د بیلابیلو پړاوونو د هایدريشن شو ایونونو انتلپي ده او د هغوی کمزوري وړښی، خو د نورو هایدرايدونو ΔH توپیر یو له بل څخه ډیر لږ دی.


د نورو هایدروجن هلايدونو تیزابي قدرت د هغوی د اتومونو د اتومي نمبر په زیاتوالي لوړیږي، د دې مرکبونو د تیزابي قدرت د پوهیدلو لپاره باید د هغوی ترمودینامیکي فکتورونه و څیړل شي، پورتنی شکل وگورئ، دلته د ټوټه کیدو انتلپي ΔH_{diss} د بیلابیلو انتلپيو له الجبري مجموعې څخه عبارت ده چې د غیر مستقیمو لارو د $H^+(aq)$ او X^- د ایونونو په منځته راتلو پای ته رسیږي:

$$\Delta H_{Diss} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 + \Delta H_6$$

کلورین هغه عنصر دی چې ډیر زیات فعاله او په طبیعت کې په ازاد حالت نه موندل کیږي؛ خو مرکبونه یې په زیاته کچه شته دي. څرنګه چې د کلورین ډیر مرکبونو په اوبو کې حل کیږي؛ نو له دې کبله په سمندرونو کې د کلورین کچه مخ په زیاتیدو ده او هم په ډیره کچه په کانونو کې موندل کیږي د کلورین ډیر مهم طبیعي مرکبونه د خوړو مالګه $NaCl$ ، د $(KCl)sylvile$ تیره کارنالیټ $KCl.MgCl_2.6H_2O$ دي. سودیم هایپوکلورایت $(NaOCl)$ د سپینوونکو موادو په توګه کارول کیږي (له هایدروجن پراکساید (H_2O_2) په شان ورڅخه ګټه اخیستل کیږي) او اکسیدي کوونکی دی، د کورنیو سپینوونکو مواد، 5% سودیم هایپوکلورایت لري او ساده ضد عفوني او اغیزمنه ماده ده: باید وویل شي چې دا مرکب خفه کوونکی دی او زیاتره د مړینې لامل کیږي.

Br_2 او Cl_2 یو له بله څخه د الکترونیګاتیوټي د ځانګړتیاوو له امله توپیر لري، پاولینګ (*Pauling*) الکترونیګاتیوټي د اتوم وړتیا د واحد په توګه چې په کوولانټ اړیکه کې یې الکترونونه تر یو حده پورې ځانته کش کوي، تعریف کړې ده، د هلوچنونو الکترونیګاتیوټي زیاتوالی په لاندې ترتیب سره بدلون کوي:





دریم لوست
د درسي کتاب مخ: 181

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د شپږم اصلي گروپ عنصرونه، اکسيجن
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د شپږم اصلي گروپ د عنصرونو او اکسيجن په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د شپږم اصلي گروپ عنصرونه د هغوی له ډلې څخه اکسيجن په بيلابيلو لارو په لاس راوړلی شي. د شپږم اصلي گروپ عنصرونه دې د هغوی د خواصو په پام کې نيولو سره له نورو عنصرونو څخه توپير کړي .
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير د شپږم اصلي گروپ د ځينو عنصرونو نمونې
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعاليتونه		لومړني فعاليتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تيرلوس ارزونه د انگېزې رامنځته کول: کوم گاز د تنفس په وخت کې د ژوبو تنفسي سيستم ته دننه کېږي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعاليتونه		د زده کوونکو د زده کړې فعاليتونه
مفاهيمو زده کړه او ارزونه		د زده کړې فعاليتونه
د لوست سرليک دې د تخته پرمخ وليکي. د شپږم اصلي گروپ او اکسيجن په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. د اکسيجن د لاسته راوړنې څو بيلگې دې ورکړي. د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره وازروي. زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د ښوونکي څرگندونو ته دې ځيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. هغه معلومات چې ښوونکی يې د شپږم گروپ د عنصرونو او د هغوی له ډلې څخه د اکسيجن په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. د ښوونکي له خوا ورکړل شوې بيلگې چې د اکسيجن د لاسته راوړنې په اړه دې يادداشت او خپله دې هم څو بيلگې ورکړي. د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. کورنۍ دنده دې تر سره کړي.




7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

فعالیت

د پوتاشیم کلورایټ څخه اکسیجن لاسته راوړنه

د اړتیا وړ مواد او سامان: فلاسک، سوری لرونکی سرپوښ، زنگون کوزي نل، ربړي پایپ، لږ څه $KClO_3$ ، د اوبو لوبښی، تست تیوبونه، تست تیوب دانې، اوبه، گوگرې او د تودوخې سرچینه.


کړنلاره: لږ څه $KClO_3$ له MnO_2 سره مخلوط او په فلاسک کې یې واچوئ، د ستگاه له لاندې شکل سره سمه جوړه کړئ او د تودوخې سرچینه روښانه کړئ، تست تیوب له اوبو څخه ډک کړئ او هغه د اوبو په تښت کې نسکور کړئ او له اکسیجن څخه یې ډک کړئ. د گوگرې د لرغې مړشوی اور چې د سکروټې په حال کې دی، د گوگرې د لرغې بیا لگیدل وازموئ. ولې مړشوی اور بیا لگېږي او د اور لمبې ترې پورته کیږي؟ د تعامل معادله یې ولیکئ.



شکل: له پوتاشیم کلورایټ څخه د اکسیجن استحصال

د فعالیت پوښتنوته ځوابونه

1. څرنگه چې اکسیجن د سون مرستندویه ماده ده؛ نو له دې کبله مړشوی اور بیرته روښانه اولگېږي.



فعالیت

د اوبو برېښنايي تجزیه

د وړتیاوړ سامان او مواد: بټری، دوه عدده کاربنی الکتروډونه، دوه عدده تست تیوبونه، د اوبو لوبښی، گوگرې او اوبه.


کړنلاره: دوه الکتروډونه د جلا تست تیوبونو په دننه کې کیږدئ، داسې چې دا تست تیوبونه له اوبو څخه په ډک لوبښي کې په نسکور ډول کیښودل شوي وي، دننه کړئ، الکتروډونه له بټری سره ونښلوئ.

هایډروجن او اکسیجن د گوگرې په واسطه آزمایشت کړئ.

ولې د هایډروجن حجم د اکسیجن د حجم دوه برابره دی؟ د تعامل معادله یې ولیکئ.

د پوښتنو حل او ځواب

څرنگه چې اکسیجن او هایډروجن په مالیکولي بڼه دي، د اوبو په یو مالیکول کې د اکسیجن یو اتوم شته دی؛ نو له دې کبله له دوو مالیکولونو اوبو څخه یو مالیکول اکسیجن او دوه مالیکوله هایډروجن جلا کیږي، دلته د گیلوسک او اوگډرو له قانون سره سم یو مالیکول یو حجم لري او دوه مالیکوله، دوه حجمه لري:



شکل : د اوبو د تجزیې برېښنایي دستگاه

8- د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د اکسیجن تعاملونه: د اکسیجن زیاتره تعاملونه د هغه له ډیرې الکترونیکاتیویتی (3.4) سره هم ورو ترسره کیږي چې لامل یې د هغه د مالیکولي اړیکې د انرژۍ زیاتوالی (494 kJ/mol) دی، نو له دې امله هغه تعاملونه چې د اکسیجن - اکسیجن د اړیکې په پرې کیدو ترسره کیږي، یوازې په لوړه تودوخه کې شونې دي، زیاتره د دا رنگه تعاملونو په ترڅ کې ډیره تودوخه را منځته کیږي، د اکسیجن زیات تعاملونه ممکن تودوخه تولید کړي او یا داچې تودوخې ته اړ وي، د کوتی په تودوخه کې د هغوی تعامل ترسره کیږي.


اکسیجن کولای شی چې څلور ډوله ایونونه سوپر اکساید، پر اکساید، اکسایدونه او اوزوناید جوړ کړي.

1- د سوپر اکساید ایون ($\bar{O}_2$): دا رنگه ایون د اکسیجن د مالیکول $\pi 2p^*$ اوربیتال ته د یو الکترون د ورزیاتولو په واسطه لاسته راځي، له دې کبله د نه جوړه شوو الکترونونو شمیر یوې جوړې ته او د اړیکو شمیر $1\frac{1}{2}$ ته را ټیټیږي.

2- د پر اکساید ایون (O_2^{2-}): دا ایون د خپل $\pi 2p^*$ په اوربیتالونو کې د اکسیجن له مالیکول (O_2) څخه دوه الکترونونه زیات لري؛ نو له دې امله د هغه د اړیکو شمیر یوې ته ټیټ شوی او د یا مگنتیک دي.

3- د اکساید ایون (O^{2-}): دا ایون د نیون له عنصر سره ایزو الکترونیک دی او پارامیگنتیک وی.


4- اوزوناید (O_3^-): دا ایون پارامیگنتیک دی او یو جوړه ازاد الکترونونه لري چې د اوزون او د KOH ، $RbOH$ او $CsOH$ له تعامل څخه ترلاسه کیږي. لاندې شکل د دې ایونونو د مالیکول اوربیتال ښیي ورښيي:




شکل: د اوربیتال - مالیکولی بڼې

ډیر فلزونه (پرته د سرو زرو او سپینوزرو) له اکسیجن سره تعامل کوي ، د هغوی اړوند اکسایدونه جوړیږي .


هغه فلزونه چې له اکسیجن سره زیات تعامل کولای شي ، د لومړي اصلي گروپ عنصرونه دي ، ټول فلزونه چې اتومي شعاع یې غټه وي ، د اتموسفیر فشار په شتون کې سوپر اکسایدونه جوړوي ، د هغوی بیلگې کیدای شي K ، Rb او Cs ورکړل شي :




د سوډیم او اکسیجن له تعامل څخه سوډیم پراکساید تر لاسه کیږي :



لیتیم یوازي معمولي اکساید جوړولای شي ؛ ځکه د هغه اتومي شعاع کوچنۍ ده ؛ نو سوپر اکسایدونه نه شي جوړولای :



ټول غیر فلزونه (پرته له نجیبه گازونو او د (VII) گروپ له درانډو عنصرونه څخه) له د اکسیجن سره تعامل کوي ، اکسایدونه جوړوي ، نجیبه گازونه او د (VII) گروپ درانده عنصرونه په ټاکلو شرایطو کې له اکسیجن سره تعامل کوي او اړوند اکسایدونه جوړوي .



څلورم لوست


د درسي کتاب مخ: 187

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		سلفر
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د سلفر او د هغې د مرکبونو په اړه معلومات وړاندې او هغه په بيلابيلو لارو لاسته راوړلی شي. - يقين دې تر لاسه کړي چې سلفر او د هغه مرکبونه صنعتي ارزښت لري او په بيلابيلو لارو تر لاسته کيدای شي. سلفر او د هغه مرکبونه دې د هغوی د خواصو په پام کې نيولو سره له نورو موادو څخه تر لاسه کړي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشیر د تجربې سامان الات
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: کوم عنصر دی چې د انگورو ناروغیو د درملو په توگه کارول کېږي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي. د سلفر او د هغه د مرکبونو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي. د سلفر د لاسته راوړنې او کارولو څو بیلگې دې ووايي. د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. د لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. د زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د ښوونکي څرگندونو ته دې ځیر شي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. د هغه معلومات چې ښوونکی یې د سلفر او د هغه د مرکبونو په اړه ورکوي، یادداشت او زده دې کړي. د ښوونکي ورکړل شوې بیلگې چې د سلفر او د هغه د مرکبونو په اړه یې ورکوي، یادداشت او خپله دې هم څو بیلگې ورکړي. د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. د کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه



د سلفر ډای اکساید مالیکول څو اتومونه لري او په هغه کې ولانسي الکترونونه به څومره ته ورسېږي؟
ځواب: د سلفر ډای اکساید مالیکول درې اتومونه لري او په هغه کې ولانسي الکترونونه اتلسو ته رسېږي چې د هغه الکترونې جوړښت په لاندې ډول دی:




8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

سیلینیم (Selenium) او تلوریم (Tellurium)


سیلینیم او تلوریم د نادرو عناصرو له ډلې څخه دی چې له سلفایدونو څخه د فلزونو د راییستلو په وخت کې د فرعي محصولو په توګه ترلاسه کېږي، د Se د برېښنا تیرونه په تیاره کې لږه ده؛ په روښنایي او د رڼا په شتون کې د برېښنا ښه تیرونکی دی، له دې امله په فوتو الکتریکي حجرو کې له هغه څخه د شدت د ټاکلو لپاره ګټه اخیستل کېږي او هم له هغه څخه د پرله پسې جریان د یو لوري کیدو لپاره ګټه اخیستل کېږي. له تلوریم څخه هم د سیلینیم په څیر ور څخه ګټه اخیستل کېږي. د Te او Se کیمیاوي خواص د S کیمیاوي خواصو ته ورته دي او د دې عناصرو فلزي خواص د اتومي نمبر په زیاتوالي سره زیاتیږي، په هایډرایدونو کې د هغوی تیزابي قدرت هم د اتومي نمبر په زیاتوالي پورې اړه لري:



د SeO_2 او TeO_2 فزیکي خواص د SO_2 له فزیکي خواصو سره توپیر لري. دا اکسایډونه په عادي شرایطو کې د جامد حالت لري. د TeO_2 د مالیکول په جوړښت کې لیدل کېږي چې دا مرکب ایوني دی او SeO_2 واز زنځیري جوړښت لري، په اوبو کې حل کېږي او تیزابي محلول جوړوي:



شکل: د SeO_2 د زنځیري مالیکول یوه برخه



څلورم لوست

د درسي کتاب مخ: 191


د مطلوبونو سرليکونه		د مطلوبونو شرح
1- د لوست موضوع		د پنځم اصلي گروپ عنصرونه، نايټروجن، فاسفورس
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د پنځم اصلي گروپ د عنصرونو، نايټروجن او فاسفورس د ځانگړتياو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي او د هغوی د لاسته راوړنې بيلابيلې لارې دې په یاد ولري. - يقين دې تر لاسه کړي چې د پنځم اصلي گروپ عنصرونه، نايټروجن او فاسفورس په بيلابيلو لارو لاسته ته راځي. - د پنځم گروپ عنصرونه، نايټروجن او فاسفورس دې د هغوی د خواصو په پام کې نيولو سره له نورو عنصرونو څخه توپير کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او د تجربې سامان الات
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او لیکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری اخېستل، د وخت په کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه. د انگېزې رامنځته کول: ولې په زړو قبرونو کې د اورلمې لیدل کېږي؟
وخت په دقیقه	5	
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
وخت په دقیقه	40	د ښوونکي څرگندونو ته دې ځیرشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې د پنځم گروپ د عنصرونو، نايټروجن او فاسفورس په اړه وړاندې کوي، یاد داشت او زده دې کړي. - د ښوونکي ورکړل شوې بیلگې چې د پنځم اصلي گروپ د عنصرونو د لاسته راوړنې او کارولو په اړه وړ کوي، یادداشت او خپله دې هم څو بیلگې ورکړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
د لوست سرليک دې د تخته پرمخ وليکي.		
د پنځم اصلي گروپ د عنصرونو، د نايټروجن او فاسفورس په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي.		
څو بیلگې دې د پنځم اصلي گروپ د عنصرونو، نايټروجن او فاسفورس د لاسته راوړنې او کارولو په اړه ورکړي.		
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.		
لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي.		
زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د امونیم نایتریت څخه د نایتروجن لاسته راوړنه


د اړتیاوړ سامان او مواد: امونیم نایترایټ، د تودوخې سرچینه، له دوو ستنو او گیرا سره له ستید، ترماتر، ربرې تیوب، زنگون کوری نل، د اوبو څخه ډک لوبنی، دوه عدده تست تیوب، او د تودوخې سرچینه (الکولي خراغ).
 کړنلاره: د لاندې شکل سره سمه دستگاه تیاره کړئ، په یو بالون لږ څه امونیم نایترایټ واچوئ او د بالون خوله د دوه سوري لرونکې کارک په واسطه وتړئ، د هغه په یو سوري کې ترماتر او په بل سوري کې یې زنگون کوری نل چې د بل زنگون کور نل سره تړلی دی، کیږدئ، دویم نل د اوبو څخه ډک لوبنی په د ننه کې چې دوه ډک تست تیوبونه شته دي په یوه تست تیوب په خوله کې یې کیږدئ، د بالون د ننه محتویاتو ته تودوخه ورکړئ، د دې عملیې له سر ته رسولو څخه وروسته، خپل لیدنې ولیکئ او کوم گازونه چې په تست تیوبونو کې را ټول شوي، وېې ټاکئ او د تعامل معادله یې هم ولیکئ.



شکل: د امونیم نایترایټ تجزیه

ځواب

د دغه عملی فعالیت له سره ته رسولو په پایله کې نایتروجن ترلاسه کیږي چې په تست تیوبونو کې ټولېږي:



8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات


د V اصلي گروپ عنصرونه یو له بل څخه بیلابیل خواص لري، داسې چې نایتروجن او فاسفورس غیر فلز، ارسینک او انیمونی شبه فلز لږ تیروونکې دي، د 3-، 5+، 3+ اکسیدیشن درجه کیدای شي د دې عنصرونو له ځانگړو ځانگړتیاوو څخه وبلل شي؛ لکن نایتروجن 5+، 4+، 2+، 1+ او 3- اکسیدیشن نمبر ځانته غوره کولی شي. د V گروپ د عنصرونو د اتومي نمبر په زیاتیدو سره، د هغوی په مرکبونه کې د دې عنصرونو د اکسیدیشن نمبر 5+ او 3- وي، بې ثباته دي او د هغوی مرکبونه هم لږ دي. د دریم (III) او څلورم (IV) گروپ د عنصرونو په هکله هم قضیه په همدې ډول ده.

د V گروپ د عنصرونو ورته مرکبونه د خواصو له کبله یو له بل سره توپیر لري؛ د بیلگې په ډول: NH_3 قلوي خاصیت لري او د ترمودینامیک له کبله با ثباته دی؛ خو PH_3 د کمزورو قلوي خاصیت لري او د ترمودینامیک له کبله بې ثباته دی، نو په AsH_3 ، SbH_3 او BiH_3 مرکبونو کې دقلوي خواص نه لیدل کیږي.

د دې گروپ د عناصرونو له ځانگړو خاصیتونو څخه یوهم په مرکبونو کې د هغوی د 3+ د اکسیدیشن د درجې ټاکل دی. N_2O_3 او P_2O_3 اکسایدونه تیزابي خاصیت لري؛ خو د As_2O_3 او Sb_2O_3 اکسایدونه امفوتریک خاصیت لري؛ په داسې حال کې Bi_2O_3 اکساید قلوي خاصیت لري.

نایتروجن (Nitrogen)

نایتروجن په طبیعت کې په مالیکولي شکل موندل کېږي او د هغه د اړیکو انرژي 942 KJ/mol ده چې له CO_2 څخه وروسته ځای لري، د نایتروجن مالیکول او CO (کاربن مونو اکساید) مالیکول یوشان الکتروني جوړښت لري، دواړه یې درې گونې (یوه د سگما اړیکه او دوه د π اړیکې) لري، سره له دې چې د کاربن مونو اکساید د مالیکول د اړیکې انرژي د نایتروجن له مالیکول څخه زیاته ده، له دې سره هم ټاکلې کیمیاوي فعالیت لري؛ خو د نایتروجن د مالیکول (N_2) کیمیاوي فعالیت محسوس نه دی چې د هغه په ترمودینامیکي فعالیت پورې اړه لري؛ د بیلگې په ډول: د نایتروجن د اکسایدونو د سلسلې د جوړښت ازاده انرژي مثبتې ده، یعنې په رښتیا چې دا اکسایدونه له جوړوونکو عناصرونو (نایتروجن او اکسیجن) څخه یې بې ثباته دي؛ له بلې خوا د نایتروجن د مالیکول د فعالیت نه شتون د هغه د تعامل په حرکي عواملو پورې اړه لري؛ نو ځکه د هغه تعامل له زیاتو کیمیاوي موادو سره سست او ورو ترسره کېږي، له نایتروجن او هایډروجن څخه د امونیا جوړښت د پورتنۍ یادونې ښکارندوی دی، په $25^\circ C$ کې د امونیا د جوړویدو ازاده معیاري انرژي $16,6 \text{ KJ/mol}$ ده چې د هغې د تعامل معادله په لاندې ډول ده:



د تعامل د تعادل د ثابت قیمت یې $K = e^{\Delta G/RT} = 8,3.10^2$ دی.

پورتنی ثابت لوی کمیت دی او د امونیا د سنتیز لپاره وړه کچه ده؛ خو تجربې لیدنې ښودلې ده چې دا تعامل ډیر ورو ترسره کېږي، هیڅکله په (STP) شرایطو کې نه ترسره کېږي؛ خو د لوړې تودوخې، فشار او کتلست په شتون کې د امونیا تولید شونی دی، سره له دې هم له لومړنیو موادو څخه د امونیا په سنتیز کې ستونزې لا هم شته او هغه دا چې په $25^\circ C$ کې د انتلپي بدلونونه په معیاري تعامل کې $\Delta H = -46 \text{ KJ/mol}$ او په $723^\circ K$ تودوخه کې $\Delta H = -46 \text{ KJ/mol}$ دي او په لوړه تودوخه کې د تعادل ثابت به کوچنی وي، د تعامل د ثابت قیمت د لاندې معادلې په مرسته لاسته راځي:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

پورتنۍ معادله هغه موده صدق کوي چې ΔH د تودوخې په مقابل کې حساسه نه وي؛ خو په واقعیت کې دا مطلب 100% صحیح نه دی؛ خو له دې سره هم منلو ته نږدې کیدای شي، د دوو تودوخو تر منځ د ΔH منځنۍ حد په پام کې ونیول شي:

$$\Delta H^{\circ} = \frac{\Delta H^{\circ}(298) + \Delta H^{\circ}(723)}{2}$$


$$\Delta H^{\circ} = \frac{-26 - 56}{2} = -41 \text{ Kjou / mol}$$

$$2,3 \log \cdot \frac{K}{2,3 \cdot 10^2} = \frac{41}{8,3} \left(\frac{1}{723} \cdot \frac{1}{298} \right), \log K(723) = -435$$


$$K_{723} = 4,5 \cdot 10^{-3}$$

که چیرته د امونیا د سنتیز په تعامل کې فشار لوړ کړل شي، امونیا تولیدیږي.

د امونیا سنتیز په صنعت کې ډیر اهمیت لري. کله چې له هوا څخه نایتروجن لاسته راوړل کیږي، د هغه اکسیدیشن ترسره کیږي، د نایتروجن اکسایدونه او نایتريک اسید لاسته راځي، لاندې د امونیا سنتیز او په کیمیاوي سرو باندې د هغې بدلون لیدل کیږي:



شکل: د امونیا د سنتیز اهمیت او له هغې څخه د کیمیاوي سرې د لاسته راوړنې بڼه



شپږم لوست

د درسي کتاب مخ: 197

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د څلورم گروپ عنصرونه، کاربن
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د څلورم اصلي گروپ او کاربن په اړه دې هر اړخيز معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې د څلورم اصلي گروپ عنصرونه او کاربن په بيلو بيلو لارو تر لاسته کېږي. - د څلورم اصلي گروپ عنصرونه او کاربن دې د هغوی خواصو په پام کې نيولو سره له نورو عنصرونو څخه توپير کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او د تجربی سامان الات
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: ولې د کاربن مرکبونه زیات دي ؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي. - د څلورم اصلي گروپ په هکله او کاربن د لاسته راوړنې او کارولو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - د څلورم اصلي گروپ د عنصرونو او د کاربن د لاسته راوړنې او کارولو څو بيلگې دې ورکړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ووايي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د څلورم اصلي گروپ او کاربن په اړه وړاندې کوي يادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي ورکړل شوې بيلگې چې د څلورم اصلي گروپ د عنصرونو او کاربن په اړه يې ورکړي دي ، زده دې کړي. - د لوست د متن په مفهوم دې پوه شي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

د لوست په متن کې پوښتنه نه شته.


8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

څرنګه چې مخکې وویل شول، د هر ګروپ د لومړنۍ عنصر خواص، د همدې ګروپ له نورو عناصرو څخه توپیر لري، کاربن چې د څلورم اصلي ګروپ لومړنۍ عنصر دی، خواص یې د همدې ګروپ له نورو عناصرو څخه توپیر لري؛ د بیلګې په ډول: د کاربن د اتومونو ترمنځ $(C = C)$ ، د کاربن او اکسیجن د اتومونو ترمنځ $(C = O)$ دوه ګونې اړیکې شتون لري، په داسې حال کې چې دا ډول اړیکه د Si د اتومونو ترمنځ نه لیدل کیږي. CO_2 با ثباته ګاز دی چې د تنفس په وخت کې ازادېږي، په داسې حال کې چې SiO_2 له $O - Si - O$ څخه جوړ دی او جامده ماده ده چې د ځمکې قشر یې جوړ کړی دی.


د دې ټولو عناصرو د باندیني قشر الکتروني جوړښت (ولانسی) $ns^2 np^2$ دی او د څلورو اړه الکترونونو څلور ګونې اړیکې چې د اړیکو یوشان ارزښت لري، له اتومونو سره جوړوي. د دې ګروپ د دوو لومړنیو عناصرو څلور ګونې اړیکې جوړوي، په داسې حال کې چې د دې ګروپ نور پاتې عناصرونه د S د اوربیتال ولانسی الکترونونه د اړیکو د جوړېدو وړتیا نه لري؛ ځکه هستې ته یې نژدې دي. څرنګه چې د عین ګروپ عناصرونو اتومي نمبر له پورتنیو خواوو څخه ښکته خواته زیاتېږي، د S او P د اوربیتالونو انرژیکي توپیر په سترګو کیږي، د S الکترونونه د اړیکې د تړلو لپاره لږ میل له ځانه ورښيي.

کاربن (Carbon)

طبیعي کاربن دوه ایزوټوپونه $^{12}_6C$ او $^{13}_6C$ لري چې د هغوی د خپرېدو سلنه په طبیعت کې په وار سره 98,89% او 0,11% ده؛ خو په طبیعت کې د کاربن $^{14}_6C$ ایزوټوپ هم شته چې د اتموسفیر په لوړو طبقو کې دلاندې هستوي تعامل په پایله کې جوړېږي:




د $^{14}_6C$ د عمر د اوږدوالي نیمایي 5568 کاله دی چې د β وړانګو له وتلو څخه په نایتروجن بدلولو مومي:



د کاربن په الوتروپو کې اړیکې په بیلابیلو بڼو لیدل کیږي، په الماس کې د کاربن هر اتوم د څلورو نورو اتومونو سره د سګما د اړیکو په واسطه نښتي دی چې د هغه جوړښت منظم څلور مخیزه دی. الماس ډیر کلک بلور دی چې تر اوسه پېژندل شوی دی، د کاربن دا الوتروپي د بریښنا نه تیرونکې ده؛ خو د هغې د تودوخې تیرونه لوړه ده چې د مس پنځه برابره ده.


په ګرافیت کې د کاربن اتومونه په سطحه د منظمې شپږ ضلعي په بڼه یو له بل سره نښتي دي، د دوو کاربنونو ترمنځ د اړیکو اوږدوالی $1,42^\circ A$ دی. د اتومونو د سطحو ترمنځ $1,42^\circ A$ واټن شتون لري چې د واندروالس Vander - waals قواوې په واسطه یو د بل د پاسه شتون لري، د دې قواوو د کمزورۍ له امله پورتنۍ سطحې یو پر بله خوږېږي، د اتومونو څرنګوالی په دوو سطحو کې سره یوشان نه دی، خو د دریمې سطحې سره ورته دی:




شکل : د گرافیت فضايي جوړښت

کاربن بیلاییل اکسایدونه لري چې د هغه ډیر مهم اکساید CO او CO_2 دی. دا اکسایدونه د گاز په حالت موندل کیږي، حال دا چې د سلیکان اکسایدونه په جامد حالت موندل کیږي.


۱- کاربن مونواکساید (CO): که چیرې کاربن او یا د هغه عضوي مرکبونه د لږ څه اکسیجن په شتون کې وسوځول شي، CO لاسته راځي، په صنعت کې CO د CH_4 او H_2O د پراسونو له تعامل څخه د لاندې معادلې سره سم ترلاسه کوي:



کاربن مونواکساید بې رنگه او بې بویه گاز دی او د وړانگو وړتیا لري، په اوبو کې نه حل کیږي، د هغه د اړیکو انرژي $1074 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ده، د دې مرکب کیمیاوي فعالیت لږ دی؛ خو له دې سره هم د لیویس د تیزاب په بڼه عمل کولای شي چې د هغه د کاربن د اتوم ازاد جوړه الکترونونه د نورو عناصرو سره د کوآرډینیشن اړیکه تړي؛ دیلگې په ډول:



کاربن مونو اکساید زهري کامپلکسونه جوړوي؛ دیلگې په ډول: په وینه کې د اکسیجن (O_2) پرځای د همیوگلوبین د اوسپنې له اتوم سره اړیکه تړي، مسموم شوی سږی خفه کوي او مړ کیږي، له دې مرکب څخه د ارجاع کوونکي په توګه د فلزونو په ایستلو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي؛ دیلگې په ډول: په $800^\circ C$ تودوخه کې د اوسپنې ایستل:




۲- کاربن ډای اکساید (CO_2): کاربن ډای اکساید (CO_2) بې رنگه گاز دی، د اړین اکسیجن په شتون کې د کاربن او یا د عضوي موادو د بشپړه سوځیدو په پایله کې لاسته راځي او همدارنګه د الکولي تخمر په پایله کې او په کاربونیټونو باندې د قوي تیزابونو له عمل څخه هم دا گاز تولیدیږي. کاربن ډای اکساید په STP شرایطو کې د گاز په حالت موندل کیږي.

د CO_2 په مالیکول کې د اکسیجن هر اتوم د یوې سګما (σ) اړیکې او یوې پای (π) اړیکې په واسطه د کاربن له اتوم سره نښلول شوي دي او د هغوی اړیکې خطي $\left(\begin{matrix} \pi & \pi \\ O = C = O \\ \delta & \delta \end{matrix} \right)$ دي. د هرې اړیکې اوږدوالی $1.162 \text{ \AA}$ او د هغوی د هریو منځنۍ


انرژي له 802 KJ/mol څخه لږ ده؛ خو په کاربن ډای اکساید (CO_2) کې د کاربن او اکسیجن د اړیکې د پرې کیدو


لپاره $2.802=1602\text{kJoul}\cdot\text{mol}^{-1}$ انرژۍ ته اړتیا ده .

کاربن ډای اکساید د لیویس له تیوري سره سم کمزوری تیزابي خاصیت لري ، د هغه حل کیدل د H_2CO_3 دجوړیدو د تعامل لامل کیږي چې د پوټه کیدو ثابت یې ډیر کوچنی دی:



د CO_2 حل کیدل په اوبو کې 0.032% دی. لاند اوسه د H_2CO_3 خالص تیزاب په لاس نه دی راغلی؛ ځکه بې ثباته دی او په اسانۍ دي هایدریشن (Dehydration) کیږي. د دې تیزاب مالګه د کاربونیټ (Carbonate) په نوم یادېږي او بې ثباته ده، د تودوخې او یا تیزابونو په اغیزه، په CO_2 تجزیه کیږي:





یوولسم څپرکی

موضوع : د شبه فلزونو عناصر

1- د تدریس وخت (6 درسي ساعتونه)

کټه	د لوست سرلیکونه	درسي ساعتونه
1	د شبه فلزونو د عناصرو جوړښت او خواص، د بور عنصر	یو درسي ساعت
2	د بورون مرکبونه	یو درسي ساعت
3	د بورون فلوراید جوړښت، د بورون هایدرایدونه	یو درسي ساعت
4	سلیکان عنصر، سلیکان اکساید	یو درسي ساعت
5	د سلیکان ډای اکساید کیمیاوي خواص، سلیکان هایدراید	یو درسي ساعت
6	د څپرکي لنډیز او پوښتنې	یو درسي ساعت

2- د څپرکي ښوونیزې موخې


- زده کوونکي دې باید پوه شي چې شبه فلزونه کوم ډول عناصرونه دي.
- زده کوونکي دې درک کړي چې شبه فلزونه دوه ګوني خواص لري او د نړۍ مهم عناصرونه دي.
- زده کوونکي دې شبه فلزونه له فلزونو او غیرفلزونو څخه بیل کړای شي.

3- د څپرکي د پوښتنو ځوابونه

1 - ب، 2 - الف، 3 - ج، 4 - ب، 5 - ج، 6 - ب، 7 - الف، 8 - د، 9 - ب، 10 - الف

د تشریحي پوښتنو ځوابونه

- 1- د بورون هایدراید مرکب د ډای میر په بڼه شتون لري چې د دوو مالیکولونو او یا ډای میر (B_2H_6) جوړښت یې په ګازي حالت په لاندې ډول دی:



شکل : د B_2H_6 ډای میر جوړښت په ګازي حالت کې


2- بوریک اسید یو سپین بلوري مرکب دی چې په 171°C کې وېلې کیږي. د $B(OH)_3$ مالیکول د اوبو د مالیکولو د دوو ازاد شوو الکترونونو په جذبولو سره د لیویس اسید په څیر عمل کوي او کامپلکس جوړوي چې د برونستید تیزاب خاصیت لري.

د بورون فلوراید جوړښت، د بورون هایدرایدونه



د لیویس اسید

د برونستید تیزاب



بوریک اسید په لرگینو موادو لکه: کاغذ کې د اور له پرمختګ څخه مخنیوی کوي، د اور اخیستنې د گواښ د راټیټولو لپاره د کاغذ په خمیره کې او دکورونو د تودوخې په عایقو موادو کې 5% بوریک اسید کارول کیږي.

-3

$$\left. \begin{array}{ll} 280\text{mL} & \text{---} 1.22\text{g} \\ 22400\text{mL} & \text{---} M \end{array} \right\} M = \frac{22400\text{mL} \cdot 1.22\text{g}}{280\text{mL}} = 97.6$$

$$\left. \begin{array}{ll} 100 & \text{---} 22.2\text{g} \\ 97.6 & \text{---} m_1 \end{array} \right\} m_1 = \frac{22.2 \cdot 97.6\text{g}}{100} = 21.6672\text{g}$$

$$\left. \begin{array}{ll} 100 & \text{---} 77.8\text{g} \\ 97.6 & \text{---} m_2 \end{array} \right\} m_2 = \frac{77.8 \cdot 97.6\text{g}}{100} = 75.9338\text{g}$$

$$n_B \frac{m}{M} = \frac{21.6672\text{g}}{10.81\text{g/mol}} = 2.004\text{mol}$$

$$n_F \frac{m}{M} = \frac{75.9328\text{g}}{19\text{g/mol}} = 3.996\text{mol}$$

$$n_B = 2.004\text{mol} \div 2.004\text{mol} = 1$$

$$n_F = 3.996\text{mol} \div 2.004\text{mol} = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} B = 1 \\ F = 2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} BF_2 \\ M(BF_2)_a = 97.6 \end{array}$$

$$(48.81)a = 97.6 \quad a = \frac{97.6}{48.81}$$

$$a = 2 \quad (BF_2)_2, \quad B_2F_4$$

4- د بورون له هایدرایدونو څخه یو یې 81.2% بورون لري، د هغې د یوې نمونې کتله په ستندردو شرایطو کې 1.22g ده، د هغه مالیکولي فورمول تر لاسه کړئ.

حل:

$$25\text{mL} \quad \text{_____} \quad 1.22\text{g} \quad M = \frac{22400\text{mL} \cdot 1.22\text{g}}{25\text{mL}} = 1093.12$$

$$22400\text{mL} \quad \text{_____} \quad M$$

$$100 \quad \text{_____} \quad 81.2\text{g} \quad m_1 = \frac{1093.12 \cdot 81.2}{100} = 81.12\text{g}$$

$$1093.12 \quad \text{_____} \quad m_1$$

$$100 \quad \text{_____} \quad 18.8\text{g} \quad m_1 = \frac{109.3 \cdot 18.8}{100} = 20.5484\text{g}$$

$$109.3 \quad \text{_____} \quad m_1$$

$$n_B \frac{m}{M} = \frac{88.7516\text{g}}{10.81\text{g/mol}} = 8.2\text{mol}$$

$$n_H = \frac{m}{M} = \frac{20.5484\text{g}}{1.008\text{g/mol}} = 20.4\text{mol}$$

$$n_B = 8.2\text{mol} \div 8.2\text{mol} = 1 \cdot 2 = 2$$

$$n_H = 20.4\text{mol} \div 8.2\text{mol} = 2.5 \cdot 2 = 5$$

$$B = 2$$




$$H = 5$$


$$M(B_2H_5)_a = 109.3$$

$$21.62a = 109.3 \quad \Rightarrow a = \frac{109.3}{21.62} = 5$$


5- SiC د سليکان کاربايد (*Silican corbide*) يا کريورنډم په نوم ياديږي، کلکه او نه سوزيدونکې ماده ده چې کاربن او SiO_2 ته تر $2000^\circ C$ تودوخې ورکړل شي، نو دا ماده تر لاسه کيږي. د غه مرکب په نه سوزيدونکو خښتو، د ژوندانه په وسايلاو نه سوزيدونکو سمټو کې کارول کيږي:




6- د سليکان هايډرايدونه: د سليکان هايډرايدونه د سيلان (*Silane*) په نوم ياديږي چې له هايډروکاربنونو سره ورته والی لري:



د سيلان عمومي فورمول ($Si_n H_{2n+2}$) دی چې د مشبوع هايډروکاربنونو ($C_n H_{2n+2}$) سره ورته والی لري. يوازې توپير يې دا دی چې په مشبوع هايډروکاربنونو کې n کولای شي چې هر قيمت ولري؛ خو په سيلانونو کې n کولای شي تر 6 پورې قيمت ولري چې $Si_6 H_{14}$ رامنځ ته کولای شي؛ ځکه د $Si-Si$ ترمنځ اړيکه کمزوری ده او لوړ مرکبونه نه شي توليدولای، همدارنگه د Si د اتومونو ترمنځ دوه گونې او درې گونې اړيکې هم نه جوړيږي. سيلانونه بې رنگه او فعال مواد دي او د هوا په شتون کې اور اخلي:




سيلانونه په چاوديدونکي بڼه له هايډروجن سره تعامل کوي؛ خو که چيرې Al_2Cl_6 د کتلست په بڼه شتون ولري، د هغه تعامل له هايډروکلوريک اسيد سره د کنترول وړ دی چې کلوروميتان ته ورته کلوروسيلان توليدوي:



ټول سليکانونه عایق او د اوبو له نفوذ څخه مخنیوی کوي چې کوم کیمیاوي فعالیت نه لري او په ساختماني کارونو کې د پوښولو په چارو کې ورځنې کار اخیستل کیږي.

7- سليکان د کیمیاوي خاصیتونو له مخې له غیر فلزونو سره ورته والی لري؛ خو د هغه برښنايي تیرونه او فزیکي خاصیتونه یې شبه فلزونو ته ورته دي. د سليکان بلور الماس ته ورته دی؛ خو د هغې د اتومونو ترمنځ اړیکه دومره ټینګه نه ده، لکه په الماس کې چې د کاربن د اتومونو ترمنځ ده. سليکان نیمه هادي دی؛ خو الماس هادي دی.



لومړي لوست

د درسي کتاب مخ: 204

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د شبه فلزونو خاصيتونه او جوړښت، د بور عنصر
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د شبه فلزونو، په ځانگړې توگه د بورون عنصر د خاصيتونو او جوړښت په اړه دې معلومات ترلاسه کړي. - يقين دې ترلاسه کړي چې عنصرونه امفوتریک خاصيت هم لري. - امفوتریک عنصرونه دې له فلزونو او غير فلزونو څخه توپير کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او د شبه فلزونو د عناصرو نمونې
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکني)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: بورکس څه شی دی او په کومو ځایونو کې مو ورځینې کار اخیستی.
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي. د شبه فلزونو، په ځانگړې توگه د بورون د عنصر د جوړښت او خاصيتونو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي اود هغه جوړښت او استحصال دې روښانه کړي. د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي. د لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. د زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده وسپاري.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د شبه فلزونو په هکله په ځانگړې توگه د بورون د عنصر د خاصيتونو او جوړښت په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځواب ورکړي او کورنۍ دنده دې تر سره کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د فعالیت حل:

د منگان خاصیت	د مرکب نوم	مرکب	د منگان د اکسیدیشن نمبر	گڼه
غیر فلزي	Potassium permanganate	$KMnO_4$	Mn^{+7}	1
غیر فلزي	Potassium manganate	K_2MnO_4	Mn^{+6}	2
شبه فلزي	Potassium manganite	K_4MnO_4	Mn^{+4}	3
فلزي	manganium(II)oxide	MnO	Mn^{+2}	4


8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

د اصطلاحاتو تعریف

1. بوراتونه: هغه مرکبونه چې په جوړښت کې یې یوازې بورون او هایدروجن شتون ولري، په دې نوم یادېږي.
2. درې مرکزي اړیکه: هغه اړیکه چې په هغه کې درې اتومه د یوې جوړې الکترونونو په واسطه په یوه واحد مالیکولي اوریتال کې یو له بل سره نښلول شوي وي، په دغه نوم سره یادېږي. دا ډول اړیکه په بور هایدرايدونو کې لیدل کېږي.
3. سیلاتونه: هغه مرکبونه چې یوازې له سلیکان او هایدروجن څخه جوړ شوي وي، په دغه نوم سره یادېږي.

د III اصلي گروپ عنصرونه

د III اصلي گروپ عنصرونه د ns^2np^1 د الکتروني ولانسي قشر جوړښت لري او بورون د دغه گروپ لومړنی عنصر دی چې د شبه فلزي خاصیتونو لرونکی دی، د هغه اکساید او هایدروکساید تیزابي خاصیت لري چې له هایدروجن سره بیلابیل دوه عنصري مرکبونه جوړوي، المونیم د دغه گروپ دویم عنصر دی چې فلزي خاصیت لري او غیر فلزي خاصیت یې ډیر لږ حس کېږي، یوازې د قوي تیزابونو او قوي القلیو په وړاندې امفوتریک خاصیت له ځانه ښيي، له دې کبله له شبه فلزونو سره ګډه اړیکه لري:



د بورون د عنصر اتوم ډیر کوچنی دی؛ له دې کبله دغه غیرفلزي عنصر د خپل گروپ له عنصرونو څخه ځانګړی خاصیت لري. په عمومي توګه د فلزونو اتومي شعاع 120 pm ده او د غیر فلزي عنصرونو شعاع له 120 pm څخه لږ ده. د دریم گروپ عنصرونه د انیون د جوړولو میل نه لري او لکه څرنګه چې د هغوی له الکتروني جوړښت (ns^2np^1) څخه ښکاريږي، ډیر شمیر یې د اکسیدیشن +3 نمبر ځانته غوره کوي. څرنګه چې د بورون د عنصر شعاع کوچنی ده، له دې امله د هغه د ایونایزیشن انرژي لوړه ده چې د B^{+3} ایون نه رامنځ ته کېږي؛ له دې کبله د بورون په مرکبونو کې اشتراکي اړیکې شتون لري او د دریو الکترونونو د جلاکولو لپاره د اړتیا وړ انرژي د بورون له اتوم د هایدريشن د انرژۍ او د کرسټالي شبکې له انرژۍ څخه نه ترلاسه کېږي. د دریم گروپ نور عنصرونه کولای شي چې په مرکبونو کې ایوني اویاکولانسي اړیکه وتړي.


ګالیم، انډیم او تالیم د اکسیدیشن +1 نمبر ځانته غوره کوي، ګالیم او انډیم د خپل اکسیدیشن +1 نمبر په لرلو سره نا پایښته مرکبونه جوړوي، په داسې حال کې چې د اکسیدیشن د +3 نمبر په لرلو سره پایښت لرونکي مرکبونه جوړوي. د دریم گروپ د

عنصرونو اکسایدونه او هایدروکسایدونه د اټومي نمبر په ډیریدو سره د اسیدي خاصیت په لږوالي کې یوه معمولي تګ لاره د اټومي نمبر پر بنسټ ځانته غوره کوي، داسې چې B_2O_3 او $B(OH)_3$ چې د H_3BO_3 په څیر لیکل کېږي، تیزاب دی، د المونیم او گالیم مرکبونه امفوتریک دي، In_2O_3 او Tl_2O_3 القلي خواص لري، لاندې جدول د دریم گروپ د عنصر و الکتروني جوړښت او ځینې خواص ښيي:

عنصرونه فزيکي ځانگړتياوې	<i>B</i>	<i>Al</i>	<i>Ga</i>	<i>In</i>	<i>Tl</i>
دوېلې کیدو درجه ($^{\circ}C$)	2300	659	30	155	304
د ایشیدو درجه ($^{\circ}C$)	2550	2500	2070	2100	1457
اټومي شعاع (<i>pm</i>)	80	125	125	150	155
ایوني شعاع (<i>pm</i>)	—	52	62	81	95
الکتروني جوړښت	$1s^2 2s^2 2p^1$	$(Ne) 3s^2 3p^1$	$(Ar) 4s^2 4p^1$	$Kr 5s^2 5p^1$	$(Xe) 6s^2 6p^1$
دایونایزیشن انرژي <i>kJ / mol</i>	801 2422 3657	579 1814 2740	579 1968 2953	560 1814 2692	589 1952 2866
اټومي نمبر	5	13	31	49	81

د بور عنصر د زنځیري مرکبونو د جوړولو ډیر لږ تمایل لري؛ د بیلگې په توگه: B_2Cl_4 مرکب کولای شي ترڅو Cl_2BBCl_2 زنځیري مرکب جوړ کړي؛ خو د دې گروپ د نورو عنصرونو مرکبونه په دې بڼه مرکبونه نه شي جوړولای.





دویم لوست

د درسی کتاب مخ: 205

د مطلبونو سرلیکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د بورون مرکبونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هیله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د بورون د مرکبونو خاصیتونو او د هغوی کارولو د ځایونو په اړه دې معلومات تر لاسه کړي. - یقین دې تر لاسه کړي چې د بورون مرکبونه په بیلابیلو صنعتي او طبي برخو کې کارول کېږي. - د بورون مرکبونه د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې وکارولای شي.
3- د تدریس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدریس اړین مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشیر او د بورون د بیلابیلو مرکبونو نمونې
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او لیکنی)
6- په ټولګي کې د تدریس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په دقیقه اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انګېزې رامنځته کول: د کرمبول د تختې د خوړولو ځانګړتیا لپاره له 5 کومې مادې څخه کار اخيستل کېږي؟
6-1: د ښوونکي د تدریس فعالیتونه (د مفاهیمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرلیک دې د تختې پرمخ ولیکي. د شبه فلزونو، په ځانګړې توګه د بور د عنصر د جوړښت او خاصیتونو په اړه دې هر اړخیز معلومات ورکړي، د هغوی جوړښت اولاسته راوړنه دې روښانه کړي. د لوست د متن مفهوم زده کوونکو ته ورکړي. لوست د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. زده کوونکو ته کورنۍ دنده ورکړي.		- د ښوونکي څرګندونو ته دې څیړشي، د هغوی مهم ټکي دې یادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي یې د بورون د مرکبونو په اړه وړاندې کوي، یاد داشت او زده دې کړي. - د بورون د مرکبونو لاسته راوړنې او د کارولو کړنلارې چې ښوونکي یې روښانه کوي، زده کوونکي دې د عمل په ډګر کې پلي کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.

7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه:

د لوست په متن کې پوښته نه شته،

8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات.


د بورن مرکبونه

بورون له اکسیجن سره په اسانۍ تعامل کوي، د بورون اکساید جوړوي، له دې امله بورون په طبیعت کې په خالص ډول نه موندل کېږي، کرسټلي رنګه بورون تور بخن څر رنګ لري او وروسته له الماس څخه ډیر کلک عنصر دی.

بورون په عادي تودوخې کې برېښنا نه تیروي؛ خو د تودوخې په ډیریدو سره د هغه برېښنايي مقاومت لږېږي. د بورون مهم مرکب BH_3 دی، د B د اتوم د باندیني قشر د الکتروني جوړښت په پام کې نیولو سره، ددې مرکب ساده فورمول BH_3 دی؛ خو د هغه مالیکولي کتله د هغه له دایمر (B_2H_6) فورمول سره سمون لري.

د غیر فلزونو اکسایدونه د بې اوبو تیزابونو (د تیزابو انهایدرید) (*Anhydrideacide*) په نوم یادېږي.

که چیرې د غیر فلزونو اکسایدونه هایدریشن شي، د هغوی اړوند تیزابونه تر لاسه کېږي:




ښېښه او د هغې جوړوونکي مرکبات : د ښېښې لومړني جوړوونکي مواد عبارت له سلیکان ډای اکساید (SiO_2)، بوریک اکساید (B_2O_3)، فاسفوریک اکساید (P_2O_5) څخه دي چې په اسانۍ سره کولی شي ښېښه جوړه کړي. له نوموړو اکسایدونو سره یو د ښېښې په جوړولو کې GeO_2 ، Al_2O_3 ، Ga_2O_3 ، V_2O_3 ، TeO_2 ، Sb_2O_3 ، As_2O_3 ، Bi_2O_3 ، SiO_2 اکسایدونه او نور مرکبونه هم برخه اخلي، که څه هم د ښېښې جوړوونکي مرکبونه په څه ناڅه توګه ډیر زیات دي؛ خو SiO_2 د ښېښې اصلي جوړوونکی دی.

که څه هم له سوچه سلیکان څخه ښکلې ښېښه تر لاسه کېږي چې کولای شو په کرکيو او ورونو کې یې وکاروو؛ خو د سلیکان د ویلې کیدو درجه $2000^\circ C$ ده او ډیر لګښت ته اړتیا ده؛ نو له دې امله د هغه د ویلې کیدو درجې د راتیتولو لپاره هغه له نورو ویلې کوونکو موادو سره ګډ وي چې دا مواد له: Na_2O ، PbO ، Li_2O ، Cs_2O او Rb_2O څخه عبارت دي.

سر بیره له دې چې ویلې کوونکي مواد د سلیکان د ویلې کیدلو درجه را ټیټه وي، د کیمیاوي محلولو په مقابل کې د ښېښې د مقاومت د کم والي لامل هم کېږي، د مایعاتو د ساتلو د بوتلونو او د کرکيو د ښېښو په جوړولو کې ور څخه ګټه نه اخیستل کېږي، د دې نقیصې له منځه وړلو لپاره د لومړي، دویم اصلي ګروپونو له عنصرنو او د انتقالی فلزونو له اکسایدونو څخه او په ځانګړې توګه له المونیم اکساید څخه کار اخیستل کېږي.

د ښېښه یې لوبڼو د ښکلا لپاره د انتقالی فلزونو له اکسایدونو څخه کار اخیستل کېږي، په پخوانیو وختونو کې د یورانیم له اکساید څخه د ښېښه یې توکو په رنګه کولو کې کار اخیستل کیده؛ خو د وړانګو د پراختیا له کبله په اوسنیو وختونو کې له هغه څخه کار نه اخیستل کېږي.



دریم لوست

د درسي کتاب مخ: 207




د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د بورون فلورايد جوړښت، د بورون هايډرايدونه
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي: - د بورون فلورايد پر جوړښت دې پوه اود هغه پرنسپ دې دهغه فزيکي او کيمياوي خواص زده او هم دې د بورون د هايډرايدونو په اړه معلومات ولري. - يقين دې تر لاسه کړي چې د بورون فلورايد جوړښت د هغه په خواصو کې مهم رول لري. - د بورون فلورايد د جوړښت په پام کې لرلو سره، هغه دې له نورو مرکبونو څخه توپير کړای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته تباشير او د لابراتوار سامانونه
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنې)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په اخېستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: بورون هايډرايد به د کوم رنگ لرونکي وي؟
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تخته پرمخ وليکي.		- د ښوونکي څرگندونو ته دې څيرشي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري.
د بورون فلورايد د جوړښت په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي.		- هغه معلومات چې ښوونکی يې د بورون فلورايد د مرکبونو په اړه وړاندې کوي، ياد داشت او زده دې کړي.
د بورون فلورايد د جوړښت پر بنسټ دې فزيکي او کيمياوي خواص روښانه کړي.		- د بورون د هايډرايدونو په اړه دې اړوند معلومات ورکړي.
د بورون د هايډرايدونو په اړه دې اړوند معلومات ورکړي.		- د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي.
د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته روښانه کړي.		- کورنۍ دنده دې تر سره کړي.
لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره وارزوي.		
زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د فعالیت حل


د کیمیاوي تعاملونو معادلې لیکل:



8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات


د BF_3 جوړښت

د BF_3 د مالیکول الکتروني جوړښت یوه ښه بیلګه ده چې په مرسته یې کولی شو د مالیکول د اوربیتال نظریه روښانه شي؛ نو په کار ده چې په غور سره مطالعه شي، د BF_3 د مالیکول جوړښت متشابه مسطح دی، داسې چې د کلورین اتومونه د مساوي الاضلاع مثلث په راس کې په مساوي واټنونو $1,291^{\circ} \text{Å}$ شتون لري او بورون اتوم د هغې په مرکز کې د 120° زاوې په کچه د فلورین له درې واړو اتومونو څخه شته دی:



شکل: په یوه سطحه کې د BF_3 په مالیکول کې د بورون پر بنسټ د فلورین د اتومونو څرنگوالی

د BF_3 , AlF_3 , BCl_3 , AlCl_3 په مالیکولونو کې شپږ الکترونونه د δ د اړیکو په اوربیتالونو ($\sigma_z, \sigma_y, \sigma_x$) کې شتون لري او دوه الکترونونه P_z په اوربیتال کې چې د π یوه اړیکه جوړوي شته دي، د دې اړیکو انرژي له 644 KJ/mol سره مساوي ده. په دې مرکب کې د بورون اتوم د sp -hybride لري چې زاویه یې 120° ده. د دغو اوربیتالونو جوړښت په لاندې شکل کې ښودل شوی دی او د π د اوربیتال اړیکې د کلورین له نهو (9) اتومونو سره ټاکل شوې دي:




شکل : د BF_3 په مالیکول کې د فلورین د اتومونو څرگوالی

دا سطح جوړښت د دریم (III) اصلي گروپ د نورو عناصرو (Ti, In, Ga, Al) په مرکبونو کې هم لیدل کېږي او هم د اکسیجن لرونکو مرکبونو په مالیکولونو کې ؛ لکه: $(BO_3^{3-}, CO_3^{2-}, NO_3^-, SO_3^-)$ لیدل کېږي.

د BF_3 ، BH_3 او BCl_3 مرکبونه په غازي حالت کې په دوو مالیکولي (Dimer) بڼو موندل کېږي او ځینې یې د B_2F_6 ، B_2Cl_6 ، B_2H_6 په بڼه هم شتون لري. د بورون په شا او خوا کې د هایډروجن د اتومونو یا کلورین او یا فلورین د اتومونو له کواردینیشن څخه نا منظمه څلور مخیزه جوړېږي، لاندې شکلونه د BH_3 د مالیکول د یاگرام او د (B_2H_6) دو مالیکولونو جوړښت او د بورون یا د المونیم د هلو جني مرکبونو دوه مالیکولي جوړښت په غازي حالت کې ښیي.

پورتنی شکل د فلور او بورون او د (BH_3) د مالیکول د اوربیتالونو انرژیکي سوبه ښیي ، څرنگه چې لیدل کېږي، د فلورین د اتوم $2s^2$ اوربیتال په اړیکه کې ګډون نه دی کړی او د بورون د اتوم sp^2 هایبرید شوي اوربیتالونه د فلورین د اتومونو له $2p$ اوربیتال سره د σ درې مساوي اړیکې جوړوي.



خرنگه چې وويل شول، د فلورين د اتومونو د $2P$ اوربیتالونو درې د σ سگما اړيکې او يوه د π اړيکه جوړوي او د π اړيکه د ريزونانس په شکل په دريو بڼو ښودل شوې ده.



څلورم لوست





د درسي کتاب مخ: 208

د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		سليکان، د سليکان اکسايډ
2- د زده کړې موخ		له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د سليکان او د سليکان د اکسايډ په هکله دې هر اړخيز معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې سليکان او د سليکان اکسايډ د طبيعت د جوړښت مهم مواد دي، کيدای شي چې په بيلابيلو لارو تر لاسه شي . - له سليکان او دهغه له اکسايډ څخه دې پرځای کار واخلي او لاس ته دې راوړلای شي.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمايشي، توضيحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته، تباشير او د لابراتوار سامانونه
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضری وخت په اخیستل، د کورنۍ د نډې کتل او د تیرلوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول : شگې له کومو مواد څخه جوړې شوي دي؟ 5 دقیقه
6-1: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه د مفاهيمو زده کړه او ارزونه		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د ښوونکي د تدريس فعالیتونه		د زده کوونکي د تدريس فعالیتونه
د لوست سرليک دې د تخته پر مخ وليکي. - د سليکان او د سليکان د اکسايډ په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - د سليکان او د سليکان د اکسايډ د لاسته راوړنې بيلابيلې لارې دې په هغو بيلگو زده کوونکو ته روښانه کړي چې په درسي کتاب نه وي، - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته ورکړي. - لوست دې د څو پوښتنو په طرحه کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		40 - د ښوونکي څرگندونو ته دې ځير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکی يې د سليکان او د سليکان د اکسايډ په اړه ورکوي، يادداشت او زده دې کړي. - هغه لارې چې ښوونکی يې د سليکان او د سليکان د اکسايډ د لاسته راوړنې په اړه وړښي، يادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه ورکړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه


د فعالیت حل:




8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات

سلیکان: د سلیکان کیمیاوي خواص له غیر فلزونو سره ورته دي؛ خو د هغوی فزیکي او د برېښنا تیروني خواص له شبه فلزي خاصیت سره سمون لري. د سلیکان بلوري بڼه د الماس په شان ده؛ خو د هغه د اتومونو ترمنځ اړیکې، د کاربن د اتومونو ترمنځ اړیکې په شان چې په الماس کې شتون لري، ډیرې ټینګې نه دي. سلیکان د برېښنا نیمګړی تیروونکی دی؛ خو الماس نه تیروونکی دی. له سلیکان څخه په ترانزستورونو کې د برېښنا د نیمګړي تیروونکي په توګه کار اخیستل کېږي.

سلیکان چې څه ناڅه د ځمکې د قشر 28% برخه جوړه کړېده او وروسته له اکسیجن څخه ډیر زیات موندل شوی دی، دغه عنصر په ازاده بڼه په طبیعت کې نه موندل کېږي؛ خو د سلیکان ډای اکساید او د سلیکاني ډبرو په بڼه شتون لري. دغه عنصر په برېښنايي بټیو کې د کاربن په واسطه د سلیکان ډای اکساید د ارجاع کولو په پایله کې لاس ته راځي:



که چیرې په پورتنۍ تعامل کې د کاربن کچه ډیره وي، د سلیکان پرځای د SiC مرکب لاسته راځي:




د سلیکان پیژندل شوی بلوري شکل الماس ته ورته دی او خرڅلیدونکی رنګ لري او د برېښنانیمګړی تیروونکی دی. دسلیکان داتومونوترمنځ اړیکې په الماس کې دکاربن داتومونو د اړیکو په شان غښتلې نه دي، د اړیکو جوړوونکي الکترونونه په بشپړه توګه ځای په ځای نه دي. په سلیکان کې الکترونونه د تودوخې په واسطه هڅول کېږي او لوړ قشر ته چې د انرژۍ له کبله ولانسي قشر ته نږدې دی، لیرې ډول کېږي.


نګه (خالصه) سلیکان چې د ترانزستورونو د جوړولو لپاره په کار وړل کېږي، په څو پړاوونو کې لاسته راځي، په لومړي پړاو کې نانګه(ناخالصه) سلیکان له کلورین سره تعامل ورکوي؛ په پایله کې SiCl_4 لاسته راځي، لاسته راغلی SiCl_4 چې یوه تښتیدونکې مایع ده، د پرله پسې تقطیر له امله سوچه (خالص) او د هایډروجن په واسطه ارجاع کېږي چې په نګه (خالصه) سلیکان بدلون مومي.

SiC د سلیکان کارباید (*Silican corbide*) یا کربورنډم په نوم یادېږي، نه سوځیدونکې کلکه ماده ده. دا ماده د کاربن او SiO_2 له تودوخې ورکولو (تر 2000°) څخه لاسته راځي. دغه مرکب د نه سوځیدونکو خښتو، د ساتونکو توکو او نه سوځیدونکو سمنتو په جوړولو کې کارول کېږي:





شکل: الماس ته ورته د سلیکان بلورونه





د مطلبونو سرليکونه		د مطلبونو شرح
1- د لوست موضوع		د سليکان دای اکساید کيمياوي خواص ، سليکان هايډرايد
2- د زده کړې موخې		له زده کوونکو څخه هيله کيږي چې د لوست په پای کې لاندې موخې تر لاسه کړي : - د سليکان دای اکساید او د سليکان د هايډرايدو د کيمياوي خواصو په اړه دې پوره معلومات تر لاسه کړي. - يقين دې تر لاسه کړي چې سليکان دای اکساید ټاکلی کيمياوي خواص لري او سليکان هايډرايد دې په بيلا بيلو لارو تر لاسه کړي. - سليکان دای اکساید دې د کيمياوي خواصو پر بنسټ له نورو مرکبونو څخه توپير کړای شي او سليکان هايډرايد دې وپيژني.
3- د تدريس میتودونه		مناقشه، نمایشي، توضیحي او عملي
4- د تدريس اړين مواد او توکي		کتاب، قلم، تخته ، تباشير او د لابراتوار سامانونه
5- د ارزونې میتود		پوښتنې او ځوابونه (شفاهي او ليکنی)
6- په ټولگي کې د تدريس او زده کړې فعالیتونه		لومړني فعالیتونه: د سلام ورکول، د احوال پوښتنه، د حاضرۍ اخېستل، د وخت په دقیقه کورنۍ د ندې کتل او د تیر لوست ارزونه د انگېزې رامنځته کول: د ودانیو جوړولو په پوښتنې کې له کومو موادو څخه کار اخېستل کيږي ؟
1-6: د ښوونکي د تدريس فعالیتونه (د مفاهيمو زده کړه او ارزونه)		د زده کوونکو د زده کړې فعالیتونه
د لوست سرليک دي د تختې پرمخ وليکي. - د سليکان دای اکساید کيمياوي خواص او د سليکان هايډرايدونو په اړه دې هر اړخيز معلومات ورکړي. - د سليکان دای اکساید او د سليکان هايډرايد د لاسته راوړنې بيلا بيلې لارې دې له بيلگوسره روښانه کړي. - د لوست د متن مفهوم دې زده کوونکو ته څرگنده کړي. - لوست دې د څو پوښتنو په کولو سره و ارزوي. - زده کوونکو ته دې کورنۍ دنده ورکړي.		د ښوونکي څرگندونو ته دې څير شي، د هغوی مهم ټکي دې يادداشت او په پام کې ولري. - هغه معلومات چې ښوونکي يې د سليکان دای اکساید د کيمياوي خواصو او د سليکان د هايډرايدونو په اړه وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - د سليکان دای اکساید او د سليکان هايډرايدو لاسته راوړنې بيلا بيلې لارې چې ښوونکي يې وړاندې کوي، يادداشت او زده دې کړي. - د ښوونکي پوښتنو ته دې ځوابونه وړاندې کړي. - کورنۍ دنده دې تر سره کړي.



7 - د لوست د متن د پوښتنو ځوابونه

د فعالیت حل:




8 - د ښوونکي لپاره اړین معلومات


سلیکان ډای اکساید: د سلیکان ټاکلی اکساید، سلیکان ډای اکساید دی چې په جامد حالت شتون لري او د هغه مالیکولونه د لوندون د قوي پرېنست یو له بل سره نښلول شوي دي. SiO_2 درې اړخیزه بلوري شبکه یې لوی حجم لري، د ویلي کیدو درجه یې 1700°C ده، د سلیکان ډای اکساید له بلوري شبکو څخه یوه یې له الماس سره ورته والی لري، یوازې یو له بل څخه دومره توپیر لري چې د کاربن د اتومونو په ځای د سلیکان اتومونه ځای په ځای شوي دي او د سلیکان د هرې جوړې اتومونو تر منځ د اکسیجن اتوم شتون لري.

د سلیکان کیمیا د یولړ مرکبونو سره تړاو لري چې د $\text{Si}-\text{O}$ اړیکه لري. SiO_2 د اکسیجن او سلیکان د تعامل محصول دی او په هوا کې د سلیکان هایدراید د سوځیدو په پایله کې هم لاسته راځي. H_2SiO_3 د سلیکان د مرکبونو د هایدريشن محصول دی.


سلیکان ډای اکساید یو ډول اسیدی اکساید دی؛ خو تر اوسه له هغه څخه کوم تیزاب نه دی جوړ شوی، دغه اکساید له اوبو سره د نیغې یوځای کیدنې له امله کوم اغیزه سره نه لري؛ خو که چیرې د سلیکاتونو او بلن محلول تیزابي شي، یوازې H_2SiO_3 لاسته ته راځي. سلیکاتونه کیدای شي چې د فلزونو د اکسایدونو اویا د فلزونو د کاربونیټونو او SiO_2 سره له یوځای تودوخې ورکولو څخه ترلاسه شي، د لومړي اصلي گروپ د عناصرو د فلزونو ځینې سلیکاتونه په اوبو کې حل کېږي (په داسې حال کې چې د لومړي اصلي گروپ د فلزونو د اکساید او د سلیکان ډای اکساید ترمنځ مولی نسبت، دوه په نسبت د یوه دی) د سلیکاتونو د ډولونو ډیر شمیر په طبیعت کې شتون لري، د ټولو سلیکاتونو بنسټیز واحد د SiO_4 څلور مخیزه گروپ دی چې په لاندې شکل کې لیدل کېږي:




د SiO_4^{4-} گروپ څلور مخیز دی چې په لاندې شکل کې لیدل کېږي، د SiO_4^{4-} ساده ایون په ځینو کانونو کې موندل کېږي چې د هغه بیلگه کیدای شي ZrSiO_4 ورکړل شي، د سلیکان د اتوم څلور جوړې اړیکې جوړوونکي الکترونونه د څلور مخیز په بڼه ترتیب شوي دي:



نور سليکاتونه له يوه څخه زيات څلورمخه لري چې د اکسيجن د اتومونو په واسطه سره نښلول شوي دي، په دې معنی چې د اکسيجن اتوم د دوه څلورمخو تر منځ گډ دی ؛ د بيلگې په توگه : دتورتوتيت ډبره ($\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$) د $\text{Si}_2\text{O}_7^{6-}$ ايون لري چې د SiO_4 له دوو څلور مخو څخه چې د اکسيجن په واسطه نښلول شوي دي، جوړ شوی دی.



شکل : د سليکات په ايونونو کې الکتروني جوړښت



شکل : دسليکاتونوڅلورمخه جوړښت

يادونه

د يولسم ټولگي درسي کتاب د وخت دغوښتنې او ستونزو له امله، له ډيزاين څخه وروسته په بشپړه توگه بيا کتل شوی نه دی؛ له دې امله په دې کتاب کې به خامخا ځينې کمپيوټري تېروتنې او ستونزې شتون ولري، دا چې نوموړی کتاب په زرگونو ټوکو چاپ او ښوونځيو ته ورکړل شوی دی او د هغوی د تېروتنې د لرې کولو وخت ورکړل شوی نه دی، د دې کتابونو ستونزې به په راتلونکي کې لرې او بيا به د ښاغليو ښوونکو او زده کوونکو په چوپړ کې به ورکړل شي، د ښوونکو او زده کوونکو د ستونزو د ليرې کولو لپاره، د دې کتاب تېروتنې او ستونزې په يو جدول کې د ښوونکي د لارښود په کتاب کې ليکل شوي دي، ترڅو ښوونکي له هغوی څخه په گټې اخيستې سره دا ستونزې زده کوونکو ته په گوته او د هغوی سمون ورته روښانه کړي.

د يادولو وړ ده چې د کتاب د خپرکو په ځينو پوښتنو کې هم ستونزې شته دي، داسې چې د پوښتنو په هکله مطالب شتون نه لري، نو حل يې ستونزمن دی، د ښوونکي د لارښود په کتاب کې نوې پوښتنې ځای پر ځای او حل شوي دي چې په راتلونکي کې دا پوښتنې به په کتاب کې هم اصلاح شي او سم کتاب به گرانو ښوونکو او زده کوونکو ته ورکړل شي.

د ښوونکو او زده کوونکو لارښوونې به هيله.

په درناوې

پوهندوی ديپلوم انجنيير عبدالمحمد عزيز

د یولسم ټولګې د درسي کتاب د تیروتنې د سمولو جدول

گڼه	مخ	کرښه	غلط	صحیح
1	2	3	ځینې	ځینې
2	2	10	تشکیل شوي وي	جوړ شوي وي
3	2	11	ټینګ	ټینګ
4	2	11	توپیر وکړو؟	پر توپیر پوه شو؟
5	3	5	تشکیل کوونکې	جوړونکې
6	3	2	دي	دې
7	3	5	غیر متجانس مخلوطونه (Homogen)	غیر متجانس مخلوطونه (Hetrogen)
8	3	9	غیر متجانس مخلوطونه (Homogen)	غیر متجانس مخلوطونه (Hetrogen)
9	3	11	نه لري	ونه لري
10	3	له اخیر څخه 2	چې له اوبو	چې $NaCl$ د اوبو
11	5	شکل	شکل (1-4)	د صفحې ښکتنی برخې ته راشی
12	6	6	تشکیل کوونکو	جوړونکو
13	6	3	کونکې	کوونکې
14	6	له اخیر څخه 5	مالکه	مالګه
15	6	اخیر کرښه	دقیق ډول	په ځیر سره
16	6	د اخر څخه 5	کیلاس	گیلاس
17	7	11	کې	کې
18	7	16	د یو قاشوغه	یوه قاشوغه
19	7	26	زیاتېږي	ډیرېږي
20	7	له اخیر څخه 2	زیات	زیاته
21	8	له اخیر څخه 10	عوامل	عاملونه
22	8	.	(1-6) شکل فعالیت	مشبوع او غیر مشبوع دې ولیکلی شي
23	7	د فعالیت لومړي کرښه	عیر	غیر
24	8	18	هیڅ	هیڅ
25	8	9	وېې ښورۍ کوم	وېې ښوروی چې
26	10	مثال	$CaCl_2$	H_2O
27	10	فورمول	$\frac{n}{m'}$	$C = \frac{n}{m'}$
28	10	23	تقسیم پر ټولو اجزاوو	تقسیم د محلولونو پر ټولو اجزاوو.
29	11	4	سلیزه	سلنه
30	11	5	د تقسیم	له تقسیم
31	11	19	33	135

32	11	23	130	135
33	11	27	$500.0g + 0.45$	$500.0g + 0.045g$
34	12		b	په فعالیت د b برخه د منځه ولاړشی او c دې په b تبدیله شي
35	13	10	lC_N	$ldeC_N$
36	15	2	انحلال	حلکیدل
37	15	11	معادله گرام	معادل-گرام ($Eq - g$)
38	15	13	مول فرکشن د سر تعریف شوی دی	د حلیدونکې یا دحلکونکې مادې مول فرکشن ، دحلکیدونکې یا حل شوې مادې دمولونو کچه د محلول د مجموعي مولې کچې له ویشلو څخه عبارت دی.
39	17	3	خواصونه	خواص
40	19	26	$P = \frac{n}{V} RT$ یا $P = \frac{n}{V} RT$	$P = \frac{n}{V} RT$ یا $PV = nRT$
41	20	10	$700 - 800k$	$700 - 800Kpa$
42	21	19	حجری ښیي	حجری رښیي
43	23		زده یې کړئ	= د علامه دې حذف شي.
44	23	28	$N_{NaCl} = \frac{m/M}{m/M + m/M} = \frac{2g/58.5g \cdot mol^{-1}}{2g/58.5g \cdot mol^{-1} + 98g/18g \cdot mol^{-1}} = 0.0342mol$ $N_{NaCl} = \frac{0.0342mol}{0.0342mol + 5.44mol} = 0.0062$ $N_{NaCl} = \frac{\Delta p}{p^0} \quad \Delta p = N_{NaCl} p^0 = 0.0062 \cdot 101.3kpa = 0.628kpa$ $p = P_0 - p, \quad p = p^0 - \Delta p = 101.3kpa - 0.62kpa = 100.672kpa$	$N_{NaCl} = \frac{m/M}{m/M + m/M} = \frac{2g/58.5g \cdot mol^{-1}}{2g/58.5g \cdot mol^{-1} + 98g/18g \cdot mol^{-1}} = 0.0342mol$ $N_{NaCl} = \frac{0.0342mol}{0.0342mol + 5.44mol} = 0.0062$ $N_{NaCl} = \frac{\Delta p}{p^0} \quad \Delta p = N_{NaCl} p^0 = 0.0062 \cdot 101.3kpa = 0.628kpa$
45	24		له اخیر څخه خلورمه	$30 - 40^{\circ}C$ پورې
46	24		فعالیت	$NaCl$ او KNO_3
47	24	3	مادې دمحلول	مادی سره د جوړ شوي محلول د --- ،
48	25	9	د نهمې کرښې تر لاندې دې ولیکل شي چې	په دي معادلو E ایبلوسکوپیک ثابت دی
49	26	2	E د ایبلوسکوپیک ثابت او	لرې دې شي.
50	26		فعالیت	سودیم نایتریت
51	27		(2-2) جدو ل	$C_4H_{10}O$
52	27		(2-2) جدو ل	$C_{10}H_{16}O$
53	27	5	الکترولیت	الکترولیت او غیر الکترولیت
54	27		جدول	E_b
55	27	//		K_f
56	28	5	الکترولیت محلول	الکترولیت او غیر الکترولیت محلول

غلظت يې Ca خخه ---	غلظت يې Ca خخه ---	11	29	57
د ټوټه کيدو	د د ټوټه کيدو	15	29	58
سلنه	سليزه	23	29	59
سلنه	سليزه	11-10-9-8	30	60
C_3H_6O	C_2H_6O	3	34	61
2.31mmHg	131.3mmHg	7	34	62
$V = \frac{-1}{a} \frac{\delta[A]}{\delta t} = \frac{-1}{b} \frac{\delta[B]}{\delta t} = \frac{1}{c} \frac{\delta[C]}{\delta t} = \frac{1}{d} \frac{\delta[D]}{\delta t}$	$V = \frac{-1}{a} \frac{\delta[A]}{\delta t} = \frac{-1}{b} \frac{\delta[B]}{\delta t} = \frac{-1}{c} \frac{\delta[C]}{\delta t} = \frac{-1}{d} \frac{\delta[D]}{\delta t}$	فورمول	36	63
دپورتني تعامل منځنۍ جټکتيا د وخت په تيريدوکې د تعامل کوونکو موادو د غلظت د ضرب له حاصل سره او يا دلاسته راغلو محصولونو له غلظتونو حاصل په يوه موده کې عبارت دی ز		4	37	64
δ	Δ	6	37	65
$= 1.9 \cdot 10^{-4} \text{ molar} \cdot \text{sec}^{-1}$	$= 1.9 \text{ molar} \cdot \text{sec}^{-1}$	فورمول	37	66
$t = 400 \text{ sec}$	$t = 60 \text{ sec}$	7	38	67
= د چټکتيا په 400 sec کې	= د چټکتيا په 600 sec کې	فورمول		68
$= \frac{\Delta C}{\Delta t} = \frac{0.042 - 0.017}{800 - 400} = 6.2 \cdot 10^{-5} \text{ m/sec}$	د مماس د خط ميل په دی شکل ليکل شى	15	38	69
چټکتيا کمه	چټکتيا سسته	18	38	70
وټاکلى	وټکالى	20	39	71
يو له بل سره	يو دبل سره	25	39	72
$CHCl_3$	$CHCl_3$	7	40	73
$I_2 + H_2 \xrightarrow{\text{وړ}} 2HI$	$Cl_2 + H_2 \xrightarrow{\text{وړ}} 2HCl$	4	41	74
NO_2^- لومړنى غلظت په molar	(NH_4^+) لومړنى غلظت ؛ molo	2-3 جدول 1	42	75
(NH_4^+) لومړنى غلظت په molar	(NO_2^-) لومړنى غلظت په molar	2-3 جدول 1	42	76
نو کيدای	خو کيدای	7	43	77
$\text{Log} \frac{5.2 \cdot 10^7}{3.5 \cdot 10^{-7}} = \text{Log} \frac{0.2}{0.13}$	په فورمول کې دې دغه برخه و ليکل شى.		43	78
$\text{Log} 1.54 = \text{Log} 1.54$	.	// // //	43	79
$0.2 = \times 0.2$	.	7.	43	80
$K = \frac{5.4 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{Li}^{-1} \cdot \text{sec}^{-1}}{(0.01 \text{ mol} \cdot \text{Li}^{-1})(0.2 \text{ mol} \cdot \text{Li}^{-1})}$ $K = 2.7 \cdot 10^{-4} \text{ Li}^{-1} \cdot \text{mol} \cdot \text{sec}^{-1}$	$K = \frac{5.4 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{Li}^{-1} \cdot \text{sec}^{-1}}{(0.01 \text{ mol} \cdot \text{Li}^{-1})(0.02 \text{ mol} \cdot \text{Li}^{-1})}$ $K = 2.7 \cdot 10^{-4} \text{ Li}^{-1} \cdot \text{mol} \cdot \text{sec}^{-1}$	11	43	81
د منځنى حرکى انرژي	د منځنى انرژي	6	44	82
په ماليکول کې د $C \equiv N$ گروپ	په ماليکول کې د گروپ	اخيرنى	44	83

84	45	2	د گاز په حالت کې	د تیروني په حالت کې
85	45	4	د پریکړیدو په عوض	د پریکړیدو او تیریدو
86	45	18	او (8-3) شکل	او (4-3) شکل
87	45	18	8-3	4-3
88	45	فورمول	$K = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}}$	$K = A \cdot e^{\frac{-E_a}{RT}}$
89	46	فورمول	اخیر نی	$= \frac{\log \Delta K}{\Delta \frac{1}{T}} = -5/4 \cdot 10^3$
90	48	18	6	16
91	49	1	10^{10}	10^{13}
92	50	20	11-3	12-3
93	52	21	پلاوکی	بل پراوکی
94	53	4	د تعامل په بله پراوکی	د تعامل په بل پراوکی
95	57	12	چټکتیا	چټکتیا
96	57	20	پاتی کیږي داسی تعادل	پاتی کیږي؛ خو داوېو د براسو بیا مائع کیدل دمایکرسکوپیک په حالت کې لاهم پهیږ مومي و داسې --
97	//	23	بې رنگه زهري	پې رنگه او زهري
98		23	اندازه	کچه
99	57	29	په دې حالت کې	په دې صورت کې
100	58	3	د تعادل د حالت	الف- له لومړني حالت څخه د NO_2 د غلظت د بدلون گراف ب- له لومړني حالت څخه د N_2O_4 د غلظت د بدلون گراف ج- له لومړني حالت څخه د NO_2 او N_2O_4 د غلظت د بدلون گراف
101	58	25	$V_2 = K_2 \cdot [N_2O_4(g)]^2$	$V_2 = K_2 \cdot [N_2O_4(g)]^2$
102	59	3	$K_1 \cdot [NO_2(g)]^2 = K_2 \cdot [N_2O_4(g)]$	$K_1 \cdot [NO_2(g)]^2 = K_2 \cdot [N_2O_4(g)]$
103	59	9	$\frac{K_1}{K_2} = \frac{[N_2O_4(g)]}{[NO_2(g)]^2}$	$\frac{K_1}{K_2} = \frac{[N_2O_4(g)]}{[NO_2(g)]^2}$
104			$K = 3.6 \cdot 10^8 mol^{-1} \cdot L^2$	$K = 3.6 \cdot 10^8 mol^{-1} \cdot L^2$
105	59	فکروکړي	$2H_2(g) + N_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$	$3H_2(g) + N_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
106	59	//	$2NH_3(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + N(g)$	$2NH_3(g) \longrightarrow 3H_2(g) + N_2(g)$
107	59	23	$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$	$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$
108	61	2	د بوه ثابت حجم لرونکي لوبني 10L	په بوه 10L ثابت حجم لرونکي لوبني

109	61	د شکل لاندی	د گازونو شتون په بالون کې	د گازونو څخه ډک بالونونه
110	62	د شکل لاندی	آغاز تعامل؛ SO_3	د تعامل پیل له SO_3 سره
111	62	د شکل لاندی	آغاز تعامل؛ SO_2	د تعامل پیل له SO_2 سره
112	65	19	$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2[O_2]} \Rightarrow 10 = \frac{\left(\frac{0.1}{V_2}\right)^2}{\left(\frac{0.3}{V_2}\right)^2\left(\frac{0.15}{V_2}\right)}$	$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2[O_2]} \Rightarrow 10 = \frac{\left(\frac{0.1}{V_2}\right)^2}{\left(\frac{0.3}{V_2}\right)^2\left(\frac{0.15}{V_2}\right)}$
113	66	2	تعامل د N_2O_4 د جوړېدو په پیل کې ګډوډ کيږي	حذف دې شي.
114	68	1	یادیرې، د تیزابونو	یادیرې، له دې امله د تیزابونو
115	70	3	ناتیروجن	ناتیروجن
116	78	2	هغوي الکتروني	هغوی له الکتروني
117	78	24	$HCl(g)$	$HCl(g)$
118	79	5	$HCl(g)$	$HCl(g)$
119	95	17	سلیزه	سلنه
120	95	18	سلینه	سلنې
121	95	4		د $[HNO_2]$ قیمت
122	98	21	د جلاکیدو ثابت	د ایوني غلظت د ضرب د حاصل ثابت
123	99	10 پوښتنه	$(K_b = 6.4 \times 10^{-4})$	$(K_b = 6.4 \cdot 10^{-14})$
124	100	9	C_4^{2+}	Ca^{2+}
125	100	24 پوښتنه	25 پوښتنه	24 پوښتنه ده .
126	108	11	زیاتې	واچوله ، دهغوي
127	114	10	تبریرې	تبریرې
128	114	19	ډیر په شی	لرې دې شي.
129	115	11	یو د اکسیدیشن - ریدکشن	یو د هم اکسیدیشن - ریدکشن
130	115	12	زیاتیرې؛ دبیلګې	زیاتیرې اوځینې نورالکترونونه اخلي چې منفي چارجونه خاټه غوره کوي؛ دبیلګې ---
131		13	د لاسه	له لاسه
132	115	18	ارجاع یا (Reduction)	ارجاع (Reduction)
133	115	21	د اکسیجن سره	له اکسیجن سره
134	116	15	اسفنجي شکه	د اسفنج په بڼه
135	116	26	په حیث	په توګه
136	117	29	په حیث	په توګه
137	128		8-9-10-11	حذف شوي دي او پرځای یې نور اچول شوي دي .
138	138		د شکل	(7-8) شکل: د ډوډی خوړلو ملمع شوي لوبني

		ترلاندي		
ټانک	ټابک	//	138	139
کچه	اندازه	2	139	140
او ځينې فلزونه	او دفلېونو څخه ځينې	1	140	41
کله	څه وخت	پنځمه پوښتنه	141	142
د مخ	د صفحي	لسمه پوښتنه	142	143
ورېډو په پوډرو يې پدلوي او بيا يې	میده کوي او	13	144	144
کارين مونوآکساید	کارين مونوکساید	7	146	145
پريود کې	پريود باندې	5	147	146
خو دا چې	نو دا چې	11	148	147
په موخه	په عوض	13	149	148
سلنه	سليزه	28	149	149
د	کلسيم	3	155	150
$MnSO_4(aq)$	کلسيم کاربونيت ($CaCO_3$)	13	156	151
د انتقالي عناصرو نوکروپونه	گروپ هاي عناصر انتقالي	3	163	152
21 او 22 کرښه زياتي ده ، و دې ويستل شي .	21 او 22	21 او 22	164	153
لانديو	دلاندي	15	176	154
زيرمه	زيرمه	19	177	155
$MnSO_4(aq)$	$MnSO_4(ag)$	19	178	156
احتياط	احتياط	20	179	157
چاوديدونکو توکو	چاوديدونکيو توکيو	7	187	158
$Cu_{(S)}$	$Cu(aq)$	وروستی	190	159
لنډپري	خلاصه کيږي	4	191	160
ايشيدو	ايشدو	جدول، 16	192	161
لږ څه	يوه اندازه	17	193	162
ښايي	ممکن	19	194	163
شونې	ممکنه	13	195	164
سيماب	سميابو	وروستی	195	165
سوځي	روښانه	4	197	166
سليکان (Si)	سليکان	15	197	167
طبيعت	طيف	12	199	168
$nS^2 \ nP^3$	$nS^2 \ nSP^3$	1 پوښتنه	201	169
د کاتي ډبرو	دکاند ډبرو	23	205	170
د بورون کارپايد	د بورکارپايد	21 او 23	206	171

دریمه پوښتنه دې لړې شي.	دریمه مرکزي اړیکه څه شی دي؟	دریمه پوښتنه	213	172
د 3 پوښتنې په لړې کولو سره دې بیا د پوښتنو نمبرون سم شي.	د تشریحي پوښتنو سمول	د تشریحي پوښتنو سمول	213	173

Thank you for reading

Find more e-books and articles on Ketabton - your multilingual digital library.

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English