

# تنفسي سيستم

## اناتومي او فزيولوژي

Ketabton.com

ډاکټر حامد شير شينواري



کتاب نوم : دتنفسي سيستم اناتومي او فزيولوژي

ليکوال: دوکتور حامد (شير شينواری)

کمپوز: دوکتور حامد (شير شينواری)

چاپ کال: 1393 هجري شمسي

ليکونکي پته: 0700601282

0786751393

[Dr.hamid1282@yahoo.com](mailto:Dr.hamid1282@yahoo.com)

## سریزه

ترتولو لمړی دهغه سترذات الله (ج) څخه ډیر شکرگزاره یم چې ماته ئې دا وړتیا راکړه ترڅو دالیکنه ترسره کړم.

څرنګه چې ټولو هیوادوالو ته دا جوتنه ده چې څو پرلپسې لسيزو ناخوالو زمونږ ګران هیواد افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخ کړ، چې ددې ستونزو څخه یوه هم په علمي ډګر کې ددې هیواد دېچو وروسته پاتې کیدل وو، نو ددې لپاره چې دغه ستونزې ته مو دحل لاره پیداکړي وي او ځان مو د نورخلکو د پیغور څخه خلاص کړی وي نو یوازیني لاره ئې په علمي پرمختګ کې ده، چې دعلمي پرمختګ لپاره تازه او نوي معلوماتو ته لاس رسې حتمي خبره ده، نو ددې لپاره مې بهتره وګڼله چې دتنفسي سیستم اناتومي او فزیولوژي تر عنوان لاندې یو کتاب ولیکم .

پدغه کتاب کې ترډیره حد دنړی د متعبرو او منل شوو سرچینو څخه استفاده شوي ده چې وروسته د دقیقې کتنې او څیړنې وروسته ستاسو لاسونو ته درسیډلی دی، خو څرنګه چې دا زما لمړني لیکنه ده نو یقیناً چې دمفهوم، جمله بندی او املا غلطې ګانې به ولري، نود ټولو لوستونکو څخه هیله کوم چې د غلطې ګانو د موندلو په صورت کې ئې له مونږ سره شریک کړي تر څو په راتلونکي کې اصلاح شي .

دیادوني وړ بولم چې د کتاب په بیا کتنه کې راسره زما ګران او د قدرور استاد پوهندوي دوکتور بریالي (ولي زاده) ډیره مرسته کړي د زړه د کومي ورڅخه مننه کوم، او همدارنګه د محترم استاد اصف (صمیم) څخه هم ډیره مننه کوم چې په ادبي لحاظ ئې کتاب اصلاح کړ .

---

همدارنگه د خپلو دوستانو دوکتور لياقت (فضلي مومند)، دوکتور  
گلدادخان (صافی) ، دوکتور سعادت الله (ابراهيم خیل)، ډاکتر امید (نیازي)  
ډاکتر احمد جاوید (زرنج) او ډاکتر حامد (نیازي) څخه هم مننه کوم چي د  
کتاب د محتویاتو په برابرولو کي راسره مرسته کړي ده.

همدارنگه د یادوني وړ بولم چي د دوکتوران برای افغانستان د غړو  
اوپه ځانکړي توگه د ډاکتر صیب اوريا څخه مننه وکړم چي زه يي د تل  
په څیر د نور ځوانانو پشان علمي زده کړو ته وهڅولم او زما کتاب يي په  
خپل ویب پاني کي نشر کړو.

ډاکتر حامد شیر شینواری

---

# مننه

د خپلو گرانو والدينو څخه چې د ژوند  
په هر پړاو کې ئې زما ملاتړ کړي  
او ماته ئې د تعليم زمينه مساعده  
کړه ده.

---

## ڊالی

ٽولو هغو ڪرانو محصلينو ته چي د طب  
مسلك ئي دهيوادوالو د خدمت لپاره  
انتخاب ڪري دي.

## فهرست

13	عموميات
15	تنفسي سيستم دندي
17	هوائي كڅوړوته د هوا انتقال
17	تنفسي سيستم اناتومي او هستولوژي
18	پوزه
23	بلعوم
26	حنجره
32	شزن
34	Trachiobronchial Tree
34	هدايتی ساحه
39	تنفسي ساحه
43	سپري
46	صديري جدار او تنفسي عضلي
50	پلورا





- 
- 95 ----- داکسیجن دنفوذ تفاوت
- 96 ----- دکاربن ډای اوکساید نفوذ تفاوتونه
- 97 ----- هیموگلوبین اوداکسیجن انتقال
- 106 ----- په وینه کې د اکسیجن انتقال
- 110 ----- په نسجی  $PO_2$  په ثابت ساتنه کې د هیموگلوبین اغیزه
- 112 ----- داکسیجن دقسیمي فشار اغیزه
- 115 ----- د کاربن ډای اوکساید دقسیمي فشار اغیزه
- 116 ----- حرارت
- 119 ----- د (DPG) BPG اغیزه
- 119 ----- دکاربن مونو اوکساید اغیزه
- 122 ----- رشمی هیموگلوبین
- 123 ----- دکاربن ډای اوکساید انتقال
- 123 ----- په منتشر شکل سره دکاربن ډای اوکساید انتقال
- 123 ----- دکاربن ډای اوکساید انتقال د مرکبونو په شکل
- 124 ----- دکاربن ډای اوکساید انتقال دباي کاربونیټ په شکل
- 125 ----- کاربن ډای اوکساید او دویني pH
-

- 
- 128 ----- دتنفسي سيستم كنترول
- 128 ----- ريتمي تهويه
- 129 ----- دتنفس تنظيم
- 130 ----- دتهوئي عصبي كنترول
- 130 ----- تنفسي مركزونه
- 133 ----- اعصاب
- 134 ----- دتنفسي مركزونو همغبري اود ريتمي تهوئي جوړيدنه
- 137 ----- هغه فكتورونه چي تنفسي مركزونه متاثره كوي
- 141 ----- دتهوئي كيمياوي كنترول
- 148 ----- تهوئي باندي د ورزش اغيزه
- 150 ----- د عمر تاثير په تنفسي سيستم باندي
- 152 ----- دتنفسي سيستم پتالوژي ته يوه لنډه كتنه
- 161 ----- خفگي يا د تنفس دريدل
- 164 ----- Hyperventilation
- 165 ----- Hypoventilation
- 165 ----- داكسيجن كمښت
-

- 
- 166 ----- Hypoxia ډولونه او علتونه
- 172 ----- د اڪسيجن تراپي پواسطه دهايپوكسيا درملنه
- 173 ----- اڪسيجن تسموم
- 174 ----- دكاربن ډاي اوكسايډ ډيربنت
- 175 ----- دكاربن ډاي اوكسايډ كمبنت
- 176 ----- Asphyxia
- 177 ----- Dyspnea
- 179 ----- دوري تنفس
- 179 ----- Cheyne stokes تنفس
- 180 ----- Biot's تنفس
- 181 ----- سيانوزس
- 181 ----- Atelectasis
- 182 ----- Pneumothorax
- 182 ----- Pneumonia
- 182 ----- سالنډي
- 182 ----- Pulmonary Edema
-

---

186	-----	Pleural Effusion
186	-----	توبرکلوز
187	-----	Emphysema
188	-----	Index
193	-----	ماخذ
194	-----	لیکوال پیژندنه

# اول فصل

## عموميات

### تنفسي سيستم

## Respiratory System

تنفس او ساه اخستل داسی يو عمل دي چي ددي عمل كړنه او فريكونسي د ژوند په بهيركي دبل هيڅ عمل سره پرتله كيداي نشي، كه څه هم مونږ دتنفس په كولو او نه كولو كي واكمنيو خويدي به لاس بري نشو چي ترډير وخته پوري خپل تنفس بند كړو. دبلي خواځه تنفس دژوند ځانگړنه ده او د Puls سره يوځاي د يو كس دم ريني او ژوند په معلوملو كي ټاكونكي رول لوبوي.

د ساه اخستل يوه اړينه پروسه ده ځكه چي د بدن حجري ددي ليوال دي چي اكسيجن واخلي او كاربن داي اوكسايد (  $CO_2$  ) له ځان څخه ليري كړي . چي اكسيجن دتنفسي سيستم پواسطه اخستل كيږي او ويني ته وركول كيږي او بيا د زړه او رگونوسيستم (Cardiovascular) له لاري د سږو څخه حجروته ليردول كيږي. نو ځكه وايلاي شو چي حجروته د اكسيجن رسول او  $CO_2$  بهر ته اويستل دتنفسي ، زړه او رگونو دواړه سيستمونو يوه گډه دنده ده.

تنفسي سيستم خپله دنده په لاندي څلورو پړاونو کي ترسره

کوي

(1) Ventilation: دسپرو څخه دهوا داخليدلو او اويستلو څخه عبارت دي.

(2) دغازونو تبادلې دسپرو او ويني ترمنځ چي ځيني وخت د External Respiration پنامه هم ياديري.

(3) دويني پواسطه د اکسيجن او  $CO_2$  انتقال.

(4) دحجرو او ويني ترمنځ داکسيجن او  $CO_2$  تبادلې.

اوس په ترتيب سره ددتنفسي سيستم عمومي دندي او وروسته دي سيستم دهر غړي اناتومي، هستولوژي او فزيولوژي ترڅيرني لاندي نيسو.

## دتنفسي سيستم دندي

### Function of Respiratory System

تنفسي سيستم يو دډيرو اړينو سيستمونوله جملې څخه دي ځکه چي هره حجره د اکسيجن اخستلو او د کار بن داي اوکسايډ ليري کولو ته اړتيا لري. دتنفسي سيستم دندو څخه په لاندي ډول يادونه کوو:

(a) دغازونو تبادلې (Gases Exchange): مخکي مو تر يادونه وکړه.

(b) دويني pH کنترول (Regulation of Blood pH): دا عمل عمدتاً دسپرو پواسطه په وينه کي د کار بن داي اوکسايډ دکچي دبدلون پواسطه ترسره کيږي، داچي کار بن داي اوکسايډ دنسجونو دمختلفو

استقلابي تعاملاتو په پايله كې منځته راځي او بيا ويني ته دداخليدو وروسته د اوبو سره تعامل كوي او يو بي ثباته مركب د كاربونيک اسيد پنامه جوړوي چې دامركب ډير ژر په هايډروجن ايون او باي كاربونيټ باندي بدليري او پدي ترتيب دويني pH بنسخته ځي خودبلي خوا په سبروكي دغه تعامل معكوس كيږي او دهايډروجن ايون سويه كميري او په پايله كې د ويني pH لوړيري.



(c) داواز توليد (Vocalization): دغه دنده دتنفسي سيستم عمدتاً دشزن (Trachea) پواسطه ترسره كيږي چې وروسته به پري مفصلاً بحث وركړو.

(d) دبوي كول (شامعي) (Olfaction): دا دنده د پوزي تشي (Nasal Cavity) څخه دهوا دمغلقو ماليكولونو دتيريډو په وخت كې ترسره كيږي.

(e) ژغورنه او دفاع (Defense): دتنفسي سيستم پواسطه نه يوازي اكسيجن ترقلبي وعايوي سيستم پوري ليږدول كې بلكي ددي لاري په اوږدوكي دهوا څخه بيگانه توکي هم ليري كيږي او بدن داننان دمدخلي څخه دامكان ترحده پوري ژغوري، همدارنكه په سرو او سنخونو (Bronchi) كې د Leukocytes, Mast cells, Macrophage, Natural Killer Cells شتون ددي سيستم ددفاعي دندي بنسكارندوي دي.

(f) Regulation of Body Temperature (دېدن دحرارت کنترول)

Temperature: دېدن څخه دساه وېستلو (Expiration) په وخت کې داوبو دمالیکولونو سره یو ځای حرارت هم ضایع کیږي. نو پدې ترتیب تنفسي سیستم دبدن دحرارت په کنترول کې هم ونډه لري.

(g) Maintenance of Body Water Balance (دبدن دابو توازن ساتنه)

Balance: تنفسي سیستم دبدن داوبو په توازن کې کړونې لري، چې د ساه اوېستلو په وخت کې یو اندازه اوبه تبخیر کیږي او پدې ترتیب دبدن څخه یو اندازه اوبه ضایع کیږي.

(h) Anticoagulant Function (دویښی پرن کېدولو څخه مخنیوی)

Function: په سږوکي د Mast Cell شتون لري چې له دې حجرو څخه هیپارین افرازیږي کوم چې د ویني دپرن کېدو څخه مخنیوی کوی او نه پریرېږي چې وینه درگونو په داخل کې پرن شي.

(i) Angiotensin Converting Enzyme (د فرانس): دسږو

دشعریه رگونو (Pulmonary Capillary Endothelial Cells) څخه د ACE افرازیږي کوم چې Angiotensin 1 په Angiotensin 2 باندې بدلوي چې دا Angiotensin 2 د حجري څخه دباندي (Extracellular Fluid) او د ویني د فشار په کنترول کې مهم رول لوبوي.

(j) Synthesis of Hormonal Substance (دهورموني موادو جوړول)

Substance: اوس دا جوته شوي ده چې دسږو نسج دیو شمیر هورموني موادو لکه Serotonin, Acetylcholine او Prostaglandins جوړوي کوم چې په بدن کې غوره فزیولوژیکي دندې ترسره کوي.



# دوهم فصل

## Alveoli ته د هوا انتقال


## تنفسي سيستم اناتومي او هستولوژي

## Anatomy and Histology of

## Respiratory System

د تنفسي سيستم غړي په دوو لويو برخو باندې ويشو چي يو يې پورتي تنفسي لاره (Upper Respiratory Tract) دي چه پدي برخه كي پوزه (Nose) حنجره (Larynx) او نور مرستندونه جوړښتونه شامل دي او بله برخه يې ښکتنې تنفسي لاره (Lower Respiratory Tract) دي چه پدي برخه كي شزن (Trachea)، سنخي (Bronchi) او دسبري شاملې دي. چه د هر غړي د جوړښت او دندي څخه په لاندې ډول يادونه کوو:

همدارنگه د يادوني ورده چه حجاب عجز (Diaphragm) ، سيني صندوقچه او د بطن جدارونه د تنفسي حرکت مسوليت په غاړه لري. (۱-۲ ش)



## 1. پوزه (Nose)

پوزه د جوړښت له پلوه د دوو برخو لرونکي ده چې یو یې خارجي برخه ده چې دا برخه په ډیره اندازه دغضروفونو څخه جوړه شوي ده، ددې برخې پوله (Bridge) د Nasal هډوکي او د Frontal او Maxillary هډوکو ډیوي برخې څخه جوړه شوي ده او بله برخه د پوزي دخالیگا (Nasal Cavity) څخه عبارت ده چې دغټو جوړښتونو څخه یې په لاندې ډول یادونه کوو:

## 1. دپوزي سوري ( Nares يا Nostrils ):

دپوزي سوري چي دپوزي دخاليگا خارجي فوهه ده او پوزه دبهر سره وصلوي اوپه مقابل كي يي Choanae داخلي فوهه ده جي پوزي جوف دستوني سره وصلوي.

## 2. Vestibule:

د پوزي دسوريو په خلف كي موقعيت لري او د Stratified Squamous Epithelium پواسطه پوښل شوي چه دا اپيټليوم د جلد د پوستكي د Stratified Squamous Epithelium سره تماس لرونكي دي. Hard Plate چه هډوكين پليټ دي او دمخاطي غشا پواسطه پوښل شوي د پوزي دجوف ځمكه جوړوي او همدا پليټ دي چه د خولي او پوزي جوفونو يي سره بيل كړي دي. Nasal Septum چه قدامي برخه يي دغضروف پواسطه او خلفي برخه يي د Vomer هډوكي او Ethmoid هډوكي د Prependicular plate پواسطه جوړه شوي ده، دپوزي جوف پردوو برخو ويشي يوي چپ او بل يي ښي برخه. ( ۲- ۲ش )

## 3. Conchea:

دا جوړښت د Vestibule شاته دپوزي په وحشي جداركي شتون لري د ماهي د غوړ يا كلي (كونجی) پشان شكل لري او دري ډوله دي. ( ۲- ۲ش )


- .a Superior Conchea
- .b Middle Conchea
- .c Inferior Conchea

.4 : Meatus

دائل ته ورته جوړښت دی چه د Conchea شاته موقعیت لري په دري ډوله دي

- .a Superior Meatus
- .b Middle Meatus
- .c Inferior Meatus

چي لږي ډلې څخه Sup. Meatus او Mid. Meatus ته دمختلفو Paranasal sinuses فوهي راخلاصيري خو Inf. Meatus ته Nasolacrimonal duct فوهه راخلاصيري. (۲-۲ش)



۲-۲ ش دپوزي جوړښت

## دپوزي فزيولوژي:

(1) هرکله چه دخولي خاليگا د غذا څخه ډک وي نو پدي وخت کي دهوا تيريدو يواځيني لاره پوزه ده.

(2) دهوا تصفيه کول:

لکه څنگه مو چه مخکي يادونه وکړه چي Vestibule دوښتانونلرونکي دي نو دا ويښتان دهوا څخه غټي ذري ايساروي دبلي خوا د Nasal Septum او Nasal Conchea پواسطه چه پدي جوف کي کومي کري

وري لاري جوړي شوي دي داددي لامل گرځي چه هوا د Concha او Septum په سطحه ولگيري اودا چه دا دواړه سطحي د Columnar Epithelium كاذبه سلياوي او Goblet Cells لري اوددي حجروپواسطه مخاط افرازيږي، نوځكه دزيات شمير غيرارينو توکو دنيولو او ددويو دوراندي تگ څخه مخنيوي کوي چه دا توکی بيا ديو قشر په ډول دمخاط سره يوځاي بلعوم ته انتقاليري او بيا به يا تو شي اويا به بلع شي.

### (3) دهواگرمول او مرطوبول:

دپوزي دجوف دا دنده د Nasal Septum او Nasal Concha دهغه پراخه برخي پواسطه چه مساحت يي  $160 \text{ cm}^2$  دي په لاندي ډول ترسره کيږي:

داوښکو هغه نم او رطوبت چه د Nasolacrimal Duct لاري دپوزي جوف ته راځي دهوا په مرطوبوالي کي رول لري او هغه گرمه وينه چه په مخاطي غشاد شعريه رگونو په منځ کي بهيري دهوا دگرميدو سبب گرځي، نوځكه دتنفسي سيستم پاتي برخي ته گرمه، مرطوبه او فلتر شوي هوا داخليري. اوددي سيستم ديادي برخي د خرابيدو مخه نيسي. دياډوني ورده چه دپوزي دجوف دا دري دندي چه دهوا گرميدل، مرطوبول او فلترکولو څخه عبارت دي د Air Conditioning پنامه ياديږي.

### (4) بوي حس (Olfaction):

دا دنده دپوزي د Olfactory Epithelium پواسطه چه دپوزي دجوف په پورتنی برخه کي شتون لري تر سره کيږي.

## 5) د خبروډ Resonance ټاکنه:

خبري دوه د Resonance جوفونه لري چې يو يې Paranasal Sinuses او بل يې همدا دپوزي جوف دي، چه دپوزي د جوف کړنه د خبروډه Resonance ټاکنه کي هغه وخت بنه جوتيزي چه د لاس او يا کوم بل شي پواسطه پوزه بنده کړو او بيا خبري وکړو.

## 2. بلعوم Pharynx

بلعوم داسي يو غړي دي چه د تنفسي او هضمي دواړو بيلابيلو سيستمونوپه ډله کي راځي. دغه غړي پورته خواکي دپوزي او دخولي سره اړيکي لري. چه دپوزي څخه هوا او دخولي څخه هوا، مايعات او غذا ورداخليزي او بيا ئي اړونده غړو ته يې چي په بنکتنې برخه کي ورسره اړيکي لري انتقالوي.

بلعوم په بنکتنې برخه کي دتنفسي سيستم دحنجري اودهضمي سيستم دمري سره اړيکي لري. بلعوم دري برخي لري چي عبارت دي له:

- ✓ Nasopharynx (د پزی برخه)
- ✓ Oropharynx (دخولی برخه)
- ✓ Laryngopharynx (حنجری برخه)


Nasopharynx دبلعوم پورتنې برخه ده چي Choanae څخه تر Soft plate (دايو نابشپړ او منضم نسج دي چي Nasopharynx او

Oropharynx دواړه سره بیلوي. ددغه پلپټ په خلفی برخه کې انګورداني ته ورته یوه بارزه (راوتلي) چوربنت د Uvula پنامه شتون لري. ددې پلپټ دنده داده چې د بلع شوي مواد نه پریردي چې Nasopharynx اودپوزي جوف ته داخل شي) پوري غزیدلي دي، بیکاره او فاضله مخاط د Nasopharynx څخه تیریري او ستوني ته راځي چې لدې وروسته بلع او یا داچه بهر ته خارجیري. Nasopharynx ته دمنځني غورځ څخه دوه Auditory تیوبونه راخلاصیري کوم چې دمنځني غورځ او اتموسفیر ترمنځ فشار یوي شان کوي. د Nasopharynx په خلفي سطحه کې یو تانسل د Pharyngeal Tonsil یا Adenoid پنامه شتون لري چې دا تانسل دانتان په مقابل کې د بدن څخه دفاع کوي.

دبلعوم Oropharynx برخه د Uvula څخه تر Epiglottis پوري غزیدلي دي چې دخولي جوف سره د Fauces پواسطه ارتباط لري نو ځکه هوا، مایعات او غذا ورڅخه تیریري. داچې دابرخه د مخاط لرونکي Stratified Squamous Epithelium پواسطه پوښل شوي نوځکه ددې موادو د تیریدو په وخت کې نه ګرول کیري. د یادوني وړده چې دوه عدده نور تانسلونه د Lingual او Palatine پنامه د Fauces سره نژدې شتون لري.

دبلعوم Laryngopharynx برخه د Epiglottis دخوکي څخه شروع او د ښکتنې برخي په قدام کې د مري سره او په خلف کې دحنجري سره وصلیري چه بلعوم دا برخه هم د Oropharynx پشان د مخاط لرونکي Stratified Squamous Epithelium پواسطه پوښل شوي دي. (۲-۳ ش)





### 3. حنجره

## Larynx


حنجره چي دبلعوم اوشزن ترمنځ ځاي لري. دحنجرې غضروفې چوکاټ د دريو طاق اودريو جوړه يي (چه سپردانی کيږي) څخه جوړ شويدي چه ټول نهه غضروفې پوښ لرونکي دي. چه تر ټولو لوي غضروف ئي د Thyroid څخه عبارت دي. په طاق ډول پروت دي اودا غضروف د Adam's Apple پنامه هم ياديږي.

دوهم طاق غضروف د Cricoid Cartilage څخه عبارت دي کوم چي د حنجري قاعده جوړه وي او د جنجري پاتې ټول غضروفونه ددي غضروف لپاسه واقع دي.

درېم طاق غضروف Epiglottis Cartilage څخه عبارت دي. دا غضروف د Thyroid غضروف دپاسه واقع او دژبي خواته امتداد لري د جوړښت له پلوه دنورو غضروفونو سره توپير لري پدي معني چي دا غضروف د Hyaline Cartilage پرځاي Elastic Cartilage لري. او غضروف دنده داده چي دبلع دعمل په وخت کي حنجره بندوي اونه پريريدي چي مواد ورته داخل شي.

لمري جفت غضروف چي د قاشوغي (ځمځي) پشان شکل لري علوي او خلفي برخو کي د Cricoid Cartilage سره وصل دي د Arthyroid Cartilage پنامه ياديږي. او هغه غضروف چي په علوي کي د Arthyroid غضروف سره څوکو سره وصل دي او دښکر پشان شکل لري د Corniculate غضروف پنامه ياديږي او دريمه جوړه غضروف Cuneiform څخه عبارت دي چي د

Corniculate غضروف په قدم کي په Mucous Membrane کي امتداد لري. (۲-۴ ش)



۲-۴ ش

دوه جوړه رباطونه ( Ligaments ) د Arthynoid غضروف دقدامي برخي څخه نيولي تر خلفي برخي د Thyroid غضروف پوري

غزیدلي دي، چي علوي رباط يي ديوي مخاطي غشا پواسطه چي د Vestibular Folds او يا False Vocal Cords پنامه ياديږي پوښل شوي دي، دا Vestibular Folds کله چي دبلع عمل صورت نيسي نو حنجره بندوي اونه پريږدي چي غذا او مايعات حنجري ته داخل شي او همدارنگه دسږو څخه دهوا خارجيدل هم يوڅه وخت دځنډسره مخامخوي. (۵-۲ش)

اوسفلي رباط يي هم دمخاطي غشا پواسطه احاطه شوي دي چي دامخاطي غشاد Vocal Folds يا True Vocal Cords پنامه ياديږي. د Vocal Folds او ددويوترمنځ سوري مجموعاً د Glottis پنامه ياديږي. Vestibular Folds او Vocal Folds دواړه د Stratified Squamous Epithelium پواسطه او دحنجري نوري برخي د Pseudostratified Squamous Epithelium پواسطه پوښل شوي دي.

ديادوني ورده چي هرکله Vocal Folds په التهاب اخته شوي نو دغه حالت ته Laryngitis وايي.

اوس مونږ دحنجري په دندو (فيزيولوژي) باندې رڼا اچو:

- ✓ د Thyroid او Cricoid غصروفونه دواړه دهوا دتيريدولو لپاره يو خلاصه لاره جوړوي.
- ✓ Epiglottis او Vestibular Folds دواړه حنجري ته دبلع شوو موادو له داخليدو څخه مخنيوي کوي.

Vocal Folds د اواز د تولید لمرني منبع ده: دا چې ✓



Folds په کوم مکانیزم سره اواز تولیدوي په لاندې ډول تری یادونه کوو:

هغه هوا چې د Vocal Folds څخه تیریري ددي Vocal Folds د اهتزاز سبب گرځي او ددي اهتزاز په نتیجه کي اواز تولیدیري. همدارنگه هغه هوا چې د Vocal Folds څخه تیریري د اهتزاز امپلیتود هم تعیینوي نوکه چیرته زیاته هوا تیره شي نو امپلیتود به لوړ او اواز به هم لوړوي او برعکس که چیرته د اهتزاز امپلیتود وړوکی وي نو اواز به هم ټیټ وي. د اواز زیر او بم کیدل د اهتزاز دفریکونسي پوري اړه لري که چیرته د اهتزاز فریکونسي لوړه وي نو Pitch (د اهتزاز دغر او فریکانس لوړوالي) به هم لوړ وي او اواز به زیر نوعیت ولري، خوکه فریکونسي ټیټه وي نو Pitch به یی هم ټیټ وي او اواز به بم نوعیت ولري، همدارنگه د Vocal Folds د اهتزاز کونکومساقو تغیر هم د اهتزاز په فریکونسي باندې اغیزه لري که چیرته د Vocal Folds قدامي برخه اهتزاز وکړي نو لوړ Pitch لرونکي اواز به تولید شي نو اوس چې د Vocal Folds هر څومره بڼکته برخه په اهتزاز راځي نو په هماغه اندازه به اواز Pitch کم وي. داچي د نارینو Vocal Folds نسبت بڼځوته اوږد دي نوځکه دکمي فریکونسي (کم Pitch) لرونکي اواز لري. هرکله چې اواز د Vocal Folds څخه راتیرشي نو دا اواز بیا د ژبي، شونډو، غابښونو او نورو جوړبښتونو پواسطه تغیرپکي راځي (Modified کیري).

همدارنگه غضروفونه د Vocal Folds دطول په تغیر سره په غیر مستقیم ډول د فریکونسي په ټاکنې باندې اغیزه لري، کله چې یوازي دتنفس عمل صورت ونیسي نو Arthynoid غضروفونه وحشي خواته تدور کوي او

Vocal Folds یوله بل څخه لیري کیري او په نتیجه کي زیاته هوا ورڅخه تیریري، خو که چیرته همدا غضروفونه انسي خواته تدور وکړي نو Vocal Folds یو بل سره نژدي کیري او کمه هوا د Vocal Folds څخه تیریري د غضروفونو قدامي او خلفي حرکتونه هم د Vocal Folds په کشش او طول باندي اغیزه کوي. (۵-۲ ش)

دیادوني ورده که چیرته یو شخص حنجره د سرطان (Carcinoma) له وجي لیري کړاي شي نوبیا اواز دمري د اهتزاز پواسطه تولیدای شي.



**B**

**Forced inspiration**


- vocal folds abducted and rima glottidis wide open
- vestibule open



**C**

**Phonation**

- vocal folds adducted and stridulating as air is forced between them
- vestibule open



(۵-۲ش)



## 4. شزن


### Trachea

شزن یو غشایي تیوب دي چي د **Dense Regular Connective Tissue** او دملسا عضلاتو څخه جوړشوي دي داجوربنت د 15-20 عدده پوري دنګلسي د C توري ته ورته غضروفونوپواسطه تقويه کيږي. داغضروفونه دشزن قدامي او وحشي جدارونوکي موقعيت لري او دهوا د تيريدلو لپاره يي يو خلاصه لاره جوړه کړي ده،چه ددغه غضروفونوداخلي سطحه مخاطي غشاپواسطه پوښل شوي. د شزن خلفي جدار چي غضروف نلري بلکي **Elastic Ligamentous Membrane** او د **Trachialis Muscles** پنامه يو بڼل دملسا عضلاتو لري( ۲- ۶ش) ،چي ددي عضلاتو دتقلص په نتيجه کي دشزن قطر کميږي چي دتوخي په وخت کي دا عمل دهوا د ډيري چټکي تيريدني سبب ګرځي او د بلعوم څخه مخاط او ناغوبنتي مواد ليري کوي.

دشزن داخلي قطر 12 mm او طول يي 10-12 cm پوري دي چي د حنجري څخه ترپنځمي صدري فقري پوري غزیدلي دي. شزن په سفلي برخه کي د دوو کوچنيو تيوبونو باندي چي **Primary Bronchi** نوميري ويشل شوي دي. د شزن ترټولو ښکنتي غضروف يوتیغه ماننده جوړبنت جوړوي چي د **Carina** پنامه ياديږي، چي دا جوړبنت د **Primary Bronchi** فوهي يوله بل څخه بيلوي. دبلي خوا **Carina** د راديولوژي له مخي هم خاص اهميت څخه برخمنه ساحه ده او همدارنگه دمیکانيکي تنبي په مقابل کي ډير حساس جوړبنت دي پدي معني چي هرکله بيګانه مواد دغه ساحي ته ورسيري نو د توخي يوه



قوي عكسه توليديري او تر هغه دوام كوي ترڅو دغه بيگانه مواد له Carina څخه ليري شي.



## Trachibronchial Tree .5

لکه څنگه مو چي مخي ووايل چي شزن په سفلي برخه کي په دوو برخو ويشل کيږي چي هره برخه يي د Primary Bronchi پنامه ياديږي. دا Primary Bronchi بيا په خپل وار سره په مسلسل ډول په ځانگو ويشل کيږي تردي چي دا تيوبونه دومره واړه شي چي د مايکروسکوپ پرته يي ليدل شوني نه وي. د شزن څخه تر اخره پوري ټوله تنفسي لاره د Trachibronchial Tree پنامه ياديږي. چي دا Trachibronchial Tree بيا د فزيولوژي له نظره په دوه برخو ويشل کيږي چي يو يي Conducting Zone (هدايتي ساحه) او بل يي Respiratory Zone (تنفسي ساحه) ده.

## 6. هدايتي ساحه : Conducting Zone

هدايتي ساحه د شزن څخه شروع او تر Terminal Bronchioles پوري دوام لري چي پدي لړکي شزن 16 ځلي په ځانگو ويشل کيږي. دا هدايتي ساحه د هوا تيريډلوپاره لاره جوړه وي، داچي دا ساحه د اپيټيل نسج پواسطه پوښل شوي ده نوځکه امکان تر حده پري ناغوبنتي ذري ليري کوي او بيا يي Trachibronchial Tree څخه بهر اوباسي.


ديادوني ورده چي Terminal Bronchioles ته هغه ذري د رارسيدو وړتيا لري کوم چي د  $5-1 \mu$  ولري نوځکه د ډيروسکرو کارکونکو کي د Terminal Bronchioles امراض زيات تر سترگو کيږي. ځني ډيري وري ذري چي قطري له يو مايکرون څخه هم کم

وي د سرو ترجدار پوري ځان رسوي او هلته له سنخي مايع (Pleural Fluid) سره نښلي او مخکي نشي تللاي، خو هغه ذري چې د  $0.5 \mu$  څخه هم کم قطر لري د سروپه جوړونو کې له هوا سره گډيري چې بېرته د ساه اويستلو (Expiration) په وخت کې بهرته وځي. خو دا چې دسکرټو د ذرو جسامت د  $0.3 \mu$  سره سمون خوري نو دتنفسي لاري په يوې برخه کې هم نه بنديري او ځان سرو ته رسوي چې له بده مرغه په سرو کې د دريمي برخې نه زيات يې د Diffusion د عمليې په اساس ترسب کوي او پاتې دوه برخې يې بيا د ضفيري هوا (Expired Air) سره يوځاي بېرته بهرته اوځي. په سرو کې دا ترسب شوي ذري په زياته اندازه د Alveolar Macrophage پواسطه له منځه ځي او پاتې برخه يې د سرو د لمفوي چينل پواسطه له ساحې څخه ورل کيري او هغه څه چې ددي ټولو ميخانيکونو څخه بيا هم پاتې شول نو هغه بيا د Alveolar Septum په برخه کې د فبروزي نسج درامنځته کيدو سبب گرځي چې دا بيا په يودومداره تضعف باندې بدليري.

اوس بېرته د Trachio bronchial Tree د جوړښت او دندو ته

رگرځو:

شزرن په بني او چپ Primary Bronchi باندې کوم چې په سرو کې غزیدلي دي ويشل کيري، د بني خوا سبري Primary Bronchi لاند او پراخه دي خو د چپ خوا سبري Primary Bronchi بيا اوږده او نري وي نو ځکه دچپ سبري په نسبت په بني سبري کې زيات مرضونه تر سترگو کيري. (۷-۲ش)



(۷-۲ش)

لکه څنگه چې په پورته شکل کې گورو چې بني خواکي Primary Bronchi په دريو او چپ سري کې په دوو Secondary (Lobar) Bronchi باندې ويشل شوي دي، چې دا Lobar Bronchi بيا هريو يې په Tertiary (Segmental) Bronchi باندې ويشل کيږي چې په ځانگو باندې د ويشني دا لري همداسې دوام کوي ترڅو چې قطر يې 1 mm څخه هم کم شي چې دا بيا د Bronchioles پنامه ياديږي، Bronchioles بيا هم په ځانگو ويشل کيږي او Terminal Bronchioles رامنځته کوي.

هرڅومره چې د هوا د انتقال لاره کوچني کيږي په هماغه اندازه ددي لارو په جدارونو په جوړښت کې هم تغير او بدلون رامنځته کيږي د بيلگي په ډول د Primary Bronchi په جدارونو کې دغضروفونو شکل د انگلسي د C توري پشان او په زيات تعداد سره وي او ملسا عضلاتو بندلونه پکې نسبتاً کم تر سترگو کيږي خوکه چېرته د Lobar Bronchi د جدارونو جوړښت ته نظر واچوو نو غضروفونه به يې د پليټ پشان شکل ولري او دملسا عضلاتو مقدار پکې زيات او دمخاطي غشا او دغضروف ترمنځ ديوې طبقي په ډول ترسترگو کيږي. اوس نو چې هر څومره د Bronchi قطر کميږي په هماغه اندازه دغضروفونو مقدار کم او دملسا عضلاتو مقدار زياتيږي ان تردي چې په Terminal Bronchioles په جدار کې غضروف هيڅ نه ترسترگو کيږي او په جدار کې يې ملسا عضلاتو مقدار په زياته اندازه ترسترگو کيږي. په Bronchi او Bronchioles کې دملسا عضلاتو استرخا او تقلص په نتيجه کې د دويو په قطر کې تغير منځته راځي، دمثال په ډول د تمرين په وخت کې د زياتي هوا تيريډوته ضرورت وي نو دا عضلات استرخا کوي او دتنفسي لاري قطر لوييږي، خو دساه بندي په حمله

---

(Asthma attack) کي بيا د Terminal Bronchioles ملسا عضلات  
تقلص کوي چي دا ددغو Bronchioles د قطر دکمیدو سبب گرځي او  
په نتیجه کي دهوا په مقابل کي مقاومت زیات او دهوا مقدار بیخي کمیري  
او حتی د مرگ سبب هم گرځي.

Bronchi د Pseudostratified Columnar Epithelium پواسطه،  
لوي Bronchioles د Ciliated Simple Columnar Epithelium  
پواسطه او Terminal Bronchioles د Ciliated Simple Cuboidal  
Epithelium پواسطه پوښل شوي دي، داچي هر سيليا لرونکي اپیتلیوم  
تر 200 دانو پوري سيلياوي لري او دا سيليا په مسلسل ډول په هره ثانيه  
کي د 10-20 ځلو پوري دوامدار حرکت کوي نو ځکه د تنفسي سیستم  
څخه د ناخوښو موادو په لیرد کي د خاص اهمیت څخه برخمن دي.


## تنفسي ساحه

### Respiratory Zone

د Trachio bronchial Tree دوهمه ساحه دتنفسي ساحي پنامه ياديږي کوم چې د Terminal Bronchioles څخه شروع او تر هوايي کڅوړو (Alveoli) پوري چې د هوا او ويني ترمنځ د غازونو تبادلې ځاي دي رسيږي، چې تر هوايي کڅوړو پوري په تنفسي ساحه کي او ځلي په ځانگو ويشنه صورت نيسي، Terminal Bronchioles په ځانگو ويشل کيږي او Respiratory Bronchioles جوړوي کوم چې په کمه اندازه د غازونو دتبادلې وړتيا لري او دا ځکه چې لدې سره د وصلو هوايي کڅوړو تعداد کم دي، لدې وروسته Respiratory Bronchioles په سنخي مجرا (Alveolar Duct) باندي ويشل کيږي چې هره سنخي مجرا بيا د دوو يا دريو سنخي کڅوړو (Alveolar Sac) لرونکي ده چې بلاخره بيا هر Alveolar Sac د دوه يا زياتو هوايي کڅوړو (Alveoli) لرونکي دي.

هره هوايي کڅوړه د داسي نسج پواسطه احاطه شوي چې الاستيکي اليف لري کوم چې د ساه اخستني او يا دساه اويستلو په وخت کي هوايي کڅوړي ته ددي وړتيا ورکوي چې پراخه اويا تنگه شي. سږي خپل ذات کي ډير الاستيکي خاصيت لري، هرکله چې دويو د هواڅخه ډکي شي نو پراخيږي او د هواد ويستلو وروسته بيرته خپل اصلي شکل ته راگرځي که چيرته سږي د هوا څخه ډکي هم نه وي بيا هم دومره هوا لري چې دويو ته اسنځي خاصيت وروبيښي. Primary Bronchioles د ملسا عضلاتو دبنډلونو سره يو ځاي دکولاجن او الاستيک منضم نسجونو لرونکي هم دي. هغه اپيټيلوم چې په

Simple Cuboidal Epithelium په شکل او هغه چې په هوايي مجراؤ (Alveolar Duct) کې شتون لري د Respiratory Bronchioles په شکل او هغه چې په هوايي کڅوړو (Alveoli) کې شتون لري د Simple Squamous Epithelium په شکل سره دي. که څه په تنفسي ساحه کې سيليا نشته خو بيا هم ناخوښي مواد لکه ځنګه مو چې مخکې و اوپل د Macrophages او لمفاوي چينلونو پواسطه د ساحي څخه ليري کيږي. (۸-۲ش)



په دواړه سږوکي تقريباً 300 ميلونو پوري هوايي کڅوړي شتون لري چې په اوسط ډول يې قطر تر  $250\mu$  پوري رسيږي. د هوايي کڅوړو جدارونه ډير نري دي چې له دوه ډوله حجرو څخه شوي دي، يو يې Type I Pneumocytes دي کوم چې د Squamous



Epithelium حجرو په ډله کي راځي او د هوابي کڅوړو جدار تر 90% پوري دهمدي حجرو څخه جوړشويدي او بل ډول حجري يي د Type II Pneumocytes پنامه ياديږي کوم چي معکبي شکل لري او د Surfactant پنامه ماده افرازوي چي دا ماده د ساه اخستلو په وخت کي د هوابي کڅوړو پراخيدل اسانوي.

په هغه ځاي کي چي د هوا او ويني ترمنځ د غازونو تبادلې

صورت نيسي پدغه ځاي کي دسږو تنفسي غشا (Respiratory Membrane) هم شتون لري چي دا غشا عمدتاً د هوابي کڅوړو د جدارونو پواسطه جوړه شوي چي ريوبي شعريه رگونه (Pulmonary Capillaries) يي رانغاړلي دي. دا غشا ډيره نري ده چي د غازونو تبادلې کي مرسته کوي اولاندي جوړبنتونو لرونکي ده. (۹-۲ش) ✓ د مایعاتو هغه نري طبقه چي هوابي کڅوړي يي پوښلي دي.


Alveoli Epithelium چي د Simple Squamous Epithelium څخه جوړ شوي دي. ✓

Alveolar Epithelium قاعدوي غشا. ✓

نري بين البيني خلا (Interstitial Space). ✓

Capillary Endothelium قاعدوي غشا. ✓

Capillary Endothelium چي د Simple Squamous Epithelium څخه جوړشوي دي. ✓



(۹-۲ ش)

## سږي Lungs


سږي چې دتنفس اساسي عضوي دي چې د حجم له نظره په بدن کي تر ټولو نور غړو لوي غړي شميرل کيږي. هره سږه مخروطي شکل لرونکي ده چې قاعده يې په حجاب عجز (Diaphragm) او څوکه يې د Clavicle هډوکي څخه تقريباً 2.5 cm پورته ده. چپه سږه چې 560 gr وزن لري دښي سږي په نسبت کوچني ده پداسي حال کي چې ښي سږه تر 620 gr پوري وزن لري.

Hilum دسږي انسي سطحه ده چې لډي سطحي څخه يوزيات شمير جوړښتونه لکه Primary Bronchi، دويني او لمفاوي رگونه او اعصاب سږو ته داخل او هم د سږو څخه خارجيږي. ټول جوړښتونه چې سږو ته د Hilum له لاري داخليږي مجموعاً دسږو دجذ (Lung's Root) پنامه ياديږي.


دښي خوا سږي د دريو او دچپ خوا سږي د دوو لوبونو (Lobes) باندي ويشل شوي چې دا لوبونه يو له بل څخه د سږي په سطحه د يو ژور او متبارز درز (Fissure) پواسطه بيل شوي دي ( ۲- ۱۰ ش). او هر Lobe د Lobar Bronchioles پواسطه تقويه کيږي، هر Lobe په خپل وار په Bronchiopulmonary Segments باندي چې د Segmental Bronchioles لرونکي دي ويشل شوي دي، نو پدي حساب سره ښي سږي کي 10 عدده او په چپ سږي کي 9 عدده Bronchiopulmonary Segments شتون لري چې هر يو Bronchiopulmonary Segment بيا د منضم نسج پواسطه په څو

برخو ویشل شوي ډي. که چیرته په انفرادي توگه کوم Bronchiopulmonary Segment د جراحي عمل په نتیجه کي لیري کړای شي نو په پاتي سري به بیا هم سالمی وي دا ځکه چي هیڅ یو لوي رگ او Bronchi لډي منضم نسج څخه ندي تیري شوي.

Bronchiopulmonary Segments بیا په خپل وار د هغه جدار پواسطه چي په بشپړ ډول د منضم نسج جوړښت نلري په Lobules باندي ویشل کیري چي هر Lobules د Bronchioles پواسطه تقویه کیري.



B



ش ۱۰-۲


## صدری جدار او تنفسی عضلی

### Thoracic Wall and

### Muscles of Respiration

صدری جدار د صدری فقرو، پښتیو، Costal Cartilages، سترونوم هډوکي او یو تعداد عضلو څخه تشکیل شوي دي او هغه جوف چې د صدری جدار او دیاگرام ترمنځ شتون لري د صدری جوف (Pleural Cavity) پنامه یادیري، چې دا جوف د بطن څخه د Diaphragm پواسطه بیل شوي دي. Diaphragm دنورو اسکلیټي عضلو سره یو ځای دتنفس سرته رسولو مسولیت په غاړه لري (۱-۱۱ ش). هغه عضلي چې په ساه اخستلو (Inspiration) کي رول لري عبارت دي له Diaphragm, External Intercostal Muscles، Pectoralis Minor Muscles او Scalene Muscles څخه، چې لدې جملې څخه د ساه اخستلو په وخت کي دیاگرام د تقلص پواسطه د صدری جوف تقریباً  $\frac{2}{3}$  برخه پراخیري او د Ext. Intercostal، Pectoralis Minor او Scalene عضلو د تقلص په نتیجه کي پښتي اوچیري او صدری جوف پراخوالي سبب ګرځي. د ساه اویستلو (Expiration) عضلي هغه دي کوم چې د Sternum او پښتیو د بنکته کیدو دنده لري لکه د بطني او Internal Intercostal عضلي. که څه هم Internal Intercostal عضلي د ساه اویستلو په وخت کي او Ext. Intercostal عضلي د ساه اخستلو په وخت کي ډیري فعاله وي خو بیا هم ددې عضلو اصلي دنده په دواړه حالاتو کي د صدری قفس ثبات ساتل او ددې قفس د Collapse څخه مخنیوي کول دي.

Diaphragm چي د گومبزي پشان شکل لري قاعده يي د Inner Circumference سره وصله ده او پورتنې برخه يي د منضم نسج هموار شپټ لرونکي ده چي داسيټ د Central Tendon پنامه ياديږي، په نورمال او عادي ساه اخستنه کي د Diaphragm په شکل کي ډير کم تغير تر سترگو کيږي پډي معني چي دبطني عضلو د استرخا په نتيجه کي دبطن غږي د Diaphragm څخه ليري ځي او دا ددي سبب گرځي چي Central Tendon بنسکته شي، خو که چيرته د ساه اخستلو شدت ډير زيات شي نو بيا د Central Tendon ډير زيات بنسکته کيدل د بطني غږو پواسطه نهې کيږي. بر علاوه لډي چي بنسکتنې پښتني د يو شمير نورو عضلاتو پواسطه هم پورته ځي د Diaphragm د مسلسل تقلص هم ددي سبب گرځي چي Diaphragm هموار شکل اختيار او بنسکتنې پښتني او چتي کړي. نو هرکله چي پښتني اوچتي شوي نو د Costal Cartilage پواسطه د پښتيو وحشي حرکت هم صورت نيسي او په نتيجه کي صدري جوف جنبي پراخوالي هم پيداکوي ( ۱۱-۲ ش). پښتني عموماً دفقرو څخه د سترنوم هډوکي په لور په مايل ډول واقع دي نو کله چي پښتني اوچتي شي نو صدري جوف قدامي خلفي حجم هم زياتيږي.




۱۱-۲ ش

د نارمل تنفس په وخت کې د Diaphragm او External Intercostal عضلو د استرخا په صورت کې د صدري جوف حجم کمیري او د سږو او صدر دالاسټیکي خاصیت له مخې په Passive ډول ساه اویستل (Expiration) صورت نیسي. او برعلاوه لدې څخه د بطني عضلاتو د تقلص په نتیجه کې Diaphragm پورته او بطني غړي بیرته خپل اصلي ځای ته راکش کول کیږي.



يو عادي او قوي ساه اخستلو په وخت كې كه چيرته مونږ د بطن او صدر جوښونو ته متوجي شو نو يو زيات شمير توپيرونه به په دواړو حالاتونو كې تر سترگو كړو او دهغه دا چي په قوي تنفس كې ټول ساه اخستونكي عضلي د نارمل تنفس په نسبت ډير او قوي تقلص كوي چي دا دصدي جوف د زيات پراخيدو سبب گرځي (۱۲-۲ش). خو له بلي خوا په قوي ساه اويستنه كې بيا د ساه اويستلو عضلي په اعظمي ډول استرخا كوي او دصدي جوف حجم د امكان تر حده راكموي.



## پلورا Pleura


که څه هم سږي په صدري جوف کې قرار لري خو که لږ څه بڼه زیر شوو نو جوتنه به شي چې هر سږي بیا په یو بل جوف کې چې Pleural Serous Membranes څخه جوړ او د Pleural Cavity پنامه یادېږي ځای پر ځای شوي دي (۱۳-۲ ش). Mediastinum د Midline هغه ساحه ده چې د زړه، شزن، مري او نورو پيوسته جوړښتونو پواسطه جوړ شوي دي او یا په بل عبارت هغه ساحه ده چې د سږو د انسي سطحو ترمنځ واقع ده، چې دغه Mediastinum پواسطه د هري سږي پلورال جوف یو له بل څخه بیل شوي دي. پلورال جوف د دوو غشاو پواسطه احاطه شوي دي چې یوه یې جداري پلورا (Parietal Pleura) پنامه او بل یې د حشوي پلورا (Visceral Pleura) پنامه یادېږي. جداري پلورا کوم چې د صدري جدار داخلي سطحه، د حجاب عجز علوي برخه او Mediastinum احاطه کوي د Hilum په برخه کې د حشوي پلورا سره چې د سږو سطحه یې احاطه کوي ده اړیکه لري.

دپلورا جوف د Pleural Fluid پنامه دیوي مایع پواسطه چې د حشوي پلورا څخه افزایږي پکې شوي دي او دا مایع لاندي دري دندي ترسره کوي:

✓ دا مایع د بنویه کونکي مادي ( Lubricant ) پشان عمل کوي  
يعني کله چي دسبرو او صدري جوف شکل تغیر کوي نو نه پریږدي چي  
جداري پلورا او حشوي پلورا یو له بل سره وموینل شي.

✓ دا مایع حشوي او جداري پلورا یو له بل سره ټینګي ساتي او نه  
پریږدي چي د صدري جوف او سبرو د تغیر شکل په وخت کي یو له بل  
څخه جدا شي.

✓ داچي دسبرو د کولپس څخه باید هم مخنیوي وشي نو ددي لپاره  
منفي فشار ته ضرورت لیدل کیږي چي دا منفي فشار ددي مایع پواسطه  
داسي ایجادیږي چي لدغه ساحي څخه لمفوي سیستم ته مایعات کمیري،  
او دا کټ مټ هغه مکانیزم دي د کوم پواسطه چي د بدن په نورو  
برخو کي منفي فشار منځته راځي. ددي لپاره چي سبري باید کولپس نشي  
نو  $4 \text{ mmHg}$  فشار ته ضرورت دي خو له نیکه مرغه د پلورا داخلي  
فشار  $7 \text{ mmHg}$  - دي، چي دا ډیر منفي فشار ددي باعث ګرځي چي  
نارمل سبري د پلورا خواته کش شوي شکل باندي پاتي شي.



۱۳-۲ ش

## سږو اروا

# Lung's Blood Supply

سږو ته دوه ډوله وینه ورځي یو هغه وینه ده چې  
Deoxygenated Blood یې بولی چې د بني بطین څخه په  
Pulmonary Artery کې ورځي او په سږو کې په  
Oxygenated Blood باندې بدلېږي او بیرته د  
Pulmonary Vein له لاري چپ  
ازین ته راځي، چې دا ډول د وینې جریان د سږو دنده بلل کېږي او  
بل هغه ډول وینه سږو ته ورځي چې ددې دندې د سر ته رسولو لپاره  
یې استعمالوي چې دا بیا Oxygenated وینه ده او په سږو کې په  
Deoxygenated وینې باندې بدلېږي، دا وینه د  
Bronchial Vein او  
Azygos Vein له لاري بیرته زړه ته رادرمي.

### (1) دریوی رگونو خصوصیات: دریوی رگونه لاندې

ځانگړني لري:

- a. ریوی شریان د Systemic Aorta په نسبت نري جدار لري.
- b. ریوی رگونه ډیر الاستیکي خاصیت لري.
- c. په ریوی رگونو کې ملسا عضلاتو کم انکشاف کړي دي.
- d. په Arterioles کې ملسا عضلي الیاف کم ترسترگو کېږي.

e. ریوی شعریه رگونه ( Pulmonary

(Capillaries) د Systemic Capillaries په

نسبت لوی دي.

(2) دریوی وینی جریان اوفشار اندازه: سرو ته چي په یوه

دقیقه کي کوم مقدار وینه خي په همدغه وخت کي د قلبی

دهاني ( Cardiac Output ) سره مساوي ده. خو هغه

فشار چي په ریوی رگونه کي منخته راخي د

Systemic رگونه په نسبت ډیر ټیټ دي چي په لاندي

ډول تري یادونه کوؤ:

شماره	د فشار نوعیت	Systemic Vessels	Pulmonary Vessels
1	Systolic Pressure	120 mmHg	25 mmHg
2	Diastolic Pressure	80 mmHg	10 mmHg
3	Main Arterial Pressure	100 mmHg	15 mmHg
4	Capillary Pressure	17 mmHg	7 mmHg

(3) دریوی وینی جریان کنترول: سرو ته د وینی جریان کنترول د

لاندي فکتورونو پوري اړه لري.


a. قلبی دهانه ( Cardiac Output ): ریوی وینی جریان د قلبی

دهاني سره مستقماً متناسب دي، نو هر هغه فکتور چي قلبی دهانه متاثره

کوي د ریوي ویني جریان هم متاثره کولای شي چي دافکتورونه عبارت دي له:

- i. وریدي بازگشت (Venous Return).
  - ii. تقلص قوه (Contraction Force).
  - iii. دتقلص شمیر (Contraction Rate).
  - iv. محیطي مقاومت (Peripheral Resistance).
- b. وعايوي مقاومت (Vascular Resistance): ریوي ویني جریان د وعايوي مقاومت سره معکوساً متناسب دي یعنی هرڅومره چي وعايوي مقاومت ډیر وي په هماغه اندازه به ریوي ویني جریان کموي او برعکس که وعايوي مقاومت کم وي نو ریوي ویني جریان به زیات وي.
- c. عصبي فکتورونه (Nervous Factors): په تجربوي ډول سره دا په ډاگه شوي ده چي د سمپاتيک اعصابو دتنبي په وجه Vasoconstriction صورت نیسي او سروته د ویني جریان کمیري، خو د پاراسمپاتيک اعصابو د تنبي په وجه بیا Vasodilatation صورت نیسي او دویني جریان سرو ته ډیریري، خو په نارمل او فزیولوژیکو حالاتو کي بیا تر اوسه دنده جوته شوي چي ایا خودکاره عصبي سیستم (Autonomic Nervous System) د سرو د ویني په جریان کومه اغیزه لري او که نه.
- d. کیمیاوي فکتورونه (Chemical Factors): برخلاف د بدن د نورو برخو په سرو کي د کاربن ډاي اکساید د ډیرنبت او یا د اکسیجن دکمښت له وجي دلته Vasoconstriction صورت نیسي او داچي ولي علت یي لا تر اوسه پوري یي مکانیزم ندي څرگند.

- e. هایدروستاتیک فشار ( *Hydrostatic Pressure* ): په نارمل حالاتو کې کله چې انسان ولاړ وي نو د جاذبې د کشش په د بدن په علوي برخو کې دسلفي برخو په نسبت فشار کم وي، چې همدا قانون په سږو کې هم تطبیق کېږي یعنې دسږو په پورتنۍ برخه کې فشار کم او په ښکتنۍ برخه کې فشار زیات دي. د فشار د تفاوت په اساس سږي په دريو برخو ویشل کېږي (۱۴-۲ش).
- i. پورتنۍ برخه ( *Apical Part* یا *Zone 1* ): دسږو پدغه برخه کې د کپیلرو په داخل کې کوم فشار شتون لري دا فشار هیڅکله دهغه فشار څخه چې په اسناخو په داخل کې د هوا د شتون له امله پیدا کېږي نشي لوریدلې نو ځکه پدغه ساحه کې دویني جریان د *Cardiac Cycle* په هیڅ یوې مرحلې کې هم شتون نلري.
- ii. منځنۍ برخه ( *Zone II* ): پدغه برخه کې د *Cardiac Cycle* په *Systole* صفحه کې د *Alveoli* فشار نسبت ریوي فشار ته کم او د *Cardiac Cycle* په *Diastole* صفحه کې د *Alveoli* فشار نسبت ریوي فشار ته زیات وي، نو ځکه پدغه ساحه کې د *Cardiac Cycle* د *Systole* په صفحه کې دویني جریان موجود او په *Diastole* صفحه کې دویني جریان موجود نه وي.
- iii. ښکتنۍ برخه ( *Zone III* ): پدغه ساحه کې ریوي شریاني فشار د *Alveolar Pressure* په نسبت د *Cardiac Cycle* په دواړو مرحلو کې زیات وي نو ځکه دلته دویني یو دوامداره جریان شتون لري. خو دیادونې وړ ده چې ستون ستاخ ځملاستي حالت کې ټول سږي *Zone III* دي.



## لمفاوي تقويه

## Lymphatic Supply

سږو ته دوه ډوله لمفاوي رگونه تللي دي چې يو يي سطحي لمفاوي رگونه ( Superficial Lymphatic Vessels ) دي کوم تر حشوي پلورا پوري رسيزي او دسږو سطحي نسج او حشوي پلورا څخه لمفاوي مایع راوړي، او بل ډول يي رانتقالوي، چې دا دواړه ډوله لمفاوي رگونه د Hilum له لاري د سږو څخه خارجيږي.

Phagocytic حجري د کاربن ذري او نور ناغوبنتي مواد د تنفس شوي هوا څخه راټولوي او لمفاوي رگونو ته يي انتقالوي. خو بلي خوا له بده مرغه همدا لمفاوي رگونه دي چې له سږو څخه سرطاني حجري د بدن نورو برخو ته انتقالوي. په زړو خلکو او خاصتاً په هغو کسانو کي چې سگريټ څکوي او يا په گرد او غبار کي ژوند تير کړاي



وي نو د کاربن د ذراتو د تجمع په اثر يې د سږو رنگ د خاکستري څخه تر تور رنگ پورې تغیر کوي.

## د ټوخي او پرنجي عکسي Cough and Sneeze Reflexes

د ټوخي او پرنجي عکسي هغه وخت تولیدیږي کله چې د تنفسي لاري په اوږدو کې بیګانه او مخريش مواد لکه سلفرداي اوکساید او د کلورین غاز پیدا شي. Bronchi او شزن (Trachea) ددغه دواړو موادو لپاره خاصي اخذي لري او کله چې دا مواد د خپلو اخذو سره وصل شي نو د Vagus اعصاب پواسطه Medulla Oblongata ته اکشن پوتنشنیل انتقالیږي او دلته بیا د ټوخي عکسه په ماشه (Triggered) کېږي.

لمري تقریباً 2.5 لیتره هوا اخستل کېږي او بیا Vestibular Folds او Vocal Folds په کلک ډول سره بندیږي او هوا په سږو کې بڼه تخته کېږي، د بلي خوا بطني عضلي تقلص ددې سبب ګرځي چې Diaphragm پورته شي او پدې وخت کې ساه اویستونکي (Expiration) عضلي هم تقلص کوي او په سږو کې فشار تر 100 mmHg پورې او یا لږې څخه هم پورته ځي. بیا یوناڅاپه Vocal Folds او Vestibular Folds خلاصیږي، Soft Plate پورته ځي او هوا دسږو څخه په زیات سرعت (75-100 mile/hour) سره د خولي له لاري

بهرته وځي او پدي طريقه د بيگانه او مخريشو موادو د اويستلو سبب گرځي.

دپرنجي عكسه هم دتوخي د عكسي پشان توليديري خو يوڅه فرق لري چي په لاندي ډول تري يادونه كوؤ:

دپرنجي په عكسه كي د تخرش مركز به دپوزي په اوږدو كي وي، نه په شزن اويا Bronchi كي او همدارنگه Medulla Oblongata د Trigeminal اعصابو پواسطه تنبي كيږي او هم Soft plate پدغه عكسه كي رابنكته كيږي او هوا دپوزي له لاري بهر ته اوځي او بيگانه مواد تنفسي لاري څخه ليري كيږي.

## تهويه

# Ventilation

مونږ دوه ډول تهويه لرو يويي Pulmonary Ventilation او بل يي Alveolar Ventilation څخه عبارت دي.

Pulmonary Ventilation دا يوه دوري پديده ده چي په نتيجه كي يي تازه هوا سږو ته داخل او په مقابل كي په عين مقدار سره هوا د سږو څخه بهر ته اوځي، چيرته دغه مقدار د هوا په مونږ په يوه دقيقه كي محاسبه كړو نو دپته Respiratory Minute Volume (RMV) وايي چي نارمل اندازه يي 6000 ml ده، چي دا په لاندي ډول محاسبه كوؤ:

---

**Pulmonary Ventilation = Tidal Volume X Respiratory rate**

Pulmonary Ventilation= 500 ml X 12/minute

Pulmonary Ventilation=6000 ml/min

Alveolar Ventilation عبارت دهغه مقدار هوا څخه دي کوم

چي په يوه دقيقه کي د غازونو دتبادلي لپاره په مصرف رسيږي. لکه

څنگه چي پوهيږو چه ټوله تنفس شوي هوا د غازونو دتبادلي لپاره نه

استعمالیږي بلکي يو اندازه هوا په مړه مسافه ( Dead Space ) کي پاتي

کيږي، نو پدي اساس ددي تهويي اندازه او مقدار د

Ventilation په نسبت کمه ده چي په لاندي ډول محاسبه کيږي:

Alveolar Ventilation = (Tidal Volume – Dead Space Volume ) X Respiratory Rate

Alveolar Ventilation = (500 ml – 150 ml ) X 12 ml/min

Alveolar Ventilation = 350 ml X 12 ml/min

Alveolar Ventilation = 4200 ml/min

دتهويي دتوضيح لپاره ضروري ده چې په لاندي موضوعاتو رڼا واچوو:

## 1) د فشار تفاوت اود هوا جريان ( Pressure Difference and Airflow):

ددي لپاره چې دهوايي کڅورو او بهراتموسفير ترمنځ دهوا تبادله صورت ونيسي نو بايد د دويو ترمنځ د فشار تفاوت موجود وي چې په تنفسي تيوب کي دهوا په انتقال باندې عيناً هغه قوانين د تطبيق وړدي کوم چې په رگونو کي دويښي په جريان تطبيق کيږي.

$$F = \frac{P_1 - P_2}{R}$$

پداسي حال کي چې  $F$  په تيوب کي د هوا جريان (  $\text{Millimeter} / \text{minute}$  )،  $P_1$  په اوله نقطه کي د فشار اندازه،  $P_2$  په دوهمه نقطه کي د فشار اندازه بڼي او  $R$  دهوا جريان په مقابل کي د مقاومت څخه عبارت دي. اوس که چيرته په اولي نقطي کي فشار لوړ وي نو د هوا انتقال به د اولي نقطي څخه د دوهمي نقطي په لور او که په دوهمه نقطه کي فشار لوړ وي نو د هوا انتقال به د دوهمي نقطي څخه د اولي نقطي په لور صورت ونيسي. عيناً قاعده په تنفس د عمل په وخت کي د تطبيق وړ ده، چې دساه اخستلو په وخت کي فشار د هوايي کڅورو په نسبت بهراتموسفير کي فشار لوړ وي نو هوا هوايي کڅورو ته داخليري او د ساه اويستلو په وخت کي بيا فشار په هوايي کڅورو کي د بهراتموسفير په نسبت لوړ وي نو هوا د هوايي کڅورو څخه بهرته اوځي.

## 2) فشار او حجم (Pressure and Volume):

د صدري جوف او هوايي کڅوړو دواړو باندې د غازونو عمومي قانون دتطبيق وړ دي.

P يي فشار، n يي دغاز د مولونوشمير، R دغازونو ثابت ( 0.08203  $\text{atm} \cdot \text{lit} / \text{mole} \cdot \text{K}$ )، T يي د حرارت درجه او V يي حجم راښيي. چي لږي جملې څخه په انسانانو کي T او n يي ثابت دي نو هرکله چي دا دواړه ثابت شول نو دا جوتيزي چي فشار د حجم سره معکوساً متناسب دي.

## 3) د هوايي کڅوړو څخه دهوا خارجيدل او داخليدل (Airflow into and out of Alveoli):

دتنفسي سيستم د فزيولوژي پوهانو له خوا دري قرار دادونه ددغه سيستم د فشار د عددي بنودني لپاره قبول کړل شوي دي. اول يي Barometric فشار ( $P_{(B)}$ ) دي چي د بدن په سطحه د اتموسفير فشار دي او په هر ځاي کي صفر قبول شوي دي. دوهم يي هغه کوچني فشار دي چي په Cm HOH سره اندازه کيږي ( $1 \text{ Cm HOH} = 0.74 \text{ mm Hg}$ ). او دريم يي هغه فشار دي چي هوايي کڅوړو ترمنځ شتون لري او Alveolar Pressure (  $P_{(alv)}$  ) پنامه ياديږي، چي ددي فشار 1 Cm HOH يي د Barometric فشار څخه د 1 Cm HOH په اندازه زيات او -1 Cm HOH يي د Barometric فشار څخه د 1 Cm HOH په اندازه کم دي.

د Alveolar فشار او Barometric فشار دتفاوت په اساس هوا سږو او هوايي کڅوړو ته داخل او خارجيږي چي د تفس په وخت کي ددي دواړو فشارونو ترمنځ لاندي څلور حالتونه شوني دي.

- a. دساه اویستلو په اخري وخت کي دا دواړه فشارونه سره مساوي وي نو ځکه د هوا تبادله صورت نه نیسي.
- b. دساه اخستلو په وخت کي Barometric فشار د Alveolar فشار په نسبت لوړیږي نوځکه هوا دسږو او هوایي کڅوړو ته ورننوځي.
- c. دساه اخستلو په اخري وخت کي بیا دا دواړه فشارونه سره مساوي کیږي او د هوا تبادله بیا صورت نه نیسي.
- d. دساه اویستلو په وخت کي Barometric فشار د Alveolar فشار په نسبت کمیږي چي داددي سبب گرځي چي هوا له هوایي کڅوړو څخه بهرته اووځي.

#### 4. دهوایي کڅوړو د حجم تغیر:

- لکه څنگه مو چي مخکي یادونه وکړه چي سږو او هوایي کڅوړو ته د هوا داخلیدلو او خارجیدلو کي Alveolar فشار خاص اهمیت لري او فشار د هوایي کڅوړو د حجم تغیر پواسطه تغیر کوي نو لازمه ده چي د هوایي کڅوړو د حجم د تغیر لاملونه مفصلاً وڅیړو:
- a. دسږو د Recoil کیدل:
- دسږو Recoil کیدل ددي باعث گرځي چي هوایي کڅوړي کولپس شي چي دا کولپس کیدل په دوو لاملونو سره منځته راځي.
- i. دسږو الاستیکي خاصیت: داچي په سږو کي الاستیکي الیاف شتون لري او دا الیاف دسږو د کولپس کیدو ته زمینه مساعدوي.
- ii. سطحي کشش: داچي د هوایي کڅوړو اندازه کوچني ده او د اندازي کموالي ددي د کولپس کیدولو لپاره زمینه برابروي او هاغه داسي چي د هوایي کڅوړو سطحه دیوي مایع پواسطه پوښل شوي ده او ددي مایع دمالیکولونو د کشش قوه نسبت دکوچنیو هوایي کڅوړو د توسع کیدو قوي ته ډیره ده نو ځکه دکولپس کیدوته خاص میلان لري. خو ددي لپاره

چي ددي کولپس کيدو څخه مخنيوي وشي نو دلته دوه فکتورون شتو لري  
چي يو يي Surfactant اوبل يي Interpleural Pressure.

## (1) Surfactant:

Surfactant هغه مواد دي چي د يوي مایع سطحي کشش کموي. هغه  
Surfactant چي په سږو کي د هوايي کڅورو اپیتلیوم پوښوي د  
Pulmonary Surfactant پنامه ياديري چي دا Surfactant د  
Alveolar Membrane د سطحي کشش کموالي سبب گرځي.  
Surfactant د دوه ډوله حجرو پواسطه توليديږي لمري ډول يي د سږو  
Type II Alveolar Epi. حجري دي کوم چي د  
Pneumocytes يا Secreting Alveolar Cell پنامه ياديري، چي د  
Alveolar سطحي باندي Microvillis د لرلو له مخي پیژندل  
کيري او بل ډول يي د Bronchi د Clara پنامه حجري دي چي د  
Bronchiolar Exocrine حجرو پنامه هم ياديري.  
که چيرته Surfactant دکيميا له نظره وڅيرؤ نو جوته به شي چي د  
فاسفوليپدونو، پروتینونو او ايونونو څخه جوړ شوي دي. فاسفوليپدونه د  
سرفکتانت 75% جوړوي چي مهم فاسفو ليپد يي DPPC (Di  
Palmitoyl Phosphatidyl Choline) پنامه ياديري اونور شحميات  
يي د ترای گلسرايد او Phosphatidylglycerol څخه عبارت دي. هغه  
پروتینونه چي په Surfactant کي شتون لري په څلور ډوله دي چي دوه  
يي Hydrophilic او دوه يي Hydrophobic دي، او همدا پروتینونه  
دي چي د Surfactant د ژونديو موادو له جملي څخه گڼل کيري. او  
هغه ايون چي په Surfactant کي شتون لري د کلسيم څخه عبارت دي.  
د Surfactant خام شکل د Tubular Myelin پنامه ياديري، چي د  
Tubular Myelin د جوړيدو وروسته د Exocytosis عمل پواسطه

Alveolar Lumen ته انتقاليري او دلته په Monomolecular طبقي باندي چي د Surfactant فعال شکل دي بدليري.

Surfactant لاندي دندي تر سره کوي.

● Surfactant د هوابي کڅورو سطحي کشش کموي، چي دا عمل په لاندي مکانيزم سره تر سره کوي.

د Surfactant فاسفوليپډ دوه برخي لري يو يي Hydrophilic برخه ده چي په اوبو کي انتشار کوي او Alveoli پوښوي او بله برخه يي Hydrophobic برخه ده چي د Alveolar هوا ته خواته درومي، نوپدي اساس فاسفوليپډ د نورو برخو سره يوځاي کيري د هوابي کڅورو په سطحه خپريري او د سطحي کشش د کموالي سبب گرځي.

● Surfactant د هوابي کڅورو د ثبات سبب گرځي او د هوابي کڅورو د کولپس کيدو مخه نيسي.

● Surfactant چي درشيمي ژوند دريمي مياشتني وخت څخه وروسته جوړيدنه پيل کيري او په اومه مياشت کي دا جوړويدنه چټکتيا پيدا کوي، نو کله چي ماشوم پيداشي نو دتنفسي مرکزونه د Hypoxia د تنبي په اثر په لمري تنفس شروع کوي او پدغه وخت کي چي سري هم کولپس کيدو ته د خپل ذاتي خاصيت له مخي ميلان لري، نو همدا Surfactant دي چي دسرو کولپس کيدنه نهې کوي. په هغه

Premature ماشومانو کي چي د اوه مياشتني څخه مخکي زيږيري د Hyaline Membrane Disease يا Respiratory Distress

Syndrome تر سترگو کيري او داځکه چي لاتردې وخته پوري په

کافي اندازه Surfactant نه وي توليد شوي ترڅو د سرو دکولپس څخه په تمامه معني مخنيوي وکړي، نوپدي ترتيب ريوې تهويه يي کمه او بلاخره د ماشومانو دمړيني سبب گرځي. نوډدي کار دمخنيوي لپاره بايد



مورته Cortisole توصیه شي دا حُکة چي دا د Surfactant جوړيدنه تنبي کوي.

• داچي Surfactant د SPA او SPD پروټينولرونکي دي نو ددي پروټينو پواسطه د بکټرياؤ او وایروسونو د Opsonization په طريقه له منځه وړي او د سږو په دفاع کي رول لري.

## (2) پلورال فشار Pleural Pressure:

دوهم هغه فکتور چي د سږو او هوايي کڅوړو د حجم تغير سبب گرځي د Pleural Pressure څخه عبارت دي، هغه فشار چي د پلورال جوف کي شتون لري يا هغه فشار چي د جداري او حشوي پلوراؤ ترمنځ شتون لري د Pleural Pressure پنامه ياديږي. نو کله چي دا فشار د Alveolar فشار څخه کم شي نو Alveoli پراخيري او کله چي د Alveolar فشار څخه زيات شي نو هوايي کڅوړي راتوليري، داچي په عادي حالت کي دا فشار د Alveolar فشار څخه کم دي نو حُکة دسږو د کولپس د مخنيوي عامل گڼل کيږي او بله داچي داد وريدي بازگشت لپاره يو تنفسي پمپ دنده هم ترسره کوي او دهغه داسي چي د جاذبي دقوي برخلاف دلته فشار منفي دي او دا منفي والي ددي باعث گرځي چي د بدن د سفلي برخو څخه وريدي ويني بازگشت د بدن علوي برخو ته صورت ونيسي. دا فشار په نارمل ساه اخستنه کي  $6 \text{ mm Hg}$ - او ساه اويستنه کي  $2 \text{ mm Hg}$ - دي.

ديادوني وړ ده چي Pleural فشار په valsalva مانوري اويا په پټالوژيکو حالاتو لکه Pneumothorax، Hydrothorax، Hemothorax او Pyothorax کي مثبت کيږي.


Pneumothorax هغه پنالوژیک حالت دي چي پدي کي د پلورال جوف کي هوا راټول شوي وي چي دا مختلف عاملونه لري لکه ضربه، چاره سره وهل، دپینتي ماتیدل او نور.....

د ساه اخستني (Inspiration) اود ساه اویستني (Expiration) په وخت کي Alveolar او Pleural فشارونه په لاندې ډول سره تغیر کوي:

په نارمل ډول د ساه اویستني په اخري وخت کي پلورال فشار -5 Cm HOH وي او Alveolar فشار د Barometric فشار سره مساوي وي، یعنی 0 Cm HOH وي. خو په نارمل ساه اخستني په وخت کي پلورال فشار 8 Cm HOH- ته ښکته کیږي او ددي سبب گرځي چي هوایي کڅوړي توسع کړي او حجم یی زیات شي چي د حجم دزیاتیدو له وجي یی فشار د Barometric فشار څخه کمیري او هوا سږو ته داخلیري، چي د هوا په داخلیدو سره بیرته د ساه اخستني په اخري وخت کي Alveolar فشار د Barometric فشار سره مساوي کیږي.

داچي ولي د ساه اخستني په وخت کي Pleural فشار کمیري ددي دوه علتونه دي، یو داچي د غازونو دعمومي قانون له مخي د صدري جوف د حجم پراخوالي ددي سبب گرځي چي pleural فشار ټیټ شي او دوهم دا چي دسږو د توسع له وجي د سږو د Recoil کیدو میلان زیاتیري او د Suction عمل د زیات اثر پواسطه هم پلورال فشار کمیري.

دساه اویستني په وخت کي پلورال فشار زیاتیري دا ځکه چي د یوي خوا د صدري جوف حجم کمیري اودبلي خوا د سږو د Recoil کیدو میلان هم مخ ښکته راځي. هر کله چي پلورال فشار لوړ شي د هوایي کڅوړو حجم کمیري او Alveolar فشارنسبت Barometric فشار ته لوړیږي او هوا سږو څخه بهر ته وځي چي د هوا د وتلو وروسته بیرته Alveolar فشار د Barometric فشار سره مساوي کیږي (۱۵-۲ش).



(۱۵-۲ش)

## دسبرو د دندو اندازه کول

### Measuring of Lung Functions

ددي لپاره چې پوه شوو چې تنفسي سيستم خپل نارمل فعاليت تر سره کوي او که نه، نو بايد دتنفسي سيستم دندو په اندازه کولو لاس پوري کړو ترڅو ددي په مرسته وشو کړاي چې د تنفسي سيستم د فزيولوژيک او پتالوژيک حالت په اړه راپور ورکړو.

### دسبرو او صدر ظرفيت

#### Compliance of the Lungs and Thorax

ديوواحد Alveolar فشار د تغير پواسطه چې کوم بدلون د صدر او سبرو په حجم کي راځي د سبرو او صدر دظرفيت پنامه ياديري او په لنډ ډول وايو چې دسبرو او صدر د پراخيدو وړتيا ته د سبرو او صدر ظرفيت وايي، چې په  $\text{liter}/\text{cm HOH}$  سره اندازه کيږي.

دسبرو او صدر زيات پراخيدل د دويو د ظرفيت دلوړيدلو سبب گرځي د بيلگي په ډول په Emphysema کي دسبرو الاستيکي اليافو تخريب ددي سبب گرځي چې دسبرو د Recoil کيدو ميلان کم کړي چې دا د Recoil کيدو ميلان کموالي د سبرو د ډير پراخيدو سبب گرځي او بلاخره دسبرو ظرفيت هم دنارمل اندازي په نسبت زياتيري، د بلي خوا که چيرته د سبرو او صدر د پراخيدو په مخ کي کوم خنډ شتون ولري لکه په Pulmonary Fibrosis، د هوایي کڅوړو کولپس کيدل، Pul. Bronchitis، Asthma، Edema او نورو کي نو داد سبرو د ظرفيت د کموالي سبب گرځي.

## ریوي حجمونه او ظرفیتونه

### Pulmonary Volumes & Capacities

هغه پروسه چې دهغي پواسطه تنفسي سیستم ته داخلیدونکی او لدې سیستم څخه خارجیدونکي هوا اندازه کیري د Spirometry پنامه یادیري او Spirometer بیا هغه اله ده چې ددغي هوا اندازه معلوموي. دا چې ددې هوا اندازه کول څومره د اهمیت وړدي پدې باندي به هله پوه شوو چې مونږ دتنفسي سیستم د پتالوژي په باره کي پوره معلومات ولرو.

عموماً د سږو هوا په دوه ډوله ویشل کیري.

(1) سږو د هوا حجمونه (Lungs Air Volumes)

(2) سږو د هوا ظرفیتونه (Lungs Air Capacities)

#### (1) دسږو د هوا حجمونه (Lungs Air Volumes)

دسږو هوا حجم عبارت دهغه حجم څخه دي چې یو شخص یي په نارمل ډول دساه اخستلو په وخت کي تنفسي کوي چې دا حجمونه متغیر (Dynamic) دي.

a. *Tidal Volume (TV)*: دا د هوا هغه مقدار حجم څخه عبارت

دي چې یو نارمل انساني یي د نارمل تنفس په وخت کي اخلي او یا خارجوي یي چې نارمل اندازه یي 500 ml ده. او ددې حجم د مقدار له مخي مونږ د تنفس شدت معلوموالي شو (۱۶-۲ش).

b. *Inspiratory Reverse Volume (IRV)*: دا

هغه مقدار هوا ده چې یو شخص یي دنارمل Tidal Volume وروسته په جبري ډول اخلي چې نارمل اندازه یي 3000 ml ده (۱۶-۲ش).

c. *Expiratory Reverse Volume (ERV)*: دا هغه مقدار هوا ده چې يو شخص يې د نارمل Tidal Volume هوا څخه وروسته په جبري توگه اوباسي چې نارمل اندازه يې 1100 ml ده (۱۶-۲ش).

d. *Residual Volume (RV)*: په نارمل حالت کې سېري په مکمل ډول سره د هوا څخه نشي تشيدلي بلکې د جبري ساه اويستني سره سره بيا هم يو مقدار هوا د سېرو په داخل کې پاتې کيږي چې دغه مقدار هوا ته Residual Volume وايي چې نارمل اندازه يې 1200 ml ده. ددې حجم هوا شتون دوه اهميته لري يو داچې سېرو شکل په ساتنه کې مرسته کوي او دکولپس کيدو څخه يې مخه نيسي او بل داچې د ساه اويستني په وخت کې د وينې سره د غازاتو تبادله صورت نيسي (۱۶-۲ش).

## 2) د سېرو ظرفيتونه (Lungs' Air Capacities):

که چېرته د سېرو دوه يا څو حجمونه سره جمع کړو نو دپته د سېرو ظرفيت وايي، چې په لاندي ډول سره دي.

a. *Inspiratory Capacity (IC)*: که د يو عادي ساه اويستني څخه وروسته، يوي ساه اخستني (Inspiration) د پيل څخه په جبري ډول شروع او تر اعظمي حده پوري ادامه پيدا کړي نو دغه ټول مقدار هوا ته Inspiratory Capacities وايي (۱۶-۲ش). په حقيقت کې دغه هوا د Tidal Volume او IRV مجموعه ده چې په لاندي ډول يې محاسبه کوو

$$\text{Inspiratory Capacity} = \text{TV} + \text{IRV}$$

$$\text{Inspiratory Capacity} = 500 \text{ ml} + 3300 \text{ ml} = \mathbf{3800 \text{ ml}}$$

b. *Vital Capacity (VC)*: ديو ژور ساه اخستني وروسته په جبري ډول چې کوم مقدار هوا خارجيږي ديوته *Vital Capacity* وايي او يا په بل عبارت د سږو هغه مجموعي ظرفيت دي چه د *Tidal, Reverse Inspiratory* او *Reverse Expiratory* حجمونو د مجموعي څخه لاسته راځي. چې نارمل اندازه يي 4800 ml ده (۱۶-۲ش).

ديادوني ورده چې پورته ذکر شوي اندازه د منځکوره ځوان لپاره ده او دا اندازه نظر عمر، جنس، فزيکي جسامت، قد او نورو فزيکي حالاتو ته فرق کوي دمثال په ډول په ځوانو بنځو کي *VC* د 20-25% پوري کموالي پيداکوي، په لويانو کي د کوچنيو په نسبت، په ډنگرو خلکو کي د عادي خلکو په نسبت *Vital Capacity* زياته وي او همدارنگه هغه ناروغان چې په *Muscular Dystrophy* او *Poliomyelitis* اخته وي د *Vital Capacity* کچه يي تردي اندازي څخه هم بنکته کيږي چې د دويو ژوند د گواښ سره مخامخ کوي.

$$\text{Vital Capacity} = \text{IRV} + \text{TV} + \text{ERV}$$

$$\text{Vital Capacity} = 3300 \text{ ml} + 500 \text{ ml} + 1000 \text{ ml} = \mathbf{4800 \text{ ml}}$$

c. *Functional Residual Capacity (FRC)*: د سږو هغه ظرفيت دي چې د يو نارمل *Tidal* حجم هوا اويستلو وروسته يي لري او يا په لنډ داسي وايو چې د سږو هغه ظرفيت چې مجموعاً يي د *Residual Volume* او *Expiratory Reverse Volume* لپاره لري د *FRC* پنامه ياديږي چې نارمل اندازه يي 2200 ml ده (۱۶-۲ش).

$$\text{FRC} = \text{ERV} + \text{RV}$$


$$\text{FRC} = 1000 \text{ ml} + 1200 \text{ ml} = \mathbf{2200 \text{ ml}}$$



d. **Total Lung Capacity (TLC)**: د سږو هغه ظرفیت دی چې د ټولې هوا لپاره چې په اعظمي ډول یې اخلي او اوباسي لري. چې نارمل اندازه یې 6 liters ده (۱۶-۲ش).

$$TLC = IRV + TV + ERV + RV$$

$$TLC = 3300 \text{ ml} + 500 \text{ ml} + 1000 \text{ ml} + 1200 \text{ ml} = \mathbf{6000 \text{ ml} = 6 \text{ lit}}$$





د یادوني وړ ده چې یو تعداد نور ظرفیتونه او حجمونه هم شتون لري کوم چې د کلنيکي څیړونو په منظور ورڅخه استفاده کيږي چې په لاندې ډول ورڅخه یادونه کوو:

### 1. *Respiratory Minute ( Minute Ventilation) Volume*

(*RMV*): هغه اندازه هوا ده چې په یو دقیقه کې اخستل کيږي او خارجيږي، چې د تنفسي Rate او *Tidal Volume* د حاصل ضرب څخه یې اندازه په لاس راځي. د *RMV* نارمله اندازه 6 lit ده چې د تمرین او احساساتي کارونو د ترسره کولو په وخت کې ډیريږي خو د پتالوژیکو حالاتو کې بیا کميږي.

### 2. *Maximum Breathing Capacity (MBC)*

که چېرته یو شخص په یوه دقیقه کې په جبري ډول تنفس وکړي نو هغه ټوله هوا چې تنفس شوي ده د *MBC* پنامه یادیږي چې نارمل اندازه یې په نارمل ځوانانو کې  $150-170 \text{ lit}/\text{min}$  پوري او په نارملو ښځو کې  $80-100 \text{ lit}/\text{min}$  پوري ده. د یادوني وړده چې دغه مقدار هوا ته *Maximum Ventilation Volume (MVV)* هم وايي.

### 3. *Peak Expiratory Flow Rate (PEFR)*

چې یو شخص د ژور ساه اخستې وروسته په جبري توګه هوا خارجوي د *PEFR* پنامه یادیږي چې نارمل اندازه یې  $400 \text{ lit}/\text{min}$  ده او د *Wright's Flow Meter* پواسطه اندازه کيږي. په عمومي توګه په ټولو تنفسي امراضو کې کميږي، خوبیا هم ددغه مقدار هوا په واسطه د تنفسي سیستم *Obstructive* ( بندښت ) او *Restrictive* ( تنګ شوي ) مرضونو ترمنځ فرق کيږي، داسې چې په *Obstructive* مرضونو کې د *PEFR* اندازه  $100 \text{ lit}/\text{min}$  او په *Restrictive* مرضونو کې  $200 \text{ lit}/\text{min}$  ده.

4. **Forced Expiratory Volume (FEV)**: هغه مقدار هوا ده کوم

چي په يو ورکړل شوي واحد د وخت کي په جبري توگه د سپرو څخه اويستل کيږي، چي دېته **Timed Vital Capacity** او يا **Forced Expiratory Vital Capacity** هم وايي.

$FEV_1$  = Forced Expiratory Volume in one Second.

$FEV_2$  = Forced Expiratory Volume in Two Seconds.

$FEV_3$  = Forced Expiratory Volume in three Seconds.

چي نارمل اندازه يي په لاندي ډول سره دي:

$FEV_1$  = 83% of total vital capacity.

$FEV_2$  = 94% of total vital capacity.

$FEV_3$  = 97% of total vital capacity.

خو د دريمي ثانيي وروسته هوا 100% د **Vital Capacity** هوا وي.

تردي دمه مو هغه کميتونه ولوستل د کومو د اندازي پواسطه چي

مونږ پدي پوهيږو چي سبري په کوم حالت کي ( فزيولوژيک او که پتالوژيک) قرار لري. اوس دېته راځو چي دغه کميتونه څنگه محاسبه کيږي يعني يوڅه په **Spirometry** هم رڼا اچوؤ:

هغه اله چي د **Spirometry** په عمليه کي په کار وړل کيږي د

**Spirometer** پنامه ياديږي، چي تردي دمه دري ډوله **Spirometers** اختراع او استعمال شوي دي.


Simple Spirometer (1)

Respirometer (2)

Computerized Spirometer (3)

داچي هر Spirometer څه رنگه جوړښت لري او څنگه خپل کار ترسره کوي ددې موضوع د څيړو څخه تيرپيرو او يواځي هغه پايلي چي ددغه ماشينونو پواسطه تر لاسه کيږي څيرو: د يو کلنيکي ازمښت څخه چي دلته بايد يادونه وشي هغه له FEV<sub>1</sub> څخه عبارت دي چي دا يو ساده ازمښت دي او په لاندي ډول ترسره کيږي:

لمري يو شخص يوه جبري ساه اخلي او وروسته د ساه اخستلو څخه امکان تر حده ژر به جبري ډول ساه په هغه پيپ کي چي دغه شخص په خوله کي نيولي خارجوي. نو هغه هوا چي په اخر د ازمښت کي پاتي کيږي د Vital Capacity پنامه ياديږي. همدارنگه هر مقدار هوا چي په لمري ثانيه کي Spirometer ته داخليږي. داهم ددغه الي پواسطه اندازه کيږي چي دا اندازه په FEV<sub>1</sub> سره د دوهمي ثانيي اندازه په FEV<sub>2</sub> سره او دريمي ثانيي د هوا اندازه په FEV<sub>3</sub> سره بنودل کيږي. دتنفسي لاري بندش لکه Asthma، Collapse، Tumor of Bronchi، Emphysema او يا سږو او صدي جدار د پراخيدو وړتيا کموالي لکه Pulmonary Fibrosis، Silicosis، scoliosis او نور د FEV<sub>1</sub> د کمښت سبب گرځي (۱۷-۲ش).



## د Functional Residual Capacity او

### Residual Volume اندازه گرځي

داچي مونږ پدي بر لاسي کيداي نه شو چي د Spirometer پواسطه د FRC او RV اندازي تر لاسه کړو، نو ددي اندازو تر لاسه کولو لپاره لازمي ده چي دا لاندي ميتودونه استعمال کړو.

#### 1) Helium Dilution Technique

ددي لپاره چي FRC اندازه محاسبه کړو نو د Spirometer د يو معلوم مقدار هيليم غاز څخه ډکوو او بيا وروسته د يو نارمل ساه اويستني وروسته شخص ته د Spirometer د پيپ څخه د تنفس هدايت کوو نو کله چي دا شخص ددغه پيپ څخه تنفس شروع کړي نو

د هیلیموم غاز به سږو ته داخل شي، او سږو د هوا سره به گډ شي او دا پروسه تر هغه وخته پوري دوام ورکولو ترڅو چې د هیلیموم اندازه په سږو او Respirometer کې یو برابر شي اولدي وروسته بیا د هیلیموم غاز په Respirometer کې اندازه کوه او FRC یې د لاندي فارمول پواسطه لاسته راوړو:

پداسي حال کې چې  $V$  په Respirometer کې د هوا مجموعي حجم،  $C1$  په Respirometer کې د هیلیموم د غاز اولني حجم او  $C2$  په Respirometer کې د هیلیموم د غاز دوهمي حجم څخه عبارت دی. او که  $RV$  محاسبه کوو نو شخص ته به د نارمل ساه اخستني په ځای د جبري ساه اویستني څخه وروسته Respirometer څخه د تنفس کولو هدايت کوو.

## (2) Nitrogen Washout Method

داچې د نایتروجن اندازه په ازاده هوا کې تقریباً 80% ده، نو که چیرته د سږو دنایتروجن اندازه معلومه شي نو هغه هوا چې په سږو کې شتون لري هم معلومولای شو، داسي چې د یو عادي ساه اویستني څخه وروسته شخص ته هدايت کوو چې اکسیجن څخه ډک تیوب څخه ساه واخلي اوخپله ساه بیرته په Valve لرونکي تیوب کې خوشي کړي او دا عمل باید د 6-7 دقیقو پوري تکرار شي تر څو دسږو ټول نایتروجن په اکسیجن بدل شي اوس نو په هغه تیوب کې چې شخص ساه خوشي کوله دنایتروجن اندازه پیداوو او د لاندي فارمول پواسطه یې FRC لاسته راوړو:

پداسي حال کي چي  $V$  د تيوب په داخل کي د هوا حجم،  $C1$  د تيوب په هوا کي د نايټروجن اندازه او  $C2$  په ازاده هوا کي د نايټروجن اندازه رابنيي.

د  $RV$  د معلومولو لپاره شخص ته د نارمل ساه اويستني پرځاي د جبري ساه اويستني وروسته د اکسيجن لرونکي تيوب څخه د ساه اخستلو هدايت کوو.

### (3) **Plethysmography**:

دا يو داسي تخنيک دي چي ددي پواسطه د بدن د غړو د اندازي او حجم تغيرات تر څيړني لاندې نيول کيږي. هغه اله چي پدغه تخنيک کي پکار وړل کيږي د Plethysmograph پنامه ياديږي، چي د غازاتو د بائيل د قانون په اساس جوړه شوي ده. پدغه تخنيک کي شخص ته لاربنونه کيږي چي د Plethysmograph د Pneumotachograph برخه په خوله کي ونيسي او تنفس عمل تري شروع کړي پدغه وخت کي ددي الي پواسطه دتنفس په مختلفو مرحلو کي د حجم او فشار تغيرات واضح کيږي او بيا شخص ته هدايت کيږي چي يو قوي تنفس وکړي چي په قوي ډول د ساه اويستني په اثر د سږو حجم ډير کميږي خو په مقابل کي دلونبي حجم زيات او فشار يي کميږي چي ددي اندازو په نظرکي نيولو سره د لاندې فورمول څخه FRC پيداکوو:

$$P_1 \times V = P_2 (V - \Delta V)$$

پداسي حال کي چي  $V$  يي FRC او  $P_1$  او  $P_2$  يي د فشار تغيرات رابنيي.

## مره ساحه

### Dead Space

Alveolar Ventilation هغه مقدار هوا ده چې په يوه دقيقه كې

د غازونو تبادله پرې صورت نيسي، پداسي حال كې چې رېوي تهويه  
( Pul. Ventilation ) هغه اندازه هوا ده كوم چې په يوه دقيقه كې تنفسي

سيستم ته داخلېږي. لډي خايه معلومېږي چې تنفسي سيستم ته ټوله دخل

شوي هوا كې د غازاتو تبادله صورت نه نيسي، بلكې دا عمل په يو

خاص مقدار هوا كې ترسره كېږي هغه مقدار هوا چې تنفس كېږي 6 lit

ده خو هغه مقدار هوا چې د غازاتو تبادله ورسره صورت نيسي 4.2 lit

ده چې دا پاتې هوا ( 1.8 lit ) يې د مړي هوا ( Dead Air ) پنامه

يادېږي.

مره هوا ( Dead Air ) چې په كومي ساحي كې شتون لري دغه

ساحي ته مره ساحه ( Dead Space ) وايي چې داپه دوه ډوله ده.

1. Anatomical Dead Space

2. Physiological Dead Space

اناتوميكه مره ساحه هغه ساحه ده چېرته چې د غازاتو تبادلې

لپاره جوړبښتونه شتون ونلري لكه Conducting Respiratory Tract

خو فزيولوژيكه مره ساحه هغه ساحه ده چېرته چې دغازاتو تبادلې لپاره

جوړبښتونه شتون ولري خودتبادلې وړتيا پكې نه وي جمع يې اناتوميكه

مره ساحه لكه هغه هوايي كڅوړې چې كافي اندازه اروا نلري او يا هم د

دندي له مخي غير فعاله وي.

په نارمل حالت كه څه هم فزيولوژيكه مره ساحه د اناتوميكي

مړي ساحي په نسبت يوه څه زياته ده خو دا ډيربڼت ډير كم دي او

---

محاسبې وړ نه دي نو ځکه دا داوآره مري ساحي يو له بل سره مساوي  
قبول شوي دي چي نارمل اندازه يي 150 ml ده.



## د ریم فصل

### د غازاتو د تبادلې فزیکي قوانین

تر اوسه مو هغه څه ولوستل چې دکوم پواسطه هوا تر هوايي کڅوړو پورې راځي، اوس د تنفسي سیستم د فزیولوژی د څیړنې په پړاو کې یو بل قدم اخلو او دلته هغه څه تر څیړنې لاندې نیسو د کومو پواسطه چې د هوائی کڅوړو او ریوی شعریه رگونو ( Pulmonary Capillaries) ترمنځ د غازاتو تبادله صورت نیسي او په عمومي ډول د غازونو مالیکولونه د لوړ څخه د تیت غلظت په لور په غیر منظم ډول سره حرکت کوي.

ددي لپاره چې پوه شو چې څرنگه د وینې او هوائی کڅوړو ترمنځ د غازاتو تبادله صورت نیسي نو لازمه ده چې لاندې موضوعات په غور سره ولولو او ځان پرې پوه کړو.

### قسمي فشار

## Partial Pressure

د بحر په سطحه د اتموسفیر فشار 760 mm Hg دي چې ددي معنی داده چې هغه غازونه چې دبحر په سطحه یې اتموسفیر یې جوړکړي دي، ددي ټولو غازاتو فشارونه سره جمع کړو نو مجموعي فشار به یې 760 mm Hg شي، دا چې د اتموسفیر زیاته برخه د نایتروجن ( تقریباً 69%) او اکسیجن (تقریباً 21%) څخه جوړه شوي ده، نو ځکه ددي دواړو غازاتو فشارونه به هم پکې لوړ وي، چې د

نایتروجن فشار په اتموسفیر کې 597.5 mm Hg او د اکسیجن فشار 158.4 mm Hg دي. نو د همدغه مجموعي فشار هغه برخه کومه چې د یو غاز پواسطه جوړیږي د همدغه غاز د قسمي فشار پنامه یادیږي، چې د  $P_x$  د سمبول پواسطه چې په  $X$  پرځای د مربوطه عنصر سمبول او یا د مرکب فارمول لیکل کیږي لکه  $P_{O_2}$ ,  $P_{N_2}$ ,  $P_{CO_2}$  او داسې نور... هرکله چې د اوبو مالیکولونه د هوا سره په تماس راشي نو یو اندازه لږ مالیکولونو څخه په مایع شکل بدلیږي او تبخیر کیږي چې دغه تبخیر شوي مالیکولونه بیا هم په هوا کې قسمي فشار تولیدوي چې دغه فشار ته د بخار (براس) فشار ( Water Vapor Pressure ) وايي.

په عمومي ډول سره د اتموسفیر هوا، د هوایي کڅوړو هوا او Expired شوي هوا د جوړښت له نظره یوله بل سره یو څه فرقونه لري چې په لاندې جدول کې دا فرقونه خلاصه کوو:

Expired Air		Alveolar Air		Humidified Air		Dry Air		Gases
%	mm Hg	%	mm Hg	%	mm Hg	%	mm Hg	
74.5	566.0	74.9	569.0	74.09	563.4	78.62	597.5	Nitrogen
15.7	120	13.6	104	19.67	149.3	20.84	158.4	Oxygen
3.6	27.0	5.3	40.0	0.02	0.3	0.04	0.3	Carbon Dioxide
6.2	47.0	6.2	47	6.20	47.0	0.0	0.0	Water Vapor

داچي ولي Expired هوا او د اتموسفير هوا ترمنځ د جوربنت له نظره فرق شتون لري ددي دري علتونه دي چي په لاندي ډول تري يادونه کوؤ:

1. د ساه اخستلو په وخت کي اخستونکي هوا د پوزي پواسطه مربوطيږي.
2. په هوايي کڅوړو کي د اخستل شوي هوا د اکسيجن او کاربن ډاي اوکسايډ تبادلې صورت نيسي.
3. د هري ساه اخستلو په وخت کي يواځي د Alveolar هوا يو کمه برخه د اتموسفير د هوا پواسطه معاوضه کيږي.

## دمايعاتو څخه د غازاتو نفوذ


### Diffusion of Gases through Liquids

هرکله چي غازات د اوبو سره تماس کي شي نو دوي ددي ميلان لري چي په مايعاتو کي منتشر شي، د Henry قانون په اساس کولاي شو چي په يوي مايع کي د يو غاز غلظت ددغه غاز د انحلايت د ضريب او د همدې غاز د قسمي فشار له مخي داسي محاسبه کړو چي:

دغاز غلظت = دغاز قسمي فشار  $\times$  د غاز د انحلايت ضريب

د انحلايت وړتيا د هر غاز لپاره فرق کوي مثلاً د اکسيجن د انحلايت قابليت ضريب 0.024 اود کاربن ډاي اوکسايډ د انحلايت





۱-۳ ش

ددي غشا څخه د غازاتو تبادلې صورت نيسي او هغه فکتورونه چې د غازاتو تبادلې متاثره کوي عبارت دي له:

1. دتنفسي غشا پيروالي (Respiratory Membrane Thickness)
2. په غشا کي د غازاتو دنفوډ ضريب (Diffusion Coefficient)

3. دتنفسي غشا سطحی مساحت ( Surface Area of Respiratory Membrane).

4. د غشا په دواړو خواو کې د قسمي فشار تفاوت.  
چې اوس دتنفسي غشا څخه دغازاتو په تیریدنه باندې د هر فکتور اغیزه مفصلاً تر څیرني لاندې نیسو.

### 1. دتنفسي غشا پيروالي (Respiratory Membrane Thickness):

دتنفسي غشا پيروالي چې په اوسط ډول تر  $0.6 \mu$  پورې دي، ددې غشا څخه د موادو له تیریدني سره معکوساً متناسب دی. پدې معني که چیرته ددې غشا پيروالي زیاتوالی ومومي نو د موادو تیریدنه به بطني او که چیرته پيروالی ومومي نو دا تیریدنه به چټکه شي. که چیرته د غشا دا پيروالی د خپلي نارمل اندازې څخه دوه یا درې چنده اضافه شي نو د نفوذ په Rate کې به یې د پام وړ تغیرات منځته راشي. په Pulmonary Edema کې چې اکثراً د چپ زړه د عدم کفایي له وجې منځته راځي ددې سبب گرځي چې د تنفسي غشا پيروالي ډیر او د غازاتو په نفوذ باندې اغیزه وکړي دا چې د چپ زړه عدم کفایه څرنگه د تنفسي غشا د پيروالي سبب گرځي، ددې خبرې سپیناوي داسې کوو چې: د چپ زړه د عدم کفایي له وجې په ریوي شعریه رگونو کې وریدي فشار لوړیږي او دا ددې سبب گرځي چې په هوایي کڅوړو کې مایعات تجمع وکړي او ددې غشا ضخامت زیات کړي. همدارنگه په توبرکلوز، نمونیا او پرمختللي Silicosis چې د سږو دنسجونو د التهاب څخه منځته راځي، هم په هوایي کڅوړو کې د هوا د تجمع سبب گرځي.

## 2. په غشا کې د غازاتو د نفوذ ضریب (Diffusion Coefficient):

د غازاتو د نفوذ ضریب د غاز هغه وړتیا ده چې په یو واحد د وخت کې په یوې مایع یا نسج کې نفوذ کوي، چې د نفوذ دا ضریب د غاز د مالیکولي وزن د دوهم جذر سره معکوساً اود انحلالیت د قابلیت سره مستقماً متناسب دی. که چیرته د اکسیجن د نفوذ ضریب یو قبول کړو نو د  $CO_2$  د نفوذ ضریب به 20 وي. چې ددې خبرې معنی داده چې د  $CO_2$  د نفوذ وړتیا د اکسیجن په نسبت 20 چنده زیاته ده یعنې که په یو واحد د وخت کې که د اکسیجن یو مالیکول ددې غشا څخه تیرېږي نو همدغه واحد د وخت کې 20 مالیکولونه د  $CO_2$  به ددغه غشا څخه تیر شي. نوځکه په تنفسي مرضونو کې Hypoxia (داکسیجن کمښت) د Hypercapnia (د کاربن دای اوکساید ډیرښت) په نسبت ډیر ژر تاسیس کوي.

که چیرته تنفسي غشا د یو مرض له وجې په دوامدار ډول تخریبه شي نو دابه د وینې د اکسیجن په اندازې باندي اثر وغورځوي او تغیر به پکې راولي نو که چیرته پدغه وخت کې ناروغ بیا هم ژوندي وي نو Oxygenthrapy ورته اجرا کيږي تر څو په سږو کې د اکسیجن قسمي فشار د لوړیدو په اثر په وینه کې هم د اکسیجن قسمي فشار لوړ شي.

## 7. د تنفسي غشا سطحې مساحت (Surface Area):

د تنفسي غشا نارمل اندازه  $70 m^2$  ده، نو که دا اندازه د یوې کوچني مساحت سره پرتله کړو نو د هغه کوچني سره چې مساحت یې  $25 \times 30 ft$  وي مساوي دي، خو په مقابل کې د سږو د شعریه رگونو د وینې ټوله اندازه 60-140 ml پوري ده. اوس که د وینې دغه کمه اندازه پدغه

پراخه سطحه کي تصور کړو په ډیرپه اساني سره به پردي خبره پوه شو چې د اکسیجن او  $CO_2$  تبادله په څومره چټکي سره صورت نیسي. دریوي شعریه رگونو منځني قطر  $5 \mu$  دي، نو بنا پردي RBC لدغه ساحي څخه بڼه د پوره فشار لاندي تیریری، ځکه نو د RBC پرده د شعریه رگونو د جدار سره مستقماً تماس پیدا کوي. او پدي ډول اکسیجن او  $CO_2$  د خپل نفوذ په وخت کي دیته اړ نه دي چې د یوي اوردي مسافي (پلازما مسافي) څخه تیر شي کومه چې باید د RBC او سنخ ترمنځ موجود وي، او دا کار په خپل نوبت د تنفس د عمليي د لا چټکتیا لامل گرځي. ددغي سطحی په ډیر کم که تغیر سره بیا هم د غازاتو په تبادله کي ډیر زیات بدلون تر سترگو کیږي، که چیرته ددغه سطحی اندازه د  $1/4 - 1/3$  پوري راکمه شي نو د استراحت په حالت کي هم د غازاتو په تبادلي بڼکاره اغیزه کوي.

ددغي سطحی کموالی د سږي د نسج د لیروالی، د هوایی کڅوړو د جدارونو د تخریب، د توبرکلوز پواسطه د سږو نسج بدلیدل په منضم نسج باندي او حتی په ځینو حادو حالاتو کي لکه د نمونیا او Pulmonary Edema له وجي هم رامنځته کیږي.

## 8. د غشا په دواړو خواو کي د قسمي فشار تفاوت:

دغشا په دواړو خواو کي د قسمي تفاوت عبارت دي له ریوي ویني او هوایی کڅوړو کي د غازونو د قسمي فشار تفاوت څخه. په عمومي ډول که چیرته یو خوا قسمي فشار لوړ وي نو مالیکولونه بلي خواته د Net Diffusion په اساس حرکت کوي. په نارمل ډول د اکسیجن قسمي فشار په هوایی کڅوړو او د  $CO_2$  قسمي فشار په ریوي شعریه رگونو کي



زیات دي، نو پدي ترتیب اکسیجن د ریوي رگونو خواته او  $\text{CO}_2$  د هوایي کڅوړو خواته نفوذ کوي.

د سنخي تهويي ( Alveolar Ventilation ) په زیاتوالي سره په هوایي کڅوړو کي د اکسیجن قسمي فشار ډیریري او دا ددي سبب ګرځي چي نارمل حالت څخه ډیر او چټک ډول اکسیجن ویني ته انتقال شي، برعکس د سنخي تهويي د کموالي په صورت کي د اکسیجن قسمي فشار په هوایي کڅوړو کي کمیري او دا ددي سبب ګرځي چي د اکسیجن انتقال ویني ته د نارمل حالت څخه کم او بطي ډول صورت ونیسي.

که چیرته د پورته ټولو فکتورونو اغیزه د غاز په نفوذیه قابلیت باندې په یو الجبري معادلي کي وڅیرو نو لرو چي:

پداسي حال کي چي DC یي د نفوذیه ظرفیت، S یي د نحلایت ضریب، Pg یي فشار تفاوت، A یي د غشا مساحت او D یي د غشا پیروالی افاده کوي.

## دتهوئي او ريوي شعريه رگونو د ويني جريان

### ترمنخ اړيکه

## Relation between Ventilation And

## Pulmonary Capillaries Blood Flow

په نارمل حالت کي سنخي تهويه او د ريوي شعريه رگونو ويني جريان هغه څه دی کوم چي په موثر توگه د ويني او هوا ترمنخ د غازاتو تبادله متاثره کوي. په نارمل ډول دا اړيکه د ثبات په حالت کي وي، چي د تمرين په حالت کي هم دغه ثبات ټينگ وي او دا ځکه چي که له يوي خوا قلبي دهانه لوړيزي نو له بلې خوا څخه سنخي تهويه هم لوړيزي چي ددي دواړو لوړيدل د غازاتو د تبادلې د اندازي د ثبات سبب گرځي.

په دوه حالتونو کي د سنخي تهويي او ريوي شعريه رگونو د ويني جريان ترمنخ دغه اړيکه خرابيږي، يو داچي د ويني جريان هوايي کڅوړو خواته کم شي او يا دا چي تهويي اندازه راکمه شي او د غازاتو تبادله په نارمل ډول سره صورت ونه نيسي.

که چيرته وينه په بڼه ډول Oxygenated نشي نو د Shunted

Blood پنامه ياديږي، چي مونږ په روغ صحت کي دوه ډوله Shunted Blood لرو، يو يي Anatomical Shunted وينه ده چي عبارت د هغه مقدار ويني څخه ده چي د Deoxygenated ويني په شکل د Bronchi او Bronchioles څخه راځي او د Pulmonary Vein سره گډيږي، او بل ډول يي Physiological Shunted وينه ده، چي دا هغه مقدار وينه ده کوم چي د ريوي شعريه رگونو او

Anatomic Shunted ویني د یوځایوالي څخه رامنځته راځي. د یادوني وړده چي Shunted وینه د قلبي دهاني 1-2% پوري جوړوي. اکثرأ مرضونه هم د Shunted ویني د زیاتیدو سبب گرځي لکه Asthma چي پدي حالت کي Bronchi بندښت پیداکوي، او دا چي دا د ویني د جریان په مقابل کي یو خنډ جوړوي نو ځکه په ریوي شعریه رگونو کي وینه Deoxygenated پاتي کيږي. همدارنگه Pulmonary Edema او Pneumonia هم د ویني د ښه Oxygenated کیدل نهی کوي او د Shunted ویني د ډیرښت سبب گرځي.

کله چي یو شخص د ولاري په حالت کي وي نو د سږو قاعده ډي د پورتنی برخي په نسبت د 22 mm Hg په اندازه لوړ فشار لرونکي وي دا لوړ فشار ددي سبب گرځي چي په قاعدوي برخه کي د ویني جریان چټک او او عیبي ښه متوسع وي، خو په پورتنی برخه کي بیا خبره معکوسه ده یعنی دلته او عیو ښه توسع نه وي کړي او حتی ځیني یي لا کولپس هم وي نو ځکه د ویني جریان پکي کم او یا هم هیڅ نه وي.

خو کله چي شخص په تمرین لاس پوري کړي نو د قلبي دهاني د لوړیدو په اثر یي ریوي فشار هم لوړیږي، او دا د فشار لوړوالي ددي سبب گرځي چي سږو ته د ویني جریان زیات شي او هغه کم متوسع او یا هم کولپس شعریه رگونه پراخه کړي، چي بلاخره دا ټول ددي باعث گرځي چي د سږو په پورتنی برخه کي ویني جریان شروع شي.

که څه هم د سږو د ویني جریان باندي د جاذبي د کشش قوه د پام وړ اثر غورځوي، خو پدغه جریان باندي د ویني د اکسیجن قسمي فشار هم له پامه نشو غورځولاي، د بدن په نورو برخو کي لکه چي د اکسیجن

مقدار کم شي نو داد Histamine، Bradykanine او نورو موادو  
افراز پواسطه د Vasodilatation سبب گرځي، خو په اسناخو کي د  
اکسيجن کموالي د Vasoconstriction سبب گرځي او دا چي ولي ددي  
علت لاتراوسه په مکمله توگه ندي په ډاگه شوي.

## د تنفس د تبادلې نسبت

### Respiratory Exchange Ratio

د نسجونو د  $CO_2$  د ورکړي او اکسيجن د اخستني نسبت ته د  
Respiratory Exchange Ratio (RER) وايي. چي په مختلفو حالتونو  
کي فرق کوي کله چي انسان يواځي قندونه د تغذيي په منظور استعمال  
کړي نو ددي نسبت قيمت 1، خو کله چي يواځي شحميات د غذا په  
منظور استعمال کړي نو قيمت يي 7 او که چيرته يواځي پروټينونه د  
تغذيي په منظور استعمال شي نو قيمت يي 0.803 دي. خو که چيرته يو  
شخص داسي غذا استعمال کړي چي هم قندونه، هم شحميات او هم  
پروټينونه ولري نو پدي وخت کي ددي نسبت قيمت 0.825 دي.

## تنفسي ضريب

# Respiratory Quotient

د نسجونو پواسطه په جذب شوي اوكسيجنې حجم باندي د هماغه نسجونو پواسطه د ازاد شوي كاربن داي اوكسايډ حجم ترمنځ نسبت ته تنفسي ضريب وائي.

ددي ضريب نارمل اندازه د غذا اخستلو يو ساعت وروسته د يو سره مساوي ده او دا ځكه چې په دغه وخت كې اخستل شوي قندونه په مصرف رسيري او داچې د قندونو RER د يو سره مساوي دي نو ځكه تنفسي ضريب يې 1 دي. د قندونو د مصرف څخه وروسته ددي ضريب اندازه 0.7 ده ځكه چې پدغه وخت كې شحميات په مصرف رسيري او هركله چې پروټين په مصرف ورسيري نو ددي ضريب اندازه 0.8 كيږي.

په داسې حال كې چې د تمرين په وخت كې تنفسي ضريب زياتيږي.

## څلورم فصل

### په ويني كې د اكسيجن او كاربن ډاي اوكسايډ انتقال

## Oxygen and Carbon Dioxide

### Transport in Blood

اوس د تنفسي سيستم د فزيولوژي په څيړنه كې دريم قدم پورته كوو او هغه دا چې هر كله اكسيجن ويني ته ورسیده نو دا اكسيجن بايد د ويني پواسطه نسجونو ته ورسيري او په مقابل كې د نسجونو څخه كاربن ډاي اوكسايډ سږو ته را انتقال شي.

اكسيجن په وینه كې په زیاته اندازي ( 98 % ) سره د هيموگلوبين پواسطه او پاتي برخه يې د ويني د پلازما پواسطه نسجونو ته ليردول كيږي، او كله چې نسجونو پواسطه كاربن ډاي اوكسايډ توليد شي نو دا كاربن ډاي اوكسايډ د هيموگلوبين سره د Bicarbonate پشكل نښلي او سږو ته انتقاليري.


داچې دغه پورته پروسه د كومو جزئياتو لرونكي ده ددې باندي پوهيدولو لپاره لاندي موضوعات څيرو:

## داکسیجن د نفوذ تفاوت

### Oxygen Diffusion Gradient

په هوائی کڅوړو کې د اکسیجن قسمي فشار تقریباً 104 mm Hg او په ریوي شعریه رگونو کې دا فشار 46 mm Hg دی چې د فشار دغه لور تفاوت ددې زمینه مساعدوي چې د اکسیجن نفوذ دی د هوائی کڅوړو څخه د وینې په طرف صورت ونیسي، او پدې ترتیب ریوي شعریه رگونو کې د اکسیجن قسمي فشار هم 104 mm Hg ته لوړیږي، چې دا قسمي فشار د ریوي شعریه رگونو تر وریدې نهایت ( Venous end of Pulmonary Capillaries ) پورې همداسې پاتې وي خو کله چې ریوي وریدو ته دا وینه ورسیري نو د Shunted وینې د گډیدو په اثر یې د اکسیجن قسمي فشار 95 mm Hg ته راښکته کیږي چې دغه گډي وینې ته Venous Admixture of Blood وائی.

د شعریه رگونو تر شریاني نهایت پورې د اکسیجن دا قسمي فشار همداسې پاتې وي، په بین البیني ( Interstitial Space ) کې د اکسیجن قسمي فشار 40 mm Hg ته او د حجري په داخل کې دا فشار تقریباً 23 mm Hg ته راښکته کیږي، نو پدې اساس د اکسیجن د شعریه رگونو څخه د Interstitial Space په لور او لدې څخه د حجرو په لور نفوذ کوي، چې په حجرو کې بیا د Aerobic میتابولیزم په اثر استعمالیږي (۱-۴ ش).



## د کاربن ډای اوکساید د نفوذ تفاوتونه

### Carbon Dioxide Diffusion Gradients

By- کاربن ډای اوکساید د حجرو د تنفسي بیکاره موادو ( Products ) په ډول د حجرو پواسطه تولیدیږي. د حجرو په داخل کې د کاربن ډای اوکساید قسمي فشار  $46 \text{ mm Hg}$ ، په بین البیني مسافه کې  $45 \text{ mm Hg}$ ، په شعریه رگونو په شریاني نهایت کې  $40 \text{ mm Hg}$ ، د شعریه رگونو په وریدي نهایت کې  $45 \text{ mm Hg}$  او په هوائی کڅوړو کې  $40 \text{ mm Hg}$  دی. نو پدې اساس کاربن ډای اوکساید د حجرو داخل څخه بین البیني مسافې ته، له بین البیني مسافې څخه وریدي شعریه



رگونو ته او لډي څخه هوائی کڅوړو ته او له هوائی کڅوړو څخه اتموسفیر ته انتقالیږي (۱-۴ شکل).

## هیموگلوبین او د اکسیجن انتقال

### Hemoglobin and Oxygen Transport


تقریباً % 98.5 اکسیجن په وینه کې د هیموگلوبین پواسطه او پاتی نور ( % 1.5 ) ئی د وینې د پلازما پواسطه انتقالیږي. د هیموگلوبین سره د اکسیجن اتصال یو رجعي تعامل دی چې په سږو کې اکسیجن د هیموگلوبین سره یو ځای او په نسجی مسافه ( Tissue Space ) کې د هیموگلوبین څخه بیل او نسجونو ته ننوځي.

که چیرته ۲-۴ شکل ته زیر شو نو بنکاری شي یوه هوائی کڅوړه د یوه Pulmonary Capillary ترڅنګ پروت او د سنخي هوا او ریوي وینې تر منځ اکسیجن د مالیکولونو نفوذ په ګوته کوي. لیدل کیږي چې په سنخ کې د اکسیجن قسمی فشار 104 mm Hg دي، پداسي حال کې چې وریدي وینه چې په Pulmonary Capillary کې جریان لري په خپل شریاني نهایت کې د اکسیجن د 40 mm Hg قسمی فشار لرونکي ده، او داځکه چې دي وینې د خپل اکسیجن زیات مقدار محیطي انساجوته لادمخه ورکړي دی، بناً لومړني تفاضلي فشار چې د اکسیجن د نفوذ سبب ګرځي داسي معلومو:

ریوي شریاني فشار - په هوائی کڅوړو کې د اکسیجن فشار = اکسیجن تفاضلي فشار

$104 \text{ mm Hg} - 40 \text{ mm Hg} = 64 \text{ mm Hg}$  = اکسیجن تفاضلي فشار

خو که د گراف لاندیني برخي ته زیر شو نو بسکاري چي اکسیجن ددغه تفاضلي فشار په اساس په څومره چټکي له اسناخو څخه ویني ته نفوذ کوي او دلته ئي  $PO_2$  په چټکي سره لورېږي. که شکل ته ځیر شو نو وبه گورو چي کله چي وینه د کیپلري تقریباً  $1/3$  برخه طي کوي نو د اکسیجن قسمي فشار يي د سنخ د اکسیجن له قسمي فشار سره مساوي کیږي يعني  $104 \text{ mm Hg}$  ته رسیږي.



خو دا چي د ورزش په وخت کي اکسیجن ته د بدن ضرورت شله ځله زیاتېږي نو که څه هم دا وخت له یوي خوا قلبي دهانه زیاتېږي خوله بلي خوا په ریوي شعريه رگونو کي د چټک دوران له کبله د ویني تم کیږي وخت هم د نارمل نیمایي ته کمیږي چي تر څنګ يي یو لړ کولیس شعريه رگونه هم خلاصیږي.

بنا دويښي اکسيجن اشباع دنوموړو دواړو فکتورونو پواسطه متاثره کيداي شي. نو دا چې څرنگه د ورزش په وخت کې دا مشکل حل شي يعنې په همدغه لږ وخت کې څنگه ډيره وينه په اکسيجن اشباع شي د اکسيجن د نفوذ لپاره يو ساتندويه عامل ( Safety Factor ) ته ضرورت دی، چې په لاندي ډول يې څيرو:


دمخه مو وويل چې د ورزش په وخت کې د اکسيجن د نفوذ ظرفيت د نارمل په نسبت درې ځلي لوړيږي چې دا کار له دوه لارو څخه صورت نيسي، يو دا چې په نفوذ کې دبرخه لرونکو شعريه رگونو ( Capillaries ) ساحه پراخيري او بل داچې  $AV/Q$  ( Ventilation ) د Perfusion (نسبت) د سږو په پورتنيو برخو کې لوړيږي.


لکه چې په ۲-۴ شکل کې ښکاري کله چې وينه د شعريه رگونو د طول د هوايي کڅوړي تر څنګ طي کوي د وخت په هغه اندازه کې چې وينه د شعريه رګ ( Capillary )  $1/3$  برخه طي کړي نو د اکسيجن پواسطه په پوره اندازي سره مشبوع کيږي او پاتې  $2/3$  برخه د وخت کې چې څومره اکسيجن نفوذ کوي چې وزگار او خوشي يې گنلي شو يعنې وينه په نورمال ډول د سږو په شعريه رگونو کې درې چنده له هغه وخت نه زياته پاتې کيږي کوم چه باندي د اکسيجن د اشباع لپاره ضروري دی. نو که دغه سرعت د نارمل درې چنده هم شي بيا هم د په اکسيجن باندي د اشباع مسله کوم د مشکل سره نه مخ کيږي.

اوس کله چې شرياني وينه محيطي انساجو ته ورسيري د اکسيجن قسمي فشار يې لا هم 95 mm Hg وي لکه چې په ۳-۴ شکل کې ښکاري. دغلته په بين الخلاي مایع کې چې د نسج د حجراتو په چاپير کې قرار لري د اکسيجن قسمي فشار له 40 mm Hg څخه عبار

دی. او دا حالت په کافي ډول د فشار تفاضل په گوته کوي کوم چي د شعريه رگ ( Capillary ) له شرياني نهايت څخه بين الخلاي مایع ته د اکسیجن د نفوذ لپاره په کار دي. ځکه نو اکسیجن په ډیره چټکۍ او تر هغي له شرياني نهايت نه بين الخلاي مایع ته نفوذ کوي تر څو چي قسمي فشار يي له هغي سره مساوي شي ( 104 mm Hg ). ځکه نو د دغو شعريه رگونو ( Capillaries ) وریدي نهايت د داسي اکسیجن لرونکي دي چي قسمي فشار يي 40 mm Hg دی.

که یو نسج ته د ویني جریان زیات شي په حقیقت کي په یوه معین وخت کي دغه نسج د اکسیجن یو زیات مقدار رسیري او پدي ډول نسجي  $PO_2$  يي لوړیږي. دا وضعه په ۳-۴ شکل کي توضیح شوي، داسي چي که د ویني جریان له نورمال حالت څخه % 400 زیات شي، نسجي  $PO_2$  به له 40 mm Hg نه 66 mm Hg ته لوړ شي، خو هغه اعظمي حد چي  $PO_2$  ورته په انساجو کي د ویني زیات جریان له وجي لوړیداي شي له 95 mm Hg څخه عبارت دی، ځکه چي دا د شرياني ویني د اکسیجن قسمي فشار دی یعني نسجي او شرياني  $PO_2$  به سره مساوي شوي. اوس نو که حجرات له نارمل څخه زیات اکسیجن د خپلو استقلابي وتیرو لپاره استعمال کړي د بین الخلاي مایعاتو د اکسیجن مقدار به کم شي دا حالت هم په ۳-۴ شکل کي بنودل شوي.





۳-۴ ش

په لنډ ډول ویلي شوي چې نسجي  $PO_2$  د دوه فکتورونو پواسطه په موازنه کې ساتل کېږي:

- دهغه اکسیجن اندازه چې دویني پواسطه نسج ته رسول کېږي.
  - د هغه اکسیجن اندازه چې د نسج پواسطه تری گټه اخستل کېږي.
- یعني نسج ته د ویني په وسیله د رسیدونکي اکسیجن او د نسج پواسطه د استعمالیدونکي اکسیجن د اندازو پواسطه  $PO_2$  په موازنه کې ساتل کېږي.



اوس دا چي د حجرو په داخل کي د اکسيجن قسمي فشار کم ( 5- 40 mm Hg په اوسط ډول 23 mm Hg) دي نو اکسيجن د بين الخلائي مسافي څخه داخل د حجراتو ته داخليري او په داخل د حجرو کي د کيمياوي تعاملاتو تر سره کولو لپاره 1-3 mm Hg فشار د اکسيجن ته ضرورت دي، دا عدد د 23 په نسبت ډير کوچني دي نو بنا پردي 23 mm Hg يو لوي ساتندويه فکتور ( Safety Factor ) دی.

اوس که چيرته د کاربن داي اوکسايډ په انتقال وغريږو نو کله چي د حجرو پواسطه اکسيجن په مصرف ورسيري، کاربن داي اوکسايډ توليد او دا کار د حجري په داخل کي د کاربن داي اوکسايډ قسمي فشار د نسجي شعريه رگونو د کاربن داي اوکسايډ د قسمي فشار په نسبت پورته وړي، ځکه نو کاربن داي اوکسايډ له نسج نه نسجي شعريه رگ ته نفوذ او له هغه ځايه د ويني پواسطه سږو ته ورل کيږي. په سږو کي له ريوبي شعريه رگونو څخه هوايي کڅوړو ته نفوذ کوي او پدي ډول د کاربن داي اوکسايډ نفوذ د سږو په حذا کي د اکسيجن په مخالف لوري صورت نيسي، خو يو غټ فرق چي د کارن داي اوکسايډ نفوذ يي د اکسيجن دنفوذ په پرتله لري دا دي چي د کاربن داي اوکسايډ د نفوذ سرعت د اکسيجن له نفوذ سرعت څخه شل ځله زيات دی او له همدې کبله د نفوذ لپاره يی تفاضلي فشار د اکسيجن په نسبت کم دی، چي په لاندي ډول دی:

✓ د حجري په داخل کي د کاربن داي اوکسايډ قسمي فشار 46 mm Hg او په بين الخلائي ميعاتو کي 45 mm Hg دی بناً تفاضلي فشار يي يوازي 1 mm Hg دی (۴-۴ شکل).

✓ د انساجو په شرياني وينه كې د كاربن ډاي اوكسايډ قسمي فشار  
40 mm Hg او همدغلته يعني د انساجو د وريدي ويني قسمي فشار 45  
mm Hg دی (۴-۴ شکل). د نسجی وريدي شعريه رگونو، د كاربن ډاي  
اوكسايډ قسمي فشار په پاي كې د بين الخلائي مايعاتو د كاربن ډاي  
اوكسايډ له قسمي فشار سره مساوي كيږي.

✓ د هغه وريدي ويني د كاربن ډاي اوكسايډ قسمي فشار چې د  
Pulmonary Capillaries په شرياني نهاياتو كې 45 mm Hg، د  
سنخي هوا دكاربن ډاي اوكسايډ له قسمي فشار 40 mm Hg دی، بناً  
يوازي 5 mm Hg تفاضلي فشار د نفوذ لپاره وجود لري لكه څنگه چې  
په ۴-۴ شكل كې ښكاري د Pulmonary Capillaries د كاربن ډاي  
اوكسايډ قسمي فشار د سنخي هوا د كاربن ډاي اوكسايډ له قسمي فشار  
سره ډير ژر مساوي كيږي يعني هغه فاصله چې په مخ كې يې لري،  
يوازي په لومړي 1/3 واټن كې دا مساوات اعاده كيږي او دا كار لكه  
چې دمخه مو وويل همغسې دی لكه د اكسيجن لپاره، خو په دومره توپير  
چې دلته لوري د اكسيجن خلاف دی.




شکل ۴-۴

نسجي ميتابوليزم او نسج ته د ويني د جريان اندازه د کاربن ډای اوکساید په قسمي فشار باندې داکسيجن سرچپه اغيزي لري لکه په ۴-۵ شکل کې ښکاري او په لاندي ډول ډول دی:



✓ که چیرته د نارمل A نقطې څخه د وینې د جریان B نقطې ته تقریباً د  $1/4$  په اندازه راکم شي نو نسجی  $PO_2$  له نارمل څخه به 60 mm Hg ته لوړ شي، خو برعکس که د وینې جریان د نارمل په نسبت شپږ چنده زیات شي (C) نو  $PO_2$  به له خپل نارمل حد نه 41 mm Hg ته راښکته شي یعنی تقریباً د شریاني وینې د  $PCO_2$  سره برار شي (-۴ ش ۵).

✓ که نسجی میتابولیزم لس چنده لوړ شي د بین الخلاي مایعاتو د کاربن داي اوکساید قسمي فشار به هم ورسره زیات شي، که څه هم د وینې جریان هر څومره زیات شي. په داسي حال کي چي که دا میتابولیزم  $1/4$  ته کم شي د بین الخلاي مایعاتو د کاربن داي اوکساید قسمي فشار به 41 mm Hg ته راښکته شي، او لږي څخه نشي کمیدي، ځکه چي شریاني  $PCO_2$  هم 40 mm Hg دی.



## په وینه کې د اکسیجن انتقال

لکه څنګه مو مخکې واورل په نارمل حالت کې تقریباً 98.5 %

اکسیجن له سږو نه انساجو ته د RBC د هیموګلوبین پواسطه د یو کیمیاوي اتصال له مخې او پاتې 1.5 % یې د پلازما او د حجرو د اوبو پواسطه وړل کېږي. ددغې فیصدي له مخې ویلي شو چې په نارمل ډول د اکسیجن د انتقال مسولیت د هیموګلوبین په غاړه دی.

## د هیموګلوبین سره د اکسیجن مکرر یو ځای کیدل


څرنګه چې د هیموګلوبین له کیمیاوي جوړښت څخه پوهیږو چې د اکسیجن مالیکول د هیموګلوبین د Heme له برخې سره یو سست او رجعي اتصال جوړوي. کله چې د اکسیجن قسمي فشار لوړ وي، لکه په ریوي شعریه رګونو کې اکسیجن له هیموګلوبین سره نښلي خو کله چې د اکسیجن قسمي فشار کم وي لکه په نسجي شعریه رګونو کې نو بیا اکسیجن له هیموګلوبین څخه خوشي کېږي چې همدا میخانیکت له سږو څخه انساجو ته د اکسیجن د لیریدني بنسټ جوړوي.

که چیرته ۶-۴ الف شکل ته ځیر شونو په اکسیجن هیموګلوبین منحنی کې ښکاري چې که چیرته په مترقي ډول سره د هیموګلوبین هغه فیصدي چې له اکسیجن سره نښلي او ورسره سم د وینې د اکسیجن قسمي فشار هم لوړیږي او دې ته د هیموګلوبین د اشباع فیصدي یا Hemoglobin Saturation Percentage وايي. او لکه چې دمخه مو هم وویل، هغه وینه چې له سږو څخه وځي او چاپیریالي دوران ته ځي د اکسیجن قسمي فشار یې د 95 mm Hg، چې د هیموګلوبین اشباع فیصدي یې 97 راځي، خو په نارمل ډول چې کله دا وینه د وریدي وینې په نوم بیرته سږو ته ځي د اکسیجن قسمي فشار یې 40 mm Hg او د


هيموگلوبين اشباع فيصدي يي 75 وي. د اکسيجن هغه اعظمي اندازه چي د ويني له هيموگلوبين سره يو ځاي کيداي شي، په لاندي محاسبو کی خلاصه کوو، له هغه ځايه چي د يو فزيولوژيک شخص وينه په خپل هر 100 cc اندازه کي 15 gr هيموگلوبين لري او هر گرام هيموگلوبين په اعظمي ډول د 1.34 cc اکسيجن د وړلو قابليت لري بيا اوس که 15 gr په 1.34 cc کي ضرب کړو 20.1 په لاس راځي او دا محاسبه دا معني چي د 100 cc ويني هيموگلوبين په نارمل ډول په اعظمي شکل 20 cc اکسيجن وړي شي چي دا وخت به د هيموگلوبين د اشباع فيصدي سل وي چي د Twenty Volumes Percent پنامه ياديري ( 6-4 شکل). اوس که چيرته په انساجو کي داکسيجن هغه اندازه معلومول وغواړو کوم چي هيموگلوبين يي خوشي کوي، نو داسي محاسبه کووچي: لکه څرنګه چي پوهيرو په نارمل ډول 100 cc وينه په هغه صورت کي چي د هيموگلوبين د اشباع فيصدي يي 97 وي، 19.4 cc اکسيجن وړلای شي ( 6-4 ب شکل)، کله چي دا وينه د نسجي شعريه رګونو څخه تيريري د اکسيجن اندازه يي 14.4 cc ته، د اشباع فيصدي 75 ته او د اکسيجن قسمي فشار يي 40 mm Hg ته رابنکته کيري، بيا په نارمل ډول يوازي 5 cc اکسيجن د هر 100 cc ويني پواسطه انساجو ته وړل کيري.

لکه څنګه چي پوهيرو چي په شديدو عضلي فعاليتونو کي د عضلي حجرو په واسطه د اکسيجن مصرف زياتيري، نو د بين الخالي مايعاتو (Interstitial Fluid) د اکسيجن قسمي فشار د 40 mm Hg څخه 15 mm Hg ته رابنکته کيري چي پدي فشار کي له هيموگلوبين سره يوازي 4.4 ml اکسيجن په 100 cc وينه کي ترلي پاتي کيري (4-6 ب شکل)، بيا 15 cc اکسيجن د هر 100 cc ويني پواسطه انساجو ته

ليږدول کيږي چي نارمل (په نارمل حالت کي 5 cc اکسيجن انساجو ته رسيږي) له دري چنده سره سمون خوري (  $19.4 \text{ cc} - 4.4 \text{ cc} = 15 \text{ cc}$  ). دا هم د يادوني وړ ده چي که چيرته ضرورت شي نو قلبي دهانه ( Cardiac Output ) هم له شپږو څخه تر اوو چنډو پوري خپل اکمالات لوړوي لکه په منډي وهونکو کي. که د قلبي دهاني ( Cardiac Output ) دا عدد او د اکسيجن د انتقال نوموړی عدد سره ضرب کړو ( $3 \times 7 = 21$ ) تقريباً 20 لاسته راځي چي دا دا معنی لري چي انساجو ته د نارمل په نسبت تر 20 چنده پوري د اکسيجن اکمالات زياتيداي شي او پدي ميکانيزم او يو لړ نورو ميخانيکتونه (راتلونکی صفحه وگوري) ددي موجب گرځي چي د شديدو تمرينونو او د سختو فزيکي فعاليتونو په وخت کي نسجي  $PO_2$  ثابت وساتي.



۴-۶ الف شکل



دویني هغه فیصدي چي په انساجو کي خپل اکسیجن له لاسه ورکوي د مصرف ثابت ( Utilization Coefficient ) پنامه یادیري. دا عدد په نارمل ډول 25 % دی یعنی که خپلو مخکینو محاسبو ته پام وکړو نو وبه گورو چي یوازي 25 % وینه په عادي حالاتو کي انساجو ته د اکسیجن په رسولو کي مصروفه ده او لکه چي ومو ویل په شدیدو فزیکي فعالیتونو او یا سختو تمرینونو کي دا عدد له 75 - 85 % پوري لوریري. په موضعي ( Local ) ډول په یوه ساحه کي چي د ویني جریان یي کم، خو متیابولیک فعالیتونه یي زیات وي نوموړی عدد حتی تر 100 % پوري لوریدای شي، پدي معني چي وینه سل په سلو کي خپل ټول اکسیجن پدغه ساحه کی له لاسه ورکړای دی.

## د نسجي $PO_2$ په ثابت ساتنه کې د هیموگلوبین اغیزه:

برسیره پردې چې هیموگلوبین انساجو ته د اکسیجن د انتقال دنده پر غاړه لري یوه بله دنده هم ترسره کوي کوم چې د ژوند د پایښت لپاره ضروري ده، چې هغه د نسجي اکسیجن غلظت ثابت ساتلو څخه عبارت ده یعنې هیموگلوبین دی چې نسجي  $PO_2$  ثابت ساتي او دا کار په لاندې میخانیکیت سره ترسره کوي: لکه چه دمخه مو څو ځلي وویل چې په نارمل حالاتو کې کله چې وینه له یوه نسج څخه تیریري له هر 100 cc ویني څخه یوازي 5 cc اکسیجن مصرفیري. که چیرته ۶-۴ ب شکل کې د اکسیجن هیموگلوبین بیلټون منحنی ته ښه ځیر شو وبه گورو چې کله نوموړي پېښه رامنځته شي نو د ویني د اکسیجن قسمي فشار تقریباً 40 mm Hg ته رسیږي او نسجي  $PO_2$  هم په نورمال حالاتو کې همدومره راواخله او لږې څخه نشي لوریدای، ځکه که فرضاً داسې وشي، نو بیا خو انساجوته د ویني له هیموگلوبین څخه اکسیجن نشي ورتلی، لږې کبله هیموگلوبین پواسطه نسجي  $PO_2$  په خپل اعظمي حد یعنې 40 mm Hg کې ساتل کیږي.

لکه چې ومو وویل، په شدیدو فزیکي فعالیتونو او سپورتونو کې د اکسیجن مصرف شل ځله هم د نارمل څخه زیات شي بیا هم دا کمال د هیموگلوبین پواسطه تر سره کیږي چې په نسجي  $PO_2$  کې ډیر لږ کمښت په سترگو کیږي ( 15-25 mm Hg ). البته ددې کار لاملون دوه دي:

- يو د اکسیجن هیموگلوبین بیلتون منحنی د Steep Slope له کبله.
- په کمه اندازه د نسجي  $PO_2$  کموالی پر بنسټ انساجو ته د ویني د جریان زیاتوالي.

کله چې د نسجي  $PO_2$  لږ کمښت هغه نسج ته د زیاتې ویني د تګ باعث شي، نو بیا د اکسیجن همدغه کم قسمي فشار ددې سبب ګرځي چې د ویني د هیموگلوبین څخه زیات اکسیجن واخلي.

بناً انساجو ته د ویني پواسطه د اکسیجن رسول پداسې طریقه کيږي چې نسجي  $PO_2$  په خپل اندي ډول له 15–40 mm Hg تر منځ وساتل شي. که چیرې د اکسیجن قسمي فشار په اتموسفیري هوا کې د پام وړ تغیر وکړي د هیموگلوبین ثابت ساتلو (Hemoglobin Buffer) رول به لا بیا هم په صحنه کې حاکم او د انساجو د اکسیجن قسمي فشار به چندان تغیر ته پري نه ږدي د مثال په ډول:

پوهیږو چې نارمل سنخي  $PO_2$  له 104 mm Hg نه عبارت دی خو که څوک یو لوړ غره ته وځي او یا په الوتکه کې لوړې ارتفاع ته ولاړ شي، چیرته چې په اتموسفیر کې د اکسیجن قسمي فشار د نارمل له نیمایي نه هم کم وي او یا برعکس یو څوک په داسې یوه بنده محوطه کې چې هوا یې Compressed شوي وي یا د سمندر د سطحې لاندي ژوروالي کې قرار ولري او یا په یوه Pressurized Chamber کې وي چیرته چې د اکسیجن قسمي فشار د نارمل په پرتله تر لس چنده پورې لوړ وي بیا هم پدې ټولو حالاتو کې (د اکسیجن د قسمي فشار زیاتوالی او کموالی) د انساجو د اکسیجن قسمي فشار چندان نه اغیزمنیږي او هغه پدې ډول چې په ۴-۶ الف شکل کې د اکسیجن

هیموگلوبین بیلتون منحنی څخه بنکاري چي که سنخي  $PO_2$ ، 60 mm Hg ته کم شي شرياني هیموگلوبین به 89% اشباع شي، کوم چي د نارمل (97%) په پرتله يوازي 8% کم دی او انساج به اوس هم د پخوا پشان له هر 100 cc ويني څخه هماغه 5 cc اکسیجن ترلاسه کړي چي پدي ډول به زور ورپدي ويني ته ووزي او اوس به نو د ورپدي ويني د اکسیجن قسمي فشار د 40 mm Hg پرځای 32 mm Hg وي. دا د نسجي  $PO_2$  په اصطلاح سخت تغيرات دی پداسي حال کي چي سنخي  $PO_2$  بڼه د پام وړ تیت شوي وي (له 104 mm Hg څخه 60 mm Hg ته) برعکس کله چي سنخي  $PO_2$  حتی 500 mm Hg ته لوړ شي، د هیموگلوبین د اشباع اعظمي فيصدي به د 97 پر ځاي 100 شي يعني يوازي شي يعني يوازي 3% فرق کوی (يو څه اندازه به د ويني د منحل اکسیجن مقدار هم لوړ شي) او کله چي دا وینه انساجو ته ولاړه شي، يوڅو سی سی اکسیجن به له لاسه ورکړي او ورپدي وینه به يوازي يو څو mm Hg د نارمل حد نه لوړ  $PO_2$  ولري. د پورته توضیحاتو نتیجه په ډیر روښانه ډول د هیموگلوبین د نسجي اکسیجن د ثابت ساتلو په هلکه کره ثبوت وړاندي کوي.

داکسیجن او هیموگلوبین اتصال د لاندي فکتورنو پواسطه متاثره کيږي.

## 1. داکسیجن د قسمي فشار اغیزه:

هغه لمړني فکتور چي د اکسیجن او هیموگلوبین اتصال باندي اغیزه کوي د اکسیجن د قسمي فشار څخه عبارت دی. د اکسیجن هیموگلوبین د تجزئي منحنی (Oxygen Hemoglobin Dissociation Curve) د اکسیجن په هر قسمي فشار کي د هیموگلوبین اشباع حالت بنیي، او هغه




هيموگلوبين مشبوع کيږي چي اکسيجن اټوم يو له هغه څلور ماليکوله د Heme سره يو ځاي شي کوم چي د هيموگلوبين په جوړښت کي شتون لري. کله چي د اکسيجن قسمي فشار د 88 mm Hg څخه لوړ وي نو ددي اکسيجن پواسطه % 95 هيموگلوبين مشبوع کيږي، او دا چي په ريوبي شعريه رگونو کي د اکسيجن قسمي فشار 104 mm Hg دی نو ځکه % 98 هيموگلوبين ددي اکسيجن پواسطه مشبوع کيږي (۷-۴ش).

په نارمل استراحت حالت کي هغه وينه چي د اسکليني عضلاتو څخه بيرته راځي 40 mm Hg قسمي فشار لري چي ددي پواسطه % 75 هيموگلوبين مشبوع کيږي او پدي ترتيب % 23 د هيموگلوبين سره نښتي اکسيجن ازاديري، چي دا اندازه دپته کفايت کوي چي نوموړی اکسيجن نسجونو ته نفوذ وکړي. خو کله چي انسان شديد تمرينات تر سره کوي نو په ويني کي د اکسيجن قسمي فشار حتی تر 15 mm Hg پوری رسيري، چي ددي پواسطه % 25 هيموگلوبين مشبوع کيږي، او پدي ترتيب % 73 اتصالي اکسيجن ازادوي. نو کله چي اکسيجن ته ضرورت زيات شي نو په ويني کي د اکسيجن قسمي فشار کميږي او دا ددي سبب گرځي چي زياته اندازه اکسيجن ازاد شي.

## 2. د pH اغيزه:


دوهم فکتور چي د اکسيجن او هيموگلوبين پيوستون باندي اغيزه کوي د ويني د pH څخه عبارت دي، چي نوموړی فکتور ددغه پيوستون سره مستقماً متناسب دي چي د ويني د pH په ډيروالي سره د اکسيجن او هيموگلوبين ترمنځ پيوستون ډيريږي، او د ويني د pH په کمښت سره دغه پيوستون کميږي. دا چي ولي دا تغير منځته راځي علت ئي داسي بيانوو چي: دويني pH کموالي په حقيقت کي په وينه کي د هايډروجن د

ایون زیاتوالی دي چي د هایدروجن ایون زیاتوالی ددي سبب ګرځي چي د هیموګلوبین د پروتیني برخي سره یو ځای او ددي پروتین دري بده جوړښت ته تغیر ورړي، چي دا تغیر بیا ددي سبب ګرځي چي د هیموګلوبین او د اکسیجن د پیوستون په لاره کي خنډ پیداګرځي خو کله چي بیا د ویني pH لوړ شي نو د هایدروجن ایون کموالي باندي دلالت کي، او ددي ایون کموالي بیا د اکسیجن او هیموګلوبین پیوستون د مخي خنډ له منځه وړي. داچي دا تاثیر لمړي ځل لپاره د Christian Bhor پواسطه و څیړل شو نو ځکه دغه د pH اغیزه د Bhor effect پنامه یادیري.



### 3. د کاربن داي اوکساید د قسمي فشار اغیزه:


دریم فکتور چې د اکسیجن او هیموگلوبین په پیوستون باندې اغیزه کوي د کاربن داي اوکساید د قسمي فشار څخه عبارت دی، چې دا فکتور ددې پیوستون سره معکوساً متناسب دی، پدې معنی چې د  $\text{PCO}_2$  په ډیرښت سره د اکسیجن او هیموگلوبین پیوستون وړتیا کمېږي او د  $\text{PCO}_2$  په کمښت سره بیا دا وړتیا زیاتېږي. دا فکتور په غیر مستقیم ډول سره د pH په تغیر سره د اکسیجن او هیموگلوبین پیوستون باندې اغیزه کوي داسې چې: دویني په RBC کې یو انزایم د Carbonic Anhydrase پنامه شتون لري چې دا انزایم یو رجعي تعامل په لاندې ډول کتلايز کوي (۸-۴ شکل).



نو کله چې  $\text{PCO}_2$  لوړ شي نو زیات شمیر هایدروجن ایونونه تولیدېږي چې د pH د کمښت سبب ګرځي او pH کمښت د اکسیجن او هیموگلوبین پیوستون د کمښت سبب ګرځي، خو برعکس د  $\text{PCO}_2$  کموالي د هایدروجن د ایونو دکموالي سبب ګرځي چې دا بیا د pH ډیرښت سبب ګرځي او د pH د ډیرښت سره د اکسیجن او هیمو گلوبین پیوستون زیاتوالي پیدا کوي.


نو کله چې وینه دنسجي شعریه رګونو څخه تیرېږي دلته کاربن داي اوکساید ویني ته داخلېږي، او د ویني د کاربن داي اوکساید اندازه لوړېږي نو ځکه پدغه ځای کې هیموگلوبین ډیر اکسیجن له لاسه ورکوي نسبت هغه ځای ته چېرته چې کاربن داي اوکساید نه وي، او کله چې وینه سږو ته راستنه شي نو دلته کاربن داي اوکساید د شعریه رګونو څخه هوآي کڅوړو ته انتقالېږي او په وینه کې د کاربن داي اوکساید

اندازه کمیري او دا ددي سبب گرځي چي د اکسیجن یو ځای والي د هیموگلوبین سره زیات شي.



#### 4. حرارت:


څلورم فکتور چي د اکسیجن او هیموگلوبین پیوستون باندي اغیزه کوي، هغه د حرارت درجه ده، چي د حرارت په زیاتوالي سره دا پیوستون کمښت پیدا کوي او دحرارت د درجي په کموالي سره دا پیوستون قوي کیږي. هرکله چي حرارت درجه لوړه شي نو د حجري فعالیت هم ډیریري، او زیات اکسیجن ته ضرورت پیداکیږي. خوکله چي د حرارت درجه ښکته شي د حجري فعالیت هم کمیري او کم اکسیجن ته ضرورت لیدل کیږي(۹-۴ شکل).



هرکله چي د اکسیجن او هیموگلوبین پیوستون کمزوري شي نو د اکسیجن هیموگلوبین تجزئي منځني بني خواته بیخایه کیري او پدي ترتیب زیات اکسیجن د هیموگلوبین څخه ازادیري. د تمرین په وخت کي د کاربن داي اوکساید او لکتیک اسید د تجمع او د حرارت د درجي د زیاتوالي له وجي دغه منځني بني خواته ځي. چي پدغه وخت کي تقریباً 75-85 % پوري اکسیجن د هیموگلوبین څخه ازادیري. خو د بلي خوا چي په سرو کي د کاربن داي اوکساید او لکتیک اسید تجمع کمه او حرارت درجه

بسکته ده نو ځکه د اکسیجن هیموگلوبین تجزئې منحنی یې چپ خواته ځي او پدې ترتیب د اکسیجن او هیموگلوبین د پیوستون لپاره ډیره زمينه مساعدیږي (۹-۴ ش).

په استراحت حالت کې د وینې هر 100 ml پواسطه 5 ml اکسیجن انتقالیږي. او دا چې دقلبي دهاني ټوله اندازه 5000 ml ده نو پدې ترتیب په یوه دقیقه کې 250 ml اکسیجن انتقالیدلای شي. خو د تمرین په وخت کې چې اکسیجن ته زیات ضرورت حس کیږي نو ځکه 15 چنده یې انتقال اندازه هم لورېږي، یعنی د تمرین په وخت کې د اکسیجن د انتقال اندازه 3750 ml پوري لورېږي خو هغه لوبغاري چې ډیر زیات تمرین کوي په دوي کې د اکسیجن د انتقال اندازه په یوه دقیقه کې تر 5000 ml پوري لوریدلای شي (۹-۴ ش).



## 5. د BPG (DPG) اغیزه:

پنځم فکتور چې د اکسیجن او هیمو گلوبین پیوستون باندي اغیزه کوي د BPG (2,3 Bisphoglycerate) څخه عبارت دی، چې دا هغه مواد دي چې په RBC کي د انرژدي د تولي په منظور د گلوکوز د تجزئي څخه منځته راځي او بیا د هیموگلوبین سره وصلیږي او دا وصلیدنه د اکسیجن د پیوستون مانع سبب گرځي. نو کله چې BPG کم وي د اکسیجن او هیموگلوبین پیوستون قوي او که BPG زیات وي نو داکسیجن او هیموگلوبین پیوستون کمزوري وي.

هغه خلک چې په لوړو ارتفاعاتو کي اوسیږي د BPG اندازه یي زیاته وي نو پدي ترتیب پدي خلکو کي د اکسیجن او هیموگلوبین پیوستون هم کمزوری وي او اکسیجن ډیر ازادیږي.


هغه وینه چې د بدن څخه بهر ساتل کیږي د BPG مقدار ئي کمیږي، نو ځکه د Transfusion عمل په وخت باید ددغه موادو د غلظت ثابت ساتل ضروری دي.

## 6. د کاربن مونو اوکساید اغیزه:

شپږم فکتور چې د اکسیجن او هیموگلوبین په پیوستون باندي اغیزه کوي د کاربن مونو اوکساید څخه عبارت دی.

دا چې کاربن مونو اوکساید د هیموگلوبین په هماغه ځای پوري نښلی چیرته چې اکسیجن وی، ځکه نو باید د ځان په خاطر اکسیجن بیځایه کړي، او دا کار کولی هم شي، ځکه چې د کاربن مونو اوکساید د یو ځای کیدو امکانات له هیموگلوبین سره د اکسیجن په نسبت 250 ځله

زیات دی، کوم چي په ۱۰-۴ شکل کي په کاربن مونو اوکساید-  
هیموگلوبین تجزئي منحنی کي ښکاري.



۱۰-۴ شکل

دا شکل عیناً لکه د اکسیجن هیموگلوبین تجزئي منحنی پشان دی،  
یوازې په دومره فرق چي دلته د کاربن مونو اوکساید فشار د  $1/250$  په  
واحد اکسیجن هیموگلوبین تجزئي منحنی په پرتله ښودل شوي دی. بنا  
پردي په اسناخو کي د کاربن مونو اوکساید قسمي فشار د  $0.4 \text{ mm Hg}$   
په اندازه، چي د نارمل سنخي  $\text{PO}_2$  له  $1/250$  می برخي سره سمون  
خوری، د همدغه نارمل سنخي  $\text{PO}_2$  ( $104 \text{ mm Hg}$ ) په اندازه زور او  
قوت لري، ځکه نو په همدغو فشارونو سره نیم هیموگلوبین د کاربن  
مونو اوکساید او پاتي نیم هیموگلوبین د اکسیجن په وسیله اشغاليري.



که  $PCO_2$  ، 0.6 mm Hg ته لوړ شي نو په حجرو به اغيزه وکړی. که خپلو توضیحاتو ته ښه ځیر شو نو پوه به شو چې په کاربن مونو اوکساید مسموم ناروغان د خالص اکسیجن پواسطه تداوی کيږي، ځکه چې اکسیجن د کاربن مونو اوکساید پواسطه بیخایه کيږي همداسې کولای شو چې د اکسیجن پواسطه کاربن مونو اوکساید بیخایه کړو، خو د یادوني وړ ده چې د خالص اکسیجن پواسطه د تداوی په وخت کې باید 5% کاربن ډای اوکساید هم شتون ولري ځکه چې کاربن ډای اوکساید د تنفسي مرکز لپاره تر ټولو غوره تنبه ده، چې د سنخي تهوي (Pulmonary Ventilation) د زیاتوالی سبب ګرځي او دا کار بیا په خپل وار د سنخي کاربن مونو اوکساید د ښکته کیدو لامل وګرځي.

دا ګډه (Oxygen – Carbon Dioxide Treatment) د کاربن مونو اوکساید د تسمم په واقعاتو کې له ویني څخه د کاربن مونو اوکساید د لیري کولو عملیې ته 10 چنده سرعت ورکوي (نظر هغه حالت ته چې دا ډول یې درملنه ونشي).

## رشيमी هيموگلوبين Fetal Hemoglobin

هرکله چي د رشيمن وينه د پلاستنا څخه تيريري، نو پدغه ځاي کي اکسيجن د مور له وينی څخه د رشيمن وينی ته او کاربن ډای اوکسايډ د رشيمن له وينی څخه د مور وينی ته انتقاليري. د رشيمن هيموگلوبين د اکسيجن د رانيولو لپاره نسبت د مور هيموگلوبين ته ډير ليوال دی او دا ځکه چي:

- (1) د رشيمن هيموگلوبين غلظت د مور د هيموگلوبين په نسبت 50% لوړ دي.
- (2) د رشيمن هيموگلوبين مور له هيموگلوبين سره فرق کوي. د رشيمن د اکسيجن هيموگلوبين تجزي منحنی د مور د اکسيجن هيموگلوبين د تجزي منحنی چپ خواته واقع ده، نو پدي ترتيب د رشيمن هيموگلوبين په يو  $PO_2$  کي د مور د هيموگلوبين په نسبت ډير هيموگلوبين لري.
- (3) BPG د رشيمن په هيموگلوبين باندې کمه اغيزه لري، پدي ترتيب BPG د اکسيجن د ازاديدو سبب نه گرځي.
- (4) د  $CO_2$  انتقال د رشيمن وينی څخه د مور وينی ته ددي سبب گرځي چي د رشيمن د اکسيجن هيموگلوبين تجزي منحنی د مور د اکسيجن هيموگلوبين د تجزي منحنی چپ خوا کي واقع شي، او په عين وخت کي د مور دغه منحنی بنی خواته انتقال شي. نو پداسی حالت کي به د مور هيموگلوبين ډير اکسيجن له لاسه ورکړی او رشيمن هيموگلوبين به د ډير اکسيجن د رانيولو وړتيا ولري.

## د کاربن ډای اوکساید انتقال

### Transport of Carbon Dioxide

د نسجونو څخه  $\text{CO}_2$  په زیاته پیمانه په لاندي دريو طریقو سره سږو ته وړل کيږي:

- (1) 7% په منتشر شکل (Dissolved Form).
- (2) 30% د Carbamino مرکبونو په شکل.
- (3) 63% د بای کاربونیونو په شکل.

چي اوس ئي هر شکل بیل بیل په تفصیل سره ترڅیړنی لاندي نیسو.

#### (1) په منتشر شکل سره د کاربن ډای اوکساید انتقال:

هرکله چی کاربن ډای اوکساید ویني ته نفوذ وکړي نو د یو عادی محلول په ډول د ویني پلازما ته انتقالیږي، چی د پلازما کاربن ډای اوکساید تقریباً  $3 \text{ ml/dc lit}$  پدغه شکل انتقالیږي، چی دا اندازه د ویني ټول کاربن ډای اوکساید 30% جوړوي.

#### (2) د کاربن ډای اوکساید انتقال د Carbamino

##### مرکبونو په شکل:

تقریباً د ویني د ټول کاربن ډای اوکساید په سلو کي 30 پدغه طریقه انتقالیږي. کاربن ډای اوکساید د هیموگلوبین او یا د پلازما د پروټینو سره یو ځای کيږي او د Carbamino مرکبونه جوړوي، که چیرته کاربن ډای اوکساید د هیموگلوبین سره یوځای شي د Carbamin

Hemoglobin او يا د carba-hemoglobin پنامه ياديږي، او که چيرته کارين ډاي اوکسايډ د پلازما د پروټينو سره يو ځاي شي نو د Carbamino Protein پنامه ياديږي، چي دی دواړو (Carba-hemoglobin او Carbamino Protein) ته په مجموع کي Carbamino Compounds وائي.

هرکله چي په نسجونو کي کاربن ډاي اوکسايډ د پلازما د پروټينونو او هيموگلوبين سره يو ځاي شي، نو دا پيوستون بيرته په سږو کي له منځه ځي، نو پدي اساس وايو چي د کاربن ډاي اوکسايډ پيوستون د پلازما د پروټينو او هيموگلوبين سره يو رجعي پيوستون دی. هغه هيموگلوبين چي اکسيجن يي له لاسه ورکړی وی نسبت هغه هيموگلوبين ته چي اکسيجن لري په زياته اندازه د کاربن ډاي اوکسايډ د رانيولو وړتيا لري چي ديه Haldane Effect وائي.

هغه اندازه کاربن ډاي اوکسايډ چي د هيموگلوبين پواسطه انتقاليري، نسبت هغي اندازی ته چي د پلازما د پروټينونو پواسطه انتقاليري ډير زيات دی، او دا ځکه چي د هيموگلوبين اندازه د پلازما د پروټينو په نسبت ډيره زياته ده.

### 3) د کاربن ډاي اوکسايډ انتقال د باي کاربونيټ په شکل:


تقريباً د ويني د مجموعی کاربن ډاي اوکسايډ په سلو کي 63 پدغه شکل د نسجونو څخه انتقاليري. داسی چي هر کله کاربن ډاي اوکسايډ د نسجونو څخه ويني ته تير شي نو لډي ځاي څخه بيا RBC کي د اوبو سره يو ځاي کيږي او د کاربونيک اسيد پنامه يو بي ثباته مرکب

جوروي، دا چي پدغه ځاي کي د Carbonic Anhydrase پنامه يو انزاييم هم شتون لري نو ځکه دا تعامل د پلازما په نسبت 200-300 چنده ژر اجرا کيږي، چي دغه مرکب ډير ژر په باي کاربونيټ او هايډروجن ايون باندي تجزيه کيږي، د RBC په داخل کي د زيات مقدار باي کاربونيټونو توليد ددي سبب گرځي چي د RBC په داخل کي ئي غلظت لوړ شي او بهرته نفوذ وکړي.

(a) د کلورايد ايون تيريلو پديده (Hamburger Phenomenon): دا چي د ويني په پلازما کي په زياته اندازه سوډيم کلورايد د  $Na^+$  او  $Cl^-$  پشکل شتون لري، نو هرکله چي د RBC د داخل څخه په زياته اندازه باي کاربونيټونه چي د منفي چارج له ځانه سره لري بهرته راوځي، نو د الکتروليکي مساوات د ټينگښت په خاطر بايد د کلورايد ايون چي هم د منفي چارج لرونکي دي د RBC داخل ته انتقال شي، چي دغه پديدي ته Chloride Shifting يا د Hamburger Phenomenon وائي.

پدغه ځاي کي Band 3 Proteins د يو Antiport Pump (يو ډول موادو داخلول او په مقابل کي د بل ډول موادو اوستلو پمپ) په حيث دنده ترسره کوي، چي د RBC څخه د يوي خوا باي کاربوني راديکلونه اوباسي او د بلې خوا څخه د کلورايد ايونونه را داخلوي. باي کاربونيټونه د سوډيم د ايونو سره يو ځاي کيږي او د سوډيم باي کاربونيټ په شکل تر سږو پوري درومي، او هايډروجن ايون ئي د بفر محلول په تهيه کولو کي ونډه اخلي (۱۰-۴ شکل). هرکله چي دا وینه هوائي کڅورو ته ورسيري نو سوډيم کاربونيټ ئي بيرته په  $Na^+$  او  $HCO_3^-$  باندي تجزيه کيږي، چي باي کاربونيټ ئي RBC ته داخليري او په مقابل کي د RBC څخه کلورايد راوځي او د سوډيم سره يو ځاي کيږي، چيدغه بروسې ته Reverse Chloride Shifting وائي.

همدغه وخت کی اکسیجن هم د RBC داخل ته ننوخی او دا اکسیجن د هیموگلوبین څخه د هایپروجن ایون ازادوی، چي دا د هایپروجن ایون د بای کاربونیټ سره یو ځای کیری او کاربونیټ اسید جوړوي، چي دا اسید بیا په اوبو او کاربن ډای اوکساید باندی تجزیه کیري، او کاربن ډای اوکساید ئي بهر ته ازادیري (۱۱-۴ شکل).



۱۱-۴ شکل

## کاربن ډای اوکساید او د وینې pH:

د وینې pH د پلازما د pH له مخې محاسبه کیږي، نه د RBC د pH له مخې. په پلازما کې کاربن ډای اوکساید د اوبو سره تعامل کوي او کاربونیکی اسید جوړوي، چې دا تعامل د Capillary Endothelial Cell د سطحې د Carbonic Anhydrase انزایم پواسطه چټکتیا پیدا کوي، دا کاربونیکی اسید بیا په هایډروجن ایون او بای کاربونیټ بانډي بدلېږي، چې د هایډروجن ایون تولید د pH د ښکته کیدو سبب ګرځي. نو په نتیجه کې وایلی شو چې د کاربن ډای اوکساید د ډیرښت له وجې pH ښکته او د کمښت له وجې ئې pH لوړېږي. چې تنفسی سیستم د وینې د کاربن ډای اوکساید د اندازې د کنټرول په اساس pH کنټرولوي، چې دا ددی سیستم د عمده دندو له جملې څخه شمیرل کیږي.

په Hyperventilation کې د پلازما کاربن ډای اوکساید اندازه کمېږي او د وینې pH لوړېږي، خو په Hypoventilation کې بیا د پلازما د کاربن ډای اوکساید اندازه زیاتېږي او د وینې pH کمېږي.

## پنجم فصل

### دتنفسي سيستم كنترول

## Regulation of Respiratory System

### ريتمی تهويه

## Rhythmic Ventilation

ريتمی تهويه هغه تهويه ده چي د وخت په منظمو فاصلو كې په منظمی فريكونسی سره ترسره شي.

د تهوئي د رېتم كنترول د هغو نيورونونو پواسطه چي په

Medulla Oblongata كې شتون لري صورت نيسي، چي دا

نيورونونه بيا تنفسي عضلي تنبي يا نهی كوي. د زياتو تنفسي عضلي

اليافو فعاليدل او ددی عضلي اليافو د تنبي ډيرښت ددی سبب گرځي چي

تنفسي عضلي په قوي ډول تقلص وكړي او د تنفسي شدت لوړ كړي.

دتنفس فريكونسی او Rate د تنفسي عضلو د تنبي دفرېكونسی

پواسطه تعينېږي.



## دتنفس تنظيم

### Regulation of Respiration

تنفس چي يوه عكسوي پروسه ده او كيداي شي چي په ارادي ډول هم تر يوه وخته ( تقريباً 40 ثانيي) پوري كنترول كيداي شي، چي دغه عمل زيات تکرارول ددي سبب گرځي چي د ارادي كنترول وخت اوږد شي.

د تمرين او احساساتي حالتون كي د تنفس شدت او شمير لوړيږي، خو د استراحت او خوب په حالت كي بيا د تنفس فريکونسي و شدت کميږي.

تنفس د لاندی دوو مکانیزمونو پواسطه کنترولیږي.

1. Nervous or Neural Control of Ventilation
2. Chemical Control of Ventilation

## 1) د تهويي عصبي کنترول (Neural Control of Ventilation):

دغه ميکانيزم تنفس د عکسی پواسطه کنترولوي، چي محتويات ئي په لاندي ډول سره ذکر کوو:

- Respiratory Centers ✓
- Medullary Center ○
- Inspiratory Center ■
- Expiratory Center ■
- Pontine Centers ○
- Pneumotaxic Center ■
- Apneustic Center ■
- Respiratory Nerves ✓
- Afferent Nerves ○
- Efferent Nerves ○

### A. تنفسي مرکزونه (Respiratory Centers):

تنفسي مرکزونه د نيورونونو هغه گيډی ده چي د تنفس رېتم، شدت او شمير د کنترول مسوليت لري. هر مرکز د دماغی ساقی (Brain Stem) په دواړو خواو کی قرار لري او د همدې موقعيت له مخی په دوو ډلو ويشل کيږي.



## .b Pontine Center :

دغه مرکز په Pons کې قرار لري چې په لاندي برخو ویشل کېږي.

### i. Pneumotaxic Center : د مرکز د علوی Pons د Reticular

Formation په علوي وحشی برخه کې شتون لري. دا ددی مرکز نیورونونه د Parabrachialis هسته جوړوي، دغه مرکز د Medullary Center د Inspiratory Center برخې د کنترول پواسطه د تنفس دوام (Duration) کنترولوی، او همدارنگه په غیر مستقیم ډول د تنفس د دوام په کمښت سره د تنفس Rate هم لوړوی، او دا ځکه چې هرکله د ساه اخستنی وخت کم شو نو طبیعي ده چې د ساه اویستنی وخت باید هم راکم شی او په نتیجه کې د تنفس Rate لوړیږي.


### ii. Apneustic Center : د مرکز د سفلی Pons د Reticular

Formation کې موقعیت لري چې دغه مرکز په Inspiratory Center باندې اغیزه کوی او د ساه اخستنی شدت لوړوي بر علاوه لږې چې ددی مرکز د تنبی په وجه د ساه اخستنی دوام زیاتېږي، یوه کمه اندازه په ستمیدلي شکل سره د ساه اویستنی پروسې ته زمینه برابروي، نو ځکه ددی مرکز د تنبی په وجه چې کوم تنفس صورت نیسی د ستمیدلی تنفس (Gasp type of Respiration) پنامه یادېږي.

## B. اعصاب ( Nerves ) :

### a. مرسله اعصابو تگ لوری (Efferent Nerve Pathway):

اعصاب د تنفسي مرکزونو څخه بنکته د ستون فقرات د Lateral Columns قدامی برخی ته راضي، او پلاخره دغه اعصاب د Cervical او Thoracic سيگمنتونو په Anterior Horn Cell باندي خاتمه پيداکوي له Spinal Cord دحرکی نيورنو ( Motor Neurons ) څخه دوه درجنه اعصاب راوځي چي يو ئي Phrenic Nerve دي چي ديافرام ( Diaphragm ) ته ځي او بل ئي Intercostal Nerve دی چي بين الضلعي عضلاتو ته درومی. د Vagus اعصاب هم د تنفسي مرکزونو د مرسله عصبی اليافو څخه يو کم مقدار په خپل ځان کي لري.



b. موصله اعصابو تگ لوری (Afferent Nerve Pathway):

تنفسي مرکزونو ته سيالی د Vagal Nerve او Glossopharyngeal Nerve د شعباتو پواسطه د Baroreceptors او Chemoreceptors څخه راځي. همدارنگه د Vagus اعصابو د اليافو پواسطه هم د سږو د Stretch د اخذو څخه هم سيالی ورته راځي. داچي تنفسي مرکزونو ته د بدن له مختلفو برخو څخه سيالي رادرومی، نو ځکه دغه مرکزونه صدري قفس او سږو د تعادل او حرکتونو د کنترول په برخه کي د پام وړ اهميت لري.

## د تنفسي مرکزونو همغږي او د ریتمی تهوئي جوړیدنه

### Intergration of Respiratory Centers & Generation of Rhythmic Ventilation

(1) د Medullary Center د همیت څیرنه:

a. *Inspiratory Ramp*

مخکی لږي چي په ساه اخستنی Ramp او د یو ریتم لرونکی تهوئي په اړه وغږیزو لازمه ده چي د Ramp په لغوی معنی وپوهیږو: Ramp یو انگلیسی کلمه ده چي د مایلی لاری او په تدریجی ډول د پورته کیدو معنی لري. اوس راځو دپته چي څنگه یو ریتم لرونکی تنفس ایجادیری او پدی ایجاد کي د تنفسي Ramp څه اهميت لري.

په عمومي ډول سره وايو چې تنفسی مرکزونه د يو نارمل ریتم لرونکی تنفس د سرته رسول مسولیت لري، ددې مرکزونو نیورونونه د وخت په منظمو فاصلو کې سیالي ایجادوی چې دا سیالی بیا د يو ریتمی تنفس سبب گرځي.

Medullary تنفسی مرکزونه د وینې د غازونو د اندازی، د وینې د حرارت درجې، د عضلاتو او بندونو د حرکتونو څخه په دوامدار ډول د خپلو اخذو پواسطه تنبی کيږي. خو ساه اویستنه هغه وخت شروع کيږي چې هرکله ددی ټولو سیالو په نتیجه کې یو Action Potential ایجاد شي، دا Action Potential ډیر کم شدت لري نو ځکه یو کم تعداد نیورونونه فعالیږي، لدې څخه وروسته د Action Potential د شدت په زیاتیدو سره په تدریجی ډول نور او نور نیورونونه فعالیږي. چی دغه ډول د سیالو تولید تر دوه ثانویو پوری دوام کوي، چې د تنفس دغه ډول پروسه د Inspiratory Ramp پنامه یادیږي.

د دوه ثانویو وروسته Ramp Signals په تپه دريږي او تر راتلونکی دریو ثانویو پوری نه تر سترگو کيږي چې په دغه وخت کې د ساه اویستنی پروسه تر سره کيږي. له دري ثانویو وروسته بیا د Ramp Signal راڅرگندیږي او ذکر شوي پروسه په مکرر ډول سره تکرار یږي.

په یو نارمل تنفس کې د ساه اخستنی په وخت کې د ساه اخستنی مرکزونو پواسطه د ساه اویستنی مرکزونه نهی کيږي، او همداسی د ساه اویستنی په وخت کې د ساه اویستنی مرکزونو پواسطه د ساه اخستنی مرکزونه نهی کيږي. چې دا دواړه عملونه د Medullary تنفسی مرکزونو پواسطه کنترول یږي.

---

## 2) Pontine مرکز د اهمیت خیرنه:

Medullary تنفسی مرکزونه د Pontine مرکزونو تر تاثیر لاندې خپل عمل تر سره کوي، د Apneustic مرکز د ساه اخستنی مرکز تنبی کوی او د یو اوږدی ساه اخستنی لپاره زمینه مساعدوي، خو له بلی خوا Pneumotoxic مرکز د Apneustic مرکز د نهی سبب گرخی او د یوې اوږدی ساه اخستنی مخه نیسي.



## هغه فکتورونه چې تنفسی مرکزونه متاثره کوي

### Factors Affecting Respiratory Centers

هغه فکتورونه چې تنفسی مرکزونه تر خپل تاثیر لاندی راوی په لاندی ډول تری یادونه کوو.

#### (1) د Higher Center څخه سیاله:

Ant. Cingulate Gyrus، د Corpus Callosum د Genu برخه، Olfactory Tubercle او Orbital Gyrus د Cerebral Cortex هغه رخی دی چې د تنفس د نهی سبب گرځي. خو د Cerebral Cortex حرکی ساحه (Motor Area) او Sylvain ساحه بیا د تنفس د شدید د زیاتوالی سبب گرځي.

#### (2) د Stretch د اخځو څخه سیاله یا د Hering Breuer عکسه:

هغه تنفسی عکسه چې د سږو له خوا تولیدیږی د Hering Breuer پنامه یادیږي. د Bronchi او Bronchioles جدارونه د Stretch اخځی لرونکی دی کوم چې د سږو د پراختیا په وخت کی عکس العمل بڼی، نو هرکله چې د ساه اخستنی په وخت کی چې هرکله سږی بڼه توسع وکړی، نو دا اخځی د لسم قحفی زوج د الیافو له لاری خپلی سیالی تنفسی مرکزونو ته لیردوی، چې د ساه اخستنی د پای او د سا اویستنی د شروع سبب گرځي.

که چیرته دغه پورته میکانیزم ته بڼه ځیر شو نو جوته به شی چې دا یو ساتندویه عکسه (Protective Reflex) دی، یعنی دسږو د زیاتی توسع مخه نیسي چې دیته Hering Breuer Inflation Reflex وائي. د

یادونی ورده چي دا عکسه هغه وخت تولیدیږي چي هرکله د سږو حجم د 100 ml څخه پورته شی خو په عادی ساه اخستنه کی دا عکسه غیر فعاله وي.

ددغه پورته ذکرشوی عکسی معکوس حالت ته بیا Hering Breuer Deflation Reflex وائي، یعنی ددي عکسی پواسطه هرکله ساه اویستنه صورت ونیسی نو د سږو د توسع کمیریږي.

### 3) د سږو د ل اخذو څخه سیاله:

د ل اخذی چي د Juxta Capillary اخذو له جملی څخه دي، دا په حقیقت کي د لسم قحفی زوج حسی نهایتونه دی چي Myline Sheet نلري او د نوعیت له مخی Type C اخذو په ډله کي راځي. دا اخذی په زیاته اندازه د هوائی کڅوړو په جدارونو کي او همدارنگه په یوه کمه اندازه د Bronchi په جدارونو کي تر سترگو کیږي، چي لاندی حالاتو کي تنبی کیږي:

- a. Pulmonary Congestion
- b. Pulmonary Edema
- c. Pneumonia
- d. Overinflation of Lungs
- e. Microembolism in Pulmonary Capillaries
- f. Bradykanine
- g. Histamine
- h. Serotonin
- i. Halothane
- j. Phenyldiguanide

تر اوسه لا دا خبره نده څرنګنده چې دا اخذی په فزیولوژیکو حالتونو کې په تنفسی مرکزونو باندی څه اغیزی لري، خو په پتالوژیکو حالتونو کې د Hyper Ventilation مسولیت په څاره لري.

#### (4) د سرو متخريشه اخذو سياله:

برعلاوه د Stretch او J له اخذو څخه یو بل ډول اخذی هم په سرو کې شتون لري چې د متخريشو (Irritant) اخذو پنامه یادېږي. دا اخذی هغه وخت تنبی کيږي کله چې د مضر موادو لکه امونیا او سلفر داي اوکساید سره مخامخ شي، چې دا اخذی بیا خپلی سيالي د Vagal اعصابو له لاری تنفسی مرکزونو ته رسوي او د Hyperventilation چې د Bronchospasm سره مل وی منځته راوړي، چې د Hyperventilation او Bronchospasm دواړه ددې سبب ګرځي چې دامضره مواد د حرکت په مقابل کې چې د هوائی کڅوړو خواته ئي کې وي خنډ جوړ کړي.

#### (5) د Baroreceptors سياله:

دا اخذی په Aortic Arch او Carotid Sinus کې شتون لري چې د ویني فشار تر اغیزی لاندې راوړی، نو ځکه وایو چې دا اخذی په غیر مستقیم ډول د تنفس کنترول په څاره لري. په فزیولوژیکو حالتونو کې دغه اخذی په تنفس باندی کوم خاص تاثیر نلري (۲-۵ شکل).

(6) د Chemoreceptors سیاله:

دغه اخذی د تنفس په تنظیم کي د پام وړ ونډه لري، چي په اړه به وروسته معلومات وړاندی شي (۲-۵ شکل).

(7) د Proprioceptors سیاله:


دا هغه اخذی دی چي د بدن د Position د تغیر په نتیجه کي فعالیږي او په بندونو، اوتارو ( Tendons ) او عضلاتو کي شتون لري. چي ددي اخذو پواسطه سیالی Cerebral Cortex ته او لدی خایه تنفسی مرکزونو ته انتقالیږي او د تنفس د عملیې د تغیر سبب ګرځي (۲-۵ شکل).

(8) د Thermoreceptors سیاله:

دا اخذی د Somatic Afferent اعصابو پواسطه سیالی Cerebral Cortex ته لیردوی او لدی خای خخه سیاله تنفسی مرکزونو ته ځي او بلاخره د Hyperventilation سبب ګرځي.

(9) د Pain Receptors سیاله:

هغه اخذی دي چي د درد پواسطه فعالیږی او خپلی سیالی د Somatic Afferent اعصابو له لاری Cerebral Cortex ته انتقالوی، او لدی خخه تنفسی مرکزونو ته سیاله انتقالیږي او د Hyperventilation سبب ګرځي (۲-۵ شکل).



## 2. د تهوئي کيمياوی کنترول :

لکه څنگه چې مو مخکی ووايل چې تهويه د عصبی او کيمياوي ميکانيزمونو پواسطه کنتروليري، چې لډي جملې څخه د عصبی ميکانيزم په اړه په تفصيل سره وغړيدو، اوس غواړو هغه د تهوئي کيمياوی کنترول ميکانيزم په اړه خبري وکړو.

دتنفسي سيستم پواسطه په ويني کي اکسيجن او کاربن دای اوکسايډ او همدارنگه د ويني pH کنتروليري، خو که چيرته هر يو له

دویو څخه له خپل نارملی اندازی لور او بنکته شي نو د تنفسی سیستم باندي د پام وړ اثر اچوي. چي دا تاثیر په عصبي مکانیزم باندي کوم چي د یو ریتمی تهویه منخته راوړی اوستوار دی.

### (1) Chemoreceptors

هغه اخذی دی چي د وینی کیمیاوی موادو په مقابل کی عکس العمل ښيي. دغه اخذی د موقعیت له مخي په دوو گروپونو ویشل شوی دي، یو ئي Central Chemoreceptors دی کوم چي په Chemosensitive ساحه کی شتون لري او د تنفسی مرکزونو سره اړیکه لري او یواځي د هایډروجن ایون په مقابل کي حساس دي. او بل گروپ يي Peripheral Chemoreceptors دی چي په Carotid او Aortic ساحو کي موقعیت لري او د اکسیجن په مقابل کي ډیر زیات، خو د هایډروجن او کاربن داي اوکساید په مقابل کي ډیر کم حساسیت لري. تنفسی مرکزونه د Carotid ساحی سره د Glossopharyngeal اعصابو پواسطه او د Aortic ساحی سره د Vagus اعصابو پواسطه اړیکه لري (۳-۵ شکل).




Figure 41-4


Respiratory control by peripheral chemoreceptors in the carotid and aortic bodies.

## 2) د $pH$ اغیزه:

دا چې Chemosensitive ساحه د Cerebrospinal Fluid (CSF) پواسطه خړوبیږي، نو ځکه د  $pH$  تغیر مستقماً ددغی ساحی د تنبی سبب نه گرځي، او د  $pH$  پواسطه په غیر مستقیم ډول دغه ساحه متاثره کیږي، چی ددی خبری میخانیکت په لاندی ډول بیانوو:

CSF د وینی څخه Blood Brain Barrier (BBB) پواسطه جدا شوي دی، او دا چې د  $pH$  تغیر په حقیقت کې د  $H$  د ایون د غلظت تغیر دی او هایدروجن ایون له BBB څخه د تیریدو وړتیا نلري، نو ځکه وایو چې وینی  $pH$  باندي مستقیماً اثر نلري. اوس یی غیر مستقیم اثر څیرو: د وینی  $pH$  د تغیر اصلی عامل په وینه کې د کاربن دای اوکساید د غلظت

له تغیر څخه عبارت دی، نو کله چې د کاربن دای اوکساید زیات شي نو دا کاربن دای اوکساید ته ځی ځکه چې د BBB څخه د تیریدو وړتیا لري، چې دلته بیا کاربن دای اوکساید د اوبو سره یو ځای کیږي او یو بی ثباته مرکب د کاربونیکیک اسید پنامه جوړوي، چې دا مرکب بیرته په هایپروجن ایون او بای کاربونیت باندي تجزیه کیږي، نو دا لاسته راغلی هایپروجن ایون اوس کولای شي چې په Chemosensitive ساحی باندي خپله اغیزه وبنائي (۴-۵ شکل).



شکل ۵-۴




خود بلی خوا Carotid او Aortic ساحی بیا د ویني پواسطه خړوبیري، او د ویني د pH تر مستقیم تاثیر لاندې راځي. د یو نارمل pH شتون د حجرو د فعالیت لپاره ضروری دی، ځکه چې د کاربن دای اوکساید مقدار هم د pH د تغیر سبب ګرځي. تنفسی سیستم د Acid – Base توازون په ساتلو کې ستره ونډه لري، د مثال په توګه که چیرته په وینه کې د کاربن دای اوکساید اندازه زیاته شي نو دا د pH د ښکته کېدو سبب ګرځي او تنفسی مرکزونه تنبی کوي چې په نتیجه کې د تنفس عملیه چټکه کيږي او د ویني pH بیرته نارمل حالت ته راځي. خو که د کاربن دای اوکساید اندازه کمه او د اکسیجن اندازه زیاته شي نو دا بیا د pH د لوړیدو سبب ګرځي او د تنفسی مرکزونو د نهی سبب ګرځي او په نتیجه کې د ویني pH نارمل اندازی ته راځي.

### (3) د کاربن دای اوکساید اغیزه:

په وینه کې د  $P_{CO_2}$  د ډیر کم تغیر سره په تنفسی سیستم کې د پام وړ تغیر منځته راځي، دا مثال په ډول که چیرته د ویني  $P_{CO_2}$  د 5 mm Hg په اندازه لوړ شي نو د تهوئي اندازه به د نارمل حالت څخه 100 % لوړه شي. په وینه کې د خپل نارمل حد څخه زیات کاربن دای اوکساید ته Hypercapnia او کم ته یې Hypocapnia وايي. کاربن دای اوکساید مستقماً په تنفسی مرکزونو باندې اغیزه نلري، بلکې دا د pH د تغیر سبب ګرځي او pH بیا په تنفسی مرکزونو باندې اغیزه کوي، چې مخکې مو پری تفصیل سره رڼا واچوله (۴-۵ شکل).

#### 4) داکسیجن اغیزه:

که څه هم د  $P_{CO_2}$  تغیر په زیاته اندازه په تنفسي عمليي باندي اغیزه غورځوی، خو پدي عمليي باندي د  $P_{O_2}$  اغیزه هم له پامه نشو غورځولای. هغه حالت چي په هغه کي د اکسیجن مقدار د خپل نارمل حد څخه کم وی د Hypoxia پنامه یادیږي. که چیرته pH او  $P_{CO_2}$  دواړه نارمل وی خو په  $P_{O_2}$  کی د پام وړ تغیر منځته راغلی وی نو بیا هم د تنفس عمليه کی تغیر منځته راځي. د یادونی وړ ده چي په عمومی ډول د اکسیجن د اغیزه د تنفس په عمليي باندي کمه ده، خو دا اغیزه هغه وخت د کمال حد ته رسیږي چي  $P_{O_2}$  د خپل نارمل حد څخه %50 راکم شي. په وینه کي د  $P_{O_2}$  کمښت د Carotid Body او Aortic Body د ساحو د Chemoreceptors پواسطه درک کیږي، او بیا د تنفس مرکزونو ته سيالي انتقالوی. که چیرته  $P_{O_2}$  ډیر زیات کم شي نو د مرگ سبب هم کیدای شي (۵-۵ شکل).



## تهوئي باندي د ورزش اغيزه

### Effect of Exercise on Ventilation

د ورزش په وخت کي د تهوئي تنظيم رقابتي ډول سره صورت

نيسي، پدي معنی چي يو فکتور هيڅکله هم ددی وړتيا نلري چي ددي ټولو تغيراتو مسول واوسيري، او هر فکتور د فعاليت له وجی نه فعاليري. د ورزش په وخت کي تهويه په دوو مرحلو باندي ويشل کيږي.

(1) د تهوئي ناڅاپي پيريښه: د ورزش په شروع کی تهويه يو ناڅاپه زياتيري او دا تهوئي زياتيدنه د هغی ټولی زياتيدنی %50 تشکيلوي کوم چي د ورزش په وخت کي ترسره کيږي هرکله چي تهويه زياته شوه، نو دا به د بدن په ميتابوليزم او د ويني د غازونو په غلظت کي د پام وړ تغير منځته راوړي. هغه اکسونونه ( Axons ) چي د Cerebrum د Motor Cortex څخه د Motor Pathway په لوری غزیدلی دی، ددي لاري په اوږدو کی د دماغو د Reticular Formation څخه يو زيات شمير نيورونونه هم ورگديږي، نو ځکه د ورزش په وخت کي چی اکشن پوتنشيل د اسکليتي عضلو د تقلص لپاره ليردول کيږي، نو يو څه يي د تنفسي مرکزونو د تنبی سبب هم گرځي.

دبلی خوا د بندونو او اوتار ( Tendons ) د حرکت پواسطه Proprioceptors فعاليري او دا هم د تنفسي مرکزونو د تنبی سبب گرځي.

همدارنگه د دماغو د زده کړي خاصيت له مخی کله چي ورزشکار ورزش کوي نو د دماغ د تهوئي اندازی پيروالي زده کوي او وروسته د ورزش څخه همداسی په پير کم تفاوت سره پاتی کيږي، نو ځکه د بڼه

روزل شوو ورزشکارانو د تنفس rate د عادی خلکو په نسبت ډیروی، خو لږې سره بیا هم ددی خبری پوره تصدیق ندی شوي.

(2) د تھوئي تدریجی زیاتیدنه: د ورزش د شروع څخه 4-6 دقیقې وروسته د تھوئي تدریجی زیاتیدنه شروع کیږي، او ټول هغه عاملونه پدې زیاتیدنی کې دخپل دی کوم چې د تھوئي په ناڅاپی زیاتیدنی مسولیت لریږ.

که څه هم پدغه وخت کې د اکسیجن مصرف او د کاربن دای اوکساید تولید زیاتیری، خو بیا هم په Aerobic ورزش کې د وینې  $P_{CO_2}$ ،  $P_{O_2}$  او pH ترمنځ نسبت ثابت وي، نولدي څخه معلومیږی چې د وینې د غازاتو تبادله او pH د تھوئي په کنترول کې کومه اغیزه نلري، خو د تھوئي د کنترول لپاره Signal کیدای شي.

د ورزش هغه اندازه چې د وینې د pH د تغیر سبب ونه گرځي د Anaerobic Threshold پنامه یادیری. خو که چیرته د ورزش شدت د Anarobic Threshold څخه زیات شی نو بیا د اسکلیتی عضلاتو پواسطه په وینه کې لکتیک اسید تولیدیری او دا د وینې د pH د تغیر سبب گرځي. چې بیا د Carotid Bodies د تنبی په اثر د تھوئي اندازه زیاتیری.

## د عمر تاثیر په تنفسی سیستم باندی

### Effect of Aging on the

### Respiratory System

که څه هم د عمر زیاتوالی څخه تنفسی سیستم هره برخه لکه Vital Capacity، دتهوئی Rate او د غازاتو تبادلې متاثره کیږي، خو بیا هم ورزش ددغو بدبختیو پوه څه مخه نیسي.

د عمر په زیاتیدو سره د سږو د پو او پوس کیدو وړتیا دواړه Minute Ventilation کمیري، چي دا ددی سبب ګرځي چي فریکونسی (Rate) کم شي، نو کله چي د تهوئی Rate راکم شی نو تنفسی عضلی ضعیفه کیږي او د غضروفونو او پښتیو د شیره کیدو له وجی د صدري قفس ظرفیت کمیري چي دا بیا پخپل وار سره د سږو د ظرفیت د کموالی سبب ګرځي. د سږو ظرفیت په حقیقت کي د عمر په زیاتیدو سره زیاتیري نو دا چي د یو خوا د صدري قفس ظرفیت کمیري او د بلي خوا د هوایي کڅوړو د پوښوونکی مایع سطحی کشش هم کمیري نو دا دواړه ددی سبب ګرځي چي د سږو ظرفیت دی کم شي. خو د یادونی وړ ده چي د سږو په الاستیکی الیافو او Surfactant باندی د عمر زیاتوالی کم خاص اثر نلري.

د عمر په زیاتیدو سره د لویو Alveolar او Bronchioles د قطر لویوالی ددی سبب ګرځي چي Dead Space زیات کړی او هغه اندازه د هوا چي د غازاتو تبادلې وړ سره صورت نیسي راکمه

---

شي. د بلی خوا د تنفسی غشا پيروالی او د هوائی کڅوړو د جدارونو له منځه تلل هغه څه دی چي د غازاتو د تبادلې اندازه راکموي.

چي دغه پورته ټول تغیرات بلاخره د Tidal Volume د کمښت سبب ګرځي.

د عمر په زیاتوالی د سلیا، په سطحه د مخاط تجمع صورت نیسی او دا د سلیاؤ حرکت کموي، چي دا بلاخره د انتان د مداخلی او Bronchitis لپاره زمينه مساعدوي.

## شپږم فصل

# دتنفسی سیستم پتالوژی ته یوه لنډه کتنه Review of Pathologic Condition

## Of Respiratory System

دتنفس د ډیرو ناروغيو د تشخیص او تداوی لپاره دا خبره ډیره ضروري ده چې شخص دی د تنفس او غازی تبادلې په فزیولوژیکو اساساتو پوه اوسي، ځنی تنفسی ناروغي د ناکافی تهوئي له کبله وی پداسی حال کي چې ځنی نوری بیا د Alveoli Capillary Membrane له لاری د خراب نفوذ له کبله او بلاخره ځنی دغه تنفسی ناروغي د سږو څخه د نسجونو په لور د ویني پواسطه د خراب انتقال له کبله وي چې د هر حالت درملنه يي ځانته اوجدا ده ځکه نو ساده او سانه نه ده چې د تنفسی عدم کفایي دی په ډیر ساه گۍ سره تشخیص شي.

په تیرو څو برخو کي مو د تنفسی اناملیو د څیرني ځنی میتودونه ولوستل لکه د Functional، Tidal Volume، Vital Capacity او Physiologic Shunt، Dead Space، Residual Capacity او Physiologic Dead Space خو داد فزیولوژی د پوهانو دکلینیکي څیړنو هسی یوه نمونه ده. ځنی نور او مهم يي په لاندي ډول دي.



## 1) د وینې د غازاتو pH څیره:

د ریوی سیستم د نورو ډیرو مهمو ازموینو تر څنګ د وینې د  $P_{O_2}$ ،  $P_{CO_2}$  او pH معلومول هم د زیات اهمیت لرونکي دي. سربیره پردې چې نوموړي شیان په اسانۍ معلومیري د حادو تنفسی پریشانی او Acid Base توازن په حادو خرابیو کې له مناسبې درملنې سره هم مرسته کوي. زیات شمیر نور ساده او چټګ میتودونه منځته راغلي چې نوموړي کارونه په څو دقیقو کې شونې کړي، او د وینې له یو څو څاڅکو څخه زیاته هم پکې پکاریري چې په لاندې ډول دي:

### a. د وینې د pH معلومول:

ددي کار لپاره یو داسې بڼینه ئې pH الکتروډ چې په ټولو لابراتوارونو کې عام دی استعمالیري. دا الکتروډ ډیر کوچنی دی، د بڼینه ئې الکتروډ پواسطه تولید شوي ولټیج د pH اندازه په مستقیم ډول بڼی، چې یا مستقماً د Volt Meter Scale څخه ولوستل کیري او یا په یو جدول باندې ثبتیري.

### b. د وینې د $P_{CO_2}$ معلومول:

یو بڼینه یې الکتروډ د pH متر ددي کار لپاره کاریري او په لاندې ډول یې استعمالوو: که د  $NaHCO_3$  یو ضعیف محلول د کاربن داي اوکساید له غاز سره مخامخ شي، د کاربن داي اوکساید غاز پدې محلول کې تر هغې حلیري تر څو یو تعادل رامنځته شي. پدغه مساوی حالت کې د محلول pH د کاربن داي اوکساید او  $NaHCO_3$  د ایونونو د غلظت یوه تابع ده، چې دا تابع د Henderson Hessel Balch معادلې په اساس په لاندې بیانو:

$$pH = \text{Log} \frac{HCO_3}{CO_2} + 6.1$$

کله چې په وینه کې د کاربن دای اوکساید پروخت بنیینه ئی الکتروډ کارول کيږي نو لومړی دا الکتروډ د  $\text{NaHCO}_3$  د یو نري محلول پواسطه چې غلظت یې معلوم وي، پوښل کيږي بیا له وینې څخه د جدا کیدو په خاطر یو نازک پلاستيکی پوښ ورکول کيږي، داسې یو پوښ چې له وینې نه محلول ته د کاربن دای اوکساید نفوذ ته اجازه ورکړي. کیدای شي د وینې یو څاڅکی او یا لږی زیاتی وینې ته اړتیا پیدا شي. دا وخت pH د شیشه ئی الکتروډ پواسطه مستقماً معلومیږي او کاربن دای اوکساید د پورته معادلی له مخې معلومیږي.

### c. د وینې د $\text{PO}_2$ معلومول:


په یوه مایع کې د اکسیجن غلظت د یوې طریقې پواسطه چې Polarography نومیږي، معلومیږي د مورد نظر محلول او یوه وړوکی منفی الکتروډ ترمنځ یو برقي جریان تیريږي که د الکتروډ ولتيج د 0.6 ولتو څخه په زیاته اندازه د محلول له ولتيج څخه فرق درلوده، اکسیجن په الکتروډ باندي راټولیری داسې چې د الکتروډ څخه د برق د جریان اندازه د اکسیجن له غلظت سره مستقماً متناسبه ده په کې ددې کار لپاره د Platinum یو منفی الکتروډ چې د  $1 \text{ mm}^2$  سطحی لرونکي وي، استعمالیږي. لکه چې ومو وویل د الکتروډ پواسطه د وینې نه د یو پلاستيکی نازکه پردی پواسطه چې یوازې اکسیجن ته د نفوذ وړ ده، جدا شوي. کله ناکله د دري واړو یعنی pH،  $\text{PCO}_2$  او  $\text{PO}_2$  د ټاکنی ضرورت وي او دا کاربن سبا شونی دی، هغه هم په ډیرې ساده گي او چټکي سره مثلاً په یوه دقیقه او یا له دی نه هم په لږ وخت کې د وینې له یوه څاڅکي څخه. بناً د وینې د غازاتو او د pH تغیرات شیبه په شیبه د ناروغ په بستر کې تعقیبدلی شي.

## 2) د اعظمي ضفير معلومول:

د ساه په ډيرو ناروغيو کې په ځانگړي ډول په سالنډۍ کې د ضفير په وخت کې د هوا په مقابل کې د هوائي لارو مقاومت لوړيږي چې کله نا کله په قابل ملاحظه ډول د ساه د سختوالي سبب گرځي او همدې ته اعظمي ضفيروي جريان (Maximum Expiratory Flow) وائي چې په لاندي ډول تعريفوي:

کل چې يو څوک بنه په زور سره ساه اوباسی، ضفيری هوا يي خپل اعظمی حد ته رسيري، داسي يو حد ته چې که نور هرڅومره زور اوقوه استعماله کړي د ضفيروي هوا په اندازه کې کوم تزايدنه تر سترگو کيږي. دا اندازه هغه وخت ډيره زياته وي کله چې سږی د هوا د زيات حجم پواسطه ډک وي. دغه په ۱-۶ شکل کې ښکاري. د همدې شکل د A برخه د هغه بهرني لوړ فشار اغيزي په سنخ او انتقالي لارو باندې ښيي چې د صدي قفس د تراکم له کبله د غشو لوری ښيي چې همدا قوه انتقالي لارو د دواړو سنخ او Bronchioles د باندنيو برخو تراکم سبب شويده او يوازي ددې باعث گرځي چې هوا د سنخ نه Bronchioles په لور تيله کړي بلکې په عين وخت کې د Bronchioles د کولپس کيدو سبب هم گرځي چې دا بهر ته د هوا وتلو په مقابل کې يوه قوه ده. کله چې يو ځل Bronchioles په نسبتاً پوره ډول کولپس شي اضافي ضفيروي قوه د سنخ په داخل کې د فشار د نور لوړيدو سبب کيږي چې دا کار د Bronchioles د کولپس حالت او د هوائي لاري مقاومت په مساوي ډول پرمخ وړي او ځکه نو د نوري هوا د تگ مخه نيسي. لدې کبله د فضيروي قوي د يوي بحراني درجي تر څنگ يو Maximum Expiratory Flow هم شوني ده. د ۱-۶ شکل د B برخه بيا د Bronchioles د کولپس د مختلفو درجو اغيزه په Maximum


Expiratory Flow باندې بنيئ. هغه گراف چي دلته رسم شوي  
Maximum Expiratory Flow د سږو د حجم په مختلفو درجو کي په  
داسي حال کي بنيئ چي روغ شخص لومړی يو جبر شهيق کوي او بيا  
تر هغه په جدي ډول ضفير کوي چي نور يي نشی کولی. بنکاري چي د  
شخص Maximum Expiratory Flow د  $400 \text{ lit}/\text{min}$  نه لوړيزي  
صرف نظر لډي چي شخص څومره اضافی هڅی د ساه اويستو لپاره  
پکار اچوي. دا هغه Maximum Flow ده چي شخص ورته خپل ځان  
رسوي. همدارنگه لکه څنگه چي د سږو حجمونه کميري ور سره په  
موازي ډول Maximum Expiratory Flow هم کمينت مومي. ددي  
کار علت داسي ديچي په پراخو شوو سږو کي برانکسونه او برانشيولونه  
د يو لړ عواملو له کبله قسماً خلاص پاتي کيري او دا د هغه الاستيکي  
کشش له امله چي د سږو بهر خواته د سږو د ساختمانی عناصرو  
پواسطه ايجاديري نو کله چي د سږی کوچني کيري نو دا جوړبنتونه  
استرخا کوي او برانکسونه او برانشيولونه د صدر د زیات فشار له امله  
په ډيره اسانی سره کولپس کيري او دا کار په پرمختللی ډول د  
Maximum Expiratory Flow د کمينت زمينه برابروي.



۶-۱ شکل

۶-۲ شکل د Maximum Expiratory Flow د گراف د حجم ابناړمل حالات بڼیښی. داسي چي خطی گراف يي نارمل حالت بڼیښی او تر څنگ يي دوه نور نقطوي گرافونه (Flow Volume Curves) د منقبضو سږو او د هوائی لارو قسمي بندیش بنودونکی دي. لکه چي پوهیږو په منقبضو سږو کی TLC او RV دواړه کمیري او دا ځکه چي سږي خپل نارمل حد ته نشي پراخیدای نو که حتی د امکان په صورت کي د ضفیر په حالت کي هڅه هم وشي بیا همدا وخت Maximum Expiratory Flow نارمل حالت ته نه رسیږي. په منقبضو سږو کي د سږو فایبروتیک ناروغي لکه توبرکلوز او Silicosis شامل دي. پداسي حال کي چي د صدري قفس دا ډول ناروغي له Scoliosis،Kyphosis او Fibrotic Pleurisy څخه عبارت دي. د هوائی لارو د بندښت په حالت

کي سږي نشي کولي هوا هغسی خارج کړي لکه څنگه يي چي اخلي، ځکه چي د هوائی لارو بندښت ته تمایل د اضافي مثبت فشار پواسطه شدیداً تزايد مومي کوم چي په صدري جوف کي د ضفير لپاره پکار دی. بر خلاف اضافی منفی پلورايي فشار چي په شهيق کي ايجاديري د هوائی لاري د کشولو له امله دغه لاري خلاصی ساتی چي په عين وخت کي دا مکانيزم اسناخو ته توسع هم ورکوي، ځکه نو هوا تمایل لري چي سږو ته ښه په اسانی سره ننوزي خو وروسته په سږو کي بنديري چي پدي ډول د میاشتو او کلونو په اوږدو کي همدا میخانیکت د TLC او RV د لوریدو سبب گرځيري. دا حالت د ۶-۲ شکل یو نسبتاً غزیډلي نقطوي گراف پواسطه افاده شوي له یوه پلوه د هوائی لارو بندښت لو له بله پلوه د نارمل په نسبت په زیات او اسان ډول د هوائی لارو کولپس ددي سبب گرځي چي Maximum Expiratory Flow شدیداً راکمه کړي. ځيني کلاسیکي ناروغی لکه سالنډي، چي دهوائی لارو د شدید بندښت سبب گرځي، همدارنگه د Emphysema په ځینو مرحلو کي هوائی لاری په شدید ډول




شکل ۶-۲

### 3) جبري ضفيري حياتي ظرفيت ( Vital Capacity ) او جبري ضفيري حجم:

د کلینکی ریوی تیسټونو لډ ډلي څخه یو بل ټسټ چې ډیر زیات د استعمال وړ هم دی همدارنگه ساده او په Spirography کی د رسمیدلو وړتیا هم لري. دا ټسټ عبارت دي له ( Forced Volume ) FVC (Capacity). ددی ازمویني نارمل گراف د ۳-۶ شکل د A برخه کی او ابنا رمل گراف یی چې د هوایی لارو یو بندښت بنیئ د ۳-۶ شکل د A برخه کی او ابنا رمل گراف یی چې د هوایی لاری یو بندښت یی د ۳-۶ شکل د B په برخه کی بنکاري. د FVC د رسمولو لپاره باید شخص لومړی یو ښه قوي شهيق وکړي (په اعظمي ډول TLC ولري) او بیا په خپل ټول توان سره په یو Spirometer کی ضفیر اجرا کړي. دا ضفیر ددی تر څنګ چې باید جبري وي دوه نور شرطونه هم بایدولري یو دا چې تیز او بل دا چې حتی الامکان مکمل اجرا شي د گراف نزولی برخه چې د وخت په مقابل کی رسم شوي FVC څخه عبارت ده. اوص که مور د نورمال سبري او د هوایی لاری د بندښت دوه گرافه سره پرتله کړو، وبه گورو چې د دواړو گرافونو د سبرو د مجموعي حجمونو تغیرات کوم چې د FVC لپاره رسم شوي چندان فرق نه لري بلکي یوازي د دواړو کسانو (روغ او ناروغ) په اساسي ریوی حجمونو کی یو متوسط توپیر تر سترگو کیري، خو برعکس ددی دواړو کسانو د هغو هواگانو د اندازو ترمنځ یو ستر فرق شته چې هره ثانیه خارجیري. په ځانگړي ډول په لومړی ثانیه کی. ځکه نو دا ډیره مهمه ده په لومړی ثانیه کی د روغو خلکو سره پرتله شي. د ۳-۶ شکل د A برخه کومه چې د یو روغ شخص لپاره رسمه شویده که د FVC فیصدی یی کومه چې په لومړي ثانیه کی Expire کیري په Total FVC باندي وویشو ( $FEV_1 / FVC\%$ ) 80

5 به لاسته راشي. د ۳-۶ شکل د B برخي له مخي چي يو هوائي بندښت بڼيئ دا عدد (  $FEV_1$  ) % 47 دی خو په ځينو شديدو تنفسي انسدادي ناروغيو لکه سالنډی کي حتی % 20 ته ښکته کيږي شي.



شکل ۳-۶



اوس د تنفسی سیستم د ناروغیو څخه په لاندې ډول یادونه کوو:

## خفگی یا د تنفس دریدل

### Apnea

د تنفس نه شتون ته Apnea وایي. Apnea کیدای شي چې په ارادي ډول هم منځته راشي چې دیته بیا Holid Apnea او یا Voluntary Apnea وایي، چې نارمل وخت یې د 40-60 sec پوري دي.

Apnea په لاندې حالتونو کې منځته راځي:

- ✓ په اختیاري ډول ( Voluntary Apnea ) لکه د خولی او پوزي بندولو سره.
- ✓ د Hyperventilation څخه وروسته.
- ✓ د بلع کولو خفگی ( Diglutition Apnea ).
- ✓ Vagal Apnea
- ✓ Adrenaline Apnea

#### (1) ارادي خفگی (Voluntary Apnea):

لکه څنگه مو چې مخکې ووايل چې دا هغه خفگی ده چې فرد ئي په ارادي ډول د خولي او پوزي دورو په بندولو سره منځته راوړوي او نارمل وخت یې 40-60 sec پوري دي چې دغه وخت ته Breath Holding Time وایي. او که چیرته په ارادي خفگی ډیر تکرار شي نو

دغه وخت پېرېدایي هم شي، چې ددې وخت اخري نقطې ته Breaking Time وائي او دا چې پدغه وخت کې د کاربن داي اوکساید د زیاتي تجمع له کبله تنفسي مرکزونه بڼه تنبي شوي وي نو ځکه فرد د تنفس کولو لپاره مجبورېږي. سر بیره د کاربن داي اوکساید د تجمع څخه د هایډروجن ایون غلظت هم لوړېږي او دا تنفسي مرکزونو د لا تنبه سبب ګرځي، هو همدا وجه ده چې Hyperventilation څخه وروسته د تل لپاره د خفګي (Apnea) منځته راځي.

(2) Hyperventilation څخه وروسته خفګي (Apnea): که چېرته Hyperventilation تر سره شي نو د کاربن داي اوکساید د غلظت د کموالي له خفګي (Apnea) منځته راځي، چې د کاربن داي اوکساید دا کموالي د تنفسي مرکزونو د نهې سبب ګرځي.

(3) د بلع خفګي (Deglutition Apnea): هر کله چې غذائي مواد د بلعوم څخه تیرېږي نو ددې لپاره چې شزن (Trachea) ته دا مواد داخل نشي نو باید د Vocal Folds پواسطه هوایي لاره بنده شي او تنفس ودرول شي، چې دغه ډول د تنفس دریدلو ته د بلع خفګي (Deglutition Apnea) وائي.

(4) Vagal Apnea: په حیواناتو کې په تجربوي توګه دا په ډاګه شوي ده چې د Vagus اعصابو د تنبي په وجه تنفسي مرکزونه نهې کیږي او د خفګي منځته راتګ سبب ګرځي، چې دا خفګي د Vagal Apnea پنامه یادېږي.

## 5) Adrenaline Apnea :

د ادرینالین د زرق کولو له وجی هم خفگی منځته راځي او دا ځکه چې ددې موادو د زرق پواسطه Barroreceptors تنبی کیري چې دا بیا په عکسوي ډول Vassomotor Center نهې کوي خفگی منځته راځي.

تردې دمخه مو خفگی ( Apnea ) د دوپو د عاملینو له مخې طبقه بندي کړه او غواړو چې Apnea د کلینکی څیرنو له نظره طبقه بندي کړو. د کلینک له نظره خفگی ( Apnea ) په لاندي ډولونو ویشل شوي ده.

### a. Obstructive Apnea :

داخفگی اکثرأ د هوائی لارو د بندښت له وجي منځته راځي، او دا لاری هغه وخت بندیري کله چې تانسلونو زیاته نمو وکړي چې دپته Sleep Disorder Breathing (SDB) هم وائي. دا بندښت اکثرأ په چاغو خلکو کي لیدل کیري. دا خفگی په ځینو حالتونو کي مرگوني هم وي.

### b. Central Apnea :

دا خفگی په Premature ماشومانو کي پیر لیدل کیري، چې د دماغو له بي نظمي له وجه منځته راځي.

### c. Mixed Apnea :

دا خفگی د Obstructive Apnea او Central Apnea مخلوط شکل دی او اکثرأ په ماشومانو کي لیدل کیري، چې علت یې دادي چې دماغو ښه تکامل نه کړی او یا فعلاً د تکامل په حال وي.

## Hyperventilation

قوي تنفس په وجه د ريوې تهوئي ( Pulmonary Ventilation ) دېرېنت ته Hyperventilation او يا Overventilation وائي. دا چې په Hyperventilation كې سېرو ته زياته هوا ننوځي او په مقابل كې ورڅخه زياته هوا وځي نو دا سېرو د بڼه پراخيدو او تنگيدو سبب گرځي. پدغه حالت كې شخص ته گنگستوب، ناراحتی او سینی درد پيدا كيري.

اکثراً Hyperventilation د تمرین په وخت كې منځته راځي او دا ځكه چې پدغه وخت كاربن ډاي اوکساید زيات توليدېږي او دا د تنفسي مركزونو د تنبي سبب گرځي، همدارنگه مونږ په ارادي توگه هم د تنفس د شدت او شمير په زياتوالي سره Hyperventilation حالت منځته راوړلی شوي چې دپته Voluntary Hyperventilation وائي.

که چيرته د Hyperventilation تاثيرات په بدن وځيرو نو پوه به شو چې د Hyperventilation له وجی په وینه كې  $P_{CO_2}$  كميري او دا د تنفسي مركزونو د نهی سبب گرځي او خفگی ( Apnea ) ته زمينه مساعدوی، چې وروسته د Cheyne Strokes تنفس (وروسته به په تفصيل سره رڼا واچوو) كولو پواسطه حالت نارمل كيږي.

## Hypoventilation

د تنفس د قوی کموالی له وجی د ریوی تهوئي ( Pulmonary Ventilation ) کمښت ته Hypoventilation وائي. او هرکله چې ریوی تهویه کمه شي نو طبیعي خبره ده چې سږو ته داخلیدونکی هوا اندازه او بیرته ورڅخه د خارجیدونکی هوا اندازه کمیري.

Hypoventilation هغه وخت منځته راځي چې کله تنفسی مرکزونه نهی او یا د تنفسی عضلاتو قسمی Paralysis شي.

Hypoventilation له وجی Hypoxia او Hypercapnea منځته راځي، چې دا د تنفس شمیر او شدت زیاتوي. خو که چیرته حالت همداسی دوام پیدا کړي نو بیا د Dyspnea لپاره زمینه مساعدوي او بلاخره د سختی کمزوری، شعور ضایع (Coma) او مرگ سبب ګرځي.

## د اکسیجن کمښت

### Hypoxia

نسجونو ته د کافی اندازه اکسیجن نه رسیدلو ته Hypoxia وائي. دا کلمه باید د Anoxia څخه فرق شي، د Anoxia کلمه د اکسیجن نه شتون معنی لري چې دا حالت په ژوندیو کی امکان لري. پخوا به دغه دواړه کلمی د یو مقصد لپاره استعمالیدی، خو اوس د Anoxia کله د استعمال څخه غورځیدلی ده.

## د Hypoxia ډولونه او علتونه

Hypoxia عموماً دخپلو لاندی څلورو عواملو پواسطه منځته

راځي.

✓ په شریاني وینه کې د اکسیجن نسبي فشار (Oxygen

(Tension).

✓ د ویني پواسطه د اکسیجن د انتقال ظرفیت.

✓ د ویني جریان سرعت.

✓ د حجرو پواسطه د اکسیجن استعمال.

د دغو پورته څلورو عواملو په نظر کې نیولو سره سره

Hypoxia په لاندی څلورو ګروپونو ویشل ده.

### (1) Hypoxic Hypoxia:

په شریانی وینه کې د اکسیجن د مقدار کمښت ته Hypoxic

Hypoxia یا Arterial Hypoxia وایي. دا Hypoxia د لاندی څلورو

علتونو له وجی منځته راځي.

(a) په اتمو سفیر کې د اکسیجن د مقدار کمښت : لکه په لوړو

ارتفاعاتو کې، له یوی بندۍ ساحی څخه تنفس کول او یا له داسی ځایه

څخه تنفس کول چې هلته د اکسیجن مقدار ډیر کم وي.

(b) هغه تنفسی مرضونه چې د ریوی تهوئي (Pulmonary

Ventilation) سره مل وي: لکه په Pneumothorax کې، په سالنډي

(Asthma) کې د تنفسی لارو د بندښت له وجي، په Poliomyelitis

کې د ستونزمن تنفسی حرکتونو له وجی او په دماغی تورمونو (Brain

Tumor) کې د تنفسی مرکزونه د فعالیت د کمښت له وجي.

(c) هغه تنفسي مرضونه چې د سرو د وینې د  $P_{O_2}$  د کمښت سره مل وي: لکه Emphysema، هوائي کڅوړو ډکيدل د يوي مایع څڅ (Pulmonary Edema, Pneumonia)، د Bronchioles د بندښت له وجی او د Surfactant دنه شتون له وجی. Hypoxic Hypoxia کی شریانی وینې  $P_{O_2}$  کم وی، خو د وینې پواسطه د انتقال ظرفیت، د وینې سرعت او د حجرو پواسطه د اکسیجن د مصرفولو وړتیا نارمل وي. دا ډول Hypoxia د Oxygen Therapy پواسطه سل په سلو کې له منځه ځي.

## (2) Anemic Hypoxia

پدغه ډول Hypoxia کې که هکسیجن په کافی اندازه شتون لري، خو وینه ددي وړتیا نلري چې دغه اکسیجن تر نسجونو پوری ورسوي. دا Hypoxia څلور علتونه لري چې په لاندی ډول تر یادونه کوو:

(a) د سروکرویاتو ( $RBCs$ ) کمښت: لکه خونریزی (Hemorrhage)، د هډوکو د مغزو ناروغتیاوئ (Bone Marrow Diseases) او داسی نور....

(b) په وینه کی د هیموگلوبین کمښت: ټول هغه عوامل چې د RBC د مقدار د کمښت او یا د RBC د شکل او اندازی د تغیر سبب گرځي د هیموگلوبین د مقدار سبب هم گرځي.

(c) د هیموگلوبین د جوړښت بدلون: د کلورایدونو، نایتريتونو، فیري سیانایدونو او نورو پواسطه مسموم کیدنه ددی سبب گرځي چې د هیموگلوبین اوسپنه د فرس حالت څخه په فریک حالت واړوي، چې پدغه وخت کی هیموگلوبین د اکسیجن او کاربن ډای اوکساید سره د پیوستون کمه وړتیا لري نو ځکه په کافی اندازه اکسیجن نسجونو ته نه انتقالیږي.





پدغه ډول Hypoxia کی د وینی سرعت کم، خو د اکسیجن مقدار، د وینی پواسطه د اکسیجن د انتقال ظرفیت او د نسجونو پواسطه د اکسیجن د مصرف وړتیا نارمل وي. دا ډول Hypoxia د Oxygen Therapy پواسطه په سلو کی 50 واقعات صحت مومي.

#### 4) Histotoxic Hypoxia :

دغه Hypoxia د سیانایدونو او سلفایدونو د تسموم څخه منځته راځي، چی دغو موادو پواسطه د حجرو Cytochrome Oxidase System وړتیا دیري، چی لدی وروسه بیا حجری ددی وړتیا نلري چی داکسیجن څخه استفاده وکړي.

پدغه ډول Hypoxia کی حجری ددی وړتیا نلري چی اکسیجن په مصرف ورسوي، خو د شریانی وینی  $P_{O_2}$ ، د وینی پواسطه د اکسیجن انتقال ظرفیت او د وینی د جریان سرعت نارمل وي. دا ډول Hypoxia د Oxygen Therapy پواسطه هیڅکله هم نه تداوی کیدای شي.

تراوسه مو د Hypoxia په علتونو او ډولونو بحث وکړو، اوس غواړو چی هغه تاثیرات وڅیړو کوم چی د Hypoxia له وجی په بدن باندی واریري. دا تاثیرات مونږ په دوو گروپونو ویشو، یو یی هغه تاثیرات دی چی فوراً د Hypoxia سره منځته راځی اوبل ئی هغه تاثیرات دی چی په راتلونکی کی د Hypoxia له وجی منځته راځي.

## A. هغه تاثيرات چې د Hypoxia سره سمدمستی پر بدن واريديږي:

a. وينه باندي د Hypoxia اغيزي: هرکله چې Hypoxia رامنځته شي نو د پښتورگو د Juxtaglomerular Apparatus تنبې کيږي او د Erythropoietin هورمون افراز زياتيريږي چې دا هورمون بيا د هډوکو د مغز (Bone Marrow) تنبې کوي او د RBC جوړښت زياتيريږي. د RBC د تعداد د زياتوالي په اثر د زيات اکسيجن د انتقال لپاره زمينه مساعديري او Hypoxia له منځه ځي.

b. قلبی وعايوني ( Cardiovascular ) سيستم باندي د Hypoxia اغيزي: په بنډا کې د قلبی او Vassomotor مرکزونه دتنبې له وجی د زړه ضربان، د زړه د تقلص قوه، قلبی دهانه او د ويني فشار زياتيريږي، خو وروسته بيا دا ټول بيرته کميريږي.

c. په تنفس باندي د Hypoxia اغيزي: په ابتدا کي د تنفس شمير زياتيريږي او زياته اندازه کاربن داي اوکسايډ بهر ته خارجيږي او Alkalemia ( د ويني pH زياتوالي) ته زمينه مساعدوي، خو وروسته بيرته د تنفس شمير کميريږي او بلاخره تنفسی مرکزونو په عدم فعاليت باندي خاتمه پيدا کوي.

d. په هضمي سيستم باندي د Hypoxia اغيزي: هرکله چې Hypoxia رامنځته شي نو د اشتها نه شتوالی، د زړه بدوالی، استقراق کولو، د خولی د وچولي او د تندي سبب گرځي.

e. په پښتورگو باندي د Hypoxia اغيزي: هرکله چې Hypoxia رامنځته شي نو د پښتورگو د Juxtaglomerular Apparatus څخه د Erythropoietin هورمون افراز زياتيريږي او همدارنگه په ادرارو کي زيات مقدار قلوۍ موادو ته د اطراح زمينه مساعديري.

f. په عصبی سیستم باندې د Hypoxia اغيزي: هغه Hypoxia چې ډیره شدیدې نه وي په عصبی سیستم عیناً هغه ډول تاثیر لري لکه څنگه چې د الکولو تاثیر دی چې پدغه حالت کې شخص پر ځان کنترول له لاسه ورکوي، خبرې ډیرې کوي، جگره مار، بې ادبه او سپین سترگی وي. خو که چیرته Hypoxia مزمنه او شدیدې وي نو بیا د احساس درک فوراً له منځه ځي او که تداوی نشی نو د Coma او مرگ سبب گرځي.

### B. هغه تاثیرات چې په راتلونکې وخت کې د Hypoxia له عمله منځته راځي:

دا تاثیرات د Hypoxia د دوام او شدت پورې اړه لري. دغه اشخاص ډیر حساس (Irritable) وی او د Moutain Sickness ناروغی نښې نښانې پکې تر سترگو کیږي چې دا نښې نښانې عبارت دی له زړه بدوالي، استفراق کول، Depression، کمزورتیا او ستوماني څخه.

# د اکسیجن تراپی پواسطه د Hypoxia درملنه

## Treatment For Hypoxia

### (Oxygen Therapy)

د Hypoxia درملنی لپاره تر ټولو بهترینه لاره اکسیجن تراپی (Oxygen Therapy) ده چې دا په دوو طریقو سره صورت نیسي.

✓ د مریض سر په یو داسي ځاي کي ایښودل چې زیات اکسیجن ولري.

✓ مریض ته د Mask او یا Intranasal Tube وړ اچول تر څو مریض وړ څخه تنفس وکړي.

### اکسیجن تراپی د نارمل اتموسفیر فشار سره:

پدی طریقه کی مریض ته له یو داسی ځاي څخه د تنفس کولو هدایت کیري چې زیاته اندازه اکسیجن ولري. که څه هم د اتو ساعتو او یا لږي څخه زیات وخت پدی طریقه تنفس کولو څخه وروسته د سږو په نسجونو کي ادیما منځته راځي خو بیا هم د بدن نور غړي د Hemoglobine – Oxygen Buffer سیستم د شتون له وجی سالم پاتی کیري.

## اکسیجن تراپی د لوړ اتموسفیر فشار سره :(Hyperbaric Oxygen)

زیات اکسیجن د لوړ اتموسفیریک فشار (2 mm Hg او یا لږې څخه زیات) سره د Hyperbaric Oxygen پنامه یادیږي.

پدې طریقه کې د Hyperbaric اکسیجن تر پنځو ساعتونو پورې مریض ته د تنفس لپاره ورکول کیږي، او پدې ترتیب په وینه کې اکسیجن په منتشر ډول زیاتېږي (دا ځکه چې هیموگلوبین یو ټاکلی مقدار اکسیجن سره د پیوستون وړتیا لري)، او  $P_{O_2}$  تر 200 mm Hg پورې لوړیږي او په نتیجه کې Hypoxia له منځه ځي. خو که چیرته Hyperbaric اکسیجن د زیات وخت لپاره تنفس شي نو د اکسیجن تسموم (Oxygen Toxicity) منځته راځي.

### اکسیجن تسموم

## Oxygen Toxicity (Poisoning)

د خپل نارمل اندازی څخه د اکسیجن ډیر زیات زیاتوالی ته د اکسیجن تسموم (Oxygen Toxicity) وائي، چې د Hyperbaric Oxygen له زیات تنفس کولو څخه منځته راځي.

د اکسیجن تسموم په بدن باندې لاندې اغیزی لري:

✓ تر ټولو لمری د سږو نسجونه متاثره کوي او د Trachibronchial Irritation او Pulmonary Edema سبب ګرځي.

✓ د ټول بدن میتابولیک فعالیت زیاتیري او زیات حرارت د تولید سبب ګرځي، چي دا حرارت د نسجونو د سوزیدو او تخریب عامل ګرځي.

✓ دماغ ( Brain ) تری هم متاثره کیري او لمړی د Hyper irritability او وروسته د ګنګستوب، Muscular Twitching او په غوړو کي د ګرنگار اوریدل منځته اړځي.

✓ او بلاخره دغه تسموم د احساس د درک نه شتون، کوما او مرګ سبب ګرځي.

## د کاربن دای اوکساید ډیرښت

### Hypercapnea (Hypercaba)

په وینه کي د  $P_{CO_2}$  ډیرښت ته Hypercapnea وائي. هر هغه عامل چي د Asphyxia (د تنفسی لارو بندښت) سبب ګرځي، Hypercapnea هم منځته راوړی. او همدارنګه Hypercapnea هغه وخت منځته راځي چی کله داسی هوا تنفس شی چي په هغی کی د کاربن دای اوکساید مقدار ډیر زیات وي.

Hypercapnea په تنفس باندي اغیزه کوي او د تنفسی مرکزونو د تنبی سبب ګرځي، خو که چیر ته Hypercapnea بیا هم ختمه نه شوه نو بیا د Dyspnea (په تنفس کی د ستونزو شتون) سبب ګرځي.

Hypercapnea په وینه باندی اثر کوي او pH ئي رابنکته کوي، او په قلبی و عایوئي سیستم باندی د اثر په وجه Tachycardia او د فشار لوړوالی منخته راوړي.

همدارنگه Hypercapnea په مرکزی عصبی سیستم باندی اثر کوي او د سردرد، Depression او لتي سبب گرځي، چي دا نښي نښاني په عضلي شخوالي (Muscle Rigidity)، تومورونو او بلاخره د حساس د درک په منځه تللو باندی خاتمه مومي.

## د کاربن ډای اوکساید کمښت Hypocapnea

په وینه کي د  $P_{CO_2}$  کمښت ته Hypocapnea وائي، چي د Hypoventilation له وجي منخته راځي او د همیش لپاره اوړی مودی Hyperventilation پسې رامنځته کيږي او دا ځکه چي پدغه وخت کي زیاته اندازه کاربن ډای اوکساید خارجيږي.

Hypocapnea په تنفس اغیزه کوي او د تنفس شدت او شمیر زیاتوي، د ویني باندي اثر کوي او pH او کلسیم غلظت يي زیاتوي، چي دا د Tetany سبب گرځي، او همدارنگه په مرکزی عصبی سیستم اغیزه کوي او عصبی تشوش، لتي، د درک احساس نه شتون او Muscular Twitching سبب گرځي.





- a. د اکسیجن د کمښت له وجی په دماغ کي د ټولو مرکزونو Depress کیدل.
- b. تنفسی ستمیدنی منځته راتگ.
- c. د Pupil پراخیدل.
- d. د زړه د ضربان کمښت.
- e. دتنفسی ستمیدنی تر منځ د وخت تدریجی زیاتیدنه.
- f. او بلاخره مرگ.

## Dyspnea

په تنفس کي د ستونزو منځته راتگ ته Dyspnea وائي.

په نارمل ډول کله چي انسان تنفس کوی نو توجه ئي نه وي، خو هر کله چي تنفس د ستونزو سره مخ شی او د تنفس په ترسره کولو ته ئي توجه پیدا شی نو دپته Dyspnea وائي.

هرکله چي تنفس کی کم تغیر منځته راځی نو شخص يي درک نه احساسوی او متوجی ورته نه وي، خو که چیرته د Ventilation اندازه د خپل نارمل څخه د 4-5 چنده پوری زیاته شي او شخص ناراحتی احساس کړي نو دغه اندازی او Level ته Dyspnea Point وائي.

په فزیولوژیکو حالتونو کي په ورزش کولو خصوصاً Muscular Exercise سره Dyspnea منځته راځي او په پتالوژیکو حالتونو کي Dyspnea په لاندي حالتونو کي منځته راځي.

- ✓ تنفسي ناروغي: Dyspnea په سينه بغل (Pneumonia)،  
'Poliomyelitis، 'Pulmonary Effusion، 'Pulmonary Edema  
Pneumothorax او سالنډي (Asthma) كې منځته راځي.
- ✓ قلبي ناروغي: په Left Ventricular Failure او  
Decompensated Mitral Stenosis كې منځته راځي.
- ✓ ميتابوليكي ناروغي: لكه د هايډروجن ايون غلظت زياتوالي،  
يوريميا او Diabetic Acidosis كې.

## :Dyspnea Index

Breathing Dyspnea Index هغه ضريب دی چې د  
( Reserve ) د تنفس اعظمي ظرفيت او په يوې دقيقه كې د تنفس شوي  
Maximum هوا د حجم ترمنځ تفاوت) او تنفس اعظمي ظرفيت )  
(Breathing Capacity) تر منځ نسبت څخه عبارت دی.

$$\text{Dyspnea Index} = (\text{B.R.} \div \text{MBG}) \times 100$$

او يا

$$\text{Dyspnea Index} = (\text{MBC} - \text{RMV}) \div \text{MBC} \times 100$$

Dyspnea هغه وخت انكشاف كوي كله چې دا ضريب د 60 %  
څخه بنسټه وي.

## دوروی تنفس

### Periodic Breathing

د تنفس غیر نارمل ریتم ته دوروی تنفس ( Periodic Breathing ) وائی. دوروی تنفس دوه ډولونه لري، چې هر یو ئې په تفصیل سره تر څیړنی لاندې نیسو.

#### 1 Cheyne Stokes Breathing

دا یو عام دوروی تنفس دی چې د چټک او ژور تنفس پواسطه لکه په Hyperperic Period کې او په مکمل ډول د تنفس په نه شتون (Apnea) پواسطه مشخص کیږي.

a. Hyperpneic Period: په ابتدا کې تنفس شدت کم وی خو وروسته په تدریجی ډول یې شدت زیاتېږي او تر اعظمی حد رسیدو

وروسته بیرته په تدریجی ډول کمېږي او بلاخره په خفگی ( Apnea ) باندې خاتمه پیداکوي، چې د تنفس Waxing – Waning ( په تدریجی ډول پورته او ښکته کیدل ) وائی. دا چې Waxing – Waning په کوم میکانیزم منځته راځي داسې ئې څیړو:

په قوي تنفس کولو سره په زیات اندازه کاربن دای اوکساید بهر ته وځي او د وینې د  $P_{CO_2}$  اندازه کمېږي چې دا بیا د تنفسی مرکزونو د نهی

سبب گرځي او خفگی ( Apnea ) منځته راځي ( دا ئې د Waning برخه )، د Apnea په دوران کې د وینې د  $P_{CO_2}$  زیا او  $P_{O_2}$  کمېږي او دا بیا د تنفسی مرکزونو د تنبی سبب گرځي او دا تنبی په تدریجی ډول زیاتېږي ترڅو چې خپل اعظمی حد ته ورسېږي ( دا ئې د Waxing

برخه)، او وروسته بیا په تدریجي ډول کمیري او د دوهم ځل لپاره دا لري بیا تکراریري.

b. Apneic Period: هرکله د تنفس شدت تر اصغری نقطی پوري راکم شی نو بیا تنفس د یو کم وخت لپاره دریري، او لږ وروسته بیا Hyperpneic Peroid صورت نیسی، او دا لری همداسی دوام مومي، چي هر دوره یوه دقیقی په برکی نیسي.

Cheyne – Stokes Period په دواړو حالتونو کي یعنی هم په فزیولوژیکو او هم په پتالوژیکو حالتونو کي منځته راځي. چي فزیولوژیک حالتونه ئي عبارت دي له: ژور خوب، لوړه ارتفاع، اوږد Voluntary Hyperventilation په نو زیریدیلو ماشوم او د سخت عضلاتي ورزش څخه.

او پتالوژیک حالتونه ئي عبارت دي له: Intracranial Pressure ډیرینت، د زړه ناروغي چي د زړه د عدم کفایي سبب گرځي، د پینتورگو ناروغي چي د یوریمیا سبب گرځي، د Narcotics پواسطه تسموم او Premature ماشومان.

## (2) Biot's Breathing :

پدي ډول تنفس کي د Waxing – Waning میکانیزم نشته، بلکی دا د خفگی (Apnea) او Hypercapnea د یوځاي شتون له مخي تشخیص کیري، پدي تنفس کي د Hypercapnea څخه وروسته فوراً Apnea منځته راځي او دا ځکه چي د Apnea په وخت کي د کاربن داي اوکساید د زیاتی تجمع له وجی Hyperventilation منځته راځي او دا

ددي سبب گرځي چي په زياته اندازه کاربن داي اوکساید بهر ته ووځي، نو پدي اساس تنفسی مرکزونه نهی کيږي او Apnea واقع کيږي. دغه ډول تنفس يوازي په پتالوژيکو حالتونو کي لکه دماغي ناروغيو کي تر سترگو کيږي.

## Cyanosis

په وينه کي د ارجاعي هيموگلوبين د شتون له وجي د پوستکي ابی کيدل د Cyanosis پنامه ياديږي. ددغه ارجاعي هيموگلوبين اندازه بايد % 5-7 پوري وي. هرکله چي Cyanosis واقع شی نو په ټول بدن کي خپريريږي خو په هغو ځايونو کي چي پوستکی نری وي لکه شونډي، غومبوري، پوزه او نوکانو څخه پورته د گوتو څوکو کي دغه ابی رنگ په ډير واضح توگه معلوميري.

په هغو حالتونو کي چي Cyanosis منځته راځي عبارت دي له:

- ✓ شرياني Hypoxia او Stagnant Hypoxia
- ✓ هرکله چي د هيموگلوبين جوړښت د تسموم کوونکو موادو پواسطه تغير ومومي چي پدغه وخت کي د پوستکي د رنگ پيکه والی ددي موادو له وجی وي نه د ارجاعي هيموگلوبين له وجي.
- ✓ په Polycythemia حالت کي.

## Atelectasis

د سږو د حجم کمښت د Airspace د پوره يا قسمي نه پراخيدو له وجی پيښی ته Atelectasis يا کولپس وايي يا په بل عبارت کله چي هوايي کڅوری په پوره يا قسمي ډول پراخه نه شي او دهغی له وجي د

سپرو حجم لږ شي Atelectasis ورته وايي. هرکله چې د سپرو يوه زياته برخه کولپس شي نو دا ددي سبب گرځي چې په وينه کې د اکسيجن مقدار راکم کړي او د تنفسی ستونزی رامنځته کړي.

هغه عوامل چې د Atelectasis سبب گرځي عبارت دی له:

✓ د Surfactant کمښت او غیر فعالیت چې د سطحې کشش د زیاتیدو په اثر سپري کولپس کيږي او د Respiratory Distress Syndrome منځته راوړي.

✓ د Bronchi او Bronchioles بندښت چې پدې وجه هغه هوائی کڅوړی (Alveoli) چې ددغو برانشی او برانشیولونو سره وصل دی کولپس کيږي.

✓ په Pleural Space کې د هوا، وینې او زوی (Pus) شتون لکه په Pneumothorax، Hydrothorax، Hemothorax او Pyothorax کې.

## Pneumothorax

په پلورال جوف (Pleural Cavity) کې د هوا شتون ته

Pneumothorax وائي. چې ددي پواسطه Intrapleural Pressure مثبت کيږي او د سپرو د کولپس کیدو سبب گرځي.

Pneumothorax په دري ډوله دی:

## (a) : Open Pneumothorax

د قوي جرحی د واقع کیدو وروسته که چیرته پلورال جوف د بهر سره ارتباط پیدا کړي نو دا د Open Pneumothorax پنامه یادي، چي دلته د ساه اخستنی په وخت کي هوا پلورال جوف ته ننوځي او د ساه اویستنی په وخت کي بیرته ورځخه اوځي، او د سږو د کولپس له وجی Hypoxia، Hypercapnea، Dyspnea، او Asphyxia منځته راځي.

## (b) : Closed Pneumothorax

د منځ مهال جرحی په وخت کي هوا پلورال جوف ته ننوځي، خو د پوستکي د الاستیکي خاصیت له مخي پلورال جوف د بهر اتموسفیر سره اړیکه نه پیدا کوي. دا هوا که کمه وي نو وروسته په کراره – کراره د پلورال جوف څخه بهر ته خارجيږي او د Hypoxia سبب نه گرځي.

## (c) : Tension Pneumothorax

په ځینو جرحو کي هغه نسجونه چي د صدري جدار له پاسه واقع دی اویا پخپله سږي د Fluttering Valve پشان دنده تر سره کوي، چي پدغه وخت کي پلورال جوف ه هوا داخليري خو د وتلو اجازه نه ورکوي او پدي ترتیب په پلورال جوف کي فشار لوړيږي او د سږو کولپس کیدو سبب گرځي.

## سینه بغل

# Pneumonia

سینه بغل چې د ځینو موادو د تنفس کولو او یا د بکتریاؤ او وایروسونو د مداخلی په اثر منځته راځي، پدې کې د سږو نسجونه په التهاب اخته کېږي او د وینې د حجرو تجمع پکې هم لیدل کېږي.

سینه بغل د تبي، د سینې د درد، کم تنفس، سیانوزس او بی خوبی سبب ګرځي.

## سالنډي

# Asthma

د بیلا بیلو تنبی ګانو په مقابل کې د هوائی لارو څو څو ځلی تنګوالی (Bronchospasm) ته استما وایي. چی د کلینک له مخي ناروغ په نوبتی ډول توخی، Dyspnea او Wheezing لري.

دا دواړه خصوصیات ئي د برانشي د ملسا عضلاتو د تقلص له کبله منځته راځي. چې دا تنګوالی د ادیما او د برانشیولونو په لومن کې د مخاط د تجمع له ډیرښت سره پیدا کېږي. هغه عوامل چې سالنډي ورڅخه منځته راځي عبارت دي له:

✓ د هوائی لارو التهاب ( Inflammation of Air Passage ): د Mast cells او Eosinophils څخه د Leukotriens افرازېږي او دا د Bronchospasm سبب ګرځي.



✓ د پوزي او حنجري د اعصابو Hypersensitivity چي د بيگانه پروټين له وجي منځته راځي.

✓ Pulmonary Edema او د سږو منجمد كيدل: دا چي د سالنډي دغه حالت د چپ زړه د عدم كفايي څخه منځته راځي نو ځكه د Cardiac Asthma پنامه ياديري.

سالنډي په جريان كې په ساه اخستنه او ساه اوپستنه دواړه كې ستونزي موجودې وي، برانشيولونه په ذاتي ډول ددي ليوالتيا لري چي د ساه اخستني په وخت كې پراخه او دساه اوپستني په وخت كې راتنگ شي نو ځكه د ساه اخستني په نسبت د ساه اوپستني په وخت كې ستونزي ډيري وي او ددي لپاره چي له سږو څخه هوا بهرته اووځي نو بايد بطني او صدري عضلات دواړه په شدت سره تقلص وكړي. كه پدي ساه اوپستنه كې له يو خوا سږي بنه تراكم نه كوي نو له بلې خوا كاربن ډاي اوكسايډ د تجمع سبب هم گرځي، چي دا تجمع د Acidosis، Dyspnea او Cyanosis سبب گرځي.

## Pulmonary Edema

د سږو په هوائي كڅوړو او بين البيني نسجونو ( Interstitial Tissues ) كې د مايعاتو تجمع ته Pulmonary Edema وايي، كوم چي د سينه بغل، د چپ زړه عدم كفايي او د Mitral Valve د امراضو له وجي چي د رپوي شعريه رگونو ( Pulmonary Capillaries ) فشار لوړوي او د مضره موادو لكه كلورين او سلفرداي اوكسايډ د تنفس كولو څخه منځته راځي.

Dyspnea د Pulmonary Edema، ټوخي، وينه لرونکي بلغم او سيانوزس د شتون له مخي تشخيص کيږي.

مزمنه بين البيني اديما (Chronic Interstitial Edema) دومره خطرناکه ده که چيرته تداوی نشي نو د سالنډي (Asthma) سبب گرځي.

## Pleural Effusion

په پلورال جوف کي د زيات مقدار هوا تجمع ته Pleural Effusion وائي، کوم چي د Dyspnea، Atelectasis او نورو تنفسي مرضونو سبب گرځي.

دا ناروغي د لمفاوي تخليي د بلاک، Pulmonary Capillaries Pressure د ډيروالي له وجي د ريوبي شعريه رگونو څخه د زياتی مایع تیریدنه او د Pleural Membrane د التهاب له وجي منځته راځي.

## توبرکلوز

### Tuberculosis

توبرکلوز چي د Tubercle Bacili پواسطه منځته راځي د بدن هره برخه متاثره کوي خو ددي ټولو په نسبت سږي ډيري متاثره کيږي، چي دغه متاثره برخه ئي بيا د Macrophage پواسطه له منځه ځي او په فيروزس باندي بدليري چي دغه برخي ته Tubercle وائي.

توبرکلوز پواسطه د سږو تر ټولو لمړی هوائي کڅوړی متاثره کيږي او دتنفسي غشا د ضخامت د زياتوالی له وجي د غازونو د نفوذ په

مخ کي خنډ پيدا کوي. که چيرته توبرکلوز تداوی نشی د سږو دمنځه تللو سبب ګرځي.

## Emphysema

Emphysema چی د تنفسی لارو بندښت یوه ناروغي ده او د سږو دخرابیدو سبب ګرځي، کوم چی سګرټ څکولو، د Oxidant غازونو د تنفس او د Bronchitis د نه تداوی په نتیجه کي منځته راځي.

هغه تغیرات چی ددی ناروغي د انکشاف په نتیجه کی منځته راځی په لاندی ډول تری یادونه کوؤ:

- ✓ د سګرټ څکل او یا د Oxidant غازونو تنفس د برانشی د تخرش سبب ګرځی او مزمنو انتاناتو ته زمینه مساعدوي.
- ✓ پدغه وخت کی د Respiratory Epithelial حجرو پواسطه زیات مخاط افرازیږي چی دهوائی لارو د بندښت سبب ګرځي.
- ✓ سیلیاؤ حرکت ډیر زیات راکمیري او پدی ترتیب دمخاط د انتقال مانع ګرځي، او دمخاط تجمع له وجی د هوائی لارو بندښت صورت نیسي.
- ✓ Alveolar مخاطی غشا تخریب صورت نیسي.
- ✓ د الاستیکی نسجونو تخریب صورت نیسي.

پای

ومن الله توفیق





---

# INDEX

---

## A

Adam's Apple · 26  
Adenoid · 24  
Adrenaline Apnea ·  
163  
Afferent Nerve  
Pathway · 134  
Afferent Nerves · 130  
Air Conditioning · 22  
Alveolar Duct · 39  
Alveolar Macrophage ·  
35  
Alveolar Sac · 39  
Alveolar Ventilation ·  
58  
Alveoli · 39  
Anatomical Dead  
Space · 79  
Anatomical Shunted ·  
90  
**Anatomy and**  
**Histology of** · 17  
Anemic Hypoxia · 167  
Angiotensine  
Converting  
Enzyme · 16  
Anticoagulant  
Function · 16  
Antiport Pump · 125  
**Apnea** · 161  
Apneustic Center ·  
130, 132

Arthynoid Cartilage ·  
26  
Asphyxia · 176  
**Asthma** · 184  
Atelectasis · 181  
Azygos Vein · 52

---

## B

Bhor effect · 114  
Biot's Breathing · 180  
Blood Brain Barrier ·  
143  
BPG · 119  
Bronchi · 17  
Bronchial Vein · 52  
Bronchioles · 37  
Bronchiopulmonary  
Segments · 43

---

## C

Carbamino · 123  
Carbamino  
Compounds · 124  
Carbonic Anhydrase ·  
115, 127  
Carina · 32  
Central Apnea · 163  
Cerebrospinal Fluid ·  
143  
Chemoreceptors · 142

Cheyne Stokes  
Breathing · 179  
Closed Pneumothorax  
· 183  
**Compliance of the**  
**Lungs and Thorax** ·  
68  
Computerized  
Spirometer · 74  
Conchea · 19  
Conducting Zone · 34  
Corniculate · 26  
Costal Cartilages · 46  
**Cough and Sneeze**  
**Reflexes** · 57  
Cricoid Cartilage · 26  
Cyanosis · 181

---

## D

Dead Air · 79  
Dead Space · 59, 79  
Defense · 15  
Deqlutition Apnea ·  
162  
Diaphragm · 17, 47  
Dyspnea · 177  
Dyspnea Index · 178



---

## E

### Efferent Nerve

Pathway · 133

Efferent Nerves · 130

Emphysema · 187

Epiglottis Cartilage · 26

Expiratory Center ·

130, 131

Expiratory Reverse

Volume (ERV) · 70

---

## F

False Vocal Cords · 28

**Fetal Hemoglobin** ·

122

FEV<sub>1</sub> · 74

FEV<sub>2</sub> · 74

FEV<sub>3</sub> · 74

Fissure · 43

Forced Expiratory

Volume (FEV) · 74

Function of

Respiratory System

· 14

Functional Residual

Capacity (FRC) · 71

---

## G

Gases Exchang · 14

Gaspe type of

Respiration · 132

---

## H

Haldane Effect · 124

Hamburger

Phenomenon · 125

Hard Plate · 19

**Helium Dilution**

**Technique** · 76

Hemoglobin Buffer ·

111

Hemoglobin

Saturation

Percentage · 106

Hering Breuer · 137

Hering Breuer

Deflation Reflex ·

138

Higher Center · 137

Hilum · 43

Histotoxic Hypoxia ·

169

Hyaline Cartilage · 26

Hyaline Membrane

Disease · 64

Hyperbaric Oxygen ·

173

Hypercapnea

(Hypercaba) · 174

Hypercapnia · 87

Hyperventilation · 164

**Hypocapnea** · 175

Hypocapnia · 145

Hypoventilation · 165

Hypoxia · 87, 146, 165

Hypoxic Hypoxia · 166

---

## I

Inferior Conchea · 20

Inferior Meatus · 20

Inspiratory Capacity

(IC) · 70

Inspiratory Center ·

130, 131

Inspiratory Ramp · 134

Inspiratory Reverse

Volume (IRV) · 69

---

## L

Laryngopharynx · 23

**Larynx** · 26

Lower Respiratory

Tract · 17

**Lungs** · 43

Lungs Air Volumes · 69

Lungs' Air Capacities ·

70

---

## M

Maintenance of

Body Water

Balance · 16

Maximum Breathing

Capacity (MBC) · 73

Maximum Expiratory

Flow · 157

Meatus · 20

Medullary Center ·

130, 131, 134



Middle Conchea · 20  
Middle Meatus · 20  
*Minute Ventilation* · 73  
*Mixed Apnea* · 163  
**Muscles of  
Respiration** · 46

---

## **N**

*Nares* · 19  
Nasal Septum · 19  
Nasopharynx · 23  
**Nitrogen Washout  
Method** · 77  
Nose · 18  
*Nostrils* · 19

---

## **O**

*Obstructive Apnea* ·  
163  
*Ofaction* · 15, 22  
Open Pneumothorax ·  
183  
Oropharynx · 23  
Overventilation · 164  
Oxygen Hemoglobin  
Dissociation Curve ·  
112  
**Oxygen Therapy** · 172  
**Oxygen Toxicity  
(Poisoning)** · 173  
Oxygenthrapy · 87

---

## **P**

*Pain Receptors* · 140  
Parietal Pleura · 50  
**Partial Pressure** · 81  
*Peak Expiratory Flow  
Rate (PEFR)* · 73  
**Periodic Breathing** ·  
179  
Pharyngeal Tonsil · 24  
**Pharynx** · 23  
Physiological Dead  
Space · 79  
**Plethysmography** · 78  
**Pleura** · 50  
Pleural Cavity · 46, 50  
Pleural Effusion · 186  
Pleural Fluid · 35, 50  
**Pleural Pressure** · 65  
*Pnemotaxic Center* ·  
132  
Pneumocytes · 63  
**Pneumonia** · 184  
Pneumotaxic Center ·  
130  
Pneumothorax · 182  
*Pontine* · 136  
Pontine Center · 132  
Pontine Centers · 130  
Primary Bronchi · 32,  
35  
*Proprioceptors* · 140  
Pulmonary Edema ·  
86, 88, 185  
Pulmonary Ventilation  
· 58

---

## **Pulmonary Volumes & Capacities** · 69

---

## **R**

Recoil · 62  
*Regulation of Blood  
pH* · 14  
*Regulation of Body  
Temperature* · 16  
*Residual Volume (RV)* ·  
70  
*Resonance* · 23  
Respiratory  
Membrane · 86  
Respiratory Centers ·  
130  
Respiratory Distress  
Syndrome · 64  
**Respiratory Exchange  
Ratio** · 92  
Respiratory  
Membrane · 41, 84  
*Respiratory Minute* ·  
73  
Respiratory Minute  
Volume · 58  
Respiratory Nerves ·  
130  
**Respiratory Quotient** ·  
93  
Respiratory Zone · 34,  
39  
Respirometer · 74  
Reverse Chloride  
Shifting · 125



---

**Rhythmic Ventilation** ·  
128

---

## S

Secondary (Lobar)  
Bronchi · 37

Segmental Bronchioles  
· 43

Shunted Blood · 90

Simple Spirometer · 74

Soft plate · 23

Spirometer · 74

Stagnant Hypoxia · 168

Steep Slope · 111

Superficial Lymphatic  
Vessels · 56

Superior Concha · 20

Superior Meatus · 20

Surfactant · 41, 63

Synthesis of  
Hormonal  
Substance · 16

---

## T

Tension  
Pneumothorax ·  
183

Terminal Bronchioles ·  
37

Tertiary (Segmental)  
Bronchi · 37

Thermoreceptors · 140

**Thoracic Wall** · 46

Thyroid · 26

*Tidal Volume (TV)* · 69

*Total Lung Capacity*  
(*TLC*) · 72

Trachea · 17, 32

Trachialis Muscles · 32

Trachiobronchial Tree  
· 34

**Transport of Carbon**  
**Dioxide** · 123

True Vocal Cords · 28

Tuberculosis · 186

Twenty Volumes  
Percent · 107

Type I Pneumocytes ·  
40

Type II Alveolar Epi. ·  
63

Type II Pneumocytes ·  
41

---

## U

Utilization Coefficient ·  
109

---

## V

Vagal Apnea · 162

Venous Admixture of  
Blood · 95

**Ventilation** · 58

Vestibular Folds · 28

Vestibule · 19

Visceral Pleura · 50

Vital Capacity · 75

*Vital Capacity (VC)* · 71

Vocal Folds · 28

Vocalization · 15

Voluntary Apnea · 161

---

## W

Water Vapor Pressure  
· 82

Waxing – Waning · 179

---

## Z

Zone I · 55

Zone II · 55

Zone III · 55

---

## J

J-*Baroreceptors* · 139



## ماخذونه

1. Seeley, Stephens, Tate Anatomy & Physiology, 6<sup>th</sup> edition, Mc Graw Hill Company
2. K.Sembulingam, Prema Sembulingam Essentials of Medical Physiology, 4<sup>th</sup> edition, JAPEE Company 2006 India
3. GUYTON & HALL Text book of Medical Physiology, 11<sup>th</sup> edition, ELSEVIER Saunder Company 2006 China
4. LUIZ Carlos JUNQUEIRA, Jose CARNEIRO Basic Hisotology, 11<sup>th</sup> International edition, Mc Graw Hill Company, 2005 USA



## ليکوال لنډه پيژندنه

ډاکټر حامد شیرشینواري د ننګرهار ولايت د هسکه ميني د لالاکلي پوري اړه لري، چې د نوموړي ولايت په مرکز جلال اباد ښار څلورمه ناحیه کې په 1369 هجري شمسي کال د حمل په 16 نيټه کې د الحاج گلبرخان په يودينداره او مدني کورني کې نړي ته سترګي پرانستلي.

لمړني زده کړي يې د خپل پلار او دمسجد مولوي صيب څخه پيل کړي او په 1374 هجري شمسي کال کې د نصرت متوسطه (چې اوس مهال لیسې ده) ښونځي کې شامل شو، تر ابتدايه دورې پوري د همدې لیسې د مهربانو او علمي کورنو څخه زده کړي وروسته د شهيد محمد عارف عالي لیسې ته تبدلي وکړه او پدې لیسې د استادانو هڅوونې او تشويق نور هم د نوموړي ژوند ته علمي رڼا راوستله او په نوموړي لیسې کې د پيژندل شوو ممتازو زده کوونکي کې ياديدلو چې د متوسطي دورې پوره کولو څخه وروسته يې ننګرهار عالي لیسې ته تبدلي وکړه او بلاخره په 1385 کې په عالی درجه د دولسم ټولګي څخه فارغ شو.

ډاکټر شينواري د 1386 کانکور امتحان له لاري د شيخ زاهد پوهنتون طب پوهنځي ته کامياب شو چې وروسته د قانوني مرحلو د ترسره کولو څخه ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته يې تبدلي وکړه او په 1393 هجري شمسي کال يې فراغت سند تر لاسه کړ.

ډاکټر حامد شیرشینواري ليکلی کتابونه:

- 1 - دتنفسي سيستم اناتومي اوفزيولوژي (همدا کتاب)
- 2 - د زړه او رگونو اناتومي او فزيولوژي (ناچاپ)
- 3 - اسلام او زړه او رگونو سيستم (ژباړه) (ناچاپ)

ډاکټر لياقت (فضلي مومند)



**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)  
Ketabton.com: The Digital Library**