


## لومړۍ شپږ کې

**مخلوط (Mixture):** دوه او یا خو ډوله مواد داسې سره یوځای شوي وي ، چې د هري یوې مادي مقدار د ظاهري خواصو په ساتلو سره بدلون وکړي د (Mixture) پنوم یادېږي او یا د دوه یا خو ډوله موادو یو ځای کيدل په یوه نه تاکل او کيفي نسبت داسې، چې د هغوي په منځ کې بشپړه کيمياوي بدولونونه ليدل شي د مخلوط (Mixture) په نوم یادېږي.

مخلوطونه په دوه ډوله دي چې د (Homogen) او (Hetrogen) خخه عبارت دي:

**متجانس مخلوطونه:** هغه مخلوطونه دي چې د هغوي تشکيل کونکې اجزاوي د مخلوطې سيستم په ټولو برخو کې مساوي او یوشان ويشل شوي وي او په یوه فاز کې دي مثلاً مالګې او اوبو ، الکول او اوبله او داسې نور...

**غیر متجانس مخلوطونه:** هغه مخلوطونه دي، چې د هغوي تشکيل کونکې اجزاوي د مخلوطې سيستم په ټولو برخو کې مساوي او یوشان ويشل شوي نه وي، هره برخه یې بېلاښل کيمياوي او فزيکي خواصلري . مثلاً د مميزو او نخدو مخلوط ، مې او وريجو مخلوط او داسې نور...




**فاز (Phase):** د سيستم د هغې برخې خخه عبارت دي چې د سيستم د نورو برخو خخه د ليدلو وړ وي سطحي پوسيله جلا شوي وي او د هغه ټوليې برخې د یوشان فزيکي او کيمياوي خواصو لرونکې وي.

**کامپونت (Component):** د مخلوطي سистем تشکيل کونکي اجزاوي يعني محلل يا حل کوونکي (Solute) او محلل يا حلidonکي (Solvent) د کامپوننت پنوم ياديري.

**محلولونه (Solution):** محلولونه عبارت د هجه متاجانس مخلوط خخه عبارت دي چې په تولو برخو کې يو شان کيمياوي او فزيکي خواص لري او جورونکو موادو د اندازې تناسب د تاکلو حدودونو ترمنځ د بدلون وړوي.

محلولونه لږ تر لړه دوه برخې لري:




منحله مواد د محلول هجه برخه ده، چې اړونده ذرات یې د محلل په مالیکولونو کې خپرېږي محلل د محلول هجه برخه ده، چې د منحله موادو ذرات له هرې خوانه احاطه کوي او هجه په خپل خان کې خپروي.

هجه (Solute) چې اشتراكې (کولانت) اړيکې ولري، په کولانت اړيکې لرونکي محلل کې حلېږي او هجه (Solute) چې د برقي اړيکې لرونکي وي په ايوني محلل کې حلېږي او قطبي محلل په قطبي محلل کې حل کېږي.

حل کيدل د محلل په مالیکولونو کې د منحله موادو له خپریدو خخه عبارت دي. د بېلاپلوا پوهانو د نظرې په بنست حل کيدل یوه فزيکي يا کيمياوي عملیه ده.

## الف: د محلول کيمياوي نظريري:

مندليف د نظريري په بنست په محلل کي د منحله موادو حل کيدل يو کيمياوي عملیه د يعني د منحله موادو ذرات د محلل له ماليکولونو سره نوي کيمياوي رابطي جوروسي. د مثال په ډول: په اوبو کي د  $KCl$  مالگي د حل کيدو په مهال په لومړيو کي په خپلو اړونده ايونونو تفکيك کيږي او وروسته د اوبو د ماليکولو پوسيله هري خوانه د نويورابطو په جورولو سره احاطه کيږي:




مثلاً: که د ګوګر و تيزاب په اوبو کي حل کړو ډير زيات حرارت آزادېږي. يا که کاپر سلفيتو سپين پودر اوبو کي حل شي د حاصل شوی محلول حجم د عومي حجم په نسبت 3.5% کم وي.



د پورتنيو مثالونو خخه داسي معلومېږي، چې د محلل او حل شوی مادي زرات يو په بل کي ساده نه ګلهېږي بلکې د هغوي تر منځ متقابل تاثير دومره شدید دي، چې په هغو کي د سيسنتم انرژۍ او د اوليې موادو خواص بدلون کوي، نو خکه د انحلال عملیه کيمياوي تعامل ته ورته او د محلول ددي نظريري طرفداران وايې، چې د محلل او حل شوی مادي د زراتو تر منځ کيمياوي اړيکې جورېږي.

## پ: د محلول فزيکي نظريري

او Arrhenius Vant-Hoff د نظر پرينست په محلل کې د منحله موادو حل کيدل يو فزيکي عملیه ده. يعني د منحله موادو او محلل د دراتو ترمنځ يوازې برقي قوي تاثير کوي او کيمياوي اړيکې د هغوي ترمنځ نه جورې پې مثلاً: په  $(H_2O)$  کې د  $KCl$  حل کيدل.<sup>(1)</sup>



- ۱- د منحله مادي او محلل ذراتو ترمنځ فزيکي قواوې عمل کوي.
- ۲- په قطبي ماليکولونوکې الکتروستاتيکي قواوې ډيرې قوي وي.
- ۳- په غير قطبي ماليکولونو کې د غه قوي ډيرې ضعيفې وي.

په محلل کې د جامدو کرستلي موادو د حل کيدو په مهال انژي مصرف کېږي، چې د کرستلي انژي یا شبکوي انژي په نوم یادېږي او هغه په (Ucryst) بنېي


شبکوي انژي هغه انژي ده چې د کرستلي جسم د تشکيل پر مهال له متشكله ذراتو خخه تولیدېږي او د متشكله ذراتو د رابطو غوڅولو لپاره (د کرستال د تخريب لپاره) هم عين مقدار انژي ته اړتیا ده.

کله چې هايدريتي قشد منحله موادو شا و خواته تشکيلېږي، یو مقدار انژي تولیدېږي چې هايدريشن (Hydration) انژي ورته وايې او هغه په  $(\Delta H_h)$  بنېي.

د شبکوي انژي او هايدريشن انژي محصله د حل کيدلو انژي ده چې په  $(\Delta H_{sol})$  بنودل کېږي.

$$(\Delta H_{sol} = \Delta H_h + U_{cryst})$$

د انحلاليت په عملیه کې که چېري ( $\Delta H_h$ ) د (انحلاليت)  $\Delta H_{sol}$  په مایع کې جامد موادو په حل کيدو سره يو مقدار انرژۍ ته اړتیا ده ، يعني د حل کيدو لپاره يې باید تودو خه ورکړل شي او د ډیرو جامدو موادو حل کيدل په اوړو کې په همدي اساس رامنځته کېږي او د تودو خې د درجې په ډیریدو سره په اوړو کې ډیری حل کېږي. د مالګې انحلاليت د تودو خې له درجې سره په ارتباط که په کواردینات سیستم کې وښو دل شي، اکثره مالګو باندي د انحلاليت منحنۍ صعودي مسیر طی کوي.




که چېري ( $\Delta H_h$ ) د (انحلاليت)  $\Delta H_{sol}$  سره مساوي شي، د تودو خې ډیریدل په انحلاليت اغیزه نلري که چېري ( $\Delta H_h$ ) د (انحلاليت)  $\Delta H_{sol}$  سره کوچني وي د موادو د حل لپاره اضافي تودو خه پکار نده . دغه عملیه (Exothermic) ده. يعني د انحلاليت په وخت يو مقدار انرژۍ تولیدېږي په همدي ترتیب ویلى شوچې د تودو خې درجه په مایع کې د جامدو موادو په انحلاليت تاثير لري د مایع او گاز په انحلاليت کې دوه میخانیکیتونه موجود دي، چې د فزيکي او کيمياوي میخانیکیت په نامه یادېږي په فزيکي میخانیکیت کې د مایع او گاز د مالیکولونو تر منځ د واندروال کمزورې قوې عمل کوي او د هغوي ترمنځ کيمياوي رابطې جوړوي.

د بيلگي په توګه: په اويو کي نايتروجن او اکسيجين د فزيکي ميخانيکيت پر بنست تر سره  
کيربي




په دې ترتیب هوا په اوبو کي حل کيربي انحلاليت يې د تودو خې په ډيريدو سره کيميربي چې  
په لاندې بنه کي بنه ليدل کيربي






باید ووايو چې د گاز او مایع انحلاليت د فشار په ډيريدو سره ډيرېږي د Henry د رابطې  
پوسيله بنه توضیح کيربي  $N = K \times P$  پدې رابطه کي  $(N, K, P)$  هنري ثابت او mol-Fraction د وارده  
فشار خخه عبارت دی ، دغه رابطه بنسيي، چې د فشار په ډيريدو سره د گاز او مایع انحلاليت هم  
ډيرېږي.

### Gas Solubility – Effect of Pressure



د کيمياوي ميختانيكيت پربنست په او بو کي د گاز ماليکولونه د کيمياوي تعامل پوسيله حل کيربي . د بيلگي په توګه :



په گازي محلولونو کي ماليکولونه يو د بل سره مخلوط شوي وي او دير ضعيف مواد دي او په دغه سيستم کي د ماليکولونو غير منظم شکلونه او ناتاکلي جورښتونه ليدل کيربي او همدارنگه گاز يې تر عادي فشار لاندي د فزيکي مخلوط په شکل مطالعه کيربي .

يو هم د گازي محلولونو خخه هوا ده چې ۷۸٪ نايتروجن و ۲۱٪ اكسجين ۱٪ نجیبه غازات او کاربن داي اكسايد بخار لوگي او به او نورو خارجي موادو خخه تشکيل شوي دي .




### په ماياعاتو کي د ماياعاتو انحلاليت

ماياعات د ارونده کيمياوي طبیعت پر بنست په يو بل کي حل کيربي، تول هغه ماياعات چې قطبی خانګرتيا لري په قطبی ماياعاتو کي حل کيربي لکه : ايتانول په او بو کي دير په اسانه حل کيربي، حکله ايتانول او او به دواړه قطبی مرکبونه دي.

ماياعات په ماياعاتو کې په نامحدوده بنه يعني په هر تناسب حل کيربي او يا په محدوده بنه حل کيربي، د بيلگې په توګه ايتانول په اوبو کې په هر نسبت حل کيربي يا په بل عبارت په محدوده بنه په اوبو کې حل کيربي بنzin چې يو غير قطبي مرکب دي په کې او به نشي حل کيداي، خو په کاربن تراكلورايد ( $CCl_4$ ) مرکب کې چې يو غير قطبي مرکب دي په اسانۍ حل کيربي باید ووايو، چې په ماياعاتو کې د ماياعاتو انحلاليت ته فشار او تودو خه نده پکار.

ماياع محلولونه به منفرد شکل او داخلي جوربنت يې منظم او نبردي دي ، د رقيقو محلولونو جوربنت د محلل د جوربنت سره او دغليظو محلولونو جوربنت د منحله موادو سره ورته والي لري ، په ماياع محلولونو کې د منحله مادي زرات د محلل د مجاورو زراتو سره ارتباط لري .



### د محلولونو طبقه پندي:

په عمومي دوں محلولونه د یو محلول د حالات خخه تاکي . محلولونه کيداي شی جامدات ، ماياعات ، يا گازات وي ، چې دا تول د محلل حالت پوري اړه لري ، ئکه نو محلولونه په جامد محلولونو ، ماياع محلولونو او غاز محلولونو ويشل شوي دي ، که خه هم چې محلولونو کې نور محلولونه هم استعماليري خو ډير مهم محلل په لبراتوارونو کې او به تشکيلو ډير منحله مواد کولاي شی اوبو کې حل شی ، د اوبو محلولونو د اوبلنو محلولونو (په اوبو کې ) چې په لاثنی ژبه کې ورته aqueous ويل کيربي .

1- جامد په جامد کې لکه د فلزاتو الياژونه .

۲- جامد په مايع کې لکه د مالګي محلول په اوبوکي .

۳- جامد په گاز کې لکه لوگي .

۴- مايع په جامد کې لکه کريستلي او به په مالگو کې .

۵- مايع په مايع کې لکه الکول په او بو کې .

۶- مايع په گاز کې لکه وريخي .

۷- گاز په جامد کې لکه هايدروجن په پلاتين کې .

۸- گاز په مايع کې لکه په او بو کې منحل اسجين

۹- گاز په گاز کې لکه هوچي د مختلفو گازونو يو مخلوط دي . ۱

### د محلولونو ډولونه:

۱- **رقيق محلول** : هرکله چې د منحله مادي لږ مقدار په زيات مقدار محلل کې موجود وي هغه محلول ته رقيق محلول وايبي . مثال پنځه ګرامه سوديم کلورايد په سل سی سی او بو کې .



۲- **غلیظ محلول** : که د منحله مادي زيات مقدار په لږ مقدار محلل کې موجود وي هغه محلول ته غلیظ محلول وايبي د مثال په ډول شل ګرامه سوديم کلورايد په سل سی سی او بو کې .

۳- **مشبوع محلول** : که په يو تاکلي تودوخي درجه کې د منحله مادي اعظمي مقدار په يو مقدار محلل کې موجود وي هغه محلول ته مشبوع محلول وايبي .

۴- **غیر مشبوع محلول** : که په يو مشبوع محلول کې يو مقدار محلل واچول شي هغې ته غير مشبوع محلول وايبي .

۵- **نيم مشبوع محلول** : که د مشبوع محلول د حجم مساوى مقدار محلل په هغه باندي واچول شي ورته نيم مشبوع محلول وايبي . ۲

۶- **ما فوق المشبوع محلول** : که مشبوع محلول ته تودو خه ورکړو او منحله ماده ورباندي علاوه کړو، ترڅو په هغه کې حل شي که محلول سورې شي او بيرته لومړي تودو خي ته راشي پدې صورت کې محلول ته ما فوق المشبوع محلول وايي.



هغه معينه اندازه منحله مواد چې د حرارت په یوه معينه درجه کې د مشبوع محلول د لاسته راولو لپاره پکاريږي د انحلال په نوم ياديږي.

### ۱-۱ - د محلول د غلظتونو ځانګړ تیا (Concentration)


غلظت د معین مقدار منحله موادو د حل کیدو خخه په تاکلي مقدار محلل او یا محلول کې عبارت دی. غلظتونه په کيميا سلنې غلظت ، مولريتي (Molarity) غلظت ، نارمليتي (Normality) غلظت او مولليتي (Molality) غلظت بنېي هر یو په لنډه توګه تشریح کو.

### 1-1-1-1 حجمي سلنپ غلظت:

په 100ml کې د تاکلي مقدار منحله موادو له حل کيدو خخه عبارت دی دمثال په ډول په محلول کې د 20gr سوديم کلورايد دحل کيدو په نتيجه کې 20% محلول يې حاصلېږي . په همدي ترتيب په 100ml محلول کې د 10gr سوديم هايدرو اكسايد دحل کيدو په نتيجه کې 10% محلول چې لاس ته رائي . دا باید یاد کړو چې حجمي سلننه په کيميا کې ډير رواج نه لري .

### 1-1-2 وزني سلنپ غلظت:

په 100gr محلول کې د تاکلي مقدار منحله موادو د حل کيدو خخه عبارت ده دمثال په ډول د 80gr او  $\text{NaCl}_2\text{Ogr}$  او 80gr او بو د حل کيدو خخه 20% خالص محلول لاس ته رائي چې په لاندې شکل لیکل کېږي .



وزني سلننه د لاندې رابطې پوسيله هم شميرلى شو

$$W\% = \frac{M_1}{M_1+M_2} \cdot 100$$

پدی رابطه کې  $w\%$  وزني سلننه  $M_1$  د منحله موادو مقدار او  $M_2$  د محلل مقدار دی دمثال په ډول ده ګه محلول وزني سلننه غلظت وشميري، چې د 250gr او  $\text{NaOH}-20\text{gr}$  او بو دحل کيدو په پايله کې لاس ته رائي .

$$M_1=20\text{gr}$$

$$M_2=250\text{gr}$$

$$w\% = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot 100$$

$$w\% = \frac{20\text{gr}}{20\text{gr} + 250\text{gr}} \cdot 100 = 7.4\%$$

$$w\% = 7.4\%$$

دو همه لاره  $m_1 + m_2 = 20\text{gr} + 250\text{gr} = 270\text{gr}$

$$270 \text{-----} 20$$

$$100 \text{-----} X$$

$$X = \frac{100 \cdot 20}{270}$$

$$X = 7,4\%$$

### 3-1-1- مولريته غلظت (Molarity)

په يو ليتر (1000cc) محلول کې د حل شوي مادي د مول شمير د هغى محلول د مولريته په نامه ياد يېرى.



مثال: داوبو په نيم ليتر محلول کې (196) گرامه د گوگړو تيزابو حل شوي دی ددی محلول مولريته معلومه کړي.

$$M = H_2SO_4 = 2.1 + 32 + 4.16 = 98 \quad \text{حل}$$

|           |               |
|-----------|---------------|
| محلول حجم | وزن $H_2SO_4$ |
|-----------|---------------|

|         |      |
|---------|------|
| په گرام | (ml) |
|---------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| 500ml | 196 |
|-------|-----|

|        |   |
|--------|---|
| 1000ml | X |
|--------|---|

$$X = \frac{1000 \cdot 196}{500} = 392 \text{ gr}$$

$$n = \frac{M}{m} \quad \text{دمول شمير}$$

$$M = 392 \text{ gr}$$

$$m = 98$$

$$N = \frac{392}{98} = 4 \text{ moles}$$

$$X = \frac{392 \text{ gr}}{98} = 4 \text{ moles}$$

| د دمحلول حجم | د حل شوي مادي مولونه | مولاريتي |
|--------------|----------------------|----------|
| ml           | moles                | M        |
| 1000         | 1                    | 1        |
| 1000         | 4                    | X        |

مثال: که د 500ml 20gr.NaOH محلول کي موجود وي مولاريتي به يې خووي؟

$$1000 \text{ ml} \quad 40 \text{ gr} = 1 \text{ M} \quad \text{حل}$$

$$500 \text{ ml} \quad 20 \text{ gr} = X$$

$$X = \frac{20 \cdot 1000}{40 \cdot 500} = 1 \text{ M}$$

$$X = 1 \text{ M}$$

او يا د لاندي فارمول په اساس کولي شوچي د یو محلول مولاريتي پيدا کړو:

$$P = Eq \cdot T$$

#### 4-1-1-1 فارملتى علظت (Normality)


په 1000ml محلول کي د منحله مواد د معادل گرام له حل کيدو خخه عبارت دي.

محلول = 1N

Eq/1000mli



معادل گرام دعنصر هجه مقدار دی چې له 1gr هایدروجن او یا 8gr اکسیجن سره تعامل وکولای شی.



او په مرکبونو کې معادل گرام وزن دلاندې رابطی پرینست شمیرل کېږي

$$Eg = \frac{m}{Am}$$

$$Eg HCl = \frac{36,5}{1} = 36,5$$

$$Eg H_2SO_4 = \frac{98}{2} = 49$$

مثال: په 100 ملى لیتر محلول کې 9,8 گرامه د گوګرو تیزاب حل شوي دي ددغه محلول نارملتی معلومه کړي.

حل:

$H_2SO_4 = 98$  مالیکولی کتله

$$Eg H_2SO_4 = \frac{98}{2} = 49$$

1m=2Nsolution

$$N = \frac{m}{2} \quad N = \frac{4,9}{100cc}$$

$$\frac{98\text{gr}}{1000\text{cc}} = 1\text{m} = \frac{9.8\text{gr}}{100\text{cc}}$$

$$\frac{49\text{gr}}{1000\text{cc}} = 1\text{n} = \frac{4.9}{100\text{cc}}$$

مثال: که د 3,65gr . HCl په 500ml محلول کي حل شى نارمل غلظت يې په لاندې دول شميرل  
کيږي

$$\left[ \frac{1000\text{ml} - 36.5\text{gr} - 1N}{500\text{ml} - 3.65\text{gr} - X} \right] X = \frac{3650}{18250} = 0.2$$

او يا په بله طریقه:

$$1000\text{ml} - 36.5\text{gr}$$

$$500\text{ml} - Eq - gr$$

$$Eq_{-gr} = \frac{500\text{ml} \times 36.5\text{gr}}{1000} = 18.25\text{gr}$$

$$N = \frac{P}{Eq} = \frac{3.65\text{gr}}{18.25\text{gr}} = 0.2$$

مثال: د فاسفوريك اسيد 6gr معادل وزن په 15 mlit محلول کي حل شوي تاسي دنوموري  
محلول نارمليتي پيداکړي؟



حل

$$H=3.1=3$$

$$P=1.30=30$$

$$O=4.16=\frac{64}{97}$$

معادل ګرام وزن

$$\frac{\text{مالیکولی وزن}}{\text{موترولاتس}} = \frac{97\text{gr}}{3} = 32,33\text{gr}$$


$$\left[ \frac{1000ml - 32,33gr}{15ml - X} \right] X = \frac{15 \times 32,33}{1000} = 0.48495 gr$$

$$N = \frac{6gr}{0.48495} = 12.3724$$

### 5-1-1 مولالیتی غلظت Molality

په 1000gr محلل کي دمنحل موادو دمول له حل خخه عبارت دي يعني:

mol / 1000gr = محلل 1m



دمثال په توګه په 1000gr خالص او بوا کي ديو مول NaOH دحل په پايله کي يو مولل خالص محلول جو پوري.

1m NaOH = 40gr

40gr/1000gr  $H_2O$  = 1M

ددوه مولل محلول دجوړولو لپاره NaOH خوګرامه ته ضرورت لري.

$$1m=40/1000gr \ H_2O$$

$$2 = X/1000gr \ H_2O$$

$$X=2.40=80gr$$

مونبه کولاي شو چې مولاليتى غلظت د لاندې رابطى پوسيله هم وشميرو:

$$m=\frac{a \cdot 1000}{m \cdot b}$$

په دی رابطه کې  $m$  مولاليتى غلظت ،  $a$  د منحله موادو مقدار ،  $m$  د منحله موادو ماليکولي وزن ،  $b$  د محلل مقدار

مثال : د محلول مولاليتى غلظت وشميرى، چې 20gr ياد شوي مرکب په 500gr خالص او بو کې حل شوي وي

$$m \ NaCl=23+35,5=58,5 \quad \text{حل}$$

$$a=20gr$$

$$b=500ml$$

$$m=\frac{a \cdot 1000}{m \cdot b} = \frac{20 \cdot 1000}{58,5 \cdot 500} = 0,68$$

$$b=500gr$$

(1)

## 2-1- د محلولونو ځانګړ تیاوې


د محلولونو یو شمير فزيکي ځانګړتیاوې د منحله موادو د شمير او په محلول کې تر حرکت پوري اړه لري، چې د (Colligative) ځانګړتیاوو په نامه یادېږي.

دغه ئانگرتياوي د (Osmotic Pressure, Osmosis, Diffusion) د محلولونو د بخار فشار تيتييدل ، محلولونو د جوش تكى لوريديل او د محلولونو د انجماد تكى تيتييدل په بر كې نيسى.

### 1-2-1- ډيفوڙن (Diffusion)

ډيفوڙن د محلل په ماليڪولونو کي د منحله موادو د ذراتو خپل سري خپريدو خخه عبارت دي ، چې د محلول په ټولو برخو کي د غلظت د مساوي کيدو سبب گرئي. ډيفوڙن په عمليه کي د منحله موادو ذرات غليظ محيط خخه د رقيق محيط خوا ته او د محلل ماليڪولونه د رقيق محيط خخه غليظ خوا ته خپريبي. يعني د محلول متشكله ذرات دوار و خوا او ته خپريبي.

د مثال په ډول: که د قلم يو خاځکي رنګ د خالصه اوبو په ګيلاس کي واچول شي. خو شيبې وورسته ليidel کيربي چې د رنګ ماليڪولونه له غليظ محيط خخه د رقيق محيط خواته او د اوبو ماليڪولونه د رقيق محيط خخه غليظ (د رنګه محيط) خوا ته خپريبي په پايله کي یې د محلول په ټولو برخو کي د غلظت د يوشی کيدو لامل کيربي دي حادثي ته ډيفوڙن وايې.




### (Osmosis 2-2-1 اسموس)

د نيمه نفوذ ور پردي خخه واره ماليکولونه چې د رقيق محیط نه غليظ محیط خواته نفوذ وکړي، دې عملې ته اسموس وايي. هغه قوه چې د اسموس عمل سبب کېږي يا په بل عبارت هغه قوه چې د ماليکولونو (ورو ذرو) د نفوذ لامل د رقيق محیط نه غليظ محیط خوا ته د نيمه قابل نفوذ پرده خخه کېږي د اسموتيک فشار په نامه يادېږي. نيمه نفوذ ور پرده هغه پرده ده، چې واره ذرات ور خخه تيرېږي او غټه ذرات ور خخه تيريدلې نشي. د بيلګي په توګه: د حيواناتو پوست، د حيوان مثانه د انسان پوست نيمه قابل نفوذ پرده ده.

باید ووايو چې نيمه قابل نفوذ پرده په مصنوعي ډول هم جورولي شي. د ازموس عمل د دوو رقيق او غليظ محیط تر منځ د نيمه قابل نفوذ پردي له لاري تر هغه وخت پوري صورت نيسې. خو په غليظ محیط کې چې د او بود حجم په ډيريدو سره هايدروستاتيک (Hydrostatic) فشار تولیدېږي د غليظ محلول په د نته د اسموتيک فشار سره مساوي شي يعني ( $Posm=PM$ ) پدې مرحله کې د ازموس عمل ظاهراً درېږي پدې حالت کې د محلول د ماليکولونو شمير، چې د رقيق محیط خخه غليظ محیط خوا ته انتقالېږي دغه حالت د ډيناميک تعادل حالت په نامه يادېږي.

هايدرو ستاتيک فشار هغه فشار دی، چې د او بود ماليکولونو د حجم په ډيريدو سره او د وزن د عمل په پايله کې د سطح پر واحد تولیدېږي.



د محلولونو اسموتيک فشار په عملي او نظري ډول کولي شو وشمیرو په نظری ډول د محلولونو اسموتيک فشار د گاز حالت عمومي معادلي ( $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ ) په وسیله شميرل کېږي.

ئکه د رقيق محلولونو او گازاتو تر منځ ورته والي موجود دي، خرنګه چې د اووګدرو د قانون پر بنسټ د گازونو مساوي حجمونه د عين شرایطو لاندې د تودوخي درجه او فشار د ماليکولونو شمير يې سره مساوي دي او د وانت هوف قانون پر بنسټ د محلولونو مساوي حجمونه د عين اسموتيک فشار لاندې د ذراتو شمير يې مساوي دي، له دې ورته والي خخه کيميا

پوهانو د محلولونو د اسموتیک فشار شميرلو لپاره استفاده کوي. خرنگه چې د ګاز حالت د عمومي معادله په بدلولو سره ليکلی شو چې :

$$P = \frac{n}{V} \cdot R \cdot T$$

په دې رابطه کې  $\left( \frac{n}{V} \right)$  په يوه تاکلي حجم کې د منحله موادو له شمير خخه عبارت دی چې د غلظت په نامه يادېږي.  $\left( \frac{n}{V} = C \right)$

په پاسني رابطه کې ددي قيمت په اچولو سره ليکلی شو چې :

$$Posm = C \cdot R \cdot T$$


د پاسني رابطي په مرسته کولي شو د محلولونو اسموتیک فشار په هغه صورت کې چې غلظت او تودو خه يې راکري وي وشميرو. بايد ووايو چې د يادي شوي رابطي پوسيله د الکتروليت (electrolyte) محلولو اسموتیک فشار نشو شميرلى. خکه الکتروليت مرکبونه په اوبو کې د حل کيدو پر مهال په اړونده ايونونو تجزيه کېږي یا تفکيك کېږي د متشکله ذراتو شمير يې د اړونده ماليکولونو په پاسني رابطه کې د وانته هوف ضريب اضافه کوو چې د ايزوتونيك ضريب په نامه هم يادېږي.

$$Posm = i \cdot R \cdot T$$

(i) يا د وانته هوف ضريب کولي شو د لاندي رابطي پوسيله بېلاښلو مرکبونو لپاره وشميرو:


$$i = \frac{1 + a(n - 1)}{\text{د مول شمير}}$$

په دې رابطه کې (i) د وانته هوف ضريب ، (a) د تفکيك درجه ، (n) د هغو ايونونو شمير دی، چې الکتروليت په هغو تفکيك کېږي. د بيلگې په توګه د وانته هوف ضريب د یو مول NaCl محلول لپاره په لاندي ترتيب سره شميرو.



$$iNaCl = \frac{1+1(2+1)}{1} = 2$$

په عملی ډول هم د محلولوں اسموتیک فشار د اسومتر دستگاه پوسیله عملاً اندازه کوي.




خونګه چې په پاسنې بنه کې ليدل کېږي په خالص او بوكې يا رقيق محلول کې د تجزيې وړ محلول د قرار ورکولو پر مهال د او بوكې مالیکولونه د نیمه نفوذ وړ پردو څخه غليظ محلول ته نفوذ کوي د محلول د حجم د ډیریدو سبب کېږي او په بنیښه ایې تیوب کې یې ارتفاع بدلون کوي او هغه هوا چې په تیوب کې مخکې موجوده وه فشار واردوی او هوا په مانومتر کې په سیماتاب فشار واردوی او په (ا) ته ورته تیوب کې د سیماتاب ستون د بدلون سبب کېږي. (۱)

محلولونه د اسموتیک فشار پر بنسټ په دریو ګروپونو ويشهو، چې د ایزوتابنيک Isotonic ھايپرتانيک Hyper tonic ھايپوتانيک Hypotonic solution محلولونه دي.


الف: ایزوتابنيک محلول: هغه دوہ مقايسوی محلولونه، چې د ازموتیک فشارونه یې سره مساوی وي دغه محلولونه د ایزوتابنيک محلول په نوم یادېږي.

د مثال په توګه: یو محلول چې 0,9% سلنہ د خور مالګه او 4,55% سلنہ گلوكوز د ويني سره ايزوتانيک دی هر کله چې نباتي حجره يا حيواني حجره سره په ايزوتانيک محلول کې واچول شی کوم بدلون په کې نه راخي:




ب : هايپرتانيک محلول : هغه محلول دي چې ده گلوكوز دا زموتيک فشار د ژونديو حجره دا زموتيک فشار په مقايسه ډير وي او هر کله چې نباتي يا حيواني حجره په هايپرتانيک محلول کې واچول شی په هغه صورت کې حجره (وچه) او له منځه ئي.


مثال په توګه: د (20%) NaCl محلول او د (10%) گلوكوز محلول (Hypertonic) محلولونه دي. که د هايپرتانيک په محلول کې ژوندي، حجره کيردو حجره منقبض کيربي او مره کيربي دي حادشي ته Plasmolyse وايي.



ج: هايپوتانيک محلول: هغه محلول دي، چې هغوی د ازموتيك فشار نسبت د ويني د ازموتيك فشار ته کم وي، دغه محلول د هايپوتانيک محلول په نامه ياديږي. که چېري کومه ژوندي، حجره په (Hypotonic) محلول کې کيردو، حجره منبسط کيربي او له منځه ئي. دي حادشي ته Heymolyse (هيموليسي) وايي. د مثال په توګه: که چيرې یو ممييز په اوبو کې کيردو او به په ممييز کې نفوذ کوي او د ممييز د انساط سبب کيربي که د ډير وخت لپاره په اوبو کې کيښودل شي ممييز چوي او له منځه ئي.



په لاندې شکل کې پورته درې وارو محلولونه بنودل شوي دي.



### 3-2-3 د محلولونو د بخار د فشار هیټېيدل (Raoult's Law)

د راولت د قانون پر بنسته په محلول کې د محلول د بخار فشار په محلول کې د محلول د مولی برخی د مول فركشن (Mol-fraction) يا کسر مولر سره مستقيم تړاو لري يعني ( $P \approx N_1 P_0$ ) په محلول کې د محلول د فشار بخار ،  $N_1$  د محلول مول فركشن دی . په مساوات د تناسب د علامې د بدلو لو لپاره د پاسني رابطې نبی خوا د ( $P_0$ ) ثابت سره ضرب کوو. ( $P = P_0 N$ ) د خالص محلول د بخار فشار دی له بل پلوه د یوه محلول د متشكله اجزا وو د کسر مولر مجموعه مساوی په یو ده، ( $N_2$ ) په محلول کې د منحله مواد د کسر مولر دی. له دې ځایه ليکلی شو چې:

$$N_1 = 1 - N_2$$

په پاسني رابطه کې د ( $N_1$ ) د قيمت په اچولو سره ليکلی شو:

$$P = P_0(1 - N_2)$$

$$P = P_0 - P_0 N_2$$

$$-1x \quad P - P_0 = -P_0 N_2 \quad x - 1$$


$$-P + P_0 = P_0 N_2$$

$$P_0 - P = P_0 N_2$$

$$\Delta P = P_0 N_2$$

$$\frac{\Delta P}{P_0} = N_2$$

پدې رابطه کې  $\Delta P$  په محلول حالت کې د محلل د بخار فشار تېتېيدل نسيي، چې د منحله مواد د کسر مولار سره مستقيم تراو لري، دا داسي مفهوم لري چې هر خومره چې د منحله مواد د مقدار د محلول په تاکلي حجم کې ڌيرېږي په هماغو کچه د بخار فشار لب کېږي وروستي رابطه د (Raoult) قانون نسيي د فشار ، په محلول کې د منحله مواد د مول فركشن سره مستقيم تراو لري



#### 4-2-1 د محللونو د جوش تکي لوړیدل

د جوش تکي د تودونخي هغه درجه ده، چې په هغه کې يوه مایع په جوش رائي او د بخار فشار يې د اتموسفير له فشار سره مساوي کېږي، له دي ځایه پايله اخلو، چې د اتموسفير فشار د محلول د جوش په تکي اغيزه لري، هر خومره چې د اتموسفير فشار ڌيرېږي د يوه مایع د جوش تکي هم ڌيرېږي، برعکس که چېږي د اتموسفير فشار لب شي د يوه مایع د جوش تکي هم لري

کيربي ، د بيلگي په توګه خالصي او به د سمندر په سطح کې د يو اتموسفير فشار سره په ( $100C^0$ ) کې په جوش رائي، خود کابل په سطحه کې چې فشار د اتموسفير د يوه اتموسفير خخه لبدي، تقریباً په ( $94C^0$ ) کې په جوش رائي يعني په کابل کې د خالصو او بود بخار فشار په ( $94C^0$ ) د اتموسفير له فشار سره مساوي کيربي او په جوش رائي. په محلول کې د اتموسفير فشار په تيپيدو سره د جوش تکيې بې هم لب کيربي په محلل کې د منحله مادې په کميدو سره د محلول د جوش تکيې لورپيربي ، حکه د محلل او منحله مواد د ماليکولونو تر منځ د ايون ډايبول برقي قوي عمل کوي.

د بيلگي په توګه : که  $\text{NaCl}$  په خالصو او بود کې حل شي د او بود او د سوديم د ايونو تر منځ د ايون ډايبول عمل اثر کوي او د مالګي ايونونه په محلول کې د او بود ماليکولو د تيپنتي مانع کيربي ، د محلل د بخار کيدو لپاره ډيرې تودو خې ته اړتیا ده. نو حکه په محلولو کې د جوش تکيې لورپيربي او د جوش تکيې لورپيدل له غلظت سره نیغ تړاو لري.

$$\Delta T_b \approx m$$

$$\Delta T_b = E \cdot m$$

$$m = \frac{a \cdot 1000}{M \cdot b}$$

$$\Delta T_b = E \cdot \frac{a \cdot 1000}{Mm \cdot b}$$

$$Mm = \frac{E \cdot a \cdot 1000}{\Delta T_b \cdot b}$$

ددې رابطي پوسيله کولي شود مرکبونو ماليکولي وزن په عملی ډول وشمیرو.

مثال : د ګلوكوز دوه مولره محلول د تودو خې په کومې درجې په ايشيدو رائي ؟ د او بود ابيليوسکوبيك ثابت  $\left( 0.52 \frac{l \cdot C}{mol} \right)$  دی.

$$\Delta Tb = E \cdot C_m$$

$$\Delta Tb = 0.52 \frac{l \cdot C}{mol} 2 \frac{mol}{li} = 1.04C^0$$

$$\Delta Tb = T_2 - T_1$$

$$T_2 = \Delta Tb + T_1 = 1.04C^0 + 100C^0$$

### 5-2-8 د محلولونو د انجماد د تکي ټيتيidel

په محلل کې د منحله موادو حل کيدل د انجماد د تکي د تيتييدو سبب کيربي او د انجماد تکي د تودوخي هغه درجه ده چې په هغو کې يوه مایع په جامد بدليسي د انجماد د تکي تنزيل يا تيتيidel د مولاليتي له غلظت سره مستقيم تړاو لري.

$$\Delta T_f \approx m$$

د انچمامد د تکي او ( $m$ ) د محلول مولاليتي غلظت دی په مساوات د تناسب د بدلو لو لپاره د معادلي بنې خوا د ( $K$ ) تناسب سره ضرب کوو.

$$\Delta T_f = K \cdot m$$

د ( $K$ ) ثابت په نامه ياديسي چې بېلاښلو مایعاتو ته تاکلى قيمت لري او د اوبو لپاره (1.86) دی له بلپلوه:

$$m = \frac{a \cdot 1000}{Mm \cdot b}$$

$$\Delta T_f = K \frac{a \cdot 1000}{Mm \cdot b}$$

$$Mm = \frac{K \cdot a \cdot 1000}{\Delta T_f \cdot b}$$

مثال: د حل شوي مادي ماليكولي کتله په هغه محلول کې پيدا کړکوم چې 5.12 گرامه حل شوي ماده په 100 گرامه حل کونکي کي حل او د تودوخي په  $0.180C^0$ - درجو کې کنګل شوي وي؟

$$(K=1.86)$$

$$m = 5.12 gr$$

$$m_{sol} = 100 gr$$


$$\Delta T_f = -0.280C^0$$

$$Mm = ?$$

$$Mm = \frac{Km \times 1000 \text{ gr} \cdot \text{molal}}{\Delta Tf \cdot m}$$

$$Mm = \frac{5.12 \text{ gr} \cdot 1.86 \cdot 1000 \text{ gr} \cdot \text{molal}}{0.28 \cdot 100 \text{ gr}} = 340 \text{ gr/mol} = 340 \text{ amu}$$

پدي ترتيب ددي رابطي په مرسته په او بو کي د منحل جامدو موادو ماليکولي وزن په عملي توګه شمورو . لاني بنه د خالص محلل او محلول د بخار فشار تيتيدل د جوش د تکي د لوريدو او د انجماد د تکي د تيتيدلوبدنونه بنبي.



په پورتني شکل کي گورو چي د محلول منحني د خالص محلل په پرتله تيتيه پرته او ورسره موازي ده. په شکل کي (O) د خالص محلل د انجماد تکي، (O') د محلول د انجماد د تکي تيتيدل بنبي. د (O) تکي ته ( $P_1$ ) د بخار فشار او (O') تکي ته ( $P_2$ ) د بخار فشار مطابقت کوي او ( $\Delta P$ ) د بخار د فشار تيتيدل د انجماد په حالت کي بنبي. (C) تکي د (t) تودخې سره مطابقت کوي، د خالص محلل د جوش تکي بنبي او د بخار فشار د اتمو سفير له فشار سره مساوي دي، چي د (P) تکي سره مطابقت کوي.


(P!) د محلول د بخار فشار دي ( $t_1$ ) تودخه بنبي، چي د اتمو سفير د فشار خخه لب وي ( $\Delta P!$ ) د محلول د بخار فشار راتيتيدل بنبي، (C!) تکي د محلول د جوش تکي بنبي او د خالص محلل او محلول ترمنځ د جوش تکي توپير په ( $\Delta t_b$ ) بنبي، چي د محلول د جوش تکي لوروالي بنبي.

خرنگه چې ولوستل شول ، په بېلاپلوا محلولونو کې د بخار د فشار تيتيدل ، د جوش تکي لوريدل او د انجماد د تکي تيتيدل يوبل خخه توپير لري.

د (Arrhenius) د خيرنو له امله دي پايلې ته رسبرو ، چې قول محلولونه په دوو ګروپونو ويشل کيربي او د الکتروليت او غير الکتروليت په نامه ياديږي.


### 3-1- غير الکتروليت (Non-electrolyte) محلولونه

غير الکتروليت محلولونه هغه محلولونه دي جې د اړونده منحله موادو ذرات یې په محلولي حالت کې تر ماليکولي پراو پوري په خپلو اړونده کوچنيو ذراتو باندي تجزيه شي. خرنگه چې ماليکول د برقي چارج له مخي خنشي دي ، نو ټکه د بريښنا د هدايت ورتيا نلري په همدي خاطر د غير الکتروليت محلولونو په نامه ياديږي د بيلګې په توګه : د قند (بورې) او د اوبو محلول تر ماليکولي حالت پوري تجزيه کيربي او د برقي هدايت ورتيا نلري.




### 4-1- الکتروليت (Electrolyte) محلولونه

الکتروليت محلولونه هغو محلولونو ته وايي چې د منحله موادو ذرات یې تر ايوني (انيون او کتيون) پروي په خپلو کوچنيو ذرو تفکيک شي خرنگه چې انيون او کتيون ، منفي او مثبت چارج لرونکي ذري دي نو ټکه د بريښنا د لارښونې ورتيا لري. د بيلګې په توګه مالګه په اوبو کې د حل کيدو پر مهال په خپلو اړونده ايونونو تفکيک (Potassiumbromide) KCl کيربي.



کله چې د  $KBr$  په اوبلن محلول کې الکترودونه کېردو ، د پوتاشیم  $K^+$  ایونونه کتود خوا ته او د برومین ایونونه د انود خوا ته خوئیرې او د الکترونونو د انتقال سبب کېږي چې په پایله کې بې د بریښنا جريان منځ ته راخې.

الکترولیت محلولونه په دریو گروپونو (Acids) تیزابونه (Bases) قلوي (Arrhenius) او مالګو (Salts) ويشي.



## دويم خپرکې

### 1-2 د كيمياوي تعاملاتو كينتىك (Kinetic Of chemical reactions)

كينتىك هغه علم دى، چې د كيمياوي تعامل د سرعت او د كيمياوي تعاملونو له ميغانىكىت خخە بحث كوي. د كيمياوي تعامل سرعت د تعامل كونوكو ذراتو د تکر د شمير خخە په يو تاكلې وخت او د تعامل كونوكو موادو په يوه تاكلې حجم كې عبارت دى او د وخت په تيريدو سره د تعامل كونوكو موادو د غلظت بدلون ته هم د كيمياوي تعامل سرعت وايى چې هغه كولانى شود لاندى رابطى پوسيله ونبيو:

$$v = \pm \frac{dC}{dt}$$

$$\bar{V} = \frac{\Delta C}{\Delta t} = \pm \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1}$$

پدې رابطو كې ( $V$ ) د كيمياوي تعامل سرعت ( $dc/dt$ ) د تعامل كونوكو موادو د غلظت ھير لې بدلون او ( $dt$ ) د وخت ھير لې بدلون بنيي  $\left(\bar{V}\right)$  د كيمياوي تعامل متوسط سرعت ( $C_2$ ) د تعامل كونوكو موادو دويم غلظت ( $C_1$ ) د تعامل كونوكو موادو لومنى غلظت ( $t_1$ ) د تعامل د پې ل وخت، ( $t_2$ ) دويم وخت د غلظت د بدلون وروسته بنيي.

( $\Delta C$ ) د غلظت بدلون او ( $\Delta t$ ) د وخت بدلون دى. په پاسنيو رابطو كې (+) او (-) نبني (علام) داسي مفهوم لري چې د تعامل په پېل كې د تعامل كونوكو موادو غلظت اعظمى قيمت لري او د وخت په تيريدو سره غلظت خخە يې كميري. نو دې صورت كې كولانى شود تعامل كونوكو موادو غلظت د لاندى رابطى پوسيله ونبيو:

$$V_1 = - \frac{dC}{dt}$$

او د كيمياوي تعامل د محصول غلظت چې د تعامل په لومنيو كې صفر دى، وخت په

تيريدو سره يې غلظت ھيريري او پدې صورت كې د غلظت بدلون لاندى رابطى پوسيله ونبيو:

$$V_2 = + \frac{dC}{dt}$$


$V = \pm \frac{dC}{dt}$  پدي اساس په مجموع کې د کيمياوي تعامل سرعت د رابطي پوسيله کولاي شو

وبنيو:


هغه عوامل چې د کيمياوي تعامل د سرعت پر بدلون باندي اثر لري په لاندي ترتيب دي:

### 1-2-1- د تعامل کونکو موادو طبیعت

کيمياوي مواد له يو بل خخه توپير لري خرنګه چې کيمياوي مواد هم شته چې په خپل تركيب کې ايوني رابطي او يا قطبي رابطي ولري او کيمياوي مواد وجود لري چې غير قطبي رابطي لري او په دې ترتيب ټول هغه مواد چې د تركيب کې يې ايونيك رابطي لري ، په سرعت په خپل منځ کې له يو بل سره کيمياوي تعامل تر سره کوي. د مثال په ډول غير عضوي تيزابونو چې په محلول او مذابه حالت کې په خپلو اړونده ايونونو تفكیک کېږي په اسانۍ او ډير سرعت له قلوي سره کيمياوي تعامل تر سره کوي.



په هغو مرکبونو کې چې ډيرې کمزوري قطبي رابطي لري د کيمياوي تعامل سرعت يې د هغو مرکبونو په پرتله چې ايونيك رابطي لري لې دې. مثال په ډول: د عضوي تيزابونو تعامل له الكولو سره نسبتاً په لې سرعت صورت نيسني ايستر توليدوي.



په هغو مرکبونو کې چې خالص (Covalent) رابطې لري د هغوي په منځ کې تعامل ډير وخت نيسی او يا په بل عبارت د تعامل سرعت يې ډير څې دي ، څرنګه چې د ځینو کيمياوی تعاملونو لپاره خو ساعته او يا خو ورځي وخت بني.

### 5 موادو اگريگات حالت

د موادو اگريگات حالت د تعامل کوونکو موادو د فزيکي يعني جامت ، مایع او ګاز حالت څخه عبارت دي.


**د ګاز حالت :** څرنګه مو چې د لوړۍ سمسټر کې ولوستل چې په ګاز حالت کې د یو جسم متشکله ذرات په بېلا بېلو ډولونو خو ځيرې او ډيره حرکي انرژي لري د تعامل کوونکو موادو په مخلوط کولو سره ذراتو تر منځ تکر ډير دي ، ځکه ذرات بنه له یو بل سره مخلوط شوي او له یو بل سره بنه تکر کوي ، نو ځکه د ګاز حالت د کيمياوی تعاملونو لپاره ډير مناسب دي، د کيمياوی تعامل سرعت پدي حالت کې ډير دي

**مایع حالت :** په مایع حالت کې هم متشکله ذرات په بېلا بېلو ډولونو خو ځيرې په مایع حالت کې د تعامل کوونکو موادو په مخلوط کولو سره ډير بنه له یو بل سره مخلوط کيرې د دوې تر منځ د تکر امكان ډير دي نو ځکه په مایع حالت کې هم د کيمياوی تعاملونو سرعت ډير وي . خو بايد ووايو چې په مایع حالت کې د تعامل سرعت د ګاز حالت په پرتله څې دي.

**2-3-1-جامد حالت :** په دي حالت کي د تعامل کوونکو ذراتو تر منځ د تکر امکان کمزوري دی چنګه چې تعامل کوونکي ذرات يوازي د تماس په سطحه کي یوله بل سره تکر کوي چې د کيمياوي تعامل امکان يوازي د تماس په سطح کي دی نوري برخې یې له یو بل سره تعامل نه کوي. نو څکه ويلی شو چې د اجسامو جامد حالت د کيمياوي تعاملونو د ترسره کيدو لپاره مناسب نه دي او د کيمياوي تعامل سرعت پدي حالت کي ډير لبودي.

### 2-3-1-د فعالیت انرژي (Activation-Energy)

د کيمياوي تعاملونو د ترسره کيدو لپاره ضرور ده چې تعامل کوونکي مواد فعاله شي د بېلګه په توګه: په هوا کي د نايتروجن او اکسیجن مخلوط وجود لري دغه گازونه د اوړدو کلونو لپاره بې له کيمياوي تعامل د یو بل تر څنګ قرار لري. علت یې دادی چې د نايتروجن او اکسیجين ماليکولونه په عادي شرایطو کي کيمياوي فعالیت نه لري د فعاله کولو په خاطر یې یو مقدار انرژي ته اړتیا ده چې په ماليکولونو کي یې اړونده اتومونو تر منځ رابطي غوخي شي او هغه په خپلو اړونده اتومونو باندي بدل شي دغه انرژي ته رابطوي انرژي هم وايي.



باید ووایو کله چې د اکسیجين او نايتروجن اتومونه تولید شي تر تاکلي بریده پوري دافعه قوه د الکترونونو منفي چارج پربنست د اکسیجين او نايتروجن اتومونو د تکر مانع کيږي. د دافعه

قوي د له منخه ورلو او اکسيجن او نايتروجن د اتومونو د تکر په خاطر مانع کيري . باید يو مقداري انژي مصرف شي خود متشکله ذراتو سرعت هغي اندازې ته ورسوي چې له يو بل سره په اسانۍ تکروکري نود فعال کولو انژي د کيمياوي رابطو د غوچولو او د تعامل کونکو ذراتو د دافعه قوي د له منخه ورلو د انژي د مجموعې خخه عبارت ده . يا په بل عبارت د فعالیت انژي هغه مقدار انژي ده چې د عامل کونکو ذراتو فعاله کولو لپاره مصرف کيري .


پدي ترتیب ويلی شو چې د کيمياوي تعامل د ترسره کيدو او د کيمياوي تعامل د سرعت لپاره د فعالیت انژي ضوري فکتور شميرل کيري د فعالیت انژي کولي شو چې د نوري انژي ، حرارتی انژي ، برینسنايی انژي او د الکترومagnetisic امواجو د انژي په شکل تعامل کونکو موادو ته ورکړو .

#### 4-1-4-2 د تعامل کونکو موادو په سرعت د غلظت اغیزه

غلظت په يو مقدار تاکلي محلل او يا محلول کې د تاکلي مقدار منحله موادو له حل خخه عبارت دي هر خومره چې په يوه لوښي کې د تعامل کونکو موادو غلظت ډير وي، د اپوندو ذراتو تر منځ یې د تکر امکان ډيرېږي او د کيمياوي تعامل سرعت د تعامل کونکو د ذراتو تر تکر پوري اړه لري يعني هر خومره چې د تعامل کونکو ذراتو د تکر شمير ډير شي په هغه تناسب د کيمياوي تعامل سرعت هم ډيرې .

د مثال په ڇول: ک د (A) او (B) مواد تعامل په پام کې ونيسو، چې د (C) او (D) موادو د

جوريديو لامل کيربي.



سرعت د  $D, C, B, A$  د مادو ضريبونه دي د  $A$  او  $B$  مادو د تعامل سرعت په  $(V_1)$  نسيو چې د غه

سرعت د  $A$  او  $B$  مادو د غلظت له ضریب سره مستقیم تراو لري. د اړونده ضريبونو په پام کې نیولو

سره په کيميا کې د مادو غلظت د غټيو قوسونو  $[C]$  او  $C$  توري (Concentration) پوسيله نسيي.

غلظت  $V_1 \approx [A]^a[B]^b$  يا  $V_1 \approx C_A^a \cdot C_B^b$  په مساواتو باندي د تناسب د علامې د تبدیلولو په

خاطر د رابطې نسي خوا د  $(K_1)$  له ثابت سره ضرب کوو:

$$V_1 = K_1 [A]^a [B]^b$$

(K) تعامل کوونکو موادو د سرعت ثابت دی په همدي ترتیب د (C) او (D) مادي په خپل منځ

کې د  $(V_2)$  سرعت سره کيمياوي تعامل ترسره کوي لوړنې تعامل کوونکي مواد تولیدوي. د هغه

تر منځ د تعامل سرعت هم د غلظتونو د حاصل ضرب سره د ضريبونو په پام کې نیولو سره بې

مستقیم تراو لري.


$$V_2 \approx [C]^c [D]^d$$

$$V_2 = K_2 [C]^c [D]^d$$

باید ووايو چې د تعامل په لومړيو کې د  $(V_1)$  قيمت ديردي او د وخت په تيريدو سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت به کمیدو سره لږ کېږي برعكس د  $(V_2)$  سرعت په لومړيو کې صفر دی خو د وخت په تيريدو سره د تعامل محصول د اجزاوه د غلظت په تيريدو سره په تدریجي ډول ډېږي او بالاخره هغه پړاو ته رسیږي چې دواړه سرعتونه له یو بل سره مساوي کېږي.  $(V_1 = V_2)$

دغه مرحله د کيمياوي تعامل په نامه يادېږي. ددي موضوع د بنه روښانه کولو لپاره د


$(N_2O_4)$  مرکب د تجزيې تعامل په پام کې نيسو:<sup>1</sup>



$$V_1 = K_1 [N_2O_4]$$

$$V_2 = K_2 [NO_2]^2$$

په هغه وخت کې چې د تعامل کوونکو موادو او پاسني تعامل د محصول غلظت په کواردينات سیستم کې د عمودي محور په مخ او د تعامل مسیر د وخت له مخې د افقی محور په مخ په پام کې نيسو:

<sup>1</sup>

د پاسني شکل خخه بسکاري چې د  $(V_1)$  تعامل د سرعت منحنۍ اعظمي قيمت لري

د وخت په تيريدو سره نزولي مسیر طي کوي برعکس د  $(V_2)$  سرعت منحنۍ د تعامل په پېل

کي سرعت يې صفر دی. خود وخت په پيريدو سره د لورېدو مسیر طي کوي تر خو چې

دواړه منحنۍ يو له بل سره يو ئاي شي پدې پړاو کي منحنۍ افقي مسیر طي کوي او د

کيمياوي تعامل پړاو ته رسپړي يعني:  $(V_1 = V_2)$


کيمياوي تعاملونه د تعامل کوونکو موادو فزيکي حالت له مخې په متجانس او

غیر متجانس تعاملونو ويشنل کېږي.

**متجانس تعامل:** هغه تعاملونو ته وايي چې تعامل کوونکي اجزاوي يې په يو ډول فاز کې

واقع وي، د مثال په ډول: د امونيا په جورېست کې د نايتروجن او هايدروجن تعامل په پام

کې نيسو:



د تعامل کوونکو موادو د تعامل سرعت د تعامل کوونکو اجزاوو تر غلظت پوري


اره لري يعني:

$$V_1 = K_1 \cdot [N_2][H_2]^3$$

**غیر متجانس تعامل:** هجه تعاملونو ته وايي چې تعامل کوونکي مواد يې په يو ډول فاز کې واقع نه وي . د مثال په توګه: د کاربن او اکسیجن تعامل په پام کې نيسو . کاربن په جامد فاز کې او اکسیجن په گاز فاز کې واقع دي . پدي صورت کې د تعامل کوونکو موادو د کيمياوي تعامل سرعت يوازي د اکسیجن تر غلظت پوري اړه لري او د کاربن د غلظت خخه يعني جامد فاز صرف نظر کوو.



1:- ددي تعامل سرعت:



به خومره بدلون وکړي، که چېږي د  $O_2$  او  $CO$  ګازونه ګډوله حجم دوه واره لپ کړاي شي.

حل: د  $CO$  او  $O_2$  غلظت مخکي د حجم له بدلون خخه په (a) او (b) حرفونو بنودل کېږي د تعامل سرعت ليکو.

$$[CO] = a \quad [O_2] = b$$

$$V_1 = K_1 [CO]^2 [O_2] = K a^2 b$$

وروسته له دې چې حجم خومره لپ شي په هماګه اندازه غلظت زياتيري لکه خنګه چې وویل شو، چې د  $CO$  او  $O_2$  حجم دوه ئلپ لپشوي ، نو غلظت يې هم دوه واره زيات شوي دي.

$$[CO] = 2a$$

$$[O_2] = 2b$$

$$V_2 = K_2 [2a]^2 [2b]$$

$$V_2 = K_2 \cdot 4a^2 \cdot 2b$$

$$V_2 = K_2 8a^2 \cdot b$$

د تعامل د سرعت بدلون د  $\frac{V_1}{V_2}$  نسبت له مخي شمیرو:

$$(1) \frac{V_2}{V_1} = \frac{K_2 8a^2 b}{K_1 a^2 b} = 8$$

### 5-2-1-5-2 د کيمياوي تعامل په سرعت د تودوخي تاثير

معمول د کيمياوي تعاملاتو سرعت د تودوخي په لوريدو سره زياتيربي مثال په توګه د هايدروجن او اکسيجين ترمنج تعامل په نظر کې نيسو په ۲۰ درجو ساتي گريد تودوخر کې د تعامل سرعت عملاً صفر دی ددي لپاره چې ۱۵% تعامل صورت ونيسي ۵۴ مليارده کالوبنه تودوخر پکارده د ۵۰۰ درجو ساتي گريد داوبو جوريدو لپاره ۵ دقيقې پکار دي او په ۷۰۰ درجو ساتي گريد تودوخر کې کيمياوي تعامل په لحظوي ډول سرته رسيربي. د کيمياوي تعامل د سرعت رابطه د تودوخي سره د لاندي رابطي له مخي افاده کيردي.

وانت هوف په کال (۱۸۸۴) ميلادي کې دا قاعده په لاندي توګه فورمول بندی کړه چې د تودوخي درجي په لوريدلو سره د کيمياوي تعامل سرعت زياتيربي د تجربو له مخي ثابته شوي ده چې د تودوخي درجه د ساتي گريد د لسو درجو په لوريدو سره د تعامل سرعت ۲-۴ واره لوروي د بلې خوا د تجربو له مخي ثابته شوي چې :

$$V_{T_2} = V_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{(T_2 - T_1)}{10}}$$

په دې معادله کې  $V_{T_2}$  د تعامل سرعت د تودوخي د  $T_2$  درجي لاندي  $V_{T_1}$  د تعامل سرعت د تودوخي د  $T_1$  درجي لاندي او ګاما د حرارتني ضريب خخه عبارت ده.

د وانت هوف قاعده د کيمياوي تعاملاتو سرعت د ډيرو مودي د تيريدو سره بیا هم معاصرې کيميا کې هم پوره ارزښت لري.

مثال: که د یو کيمياوي تعامل حرارتني ضريب درې وي د تعامل د تودوخي درجه د سانتي گريد ۹۰-۵ پوري لوره کړو محاسبه کړي چې د تعامل سرعت خو مرتبې زياتيرې؟


$$\begin{aligned} T_1 &= 50\text{C} & V_{T_2} &= V_{T_1} \cdot \gamma^{\frac{(T_2 - T_1)}{10}} \\ T_2 &= 90\text{C} & \gamma &= 3 \\ \gamma &= 3 & \frac{V_{T_2}}{V_{T_1}} &= \gamma^{\frac{(T_2 - T_1)}{10}} = 3^{\frac{(90-50)}{10}} = 3^4 = 81 \end{aligned}$$

يعني د تعامل سرعت د تودوخي په وروستۍ برخه (اخري درجه) کې ۸۱ مرتبې نظر لوړې درجي ته زياتيرې.


### 1-6-2- د فعالیت د انرژۍ فزیکي مفهوم

خرنګه مو چې په تيرو درسونو کې ولوستل، د کيمياوي تعامل د ترسره کيدو لپاره باید تعامل کونکي مواد فعال شي، هغه انرژۍ چې د فعاله کولو په خاطريې مصرف کېږي دفعاليت انرژۍ د مصرف په پايله کې د تعامل کونکو موادو ذرات فعاله کېږي له یو بل سره نړدي کېږي او فعال کمپليکس تشليکلوي د فعاله کامپليکس پړ او غیر ثابت دي. تعامل کونکي اجزاوي په سرعت له دي پړ او خخه تيرېږي، د کيمياوي تعامل محصول د انرژۍ په تولید سره تولیدېږي که د تولید شوي انرژۍ مقدار د مصرف د انرژۍ په پرتله لړ وي دي ډول تعاملونو ته (Endothermic) وايې. که چېري د تولید شوي انرژۍ مقدار د مصرف د انرژۍ په پرتله ډيره وي دي ډول تعاملونو ته تعاملونه وايې. که د (Activation) انرژۍ مقدار د عمودي محور پر مخ او د تعامل (Exothermic).

مسير په کواردیناتي سистем کي د افقی محور په مخ ونبيو ، د تعامل د مسیر منحنی چې فزيکي مفهوم لري په لاندي ترتیب لاسته رائي.



پورته د فعالیت د انرژۍ منحنی د تعامل د مسیر په ارتباط انجووترميك تعاملونو لپاره په پاسني شکل کي ليدل کېږي چې د تعامل کوونکو موادو د فعاله کولو لپاره د ( $E_1$ ) په اندازه د فعالیت ( $E_1$ ) او ( $E_2$ ) او انرژۍ مصرف کېږي او د محصول د تولید په ترڅ کې د ( $E_2$ ) په اندازه تولیدکړي د ( $E_1$ ) او انرژيو د مقاييسې خخه د ( $\Delta E$ ) په اندازه انرژۍ تولیدکړي . دغه داسي مفهوم لري چې د انرژۍ تولید د انرژۍ د مصرف په پرتله په تعامل کې ډير Exothermic تعامل بنبيي په (Endothermic) تعاملونو کي د تعامل مسیر په لاندي ترتیب وي



په پورته شکل کي په انجووترميك تعاملونو کي د فعالیت د انرژۍ منحنی د تعامل د مسیر په ارتباط بنبيي .


$$E_2 - E_1 = \Delta E$$

دغه راطه بنبيي چې پدې تعاملونو کې د  $\Delta E$  په اندازه مصرف شيربي چې (Endothermic) تعاملونه بنبيي.

### 1-7-2 د کيمياوي تعامل په سرعت د کتلست اغيزي

د کيمياوي تعاملاتو سرعت نه يواخي د تعامل کوونکو موادو د غلظت او تودوخي په زياتولي سره کيداي شي زيات شي بلکه د کتلستونو د اغيزي له امله هم بدلون موندلی شي کتلستونه دهغه موادو خخه عبارت دي چې د کيمياوي تعامل سرعت ته تغير ورکوي او د تعامل د ختميدو خخه وروسته په لوړني مقدار او ترکيب سره پاتي کېږي کتلستونه د کيمياوي تعامل سرعت زيات يا کم کړي . که کتلستونه د کيمياوي تعاملاتو سرعتونه زيات کړي د مثبتو کتلستونو په نوم ياديږي . او که چيرته يې کيمياوي تعاملاتو سرعت کم کړ دمنفي کتلستونو په نوم ياديږي . په ئينې کيمياوي تعاملاتو کې یو د تعامل کوونکو موادو خخه د کتلست په حيث وظيفه اجراء کوي چې دا هول تعاملات اتوماتيک کتلستي تعاملاتو په نوم ياديږي .

چې د وخت په تيريدو سره يې سرعت زياتيږي .




په دې ئايي کې د  $\overset{+}{H}$  تولیديږي د تيزابو په موجوديت کې (تيزاب کتلستي عمل اجراء کوي) تعامل سريع . نظر په درې ګوني حالت د تعامل کوونکو موادو او کتلست .

کتلستي تعاملات په دوه برخو ويشل شوي دي .


۱- متجانس کيمياوي تعامل کوونکي مواد او کتلست په یو فاز کې واقع وي .

۲- غيري متجانس کيمياوي کتلستي تعاملات :


په دي صورت کي تعامل کوونکو مواد او کتلست په جداگانه فاز کي واقع وي مثال په توګه پلاتين او ويناديم پنتا اكسايد د مثبتو کتلستونو د ډلي خخه دي او د تعامل سرعت د کتلست پرته ډير کم دي.



دغه تعامل يعني سلفر تراي اكسايد استحصال د ګوګرو تيزابو د توليد په صنعت کي کارول کيږي.




همدارنگه د امونيا په استحصال کي د اوسيپني د کتلست خخه کار اخيستل کيږي چې مثبت کتلست بلل کيږي.




### دکتلستي تعاملاتو بعضي خصوصيات

- i. کتلست ډير کم مقدار د تعامل سرعت ته ډير زيات تغير ورکوي او دا تغير د کتلست د غلظت سره مستقييم تناسب لري.
- ii. د کتلست عمل اتخابي دي يعني هر کيمياوي تعامل ځاته مخصوص کتلست لري ددي خاصيت د مختلفو کتلستونو په استعمال سره د عيني اوليه موادو خخه مختلف حاصلات لاسته راړول کيږي.  
مثلاً:



يا



iii. په غيرمتجانس کتلستي تعاملاتو کې يو يا خو تعامل کوونکي مواد د کتلست سره منځني غير ثابت مرکب جوړوي چې داسي مرکب دير ژر تجزيه کېږي او هغې خخه فعال ذرات لاسته رائي کوم چې دير ژر تعامل کوي او د تعامل اصلي حالت جوړوي مثلاً د هايدروجنيشن او دی هايدروجنيشن کتلستونه لکه Ni او Pt,Cu د هايدروجن سره Ni-H, Pt-H, Cu-H غيري ثابت منځني مرکب جوړوي همدارنګه د اكسيديشن کتلست Pd د



iv. د تعامل په محیط کې بعضې اجنبۍ مواد د کتلست تاثير زياتوالی شي داسي مواد د پرمotor په نوم يادېږي.


v. بعضې وخت اجنبۍ مواد د کتلست پر سطحه جذب کېږي او د کتلست پر سطحه د جذب فعال مرکزونه مصروفوي چې په تئيجه کې د کتلست فعالیت کمېږي . دې پېښې ته د کتلست زهري کيدل او هغه مواد چې د کتلست د زهري کيدو سبب کېږي د کتلست د زهرو په نوم يادېږي . مثلاً هايدروجن سلفايد ، کاربن ډاي اکسايد ، هلوجنونه او نور د پلاتين او نيكل کتلستونه زهري دي.

vi. اکثراً د کتلستي موادو په خير د انتقالی فلزاتو خخه هم کار اخلي . علت يې دادی چې په انتقالی فلزاتو کې د (d) سويې الکترونونه او اربیتالونه په اسانۍ خوچېږي د خپل منځي مرکباتو د تولید لامل کېږي ، چې په پايله کې يې د کيمياوي تعامل سرعت هم ديرېږي .

### د کتلست په وسیله د کيمياوي تعامل د سرعت د بدلون میخانیکیت:

د کيمياوي تعاملاتو د میخانیکیت په هکله يوه نظریه داده چې هر کيمياوي تعامل د يوې انتقالی مرحلې خخه تيرېږي په انتقالی مرحله کې د تعامل کوونکو موادو تر منځ يو فعال کمپلکس مرکب جوړېږي د دې کمپلکس د جوړیدو انرژي دتعامل د فعال کولو د انرژي سره

مساوي ده. کمپلکس مرکب بیا وروسته تجزیه کيږي او د تعامل اصلی حالت جوروی مثلاً: د A او B موادو تعامل خخه په انتقالی مرحله کې<sup>\*</sup> (AB) فعال کمپلکس مرکب جوروی او د دغه مرکب نه وروسته د تعامل اصلی حاصلات د AB لاسته راهي.




د کتلستي تعاملاتو په انتقالی مرحله کې کمپلکس د کتلسست (K) په شمول د تعامل کوونکو موادو خخه جوروی.



په مثبتو کتلستونو کې د (ABK\*) کمپلکس په ډيره لبه انرژي جوروی يعني دلته کتلسست د تعامل د فعال کولو انرژي راکموي په دي ترتیب ده ګه مالیکولونو شمير چې د تعامل کولو انرژي لري زياتيري او په تئيجه کې د تعامل سرعت هم زياتيري ABK\* کمپلکس د AB\* د کمپلکس په پرتله په لبه انرژي جوروی يعني کتلسستي تعامل د فعال کولو انرژي د غيري کتلسستي تعامل د فعال کولو انرژي په پرتله کمه ده. نو څکه د مثبت کتلسست په استعمال سره تعامل په لبه انرژي او ژر صورت نيسسي. غير متجانس کتلسستي تعاملاتو په هکله تراوسه واحده نظریه نشه. د جامدو کتلستو په هکله یو داسي نظریه موجوده ده چې ګويه تعامل کوونکي مواد د کتلسست پر توله سطحه نه بلکې ددغې سطحې پر مشخصو نقطو چې دفعاله مرکزونو په نامه یاديږي جذب او د فعال مرکزونو د اتوموسره مابيني غير ثابت کمپلکسونه جوروی دغه غيري ثابت کمپلکسونه ډير ژر تحریب او د تعامل کوونکو موادو فعال ذرات سره ډير ژر تعامل کوي مینځ ته راهي دلته د کتلسست پرمخ د فعاله مرکز هندسي شکل او فعال کوونکو ذراتو د فضائي جورښت مطابقت همدا ډول فعاله مرکز د اتومونو ترمنځ کيمياوي اړیکو او بدوالۍ او د تعامل ذراتو د اتومونو ترمنځ د کيمياوي اړیکو د او بدوالۍ مطابقت ضرور ګنل کيږي چې د کتلسست انتخابي عمل ددې شرایطو رامنځ ته کيږي. د کتلسست په الکتروني نظریه کې داسي ويل کيږي چې ګويه د کتلسستي موادو پر سطحه ازاد يا ژر تحریک کیدونکي الکترونونه موجود دي د الکترونونه نه ژر او په اسانۍ د

كتلسٽ او د تعامل کونکو ذراتو تر منځ کمپلکس د جو پيدو سبب گرئي مثلاً د  $d$  انتقالی عناصر و کتلسٽي فعالیت د غو عناصر د  $d$  اربیتالو د الکترونونو د ژر تحريك کيدو پوري مربوط ګنبي.



غيري کتلسٽي تعامل

$E_1^* a$  د ايگزو ترميك تعامل (۱) د  
فعال کولو انرژي.

$E_2^* a$ - د اندو ترميك تعامل (۲) د  
فعال کولو انرژي.

كتلسٽي تعامل

$E_1^* a$  د ايگزو ترميك تعامل (۱) د  
فعال کولو انرژي.

$E_2^* a$ - د اندو ترميك تعامل (۲) د  
فعال کولو انرژي.

### د کتاليز مفهوم:

د تعامل د سرعت د زياتوالي عملیه د کتلسٽ په مرسته يا په بل عبارت د کتلسٽ په موجودیت کې د کيمياوی تعامل د سرعت تغير د کتلسٽ په نوم يادیږي. البته د کتاليز اصطلاح د لوړې خل لپاره په کال ۱۸۳۶ ز کې سویلهاني کيمياپوه (برسيلپوس) لخو و کارول شوه.

هغه تعامل چې د کتلسٽ په موجودیت کې جريا ن کوي د کتلسٽي تعامل په نوم يادیږي  
کتاليز په دوه ډوله دی. متجانس او غير متجانس.

متجانس كتلستونه معمولاً د تيزابو، قلوياتو او مالگود هر خه نه مخکي (d) عناصر مالگي . او نور د محلولونو خخه عبارت دي (1) Cu, Ni, Co, Na, Cr


## درېم خپرکې

### 1-کيمياوي تعادل

که تعامل کوونکي مواد په خپل منځ کې کيمياوي تعامل ترسره کړي د تعامل محصول

توليد کړي او د کيمياوي تعامل ذرات د لومړي تعامل کوونکو موادو په قسمی تولید باندې قادر

نه وي دي ډول تعاملونو ته مستقيم تعاملونه (غیر رجعي) واي



پدې تعامل کې د معکوس تعامل امکان نشه يعني سوديم کلورايد او او به د HCl او


NaOH د توليد قدرت نلري . که چيرې تعامل کوونکي مواد په خپل منځ کې کيمياوي تعامل

ترسره کړي ، د تعامل محصول توليد کړي ، د کيمياوي تعامل د محصول اجزاوي بيرته کيمياوي

تعامل ترسره کړي لومړني تعامل کوونکي قسمی مواد توليد کړي . دي ډول تعاملونو ته رجعي

تعاملونه يا دوه اړخیزه تعاملونه واي د مثال په توګه A او B موادو د غلظتونو د حاصل ضرب سره

مستقيم تراو لري.



$$V_1 \approx [A]^a [B]^b$$

$$V_1 = K_1 [A]^a [B]^b , \quad V_1 = K_1 \cdot C_A^a \cdot C_B^b$$

په همدي ترتیب د تعامل د محصول سرعت په خپل منځ کې ( $V_2$ ) نیغ په نیغه د تعامل د محصول د اجزاوو د غلظتونو سره د اړونده ضریبونو په بام کې نیولو سره تراو لري.

$$V_2 \approx [C]^c[D]^d$$

$$V_2 = K_2 [C]^c [D]^d$$

په رجعي تعامل کې هغه پراو هم ترسره کړي چې  $V_1 = V_2$  کېږي دغه مرحله د کيمياوي تعادل په نامه یادېږي کيمياوي تعادل د رجعي تعاملونو هغه پراو دی چې د تعامل کوونکو موادو د تعامل سرعت د اړوند ه محسول د تعامل له سرعت سره مساوی شي د  $(V_1)$  او  $(V_2)$  د قيمتونو په اچولو سره د تعادل په پراو کې لیکلی شوي چې :

$$K_2[A]^a[B]^b = K_2[C]^c[D]^d$$

غلهظونه د معادلې يوې خوا ته او ثابتونه د معادلې بلې خوا ته اتقالوو ، نو ددي لپاره د مساوات دواړه خواوي په  $K_2[A]^a[B]^b$  تقسيمو:

$$\frac{K_1[A]^a[B]^b}{K_2[A]^a[B]^b} = \frac{K_2[C]^c[D]^d}{K_2[A]^a[B]^b}$$

د احتصار د عملیي خخه و روسته لیکلی شو چې :

$$\frac{K_1}{K_2} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

خرنگه چي د  $\frac{K_1}{K_2}$  ثابتونو نسبت د  $(K)$  دريم ثابت سره مساوي دی نول رو چي :

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \quad (1)$$

(K) د کیمیاوی تعادل ثابت په نامه سره یادیږي که چېرې لاندې تعامل د تعادل په حال کې د نظر لاندې ونیسو نو:


-1 م ١٣٥١ ل، کال



د پورته تعامل د تعادل ثابت ليكوچې :

$$K_c = \frac{[C][D]}{[A][B][E]}$$

که چيرې (B) او (E) عين مواد وي ، نو پورته معادله په لاندی ډول سره ليکل کېږي:




$$K_c = \frac{[C][D]}{[A][B]^2}$$

که تعامل کونکي مواد او د کيمياوي تعامل محصول په ګاز حالت کې وي، د تعامل کونکو مواد او د تعامل د محصول غلظت په ئاي د قسمي فشارونو خخه ګته پورته کوي ، ځکه د ګازونو د غلظت اندازه کول ګران کار دي او په اسانه کولی شو چې قسمي فشارونه يې اندازه کرو: (1)

$$K_p = \frac{P_C \cdot P_D}{P_A \cdot P_B^2}$$

په پورته رابطه کې (KP) د تعامل ثابت د قسمي فشار په پام کې نیولو سره (PC او PD) د تعامل د محصول قسمي فشارونه، ( PA او PB) د تعامل کونکو مواد د قسمي فشارونه دي د مثالا په توګه د H2 او N2 تعامل د امونيا په تشکيل کې په پام کې نيسو:



د کتلې د عمل قانون په تطبق کولو سره پدې تعامل کې ليکل شو چې:


$$K_p = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{H_2}^3 \cdot P_{N_2}}$$

(K<sub>p</sub>) او (K<sub>c</sub>) ثابتونه د کيمياوي تعاملونو لپاره دير مهم او هر کيمياوي تعامل د ئان لپاره تاکلى قيمت لري د (K<sub>c</sub>) او (K<sub>p</sub>) قيمتونو باندي د تودوخى درجه اغيزه کوي د تودوخى درجي په لوريدو سره ارونده قيمتونه ديريربي، خود تعامل کوونکو اجزا و او د محصول د اجزا و د غلظت بدلون د (K<sub>c</sub>) او (K<sub>p</sub>) په قيمتونو دومره اغيزه نه لري (1)

په عومومي توگه که چيرى د  $K_c = \frac{[C][D]}{[A][B]^2}$  معادله نظر کي ونيسو ، نوموري معادله د کيميا يو دير مهم قانون ، چي د كتلي عمل قانون په نامه سره ياديربي، چي په لاندي چولتعريف شوي دي .

په يو کيمياوي تعامل کي جي د تعادل به حالت کي وي د تعامل د محصول د اجزا و د غلظت د ضرب حاصل د ضريب په طاقت پر تعامل کوونکو مواد و د اجزا و د غلظت د ضرب حاصل د ضريب په طاقت يو ثابت مقدار سره مساوي دي

که چيرى د تعامل کوونکو مواد و غلظتونه د محصول د غلظتونو سره مساوي وي د تعادل ثابت له يوه سره مساوي کېرى يعني : (K=1) لكه په (2a) شكل کي :




شکل (۲)

د تعادل د ثابت د قيمتونو خخه کولي شوداسي گتيه پورته کرو :

1- ، کال ۱۳۹۰، ۲۰۹ م ۲۱۰

2- ، کال ۱۳۸۸ لل، ۱-۳ م

- ۱- د تعادل د ثابت د قيمت خخه کولي شو په کيمياوي تعامل کي د تعامل جهت و تاکو.
- ۲- د تعادل د قابط د قيمت خخه په مشخصو شرایطو کي کولي شو د کيمياوي تعامل د جريان امكان و راندوينه و کرو. د مسئلي د بنه روښانه کولو په موخه لاندي تعامل د  $25C^0$  تودوخي سره په پام کي نيسو.



د  $25C^0$  تودوخي سره د تعامل کونکو مواد او د تعامل د محصول مقدار په دوو بیلا بیلو

تجربو کي په پام کي نيسو:

$$C_{I_2} = 0.100\text{mol} \quad C_{H_2} = 0.100\text{mol} \quad C_{HI} = 0.100\text{mol}$$

لومړي تجربه:

$$C_{I_2} + 1.00\text{mol} \quad C_{H_2} = 1.00\text{mol} \quad C_{HI} = 1.00\text{mol}$$

دویمه تجربه:

که چيري د پاسني تعامل د تعادل د ثابت قيمت  $K_C = 0.156$  وي په دواړو تجربو کي د


کيمياوي تعامل جهت د شميرل شوي قيمت په پام کي نیولو سره تشخيص کړئ!

$$K_C = \frac{C_{H_2} \cdot C_{I_2}}{C_{HI}} = \frac{(0.100)(0.100)}{(0.100)^2} = 10^{-2}$$

$$K_C = \frac{C_{H_2} \cdot C_{I_2}}{C_{HI}} = \frac{(1.00)(1.00)}{(1.00)^2} = 1$$

په لومرې تجربه کې شميرل شوي ثابت قيمت د تعادل د ثابت په پرته کوچنۍ دی نو خکه د کيمياوي تعامل جهت بنۍ خواته دی په دويمه تجربه کې شميرل شوي ثابت قيمت د تعادل د ثابت په پرته ډير قيمت لري نو خکه د تعامل جهت کينې خواته دی د لا روښانه کولو په خاطر لاندې

مثالونه په پام کې نيسو:



$$K_C = \frac{C_{NO}^2}{C_{N_2} \cdot C_{O_2}} = 10^{-30}$$

لومرې مثال


د تعادل د ثابت قيمت پدې تعامل کې ډير کوچنۍ دی او د کيمياوي تعامل جهت کينې خواته بنېي او په عمل کې تقریباً ویلي شوچې په  $O_2$  او  $N_2$  کې د  $25C^0$  ترمنځ تعامل نشي کيدا.



$$K_C = \frac{C_{NO_2}^2}{C_{N_2O_4}} = 0.36$$

دويم مثال

د تعامل د ثابت قيمت په پاسني تعامل کې بنېي چې تعامل رجعي حالت لري يعني د معينو شرایطو لاندې په تعادل کې دی.




$$K_C = \frac{C_{Cl_2}}{C_{Cl}^2} = 10^{+38}$$

دریم مثال

پدې تعامل کې د تعادل د ثابت قيمت نسيي چې د کلورين اتمونه په عادي شرایطو کې په سرعت د یو بل په منځ کې کمياوي تعامل ترسره کوي او د کلورين ماليكول توليدوي او د تعامل جهت نسي خواته يا د کلورين ماليكول د تشکيل خواته دي.

خلورم مثال: په عادي شرایطو کې د ايتانول سره د استيک اسيد د تعادل ثابت وشميري په هغه صورت کې چې (60gr) استيک اسيد د (46gr) ايتانول سره تعامل وکړي په تعادل حالت کې (12gr) او به او (58.7gr) ايستر توليد کري.



$$n = \frac{m}{Mm}$$

$$n = \frac{60gr}{60gr \cancel{/mpl}} = 1mol$$

$$n = \frac{46gr}{46gr \cancel{/mpl}} = 1mol$$

$$\left[ n = \frac{58.7gr}{88gr \cancel{/mpl}} = 0.666mol \right]$$

$$\left[ n = \frac{12gr}{18gr \cancel{/mpl}} = 0.666mol \right]$$

Ester

Water

د تعادل په حالت کې


$$= 1mol - 0.66mol = .333mol$$

$$= 1mol - 0.66mol = .333mol$$

د پاسنيو قيمتونو په پام کي نيلولو او د کتلې د عمل په تطبيق کولو سره په پاسني تعامل کي کولاي شو د تعادل ثابت په لاندي ترتيب وشمورو:

$$K_C = \frac{C_{Ester}^2 \cdot C_{Water}^2}{C_{acid} \cdot C_{alchole}} = \frac{(0.666)(0.666)}{(0.333)(0.333)} = 4$$

د تعادل د ثابت د ثيمتونو په پام کي نيلولو سره که چېري په عادي شرایطو کي (92gr) ايتانول د استيک اسيد سره مخلوط شي د هغونه خو گرام اسيتر توليد کيربي.



$$\frac{120\text{gr}}{60\text{gr}/\text{mpl}} = 2\text{mol} \quad , \quad \frac{92\text{gr}}{46\text{gr}/\text{mpl}} = 2\text{mol} \quad , \quad x\text{mol} \quad , \quad x\text{mol}$$

$$2 - X \quad 2 - X$$

په پاسني تعامل کي د کتلې د عمل په تطبيق کولو سره ليکلې شو چې:

$$K_C = \frac{C_{CH_3COOC_2H_5} \cdot CH_2O}{C_{CH_3COOH} \cdot C_{C_2H_5OH}} = \frac{x \cdot x}{(2-x)(2-x)} = \frac{X^2}{(2-x)^2} = 4$$

او سنوموري رابطه طرف او وسط کوو او ليکو چې:

$$4[(2-X)(2-X)] = X^2 \Rightarrow 4(2^2 - 2X - 2X + X^2) = X^2 \\ 4(2^2 + X^2 - 2 \cdot 2X) = X^2$$

ددې معدلي خخه کولي شو چې په لاندي توګه سوال حل کرو:

$$4(2^2 + x^2 - 2.2x) = x^2$$

$$16 + 4x^2 - 16x - x^2 = 0$$

$$3x^2 - 16x + 16 = 0$$

$$a = 3, \quad b = -16, \quad c = 16$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_{1,2} = \frac{-(-16) \pm \sqrt{16^2 - 4 \cdot 3 \cdot 16}}{2 \cdot 3}$$

$$x_{1,2} = \frac{16 \pm \sqrt{256 - 192}}{6} = \frac{16 \pm \sqrt{64}}{6}$$

$$x_{1,2} = \frac{16 \pm 8}{6} = \begin{cases} 4 \\ 1.33 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} x_1 = 1.33 \text{ mol} \\ x_2 = 4 \text{ mol} \end{array} \right\}$$

د تعادل په وخت کې د اسيتر غلظت (1,33) موله دی او عین اندازه او به تولیديرې (X2) قيمت

دقيقندی خکه د لومړني تعامل کوونکو موادو مقدار د (4mol) خخه لبې دی

$$m = n \cdot M_m \quad \text{يا} \quad n = \frac{m}{M_m}$$


$$\text{د ايتايل استيit مقدار} = 88 \times 1.33 = 117.04 \text{ gr}$$

(1)

په تاکلو شرایطو کي (فشار ، تودو خه، غلظت) د کيمياوي تعادل ثابت بدلون نه مومي خود شرایطو په بدلولو سره کولاي شو کيمياوي تعادل ته بدلون ورکرو د بهرنيو شرایطو پوسيله د کيمياوي تعادل د جهت بدلون د Lechatelier د پرنسپ تابع دي.

### Lechatelier پرنسپ ۱-۱-۵

د Lechatelier پرنسپ وايي چې په يوه کيمياوي تعامل چې په تعادل حالت کي واقع وي ، که بهرنوي شرایط (غلظت، تودو خه، فشار، بدلون وکړي د تعامل موثریت يا د هغه شرایطو په عمل کې کنې خواته بدلون مومي د لاروبانه کولو په موخه لاندي مثال په پام کې نيسو:



پدې کيمياوي تعامل کې چې په تعادل حالت کي واقع دی اضافي مقدار  $SO_3$  اضافه شي د  $KC$  د قيمت د ساتلو په خاطر د تعادل جهت کينې خواته سوق کيربي تر هغو د تعامل جريان کينې خواته دوا مومي چې دويم تعادل برقرار شي او د  $KC$  قيمت ثابت پاتې شي که له ياد شوي تعامل خخه يو مقدار د  $SO_3$  ګاز بهر شي تعامل بنسی خواته سوق کيربي او د تعامل جريان تر هغه وخت پوري دوا مومي چې نوي تعادل برقرار شي او  $KC$  ثابت قيمت وساتي.

$$(V_1 \rangle V_2)$$

ددې تعامل په ترڅ کې دی که په تعامل کې اضافي مقدار  $SO_2$  ور زيات شي تعامل بنسی خواته سوق کيربي او تعامل تر هغه وخت پوري مخ ته ئي چې د نوي تعادل حالت برقرار شي پدې


ترتیب ویلي شو چې د تعامل کومکو اجزاوو د غلظت د بدلونه په پایله کې جهت بنې او یا کينې خواته بدلولي شي.

### د فشار تاثير:

هغه کيمياوي تعاملونه چې په گاز حالت کې رامنځته کېږي په هغويه باندي د فشار بدلون تاثير واردوسي د فشار ډيريدل لې حجم خواته د تعادل جهت بدلوي.

څکه د گاز حجم له فشار سره معکوس تراو لري څرنګه چې په پاسني تعامل کې چې تولې اجزاوي یې د گاز په حالت دي ، ډير فشار وارد شي ، د تعامل جهت د لې حجم خواته ( $SO_3$  تولید) خواته سوق کېږي.

سرعت د  $V_1$  سرعت په پرته ډيرېږي برعکس که پدي تعامل کې بهري فشار لې شي ، د تعامل جهت کين لورته يعني د ډير حجم خواته بدلون مومي.



### د تودو خپه درجې اغيزه:

څرنګه مو چې مخکې ولوستل چې په اکثره کيمياوي تعاملونو کې د تعامل په ترڅ کې يو مقدار انرژي يا تودو خه تولیدږي دي ډول تعا ملونو ته Exothermic تاملونه وايي

کيميا وي تعاملونه هم شته چې د کيميا وي تعامل په ترڅ کې يو مقدار انرژي مصرف کېږي  
دي ډول تعاملونو ته Exothermic تعاملونه وايي په Endothermic تعاملونو کې د تودو خې  
ډيريدل تاثير نه لري.


خو په Endothermic تعاملونو کې د تودو خې د درجې ډيريدل د تعامل سرعت بني يعني د  
محصول تولید خواهه ډيري وي او د تعامل جهت هم بني خواهه بدلون کوي بايد ووايو چې د تودو خې  
د درجې ډيريدل د تعامل په ثابت هم تاثير کوي.


### 2-3-1-په او بو کې ايوني حاصل ضرب او $(\text{PH})$ شميرل

د کيميا تعاملونو له جملې هغه تعاملونه، چې په تحليلي کيميا کې صورت نيسني معمول  
د او بو په محیط کې قرار لري، له دی سببه لازمه ده، چې د او بو خواص په غور سره مطالعه کرو.  
خاليصې او به یو ضعيفه الکتروليت مرکبونو له ډلي خخه دی او په ډير کم مقدار ايونايز کېږي.



د هايدروجن ( $\text{H}^+$ ) ايونونه په محلول کې په آزاده توګه موجود نه دی، بلکه د او بو له  
مالیکولونو سره د هايدروكسونیم ( $\text{H}_3\text{O}^+$ ) ايون او ( $\text{OH}^-$ ) ايون مینځ ته راوري، ولی د اسانه  
ليکلو په خاطر د ( $\text{H}^+$ ) په شکل ليکل کېږي (شکل 5-1).





د  $H^+$  او  $OH^-$  ایونونو غلظت، چي د خالصو او بوده برق هدایت په اساس په (22CO) محاسبه

شوی مساوی دی په

$$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/l}$$

د او بو ایونا یزشن یا بر قی تفکیک یو رجعی تعامل دی او د نورو ضعیفو لکتروولیتونو په

شان د کتلې د عمل قانون پر هغه باندې تطبيق کېږي .

(1)

د یوه ليتر وزن په  $25C^0$  کي (997,8g) سره مساوي دي دا عدد د اوبو په ماليکولي وزن

باندي تقسيمو او د هغه د مولونو شمېر پیدا کوو.

$$n = \frac{m}{Mm} \quad [H_2O] = CH_2O = \frac{997,8}{18,06} = 55,37 mol / li$$

خونگه چی:

$$K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]} \Rightarrow [H^+][OH^-] = K[H_2O]$$

-1 ، کال 1388 م م ۲۶، ۲۷، ل ل

په پورته معادله کي د (K) قيمت او د يو ليتر او بود مولونو اندازه وضع کرو په پايله کي به

او  $[H^+]$  ايونونو غلظت په يوه ليتير محلول کي پيدا کرو:

$$[H^+] [OH^-] = 1,8 \times 10^{-16} \cdot 55,37 = 1,10^{-14} \dots ()$$

دا چې د (K) قيمت مو د کومه لاسته راورو ليکو چې:

$$K = \frac{10^{-7} \cdot 10^{-7}}{55,37} = \frac{10^{-14}}{55,37} = 1,8 \cdot 10^{-16}$$

په  $[H^+] [OH^-] = 1,8 \times 10^{-16} \cdot 55,37 = 1,10^{-14} \dots ()$  معادلي کي د او بو غلظت ثابت

قبلوو واضحه ده، چې د دوو ثابتو د ضرب حاصل، درېيم ثابت جوړوي، چې هغه په  $K_{H_2O}$  يا

(Kw) سره بنودل کېږي.

$$K_{[H_2O]} = K_{H_2O} = Kw$$

$$[H^+] [OH^-] = 10^{-14}$$

يا داسي ليکو چې:

$$[H^+] [OH^-] = Kw \dots ()$$

د (پورته) معادلي خخه معلومېږي، چې هر خومره  $[H^+]$  او  $[OH^-]$  ايونونه غلظت بدلون

مومي د هغه د ضرب حاصل په او بو او يا د او بو په رقيق محلول کي بدلون نه کوي د او بود ايونونو

د ضرب حاصل په نوم يادېږي (1)

د هر محلول خواص یا تعامل کولای شی، چې د هایدروجن د ایون غلظت په وسیله توضیح

کرو، د  $[OH^-]$  د ایونو غلظت د  $[H^+]$   $[OH^-] = Kw \dots 0$  معادلی په مرسته محاسبه کوو:

په خنثی محیط کي د هايدروجن او هايدروکسیل ايونونو غلظت سره مساوي دي.

$$[OH^+] = [OH] = 10^{-7} \text{ g-Ion/l}$$

په تیزابی محیط کي د هایدروجن د ایونونو غلظت نسبت د هایدروکسل ایونونو غلظت

خ خہ ڈپر دی یعنی:

$[H^+] > [OH^-] \Leftrightarrow [H^+] > 10^{-7} \text{ ag-Ion/l}]$

۲

$[OH^-] < 10^{-7} \text{ g-Ion/l}$

په قلوي محیط کي د هايدروجن د ايونونو غلظت نسبت د هايدروکسل ايونونو غلظت

خخه لردي

$$[H^+] < [OH^-] \Leftrightarrow [H^+] < 10^{-7} \text{ ag-Ion/l}$$

یا داسی

$[H^-O] > 10^{-7} \text{ g-Ion/l}$

په لند توگه ليکلی شو:

$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} g - Ion/li$  په حنثی محلول کې

$[H^+] > 10^{-7} g - Ion/li$  په تيزابي محلول کې :

$[HO^-] > 10^{-7} g - Ion/li$  په قلوی محلول کې :

معمولًاً په عمل کې د محلول محیط د هايدروجن د غلظت په وسیله نه بنودل کېږي، بلکې



د  $(PH)$  په وسیله مشخصېږي او هغه د هايدروجن د ايونونو د غلظت لوګاريتم خخه عبارت دی.

$$PH = -\log[H^+]. . . . . 0$$


نو په حنثی محیط کې  $7$

قلوی محیط کې  $PH > 7$

په تيزابي محیط کې  $PH < 7$



## () شکل



## () شکل

په () شکل کې دیجیتال (PH) میتر شکل بسکاره کوي چې محلولونو د (PH) اندازه کولو

پاره استعمالیې.

همدارنگه (POH) د لاندی فارمول په وسیله پیدا کولای شو.

$$POH = -\log[OH] \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{که چیری له } [H^+] [OH] = 10^{-14} \text{ معادلی خخه لوکارتمند و اخلو و به یې لرو.}$$

$$[H^+] [OH] = 10^{-14}$$

$$\log[H^+] \log[OH^-] = \log 10^{-14}$$

د لوگارتمند قوانینو له مخې ضرب په جمع بدلوو.

$$\log[H^+] + \log[OH^-] = \log 10^{-14}$$

که چیری دواړه خواوی په منفي علامي کي ضرب کړو نو:

$$-\log[H^+] + (-\log[OH^-]) = -\log 10^{-14}$$

دا چې  $(14 = -\log 10^{-14})$  دی، نو لېکلی  $(POH = -\log[OH^-], PH = -\log[H^+])$  او

شو چي:

په خالصو او بو کې  $[H^+]$  او  $[OH^-]$  غلظتونه ډير څو دی او له  $(10^{-7} g - Ion/li)$  سره

مساوي دی د فعالیت ضریب هم په داسی او بو کې (یو) سره مساوی دی.

$fH^+ = fH\bar{O} = 1$  : يعني

لهذا: د  $H^+$  او  $OH^-$  د ایونونو فعالیت د هغۇ د غلاظت سرە يو شان دى.

$$a_{H^+} = [H^+] \quad , \quad a_{OH^-} = [OH^-]$$

د ایونونو د فعالیت ضرب مساوی دی په :

$$aH^+ aOH^- = \left[ H^+ \right] \left[ OH^- \right] = K_w = 10^{-14}$$

په ضعفیه الکترولیتونو کې (PH) او (POH) پرته د ایونونو د فعالیت په نظر کې نیولو سره

محاسبه کپری، حکم چی د  $H^+$  او  $OH^-$  د ایونونو د فعالیت ضریب تقریباً (یوه) ته نژدی دی، په

قوی الکترولیتونو کې (قوی تیزاب ، القلي او مالگو) کي د محلول ایوني قوه له صفر خخه ډيره

ده، له دې کبله د هايدروجن د ايونونو د فعالیت ضریب له يوه سره نشي مساوي کېدلاي، نو که چيرې د هايدروجن د ايونونو له فعالیت نه صرف نظر وشي نا سمه پايله به لاسته راشي په داسی موادو کې PH د فعالیت د ضریب نه په گتې اخيستلو سره شميرل کېږي.

$$^a H^+ = f_H [H^+]^6 P_{H^+}^a = -\log a_{H^+} \dots \dots \dots \quad (1)$$

د اوبو انفکاك يوه اندوترميکه پروسه ده، د حرارت د مصروفولو په واسطه سرته رسېږي له دې کبله د لې شيتليلير (Lechatelier) د پرنسيپ په مطابق د حرارت د زياتوالی په اثر د اوبو انفکاك د ايونونو د تشکيل خواته صورت نيسېي په پايله کې (Kw) قيمت هم ډيرېږي، مثلاً د حرارت زياتوالی له صفر نه تر ( $100C^\circ$ ) پوري د اوبو د ايونونو د ضرب حاصل (500) واري ډيرېږي.

$$\begin{aligned} Kw &= 55 \cdot 10^{-14} 100C^\circ & Kw &= 0.11 \cdot 10^{-14} (oc^\circ) \\ &= \frac{55 \cdot 0 \times 10^{-14}}{0.11 \times 10^{-14}} 500 \end{aligned}$$

(1)

لكه خنګه چې په پورته ډول سره مو وکړاي شوه، چې په (OCO) او (100CO) کې د اوبو د تفكیک شوې ايونونو اندازه مو یوبل سره پرتلې کړي، ومولیدل چې د (OCO) نه تر (100CO) پوري د اوبو په تفكیک (500) واره زياتوالی راغلې، دلاندي جدول له مخي کولې شو چې هره درجه د تودوخي کې د اوبو تفكیک سره پرتلې کړو:

۱) جدول ، د  $K_w$  قيمتونه په مختلفو درجود حرارت کي:

| $C^o$ حرارت | $K_w = a_H^+ \cdot a_{OH}^-$ | $\sqrt{K_w} = a_H^+ = a_{OH}^-$ | $C^o$ حرارت | $K_w = a_H^+ \cdot a_{OH}^-$ | $\sqrt{K_w} = a_H^+ = a_{OH}^-$ |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0           | $0,11 \times 10^{-14}$       | $0,33 \times 10^{-7}$           | 40          | $2,95 \times 10^{-14}$       | $1,7 \times 10^{-7}$            |
| 10          | $0,3 \times 10^{-14}$        | $0,54 \times 10^{-7}$           | 50          | $5,5 \times 10^{-14}$        | $2,34 \times 10^{-7}$           |
| 15          | $0,46 \times 10^{-14}$       | $0,68 \times 10^{-7}$           | 60          | $9,55 \times 10^{-14}$       | $3,09 \times 10^{-7}$           |
| 20          | $0,69 \times 10^{-14}$       | $0,83 \times 10^{-7}$           | 70          | $15,8 \times 10^{-14}$       | $3,98 \times 10^{-7}$           |
| 25          | $1,0 \times 10^{-14}$        | $1,0 \times 10^{-7}$            | 80          | $25,1 \times 10^{-14}$       | $5,01 \times 10^{-7}$           |
| 30          | $1,48 \times 10^{-14}$       | $1,2 \times 10^{-7}$            | 90          | $38,0 \times 10^{-14}$       | $6,17 \times 10^{-7}$           |
| 35          | $2,09 \times 10^{-14}$       | $1,45 \times 10^{-7}$           | 100         | $55,1 \times 10^{-14}$       | $7,41 \times 10^{-7}$           |

3-1-په تيزابو او قلوي محلولونو کي د هايدروجن ايونونو محاسبه:

د هايدروجن او هايدروكسيل د ايونونو د محاسبه کولو فورمولونه په (جدول) کي ورکړل

شوي دي.

A: د هايدروجين د ايونونو محاسبه کول د یوه قيمته تيزابونو په محلولونو کي:

قوي یو قيمته تيزابونه مثلاً  $HNO_3, HCl$  او داسي نور ، په مکمل ډول په لاندي توګه منفك

کېږي.



د قوي يو قيمته تيزابو په محلولونو کي د هايدروجن  $[H^+]$  د ايونونو غلظت تقریباً د تيزاب

له غلظت سره مساوي دي، يعني کولاي شي چې فارمول په لاتدي جدول کي پيدا کړي. (1)

٠ جدول د هايدروڪسیل د ايونونو د محاسبه کولو فورمولونه په حنشی

تيزابي او قلوی محلولونو کي:

(جدول:

| الكتروليت   | $[H^+]$   | $[OH^-]$  |
|-------------|---|---|
| اوې         | $[H^+] \sqrt{Kw}$   | $[OH^-] \sqrt{Kw}$  |
| قوي تيزاب   | $[H^+] C_{HAn}$   | $[OH^-] = \frac{Kw}{[H^+]} = \frac{Kw}{C_{HAn}}$          |
| قوي قلوی    | $[H^+] = \frac{Kw}{[OH^-]} = \frac{Kw}{C_{KtOH}}$         | $[OH^-] = C_{KtOH}$                                       |
| ضعيفه تيزاب | $[H^+] = \sqrt{K_{HAn} \cdot C_{HAn}}$                    | $[OH^-] = \frac{Kw}{[H^+]} = \frac{Kw}{\sqrt{K \cdot C}}$ |
| ضعيفه قلوی  | $[H^+] = \frac{Kw}{[OH^-]} = \frac{Kw}{\sqrt{K \cdot C}}$ | $[OH^-] = \sqrt{K_{KtOH} \cdot C_{KtOH}}$                 |

په قوي تيزابونو فارمول کې  $C_{HAn}$  د هغه تيزابونو خخه نمایندګي کوي، چې غلظت يې (g-


eq/li , mol/li او بسودل شي.

مثال:- په (0.05N) د مالګي په تيزابو کي د هايدروجن د ايونونو غلظت له تيزاب سره برابر قبلوو.

$$\begin{aligned} [H^+] &= C_{HCl} = 0.05N = 0.05g - eq / li = 5 \times 10^{-2} geq / li \\ PH &= -\log [H^+] = -\log 5 \times 10^{-2} = -\log 10^{-2} + (-\log 5) \\ PH &= 2 - 0.7 = 1.3 \end{aligned}$$

B: د هايدروجن د ايونونو غلظت محاسبه کړي د یو قيمته ضعيفه تيزابو په محلول کې:

د یو قيمته ضعيفه تيزابو لپاره د تفکيک او ثابت تعادل معادله ليکو.



د تفکيک شوي ماليکولونو غلظت په (x) او د ناتفکيک شوي ماليکولونو غلظت په (C-x) افاده کوو.

$$[H^+] = [An^-] = X \quad , \quad [HAn] = C - X$$

$$K_{HAn} = \frac{X \cdot X}{C - X}$$

په (C-x) ناتفکيک شوي ماليکولونو غلظت (x) د عومويي غلظت په نسبت دير لمبدي نو صرف نظر ورڅخه کوو چې:

$$C - x \approx C$$

$$K = \frac{X \cdot X}{C} = \frac{X^2}{C} \Rightarrow X^2 = K \cdot C \Rightarrow \sqrt{X^2} = \sqrt{K \cdot C}$$

$$X = \sqrt{K \cdot C}$$

مثال: په (0.2N) استيک اسيد کې د هايدروجن د ايونونو غلظت محاسبه کړي په هغه صورت کې  
چې (K = 1.86 \cdot 10^{-5}) سره وي.

$$\left[ H^+ \right] = \sqrt{1.86 \times 10^{-5}} \times 0.2 = 1.9 \times 10^{-3} \text{ g} - \text{Ion / li}$$

$$PH = \log 1.9 \times 10^{-3} = -\log 1.9 + (-\log 10^{-3})$$

$$PH = 3 - 0.28 \Rightarrow PH = 2.72$$

د هايدروجن د ايون غلظت محاسبه کول د خو قيمته ضعيفه تيزابو محلول کي:

خو قيمته تيزابونو په خو مرحلو کي ديسيوشين يا منفك کېږي.

$$1, H_2An \Leftrightarrow H^+ + H\bar{A}nK = \frac{\left[ H^+ \right] \left[ H\bar{A}n \right]}{\left[ H_2An \right]}$$

$$2, HAn \Leftrightarrow H^+ + An^-, K = \frac{\left[ H^+ \right] \left[ An^- \right]}{\left[ HAn \right]}$$

د خو قيمته ضعيفه تيزابو په ايونونو کي يوازي د تفكیک لمړۍ مرحله په نظر کي نیول

کېږي مثلاً  $H_2S, H_2CO_3, H_2C_2O_4$  او د اسي نور ځکه چې په اکثره مواردو کي د تفكیک لمړۍ مرحله  $(K_1)$  نسبت دوهمي مرحلې ته  $(K_2)$  1000 واري ډيره وي.

مثال: د (0.025M) هايدروجن سلفايد په محلول کي د هايدروجين د ايونونو غلظت محاسبه کړي؟

حل: د  $(H_2S)$  د انفکاک ثابت په لمړۍ مرحله کي:

$$K_1 = 5.7 \times 10^{-8}$$

د  $(H_2S)$  د انفکاک ثابت په دوهمي مرحله کي:

$$K_2 = 1.2 \times 10^{-15}$$

$$K_1 = \frac{\left[ H^+ \right] \left[ HS^- \right]}{\left[ H_2S \right]} = 5.7 \times 10^{-8}$$

$$K = \frac{x \cdot x}{c - x} = \frac{x^2}{c} \Rightarrow K = \frac{X^2}{0.025} \Rightarrow \sqrt{x^2} = \sqrt{0.025 \cdot K}$$

$$x = \sqrt{0.025 \cdot 5.7 \times 10^{-8}} \Rightarrow x = \sqrt{14.25 \times 10^{-10}} = 3.77 \times 10^{-5}$$

$$x = [H^+] = 3.77 \times 10^{-5} \text{ g} - \text{Ion/li}$$

D: د هايدروكسيل د ايونونو او  $(P^{OH})$  محاسبه کول په قوي قلوي محلولونو کې:

د  $(OH^-)$  غلظت او  $(P^{OH})$  محاسبه کول د  $(H^+)$  غلظت او  $(P^H)$  په شان په محلولونو کې صورت

نيسي، قلوي په  $(K_{tOH})$  د هغه غلظت په  $(C_{K_{tOH}})$  او د انفکاك ثابت يې په  $(K_{tOH})$  سره بنودل کېږي د قوي قلوي په محلول کې  $(OH^-)$  د ايونونو غلظت د قلوي عمومي غلظت سره مساوى دی يعني

$$[OH^-] = C_{K_{tOH}}$$

مثال: په 0.05 سوديم هايدرواكسايد محلول کې د هايدروكسيل د ايون غلظت محاسبه کړي!

حل:

$$[OH^-] = C_{K_{tOH}} = 0.05 \text{ g} - \text{Ion/li} = 5 \times 10^{-2} \text{ g} - \text{Ion/li}$$

$$POH = -\log[OH^-] = -\log 5 \times 10^{-2} = -\log 5 + (-\log 10^{-2})$$

$$POH = 2 - 0.7 = 1.3$$

$$PH + POH = 14 \Rightarrow PH = 14 - POH$$

$$PH = 14 - 1.3 = 12.7$$

E-D: د ايونونو د غلظت محاسبه په ضعييفو قلوي محلولونو کې:

چې کتیون يې مثبت  $(Kt^+)$  چارج لري د لاندي فورمول په وسیله محاسبه کېږي.

$$[OH] = \sqrt{K_{K_{tOH}} C_{K_{t+OH}}}$$

مثال: په ۰.۳ مولیم هایدرو اکساید محلول کې د  $\bar{OH}$  د ایونونو غلظت محاسبه کړي!

$$K_{NH_4OH} = 1.8 \times 10^{-5}$$

$$\left[ \bar{OH} \right] = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \cdot 0.3} = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \cdot 3 \times 10^{-1}} = \sqrt{5.4 \cdot 10^{-6}} = 2.3 \times 10^{-3}$$

$$POH = -\log 2.3 \times 10^{-3} = -\log 10^{-3} + (-\log 2.3) = 3 - 0.36 = 2.64$$


$$PH + POH = 14 \Rightarrow PH = 14 - 2.64 \Rightarrow PH = 11.36$$

۱)

## څلورم څپرکې (بفری سیستمونه)

### ۱-۴- بفری سیستمونه او د هغونه ګته اخیستل په تحیلی کیمیا کې:

د هایدروجن ایون غلظت دیو کم مقدار تیزابو یا القلي د علاوه کولو په وخت کې او همدارنگه د اوبلن کولو په اثر دیر کم بدلون کوي د  $(\text{PH})$  دقیمت ثابت ساتل په امتحانی نلونو کې د بفری سیستمونو په وسیله تحقیق پیدا کوي، هغه محلولونه چې د هغود  $(\text{PH})$  قیمت دلبر مقدار تیزاب، قلوی یا په مقطرو او بورقیق شي، دیر کم بدلون وکړي د بفری محلولونه یا بفری سیستمونو په نامه سره یادېږي، <sup>۱</sup> یا په بل عبارت بفری محلولونه عبارت دي له: هغه محلول چې د ضعیفه تیزابو یا القلي او د هغود مربوطه مالګو خخه جوړشوي وي او د قوي تیزابو یا القلي دلېږي <sup>۲</sup> اندازې ور علاوه کولو یا د اوپو په مرسته د رقيقولو سره یې  $(\text{PH})$  بدلون ونه کړي.




بفر محلولونه د الکترولیتونو له محلول خخه چې مشترک ایون سره ولري برابر وي د بفری مخلوط په توګه اکثراً ضعیف تیزاب او د هغه د مالګو مخلوط او ضعیف قلوی او د هغه د مالګو


1 - ، کال ۱۳۸۸ ل، ۴۳ م

2 - ، کال ۱۳۶۴ ل، ۲۴ م


مخلوط او همدارنگه دخو قيمته تيزابونو مخلوط مالگونه گته اخيستل كيربي مثلاً داستات بفر محلول دسركى تيزابوا و سوديم استيت ، دامونيا بفرى محلول دامونيم هايدرو اكسايد او دامونيم كلورايد دمخلوط محلول خخه برابر يري، په لاندې مثالونو کي ليدل كيربي، چې بفر محلولونه خنگه دقوي تيزابوا او قوي قلوي تاثير رفع کوي او (P<sup>H</sup>) قيمت په معين حد کي ساني مثلاً که چيرې په استيتني بفر محلول یو لب مقدار (NaOH) علاوه شي تيزابو پوسيله خنشي كيربي.




يا



په ايوني شکل:




اويا




دقلوی (CH<sub>3</sub>COOH) ايونونه دتيزابو له (H<sup>⊕</sup>) (NaOH) ايونونو سره تعامل کوي او کم منفك شوي داوبو ماليکولونه جوروی دصرف شوي هايدروجن ايونونو په عوض دسركى تيزاب نور منفك كيربي او په محلول کي دهايدروجن نوي ايونونه ازاده وي، ترڅو چې دايونونو او


مالیکولو تر منخ بيرته تعادل برقراره شي، ددي عمل په پايله کي د زيات شوي قلوي له امله او به تشکيليري او د هايدروجن غلظت تقریباً ثابت پاتې کيربي که په نوموري بفر محلول باندي لب مقدار قوي تيزاب مثلاً (HCl) علاوه شي لاندي تعامل صورت مومي:




اويا



په ايوني شكل:




اويا




له پورته تعاملونو خخه معلوميري چي د تيزابو علاوه کول په بفری محلول باندي دهغه د  
قلوي خاصيت لرونکي مالگني او د قلوي علاوه کول په بفر محلول کي دهغه د تيزابو سره تعامل  
کوي!

همدارنگه د بفر محلول او بلن کول د مقاطرو او بو په وسیله دهغه په (P<sup>H</sup>) کي کوم د پام و ر  
بدلون نه رائي، خکه چي د هايدروجن دايونونو کم والي چي د او بلن کولو (رقيق کولو) له امله


مينخ ته را اورل کيري، بيرته د تيزابو دلا ديرتفكىك كيدو په وسيله جبران کيري، او س هفه تعاملات چې د امونيا يې بفر محلول او د تيزابو او قلوي ترمنيغ صورت نيسسي تربخت لاندي نيسو.




او ياداسي



ايوني شكل يې داسي دي:




او ياداسي:





۱)

د)  $\overline{\text{OH}}$  ايونونو غلظت په محلول کي د  $\text{NaOH}$  دعلاوه کولوپه هکله مينخ ته راخي او د امونيم کلوريده  $(\text{NH}_4\text{Cl})$  مربوط دامونيم  $(\text{NH}_4^+) \text{ NH}_4^+$  له ايونونو سره تعامل کوي او کم تفكىك کيدونکي ماليکولونه يعني  $(\text{NH}_4\text{OH})$  تولیده وي په دې ترتیب سره د  $(\overline{\text{OH}})$  دا يونونو غلظت په محلول کي نه ديرېري او د  $(\text{P}^H)$  قيمت بدلون نه کوي، او که چيرې په نوموري محلول باندي يولې مقدار قوي تيزاب مثلاً  $(\text{HCl})$  علاوه شي:



ياداسي



له پورته تعاملونو خخه ليدل كيربي، چې دقوي تيزابو علاوه کولو په وسیله ده ګه د هايدروجن ايونونه د امونیم هايدرو اکساید د ( $\text{OH}^-$ ) ايونونه سره تعامل کوي اوکم تفکیک کیدونکې د او بوماليکولونه تشکيله وي او په تعامل کي مصرف شوي د ( $\text{OH}^-$ ) ايونونو په عوض نور د ( $\text{OH}^-$ ) ايونونه د ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ) دلاړير تفکيک ده په اثر مينځ ته راهي او ده ګه کموالي جبران کوي په دې توګه د محلول ( $\text{H}^+$ ) ثابت پاتي کيربي (په لاندي) جدول خينې بفر محلولونه چې په تحيليلي کيميا کې گتې ورخخه اخیستل کيربي وجودلري.<sup>۱</sup>

### (۱) جدول

| H  | دمحلول يا مخلوط اجز (په 1:1 مولره نسبت)                      | بفر محلول         |
|----|--|-------------------|
| ,8 | فورميک اسيداو سوديم فورميٹ ( $\text{HCOOH}, \text{HCOONa}$ ) | فورميٹ<br>Formate |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| ,2 | بنزویک اسید او سودیم بنزویت<br>$(C_6H_5COOH, C_6H_5COONa)$                           | بنزویت<br>Benzoate  |
| ,8 | سودیم اسیتیت او د سرکی تیزاب<br>$(CH_3COOH, CH_3COONa)$                              | اسیتیت<br>Acetate   |
| ,6 | $(NaH_4PO_4)$ سودیم ڈای ہایدرو جن فاسفیت<br>$(Na_2HPO_4)$ ڈای سودیم ہایدرو جن فاسفیت | فاسفیت<br>Phosphate |
| ,2 | $(NH_2OH)$ امونیم ہایدرو اکساید<br>$(NH_4Cl)$ امونیم کلوراید                         | امونیم<br>Ammonium  |


دیفر موادو غلظت ديدلوونونو يه اساس کولای شو هسي بفر محلول جور کرو، چي تاکلي

ولري ( $P^H$ )

۱- دهجه بفر محلولونو د ( $P^H$ ) محاسبه کول، چي له ضعيف تيزابو او له مربوطه مالگي خخه يي

جور شوی وی، دمثال یه تو گه د  $\text{CH}_3\text{COONa}$  او  $\text{CH}_3\text{COOH}$  دیفر محلول  $(\text{P}^{\text{H}})$  محاسبه کوو:

حل: دهایدروجن دایونونو غلظت د  $(CH_3COOH)$  دتفکیک د ثابت له معادلي خخه پیداکوو:



$$K = \frac{[CH_3CO\bar{O}][H^+]}{[CH_3COOH]} \dots\dots\dots(1)$$

د(3-1) معادلي دواړه خواوې په  $\text{CH}_3\text{COOH}$  کې ضربوو:

$$[\text{CH}_3\text{COOH}]_K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+] = K [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

او س د مساوات دواړه خواوې داستیت په ايون تقسموو:

$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = \frac{K[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

$$[\text{H}^+] = K \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} \dots\dots\dots (3-2)$$

خرنګه چې په محلول کې  $\text{CH}_3\text{COONa}$  موجود دي، او له بلې خواهله یوه مالګه هم ده،

چې په مکمله توګه د  $\text{Na}^+$  او  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  په ايونونو تفکیک کېږي له دي کبله دسر کې تیزاب

د  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  په شتوالي کې د مشترک ايون درلودلو په وجه نه تفکیک کېږي، او په  $[\text{CH}_3\text{COOH}]$

مالیکولي شکل په محلول کې وجود لري له دي کبله ده ډله مالیکولي غلظت دمولري غلظت سره

برابردي يعني:

$$\{\text{CH}_3\text{COOH}\} = C_{\text{CH}_3\text{COOH}} \quad , \quad [\text{CH}_3\text{COO}^-] = C_{\text{CH}_3\text{COONa}}$$

دا قيمتونه په (3-2) معادله کې وضع کوو:

$$[\text{H}^+] = \frac{K \cdot C_{\text{CH}_3\text{COOH}}}{C_{\text{CH}_3\text{COONa}}}$$

له پورته معادلي خخه لوگاريتم اخلو.

$$\log[H^+] = \log K + \log \frac{C_{CH_3COOH}}{C_{CH_3CONa}} = \log K + \log \frac{Ca}{Cs}$$

اوسمی خواوونکی دعاووکی علامی بدلون کرو:

$$-\log[H^+] = -\log K - \log \frac{Ca}{Cs}$$

دراچی د  $P^K$  سره او  $- \log K$  و د  $P^H$  سره مساوی وي لرو چې:

که چیرته دبفری محلول تهیه کولولپاره دتیزاب او مالگی برابر یا مساوی واخیستل شی

لیکلی شو:

$$Ca = Cs \quad , \quad \frac{Ca}{Cs} = \frac{1}{1} = 1$$

بناءً كه  $P^H = P^{Ka} - \log 1$  و  $P^H = P^{Ka}$  که چیری دیزاب او مالگی دغلهٔ نسبت


تله ۱ نه تر ۱۰ یاله ۱۰ نه تر ۱ (۱۰ تر  $\frac{1}{10}$ ) پوری بدلون ورکرو نو د (۳-۳) معادله به لاندی

قىمتونه ولرى

$$P^H \equiv P^K - 1$$

$$P^H = P^K + 1$$

2- دضعیفه قلوي اودهجه دمالگي دمخلوط (P<sup>H</sup>) محاسبه کول ددي محلول یومثال يي (



$$K_{NH_4OH} = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_4^+][OH^-]} , \quad K_{NH_4OH} = K_b$$

$$[\bar{OH}] = K_b \frac{[NH_4^+ OH^-]}{[NH_4^+]} \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$NH_4OH = C_b \quad , \quad NH_4Cl = NH_4^+ = Cs$$

نوپه دی توگہ لیکوچی

$$[O\bar{H}] = K_b \frac{C_b}{C_s} \dots \quad (3-5)$$

1  
( )

د یو لپ عملیو خخه و روسته (3-5) معادله لاندی شکل غوره کوي:

$$POH = PK_b - \log \frac{C_b}{C_s}$$

خزنگہ چھپ

$$\text{PH} + \text{POH} = 14$$

$$PH = 14 - POH$$

$$PH = 14 - PK_b + \log \frac{C_b}{C_s} \dots (3-6)$$

## 2- بفری ظرفیت:

يو مقدار تيزاب يا قلوي چې په محلول علاوه شي او د هغه په  $(P^H)$  کې ډير بدلون رانشي دا خاصیت د بفری محلول ظرفیت په نامه يادېږي، بفری ظرفیت د تيزاب د غلظت د مالگې دا نبو نوله نسبت خخه په لاس راوري او دا ظرفیت هغه وخت اعظمي دي، چې تيزاب پر مالگې نسبت له یوه سره مساوی شي (پورته رجوع وکړي) او د اسې یې هم تعريفولی شو چې په یو ليټر بفر محلول کې د قوي تيزابو يا القلي د مول زياتولو ته وايې، چې د یو واحد په اندازه د  $(P^H)$  بدلون سبب کېږي او د لاندې رابطې په وسیله نسودل کېږي.<sup>۱</sup>

### (د تيزاب يا القلي معادل ګرام)

$$\beta = \frac{C}{PH_1 - PH_0} \quad \text{يا} \quad \frac{D[H^+]}{D[\text{غلظت تيزاب يا القلي د علاوه کولو مخکي} - D[H^+]]}$$

<sup>2</sup>)

په پورته رابطه کې  $(\beta)$  بفری ظرفیت  $(\sigma)$  علاوه شوي تيزاب يا قلوي د مولونو شمير او د بفر سیستم د  $(P^H)$  د بدلون چې د قوي قلوي يا قوي تيزابو د زياتولو په پايله کې تولید یېږي صورت نیسي.<sup>3</sup>

-1 ، کال ۱۳۹۰ ل، م ۲۴۶

-2 ، کال ۱۴۱، م ۲۰۱

-3 ، کال ۱۳۹۰ ل، م ۲۴۶

## پنجم خپرکي (د مالگي هايدروليزي)

### 5-1- د مالگي هايدروليزي:

د مالگي هايدروليزي دهجه عملیه خخه عبارت دی، چې مالگي په خپلو مربوطه اجزاء

تجزیه شي او ددي عمل په پايله کې د مالگي دا يونونو په مقابل کې د او بو دا يونونو په بدلون سره

( $P^H$ ) هم بدلون کوي، د همدي تعریف له مخې مالگي کولی شو، چې په خلور برخو وويشي: (۱)

**لومړۍ ډله مالګي:** دهجه مالګو خخه عبارت دی، چې ضعيفه تيزاب او د قوي القلي خخه لاسته

راغلي وي لکه سوديم استيت او ( $K_2CO_3$ )

**دويمه ډله مالګي:** په دې ډله کې هغه مالگي شاملې دي، چې د قوي تيزابو او قوي القلي خخه

لاسته راغلي وي لکه ( $NaCl$ ) يا ( $KCl$ )

**دریمه ډله مالګي:** هغه مالگي دي، چې د يو قوي تيزابو او يو ضعيفه القلي خخه جوره شوي وي

لکه:  $NH_4Cl$




**خلورمه ډله مالګي:** دهجه خخه عبارت دی، چې د يو ضعيفه تيزابو او ضعيفه القلي خخه لاسته

راغلي وي لکه:  $CH_3COONH_4$

- 1- که د لمړې ډله مالگي تعامل د او بو سره په نظر کي ونيسو:





خرنگه چي او به یوضعيه الکتروليت دی، چي په کي د  $(H^+)$  او  $(OH^-)$  ډير لپه مقدار ايونونه تشکيليري، هكه نود  $(MA)$  د مالگي خخه د  $(A^-)$  ايون د  $(H^+)$  سره چي داوبو خخه لاسته رائي تعامل کوي، د  $(HA)$  ضعيف تيزاب تشکيلوي او په پايله کي د  $(H^+)$  او  $(OH^-)$  دايونونو تعادل له منخه خي او د  $(OH^-)$  دايون غلظت په محلول کي ډيريري او محلول قلوي خاصيت پيداکوي لکه:




د حل شوي مالگي دايونونو تعامل د او بود  $(H^+)$  او  $(OH^-)$  دايونونو سره د هايدروليزي

پنوم يادېږي.




ایونې معادله یې په لاندې ډول ده.





2- که دويمه ډله مالگي په او بوكې حل کړو ده ګي ايونونه او کتيون دواړه داوبود  $(H^+)$  او  $(OH^-)$  سره تعامل نه کوي يعني د تعامل کولو تركيبي ميل نه لري، هكه چي لاسته راغلي تيزاب او

القلبي دواړه دقوي الکتروليت خخه دی، چې په سلوکي سل (100%) په اوپوکي تفکيک کيرې، نولدي امله د اوپو د ايونونو ترمنځ تعادل په خپل حال پاتې کيرې او محلول په خنڅي توګه وجود لري لکه:



1)



3- د هغه مالګې هايدروليک، چې ضعيفه قلوي او قوي تيزابو په وسیله تشکيل شوي وي لکه:




ایونې معادله یې د اسي ليکل کيرې.



د مثال په توګه:





## ياباني شكل سره:



كله ليدل كيپي چي ددي دول مالگو دهايدروليز په پايله کي محيط تيزابي خاصيت

پيداكوي

4- دهجه مالگو هايدروليز چي ضعيفو القليواتيزابو په وسيله منع ته رائي: ددي دول مالگي په اوبلنو محللونو کي د (H<sup>+</sup>) ايونونه دمالگي دايونونو سره يو خاي ضعيف تيزاب تشکيلوي او د (O<sup>-</sup>) دايونونه دمالگي دكتيونونو سره اتحاد کوي ضعيفه قلوي منع ته راوري مثلا:



خرنگه چي د او بو (H<sup>+</sup>) او (O<sup>-</sup>) دمالگي دكتيون اوانيون سره يو خاي شوي او په پايله کي ضعيفه الکتروليتونه تشکيل کري، نولدې امله هايدروليز په لوره درجه صورت نيسی، ددي لپاره چي معلومه کرو پدي تعاملونو کي خنثی محيط مينع ته راتلای شي باید هغه تيزاب او القلي ته وکورو، چي د هايدروليز په پايله کي منع ته رائي، په پورته مثال کي (K<sub>CH<sub>3</sub>COOH</sub> = 1,86 · 10<sup>-5</sup>) تقریباً مساوی دي، نولدې امله د محلول او د (K<sub>NH<sub>4</sub>OH</sub> = 1,79 · 10<sup>-5</sup>) د تعامل محيط عملاً خنثی دي، (PH ≈ 7) که د (HCOONH<sub>4</sub>) مالگه هايدروليز شي پدي صورت کي (NH<sub>4</sub>OH) چي يوضعيه القلي دي او د ميربانو تيزاب ورخخه حاصليلېي، لاسته راغلي

$(\text{NH}_4\text{OH})$  نسبت  $(\text{HCOOH})$  ته دير ضعيف دی، حکه چې د  $\text{HCOOH}$  دانفکاک ثابت  $(1.77 \times 10^{-4})$

دی، په ذکر شوي محلول د  $(\text{H}^+)$  ايونونه په زيات مقدار سره موجود وي او د محلول محطي

کاربونيک اسيد د  $(K_2 = 5.6 \cdot 10^{-11})$  دی قيمت  $(K_2)$  دی.

په (4-1) جدول کې د هايدروليزي له نظره د مالگو صنف بندې:

| دمالگو د تشکيلونکي تيزابي او قلوي قوه |       | هايدروليزي صورت نيسني يا<br>نه | دمالگو د محلولونو تعامل                       |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------|---|
| القلبي                                | تيزاب |                                |   |
| قوي                                   | ضعيف  | صورت نيسني                     | القلبي ( $\text{PH}>7$ )                      |
| ضعيف                                  | قوي   | صورت نيسني                     | تيزاب ( $\text{PH}<7$ )                       |
| ضعيف                                  | ضعيف  | په بهه درجه صورت نيسني         | د تيزاب او قلوي مالگو کې<br>نسبي قوي تابع وي. |
| قوي                                   | قوي   | صورت نه نيسني                  | خنثى ( $\text{PH}=7$ )                        |


دهجه مالگو هايدروليزي چې د خوقيمه تيزاب او يا خوقيمه القلي په وسileه صورت

نيسي:


د هغه مالگو هايدروليزي چې د خوقيمه تيزابو خخه منځ ته راغلي وي، په تدرج سره

صورت نيسني.

لومړۍ مرحله:



## ايونى



دويمه مرحله:



ايوني شكل:



د (H $\bar{C}O_3^-$ ) ايون دماليكول ( $K = 4,3 \times 10^{-7}$ ) د (H $CO_3^-$ ) د (H $CO_3^-$ ) په نسبت ډير

تفکیک کېږي، یعنې د کاربونيت ايون د (H $\bar{C}O_3^-$ ) ايون په نسبت زیاتره او بوده ايدروجن ايون سره یوچای کېږي، نولدې امله هايدروليپه لومړي مرحله کې ډير قوي دي.


پورته توضحات د تجربې په وسیله ثابتولاني شي.

که سوديم کاربونيت او NaHCO<sub>3</sub> مالګي را واخلو او محلولونه یې جوړ کړو او یوه اندازه فینول فتاليں ور علاوه کړو (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) به ګلابي رنګه غوره ( $P^H = 11,6$ ) او (NaHCO<sub>3</sub>) به کمه رنګه ګلابي رنګ سره بسکاره کېږي ( $P^H = 8,3$ )

## شپم خپرگې

### 6- انحالليت د ضرب حاصل (Solubility Product (SP)) او د اوبو د ايونونو د فعاليت د ضرب حاصل:

په تير فصل کې دكتلي د عمل قانون ھينې مثالونه په متجانس الکتروليتي سيستمونو کې تربح لاندي ونيول، د تحليلي کيميا ډير زيات سراوکار له غير متجانس سيستمونو سره دی، ئىكەنچي دا سيستمونه مختلف فازونه جوره وي، د غير متجانس سيستم بىلا بىلې اجزاء چې د تاکلي سرحد لرونکې وي دفار په نوم يادېږي مثلاً مشبوع محلولونه چې د موادو له رسوب سره په تماس کې وي يو غير متجانس (هيتروجن) سيستم شميرل کېږي رسوب جامد فاز او محلول يې ماياع فاز تشکيلوي، د يو مرکب حلیدل اويا رسوب کولو مراحلې په (5-1) جدول کې ليدل کېږي:




(5-1) جدول

يو لم حل کيدونکي الکتروليت مثلاً ( $\text{AgCl}$ ) له اوبو سره یوخاي کوو، ( $\text{AgCl}$ ) خه اندازه په او بوكې حلېږي، د ( $\text{Ag}^+$ ) او ( $\text{Cl}^-$ ) ايونونه توليدوي ددي پروسې په پايله کې په سيستم کې د حل کيدو او رسوب کولو په سرعت کې تعادل منځ ته رائي، چې دې قسم تعادل ته متحرک تعادل (Dynamic – Equilibrium) ويل کېږي.

د درې قسمه تعادل په بهير کې د  $(\text{Ag}^+ \text{ او } \text{Cl}^-)$  ايونونو چې په تاکلى وخت کې جامد فاز ترک کوي دهغه ايونو تعداد سره مساوي کېږي، چې بيرته د  $(\text{AgCl})$  رسوب جوره وي په دې ترتیب د  $(\text{AgCl})$  یو مشبوع محلول حاصلېږي، چې په هغه کې د  $(\text{AgCl})$  رسوب کوي او دهغه بيرته حلیدل دتعادل په حالت کې قرارلري.

داسي مشبوع محلولونه چې په هغو کې تعادلي سیستم موجودوي دکتلي دعمل قانون پر طبيق کېږي  $(\text{AgCl})$  دحل کيدو سرعت په  $(V_1)$  سره، چې د  $(\text{Ag}^+ \text{ او } \text{Cl}^-)$  ايونونو په یو واحد وخت کې دجامد فاز سطحه ترک کوي دهغه ايونونو له تعداد سره مستقيماً متناسب دي، چې دجامد په سطحي کې رسوب کوي، له دي کبله ويلی شو چې:




دحلیدو

بهير ثابت پاتي کېږي نو  $(V_1 = K_1)$  ثابت قبولو.

شكـل (5-1)

د رسوب او د حل کيدو بهير



د بیرته گرستل کيدو سرعت په  $(V_2)$  سره د  $(\text{Ag}^+)$  او  $(\text{Cl}^-)$  د ڈراتو دتکائف له مخي چې د  $(\text{AgCl})$  په سطحه باندي په تاکلي وخت کي صورت نيسني تاکل کيربي، هر خومره چې  $(\text{Ag}^+)$  او  $(\text{Cl}^-)$  ايونونو غلظت ډير وي په هومره اندازه د گرستل ايزيشن سرعت هم ډير وي، د گرستل ايزيشن سرعت معادله په لاندي ډول ده.<sup>۱</sup>

$$V_2 = K_2 [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

په تاکلي درجه د ټودو خې کي  $(K_2)$  ثابت دی.

د  $(\text{Cl}^-)$  او  $(\text{Ag}^+)$  د ايونونو غلظت سره هم مساوي وي.

$$[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$$

په مشبوع محلول د حلیدو رسوب کولو سرعتونه سره مساوي دي  $(V_2 = V_1)$ ، نود  $(V_2)$  په

ځای د  $(K_1)$  قيمت هم ليکلي شو:

$$K_I = K_2 [Ag^+] [Cl^-]$$

د معادلي دواړه خواوې په  $K_2$  سره تقسيموو:


$$\frac{K_I}{K_2} = \frac{K_2 [Ag^+] [Cl^-]}{K_2} \Rightarrow \frac{K_I}{K_2} = [Ag^+] [Cl^-]$$

د دوه ثابتونو نسبت په دريمې ثابت سره دي، نو دا په  $(SP)$  سره بنيوچي  $(SP)$  د انحلاليت حاصل ضرب (Solubility product) خخه عبارت دي.

$$SP = [Ag^+] [Cl^-] \dots \dots \dots (1-6)$$

د حل شوي الکتروليت مقدار په  $(SP)$  سره بشودل کيربي، چې په لاندي ډول يې تعريفوو: (ديولو حل کيدونکي الکتروليت د ايونونو مولاري غلظت د ضرب حاصل د هغه په مشبوع محلول په تاکلي درجي تودو خې کې ثابت قيمت لري)  $\textcircled{1}$


که د الکتروليت انفکاك په عوموي بنې ولیکو په دې صورت کې د مالګې عوموي فارمول د  $K_{t_n} An_m$  په بنې افاده کړو.



د انفکاك عوموي معادلي لپاره د انحلاليت حاصل ضرب الجبری شکل په لاندي ډول سره ليکو:

$$SP_{K_{t_n} An_m} = [Kt^{m+}]^n [An^{-n}]^m \dots \dots \dots (2-6)$$

په دي معادله کي  $[An^{n-}]$  او  $[Kt^{m+}]$  دكتيونونو اوانيونو د تعادل غلظتونو خخه عبارت دي، چي  $(Kt_n An_m)$  الکتروليت دتفکيک په جريان کي تشکيل شوي  $(m)$  او  $(n)$  دايونونو د غلظت توانونه دي مثلاً که د  $(Kt_n An_m)$  پرخاي د  $Ca_3(PO_4)_2$  مالگي دانحاليت د ضرب حاصل معادله ولیکو:



$$SP_{Ca_3(PO_4)_2} = [Ca^{+2}]^3 [PO_4^{-3}]^2 \dots \dots \dots \quad (3-6)$$

که وغوارو د انحاليت د ضرب حاصل په دقيقه توګه محاسبه کرو، په دي صورت کي د ايونونو مولاري غلظت په عوض دايونونو فعاليت وضع کوو، ئكه چي دايونونو په مولاري غلظت کي بین الایوني قوه په نظر کي نه نیول کېږي د بین الایوني قواوو په نظر کي نیولو سره د انحاليت د ضرب حاصل فورمول په دي بنه ليکل کېږي.

$$SP^a_{Ca_3(PO_4)_2} = a^3_{Ca^{+2}} \cdot a^2_{PO_4^{-3}} \dots \dots \dots \quad (4-6)$$

$$SP^a_{Ca_3(PO_4)_2} = [Ca^{+2}]^3 [PO_4^{-2}]^2 \cdot f_{Ca^{+2}} \cdot f_{PO_4^{-3}} \dots \dots \dots \quad (5-6)$$

په عوموي بنه:

$$SP^a_{Kt_n An_m} = a^n Kt^{m+} \cdot a^m An^{-n} \dots \dots \dots \quad (6-6)$$

د  $(6-6)$  معادله بیانوي چي په اوړو کي دکم حل کیدونکو الکتروليتونو په مشبوع محلولونو کي دايونونو غلظت دير لبر قيمت لري، له دي کبله په دي محلولونو کي د بین الایوني قواوو تاثير دير ضعيف دي، چي د هغه خخه کيداي شي صرف نظر وکرو.

## معمولاد تحليل په عملبي کي الکتروليتونو دانحاليت دضرب حاصل دايونونو د غلظت

په اساس صورت نيسسي يوازي په هغه الکتروليتونو کي، چې دير دحل کيدو قابلیت لري د ( $SP_{AgCl}$ ) قيمت دايونونو د فعالیت دضرب حاصل نه محاسبه کيرې.

مثال: د ( $AgCl$ ) انحالیت په  $(25C^0)$  کي  $1,89 \times 10^{-3} g - Ion / lit$  دی، ( $SP_{AgCl}$ ) محاسبه کړي؟

حل: د ( $AgCl$ ) مولاري غلظت محاسبه کوو ( $AgCl$ ) ماليکولي وزن  $(143,32)$  دی.

$$C_{AgCl} = \frac{1,89 \times 10^{-3}}{143,32} = 1,3 \times 10^{-5} mol / lit$$

خرنگه چې د ( $AgCl$ ) داionaيزيشن په پايله کي د ( $Ag^+$ ) او ( $Cl^-$ ) غلظتونه سره مساوي

تولیديرې نوليکلی شو:

$$[Ag^+] = [Cl^-] = 1,3 \times 10^{-5} gr - Ion / lit$$

$$SP_{AgCl} = [Ag^+] [Cl^-] = 1,3 \times 10^{-5} \cdot 1,3 \times 10^{-5} = 1,78 \times 10^{-10} \approx SPa_{AgCl}$$

2- مثال: دانحالیت قابلیت که په ( $x$ ) سره و بنو يعني د ( $BaSO_4$ ) حل کيدوله کبله د

موله ( $Ba^{+2}$ ) او ( $x$ ) موله ( $SO_4^{-2}$ ) په یوه ليتر کې تولیديرې نوليکلی شوچې:

$$SP_{BaSO_4} = [Ba^+] [SO_4^{-2}] = X \cdot X = X^2 = 1,1 \cdot 10^{-10}$$

$$\sqrt{X^2} = \sqrt{1,1 \cdot 10^{-10}} \Rightarrow X = \sqrt{1,1 \cdot 10^{-10}} = 1,05 \times 10^{-5} mol / lit$$

که انحالیت وغواړو چې ګرام فى ليتر ( $y$ ) باندي وارو نوباید د ( $x$ ) قيمت د ( $BaSO_4$ ) په

ماليکولي کتله کي ضربوو.

$$y = x \cdot M_{\text{WBaSO}_4} = 1,05 \times 10^{-5} \cdot 233,4$$

$$y = 2,45 \times 10^{-3} \text{ g} - I/\text{lit}$$


(۱)

### امفوٽريک هايدرو اكسايدونه:

دا هايدور اكسايدونه  $\text{Sn(OH)}_2$  ،  $\text{Pb(OH)}_2$  ،  $\text{Zn(OH)}_2$  ،  $\text{Cr(OH)}_3$  ،  $\text{Al(OH)}_3$  او نورو

خخه عبارت دی، دا مرکبونه هم تيزابي خواص اوهم قلوي خواص لري په محلول کې د  $\text{H}^+$  کتیون او د  $\text{OH}^-$  انيون توليده وي دارنگه مرکبونه د امفولایت يا امفیپروتیک يا امفوتريک ياديري دسرب هايدرو اكسايد په مشبوع محلول کې زنجيري تعامل دجامد فاز او د ديسویشن شوي مخصوصاتو ترمینځ موجود دي.

### جامد فاز (رسوب)



(دهايدرو اكسايد په شکل ديسویشن) (متصل) (د تيزابو په شکل ديسویشن)

ددې تعاملونو دهريو لپاره ديسویشن ثابت ليکو:

(a) د  $\text{Pb(OH)}_2$  لپاره، چې د قلوي په شان عمل وکړي:

- ، کال 1388 لـ ، ۶۵ مـ

$$K_{\text{Pb}(\text{OH})_2} = \frac{[\text{Pb}^{+2}][\text{OH}]^2}{[\text{Pb}(\text{OH})_2]} = 9,6 \times 10^{-4}$$

(b) لپاره کله، چې د تیزابو په شان عمل وکړي.

$$K_{\text{H}_2\text{PbO}_2} = \frac{[\text{H}^+][\text{Pb}^{-2}\text{O}_2]}{[\text{H}_2\text{PbO}_2]} = 2,10^{-16}$$

رسوب د هايدرو اكسايد یو تیزابي شکل او قلوي شکل ثابت قيمتونه نسه ايبي، چې دا قيمتونه ډير یوبل سره توپير لري، ددي مرکب قلوي خاصيت نسبتاً تیزابي خاصيت ته ډير قوي دی، په نورو امفوتري مرکبونو کې مثلاً  $\text{Al(OH)}_3$  یو تیزابي او قلويو شکلونو ثابت قيمتونه په ترتیب سره  $10^{-13} \times 10^4$  او  $10^{-25} \times 10^8$  دی، یوشمير هايدرو اكسايدونه موجود وي، چې د قلوي او تیزابي ديسیویشن ثابت یې تقریباً مساوی وي مثلاً:



$$K_{\text{Ga}(\text{OH})_3} = 1,6 \times 10^{-11} \quad , \quad K_{\text{H}_2\text{GaO}_3} = 5 \times 10^{-11}$$

د جست د هايدرو اكسايد په مشبوع محلول کې لاندې تعادل موجود دی.



په پورته تعامل کې که د  $\text{OH}^-$  علاوه شي نوموري تعادل کينې خواته ميل پيداکوي او په محلول کې د زنكیت ايونونه ډيرېږي او که په هغې باندې د  $\text{H}^+$  کتیون علاوه شي پورتنې مساوات بني لوري ته بدلون مومي او د  $\text{Zn}^{+2}$  ايونونه ډيرېږي په پايله کې ويلاقى شو، چې په تیزابي محلول کې جست د  $\text{Zn}^{+2}$  په شکل او په قلوي محلول کې  $\text{ZnO}_2^{-2}$  موجود دي امفوتريک هايدرو اكسايدونو خخه په مخلوطو تجربو او همدارنګه جدا جدا تعاملونو کې لکه  $\text{Cr}^{+3}$  ،  $\text{Zn}^{+2}$  ،  $\text{Al}^{+3}$  اونرو د دريم گروپ کتیونونو خخه (قلوي په میتود کې) د هغه د هايدرو اكسايد یو خلې ډير

زيات علاوه شي پورته رسوبونه د  $ZnO_2^{-2}$ ،  $Cr\bar{O}_2$  او  $Al\bar{O}_2$  په شکل حل کيربي، ددي گروپ دنورو کتیونو هايدرو اكسايدونه د رسوب په شکل پاتې کيربي او په اسانې يود بل نه جدا کيربي الومنيت او زنگيت د ايونونو مخلوطونه د تيزابي کولو په وسيله په  $Zn^{+2}$  او  $Al^{+3}$  تبدليربوي مثلاً:



المونيم د  $NH_4OH$  د عمل په ذريعه د  $NH_4Cl$  په موجوديت کي د  $Al(OH)_3$  په شکل سپين پاغنده يې رسوب جوروي ضمناً  $Zn(OH)_2$  هم رسوب کوي، ددي تعامل دستره رسولو لپاره نه بنايې چې  $NH_4OH$  مقدار په استعمال شي، خكه چې ممکن  $Al(OH)_3$  د دوهم خل لپاره رسوب وکري، په دې صورت کي  $Al\bar{O}_2$  بيرته بايد په  $Al(OH)_3$  تبديل شي ۱

## اوم خپرکې

### 1-7- ترموديناميک (Thermodynamics)

د کيمياوي تعامل د ترسره کيدولپاره په لومړي پړاو کې تعامل کونکي عناصر د انرژۍ په مرسته فعاليري خرنګه چې د متشکله ذراتو تر منځ یې رابطې غوڅيري او وروسته په خپل منځ کې کيمياوي تعامل ترسره کوي ، د نوي مرکب د جورولو پر مهال یوه اندازه انرژي ازاد يېږي چې د رابطوي انرژۍ په نامه يادېږي.




که د لومړني ذراتو لپاره د مصرف انرژي اندازه د هغې انرژۍ په پرتله چې د نويو رابطو د جورېدو پر مهال تولید يېږي لېږوي ، دغه ډول تعاملونو ته (Exothermic) وايي يعني کيمياوي تعامل د انرژۍ له تولید سره یو ځای رامنځته کېږي.

که چيرې د لومړنيو ذراتو لپاره د مصرف انرژي اندازه د هغې انرژۍ په پرتله چې د نويو کيمياوي رابطو د جورېدو پر مهال تولید يېږي ډيره وي دغه تعاملونو ته (Endothermic) تعاملونه وايي . د مقال په ډول : د او بو د چورولو لپاره باید اکسجين او هايدروجن فعال شي يعني هغه کوولانت رابطې چې د هايدروجن په ماليکول کې د هايدروجن د اتمونو تر منځ او د اکسيجين په ماليکول کې د اکسيجين د اتمونو تر منځ موجود دي ، غوڅي شي او ماليکولونه یې په خپلو اتمونو بدل شي . پدي صورت کې یو اندازه انرژي مصرف کېږي . هايدروجن او اکسيجين تولید شوي اتمونه په ډيره تيزۍ سره په خپل منځ کې کيمياوي تعامل کوي او د نويو کوولانت رابطو په جورولو سره د او بو مرکب تولیدوي او یو مقدار انرژي هم تولید يېږي چې د رابطوي انرژۍ په نامه يادېږي.



په همدي ترتيب نايتروجن او اکسيجين په هوا کې مخلوط دي خو په خپل منځ کې کيمياوي تعامل نکوي . د کيمياوي تعامل د ترسره کيدولپاره باید دواړه عنصر په خپلو اړونده اتمونو د انرژۍ په مصرف کولو سره بدل شي .

په اتممي حالت کې دواړه عناصر کيمياوي تعامل ترسره کوي  $NO$  مرکب د نويو کوولانت رابطو په جورولو سره تولیدوي او یو مقدار انرژي هم تولید يېږي .



کيمياوي ترموديناميک دکيمياوي تعامل په جريان کې دکاراوانرژي راکره ورکره دکيمياوي تعادلاتوقوانين او وبين الفاري تعادلاتوقوانين مطالعه کوي، دترموديناميک دقوانيوند پيل دمخه بنه ده چې د فزيکي کيميا حيني تعريفات ترڅيرنې لاندي ونيسو. او يا په بل عبارت هغه علم چې په کيمياوي تعاملونو کې د انرژي د بدلونونو د فاري حالت د بدلونونو او د کيمياوي تعامل د جهت له تاکلو خخه بحث کوي د کيمياوي ترموديناميک په نامه ياديږي.

په ترموديناميک کې حيني اصطلاحات شته چې په لنډ ډول هغه کولی شو داسيتعريف کرو.

**سيستم**(System): دمادي جهان هغه برخه چې د نوروبرخو خخه جلا ترڅيرنې لاندي نیول کيربي سيسitem بلل کيربي. يا په بل عبارت د جسم يا د جسمونو د کروپ خخه عبارت دی، چې په حقيقي او ذهنې صورت سره د شاوخوا محیط خخه جدا او مشخص اوسي د خارجي عواملو خخه چې د هغوي د بې نظمې سبب کيربي سيسitem کيداي شي چې د چای پياله، د مالګو کرستل د غاز بالون او داسي نور... (1)


**چاپيريال**(Environment): دسيستم شاوخوا یاهغه برخې چې يو سيسitem یې احاطه کړي وي چاپيريال بلل کيربي.

**جهان یا طبیعت**(Nature): دسيستم او چاپيريال مجموعي ته طبیعت وايې په کيمياکي سيسitemونه په درې ډوله دي.

۱- **خلاص سيسitem**(Open System): هغه سيسitem ته ويل کيربي چې د خپل چاپيريال سره دمادي او انرژي راکره ورکره ولري. يا په بل عبارت چې د شاوخوا محیط سره د مواد او انرژي تبادله ولري لکه جوش او به چې د او بوبخار بدون د کوم مخالفت خخه شاوخوا محیط ته انتشار کوي او انرژي بدلون د شاوخوا محیط سره صورت نيسسي.

۲- **تپلى سىستم** (Close System): هغه سىستم ته ويل كىپى چې دخپل چاپيرىال سره يوازى دانرژى راکره ورکره ولري.

۳- **گوشە شوي او يا چدا شوې سىستم** (Isolated System): هغه سىستم ته ويل كىپى چې دخپل چاپيرىال سره نه دمادى او نه دانرژى راکره ورکره ولري.



همدارنگه ديوالونو خخه دتودوخى دتيريدوله مخې سىستمونه په دوه برخوو يشل كېپى :

۱- **دياترميك سىستم** (Diathermic System): هغه سىستم ته ويل كىپى چې دديوالونو خخه بې تودوخه تيريداي شي.

۲- **adiabatic System** (Adiabatic System): هغه سىستم ته ويل كىپى چې دديوالونو خخه بې تودوخه نه تيريدى.

هغه عملیه په کومه کې چې تودوخه ازادىپى داكزوترميک په نامه او هغه عملیه چې پكى تودوخه جذبىپى داندوترميک په نامه يادىپى. لکه : د بنzin او لرگىو سوزىدل يوه اکزو ترميك عملیه او د اوپۇ بخار كىدل يوه انھو ترميك عملیه ده. د انھو ترميك د عملىي تودوخه مثبت ( $Q>0$ ) او د اکزو ترميك د عملىي تودوخه منفي ( $Q<0$ ). نى يول كىپى كە په يو ادياباتك سىستم کې اکزو ترميك عملیه صورت و مومى دلتە د سىستم په داخل كې د تودوخى درجه لورپىپى او برعكس كە د ادياباتك سىستم په داخل كې انھو ترميك عملیه صورت و مومى نو دلتە د سىستم په داخل كې د تودوخى درجه راتېتېپى.

کالوري ميترونە معمولاً ادياباتك سىستمونه وي په کالوري متر كې د تودوخى درجي د لورپيدو يا تىتەدو لمخې د هغى تودوخى اندازه معلومىدai شي، کومه چې د کالوري متر په داخل

کي ازاديربي يا جذب شي ، که د ديا ترميك سيستم کي اکزوترميک عمليه اجراء شي ، نو دلته تودو خه سيستم خخه چاپيريال ته وحئي او د چاپيريال د تودو خه درجه لوريربي او که په دياترميک سيستم کي انهو ترميك عمليه اجراء شي ، نو دلته د چاپيريال خخه د سيستم داخل ته تودو خه راخي او چاپيريال سريربي (1)

**فاز:** فاز د يو متجانس سيستم د تمامي اجزا و د مجموعې خخه عبارت دی چې تر کيب ، فزيکي او کيميا وي خواصو له مخي يو شان وي او د نورو برخو خخه جدا او په جداگانه سطحه کي قرار وي لکه او به لرونکي د يو فاز او سيستم د مایع او بيو او يخ لرونکي د دوه فازو دی چې اجزا د هغوي د کيميا وي خواصو له مخي يوشان اما د داخلی ساختمان ، کثافت او داسي نورو له مخي يو د بل سره توپير لري تول ترمو ډيناميک سيستمونه په دوه ډوله دی متجانس او غير متجانس.

**متجانس سيستم:** عبارت د هغه سيستم خخه دی چې لرونکي د يو فازوي مثلاً بوري او مالګي محلولونه په او بيو کې عبارت د متجانس محلولونو خخه دي.

**غير متجانس سيستم:** عبارت د هغه سيستم خخه دی چې لرونکي د دوه يا زياتو فازونو وي مثلاً يخ او بيه په عين وخت کې په پاسنې سطحه د هغوي بخار تشکيلوي عبارت د غير متجانس سيستم خخه دي. (2)

**انرژي:** د کار کولو له ظرفيت خخه عبارت دی چې د انرژي د شکلونو له جملې خخه داخلی انرژي زيات ارزښت لري.


**کار:** د انرژي بدلون کوونکي شکل له يو سيستم خخه بل سيستم نه دی

**حرارت:** د انرژي بدلون کوونکي شکل دی او د (Q) په حر ف بندول کيربي چې په دې شکل انرژي د ماليکول د مستقيم تماس په اثر له يو جسم خخه نه انتقاليربي. (3)

1 - ، کال ۱۳۸۵ ل، ۵۵

2 - ، کال ۱۳۹۳ ل، ۹۲ - م

3 - ، کال ۱۳۹۳ ل، ۹۳ - م




### 1-1-7 قانون لومړی ترمودینامیک

د ترمودینامیک لومړی قانون د انرژي د بقاء قانون یو خاص شکل دی (1) دیوسيستم د انرژي زیاتوالی اویا کموالی د چاپیریال د انرژي د کموالی یا زیاتوالی سره مل وي، دسیستم خخه دانرژي تبادله چاپیریال ته دیوشکل خخه بل شکل ته اوپري، ولې هيڅکله له منځه نه ئې، چې دغه مفهوم دانرژي دبقا قانون په بنه ډول بياني، دجهان دانرژي مقدار ثابت دی، چې دغه قانون دترمودینامیک د لومړي قانون په نوم پیشنو. د انرژي ثبات یابقاء په تول جهان کې ليدلای شو. دبيلګي په ډول په یو موټر کې د سوزیدونکو تيلومقدار د انرژي د کار او انرژي د اندازې سره معادل دي، کوم چې د موټر د اجزاوو د مسافرينو (سورلي) او د هغوي وسائل او د اطراف هوا ګرموي، کارهم د ميكانيکي انرژي په شکل د ماشين خرخونه په حرکت راولي، همدارنګه انرژي شونې ده، چې په الکتروني (راهي، ساعت)، کيمياوي (بطريو) او حرارت یې چې له اصطحکاک خخه منځ ته راهي هم تبدیله شي، ولې مجموعه د دغه انرژيو باید د تعامل کونکوا و محصول د تعامل (د تيلو سوزيدلو) سره برابره وي.

### Forms of Energy

Energy comes in a variety of forms...



ترموديناميک عمليه په دريو بيلابيلو شرائيطو کي تر سره کيږي چې دی (Isobaric )، Isochoric او Isothermic عمليو په نامه يادېږي.

Isothermic عملبي هغو عمليو ته وايي چې په ثابته تودو خه کي ترسره شي.

Isobaric عملله هغو عمليو ته وايي چې په ثابت فشار کي ترسره شي.

Isochoric عملبي هغو عمليو ته وايي چې په ثابت حجم کي ترسره شي د ترموديناميک لومړي  
قانون د لاندې رياضيکي معادلې پوسيله بنو دلی شو:

$$Q = \Delta u + A$$

$$Q = \Delta u + (-A)$$

په دې رابطه کي (Q) د هغو تودو خي په نامه يادېږي چې د کيمياوي عمل په ترڅ کي جذب او يا ازادېږي. ( $\Delta u$ ) په سистем کي د ننه د ارزۍ بدلونونو په نوم او (A) هغه کار دی چې د سистем د موادو د انبساط په پايله کي ترسره کيږي.

( $\Delta u$ ) د سистем د ننه د انرزۍ بدلون بنبي او دغه انرزۍ په کيمياوي تعاملونو کي د یوه سистем د متشکله ڈراتو د اتومونوله انرزې خخه عبارت ده. يعني د سистем د متشکله ڈراتو د پوتانشيل او حرکي انرزۍ مجموعه ده.

په دې رابطه کي ( $A = P\Delta V$ ) ده چې ( $P$ ) فشار ( $\Delta V$ ) د سистем د حجم بدلون دی هغه وخت کار امكان لري چې د سистем د حجم ډير شي په دې صورت کي ( $P\Delta V + \Delta u = Q$ ) کله چې د سистем د حجم له ډيريدو خخه مخنيوي وشي پدې حالت کي د سистем لخوا انبساطي کار نشي ترسره کيدا.

$$\Delta V = 0$$

$$A = P\Delta V \Rightarrow A = P \cdot 0 \Rightarrow A = 0$$

$$Q_v = \Delta u$$

(Q<sub>v</sub>) د تودوخي مقدار په (Isochoric) شرایطو کې بنسي، د تودوخي بدلون يوازي د سیستم دته د انرژۍ د بدلون سبب کيربي. يعني په پايله کې يې د ( $\Delta u$ ) مقدار لږ او يا ډيرېږي په شرایطو کې د سیستم لخوا انبساطي کارتر سره کيربي يعني:

$$Q_P = \Delta u + P\Delta V \dots \dots \dots$$

$$Q_P = \Delta u + A$$

$$Q_P = (u_2 - u_1) + P(V_2 - V_1)$$

$$Q_P = u_2 + u_1 - PV_2 - PV_1$$

$$Q_P = u_2 + PV_2 - (u_1 + PV_1)$$

ثرنګه چې په يو سیستم کې د داخلی انرژۍ او کار مجموعه د (Enthalpy) په نامه يادېږي.

$$U + PV = H$$

پورتنې رابطه کولی شو، چې په لاندې ترتیب سره يې وليکو:

$$\begin{aligned} Q_P &= H_2 - H_1 = \Delta H \\ Q_P &= \Delta H \dots \dots \dots (1) \end{aligned}$$

(ΔH) د سیستم د انتالپی بدلون او يا د کيمياوي تعامل د انتالپی بدلون په نامه يادېږي چې په Isobar شرایطو کې د سیستم د تودوخي سره مساوي کيربي.

## ۱-۷-۲- د هييس قانون (Hess Law)

د کيمياوي تعامل حراري اثر د هغه سیستم په ابتدائي او انتهائي حالت کې (په تعامل کې د داخل شويو او د تعامل خخه د حاصل شويو موادو په طبیعت او خواصو پوري اړه لري او د کيمياوي تعامل په لار يعني د کيمياوي تعامل په منځنيو مرحلو پوري اړه نلري. د مثال په توګه د کاربن خخه د کاربنداي اكسايد لاسته راولپ په پام کې نيسو: د کاربن خخه کاربنداي اكسايد په دوو طریقو لاسته راتلاي شي.

۱- کاربن د کافي مقدار اکسيجن په موجوديت کي سوزيربي او کاربنداي اکسайд جورېري.




۲- کاربن په داسي محيط کي سوزول کيربي، چې هلتنه د اکسيجن مقدار کم وي.



بیا لاسته راغلی کاربن مونو اکساید د دستگاه داسي برخې ته ئى، چې هلتنه د تودو خې درجه کافى لوره او هم اکسيجن په کافى اندازه موجود دى، دلتنه داسې تعامل صورت نىسى:



د کاربن خخه د کاربنداي اکساید د لاسته را ورولاري په لاندى شكل کي بى سودل کيربي:



د هيىس د قانون په اساس د کاربن خخه د کاربنداي اکساید لاسته را ورلۇد تعامل حرارتى اثر بايد د دواپو طريقو خخه يوشى وي . پس ليكۈچې:

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$$

$$\Delta H = (-26.39 \text{ Kcal}) + (-67.64 \text{ Kcal})$$

$$\Delta H = -94.030 \text{ Kcal}$$



$$-94.030 \text{ Kcal} = -94.030 \text{ Kcal}$$

د (Hess) د قانون خخه دوه پايلى اخىستىل کيربي:

۱- د كيمياوي مادي د جورېيدو تودو خە:

د ساده موادو كيمياوي عناصرۇ خخه د يوې كيمياوي مادي د جورېيدو په تعامل کې چې كومە تودو خە جذب يا ازادىرېي د هېنى مادي د جورېيدو د تودو خې په نوم يادىرېي ، د موادو د جورېيدو تودو خە اكثراً د ثابت فشار لاندى د يو مول مادي د پاره معلومىرېي.

## د یو شمير مواد د جورېدو کيمياوي تعاملونو لاندي ورکړل شويده:



باید زياته کړو چې د یوې کيمياوي مادي د جورېدو او تخریب کیدو تودو خې عددًا یوشی ولې علامې بې مخالف وي، نو خکه هر خومره زياته تودو خه چې د یوې کيمياوي مادي د جورېدو په وخت کې ازاده شوې وي په هماغه انهول د هغې مادي تخریب لپاره زياتې تودو خې ته ضرورت دی. همدا سبب دی چې د اگزوترميك تعامل حاصلات د اندوترميک تعامل دحاصلاتو په پرتله ډير ثابت دی، که د یو کيمياوي تعامل د ټولو مواد د جورېدو تودو خې وپېژنو نو کولاني شو چې په نظری ډول د هغه تعامل حراري اثر محاسبه کړو.

مثال: د تودو خې په  $(25C^0)$  درجه کې د کوراندوم د کرستل  $(Al_2O_3 - \alpha)$  او د  $(SO_3)$  د ګاز خخه کرستلي المونيم سلفيت د جورېدو د تعامل حراري اثر محاسبه کړې په دغه تعامل کې د شاملو مواد د جورېدو د تودو خو ستپنله ره قيمتونه په لاندي ډول کې ورکړل شوي دي:



$$\Delta H^0_{(Al_2O_3)} = -400.5 \text{ Kcal}$$

$$\Delta H^0_{[Al_2(SO_4)_3]} = -822.8 \text{ Kcal}$$

$$\Delta H^0_{(SO_3)} = -94.6 \text{ Kcal}$$

حل:

د کوراندوم او سلفر ترای اکساید خخه د المونيم سلفيت د جورېدو تعامل په لاندي ډول دی؟



## د هييس د قانون په اساس ليکو چې:

$$\begin{aligned}\Delta H^0_{Al_2(SO_4)_3} &= \Delta H^0_{Al_2O_3} + \Delta H^0_{SO_3} + \Delta H^0_x \\ \Delta H^0_x &= (\Delta H^0_{Al_2(SO_4)_3}) - (\Delta H^0_{Al_2O_3} + \Delta H^0_{SO_3}) \\ \Delta H^0_x &= (-822.8 \text{Kcal}) - (-400.5 \text{Kcal} - 3 \cdot 94.6 \text{Kcal}) \\ \Delta H^0_x &= (-822.8 \text{Kcal}) - (-684.3 \text{Kcal}) = -138.5 \text{Kcal}\end{aligned}$$

پس د هييس د قانون په اساس د يو کيمياوي تعامل حراري اثر د تعامل خخه د حاصل شويو موادو د جوريدو د تودو خو مجموعه منفي په تعامل کې د شامل شويو موادو د جوريدو د تودو خو د مجموعي سره مساوي کيربي ، په دي محاسبه کې د کيمياوي تعامل په معادله کې د هري مادي د مولونو شمير په پام کې نیول کيربي او د ساده موادو لکه ( $O_2$  ,  $N_2$  ,  $C$  ,  $Cu$ ) د جوريدو حرارتونه صفر حسابيري.


## ۲- د کيمياوي موادو د سوزيدو تودو خه:

هغه تودو خه چې د يو کيمياوي مادي د مکمل سوزيدو په پايله کې ازاديږي د هغې مادي د سوزيدو د تودو خې په نامه ياديږي د کيمياوي مادي د مکمل سوزيدو خخه مطلب دادی چې په هغه مرکب کې د تولو شاملو عناصر د اعظمي ولانس اكسايدونه جورشي ، مثلاً که يو هايدور کاربن وسوزي ، نو دلته باید او به او کاربنداي اكسايد جورشي او که او به او کاربن مونو اكسايد جورشي ، نو دغه د هايدرو کاربن مکمل سوزيدل نه دي د غضوي تعاملونو حراري اثر اکثراً په هغه تعامل کې د شاملو موادو د سوزيدو د حرارت په مرسته حسابوي ، په دي صورت کې په تعامل کې د داخل شويو موادو د سوزيدو د تودو خو د مجموعي خخه د تعامل خخه د لاسته راغلو موادو د سوزيدو د تودو خې مجموعه منفي کوي.

مثال: د لاندي کيمياوي تعامل د تودو خې اثر حساب کړي؟



په دي تعامل کې د شاملو موادو د سوزيدو حرارتونه په لاندي ډول دي:



## د پورتنې تعريف په اساس ليکوچې:

$$\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$$

$$\Delta H = (-780.98Kcal) - 3.(-310.62Kcal) = 150.88Kcal$$

د يو شمير کيمياوي موادو د سوزيدو د تودو خو ستنه دره قيمتونه په (۳) جدول کې ورکړل شوي دي.

## 7- د ترموديناميک دویم قانون:

مخکې مو ولوستل چې د ترموديناميک لومړۍ قانون د انژۍ، د بقاء قانون يو خاص شکل دی، د ترموديناميک په لومړۍ قانون کې د سیستم او د هغه د چاپيریال تر منځ د کار او تودو خې په بنه د انژې راکړه ورکړه خیړل کېږي، خو دلته د کار يا تودو خې د راکړې ورکړې د لوريجهت، امکان او حد په هکله خه نه ويل کېږي، د يو ترموديناميک جريان امکان، حد او لوري د ترموديناميک په دویم قانون کې خیړل کېږي. (۱)

يعني د کيمياوي تعامل جهت بنيي او د هغې پواسطه کولی شو چې د کيمياوي تعامل جهت او د پاي وړاندوينه وکړو. د ترموديناميک په دویم قانون کې انتروپي (Entropy) د ايزوترم ايزوبار پوتانشيل هم لولو (Entropy) د يوه سیستم د بې نظمي مقدار په طبيعي ډول د تولو کيمياوي مواد خاصيت دی، چې ميل لري د څانګړي نظم خخه بې نظمي خواته بدلون وکړي. خرنګه چې هوا له ډير فشار خخه لړ فشار يا ډير حجم خواته چې بې نظمي ولري خوخيږي په کيمياوي تعاملونو کې هم د تعامل ميل هغو خواته دی چې هلته ډير فشار او بې نظمي وي. پدي ترتیب کولی شو په يوه سیستم کې د انتروپي په پیژندلو سره د سیستم جهت وړاندوينه وکړو. د سیستم انتروپي د لاندې رابطې پوسيله بنيو:

$$S = K \cdot \log W$$

پدې رابطه کې (S) د سیستم د بې نظمي مقدار يا انتروپي ، (K) د Bolzman ثابت دی او (W) د يو سیستم د متشکله ذراتو د موقعیت احتمال بنيي، هر خومره چې يو سیستم په خاص نظم کې قرار ولري، په هماګه کچه انتروپي بې لړه ده او بر عکس هر خومره چې د متشکله ذراتو موقعیت په ډير بې نظمي کې واقع وي، د سیستم انتروپي ډيره وي. د بىلکې په توګه که چېږي

دسوديم کلورايد مالگه په کرستالي بنه ولرو، چې خانګري نظم ولري په اوبو کي د مالگي د حل کيدو پر مهال متشکله ذرات يې هڅه کوي، خود ډير نظم حالت خخه چې لبه انتروپي لري بې نظمي خواته يعني ډيرې انتروپي خواته وخوئيږي.

په دې ترتیب ويلاي شو چې په يو سیستم کي د لړ انتروپي خخه ډيرې انتروپي خوا ته خوئيدل خپل سري دي، مثلاً د عطرو ماليکولونه په خپل سر د کوتې په هوا کي ورگاهيږي، د ګرم منقل خخه تودوځه په خپل سر کوتې ته ورڅريږي، که برقي منقل او بطري د برق په يو ترلي سیستم کي يو بل سره وتړل شي، دلته د بطري داخلی انژي په خپل سر په تودوځه اوږي، دغه تول د خپل سري جريان مثالونه دي په تولو خپل سره جريانو کي سیستم د تعادل خوا ته ورثدي ګيرې. خود ډيرې انتروپي خخه د لړې انتروپي خواته عمل خپل سري عمل نه دي، مثلاً د هوا هغه د عطرو د ماليکولونو بېرته راتولول، د کوتې خخه د تودوځي راتولول او په هغې دمنقل بيا ګرمول، د کوتې تودوځه بېرته د بطري په داخلی انژي اړول دا تول جريانونه په خپل سر نه اجرا ګيرې او د هغې د اجرا کولو دپاره خارجي کارتنه اړتیا ده او یا د ترسه کيدلو لپاره يې انژي ته اړتیاده.

### 7-2-1- د ازو ترم - ايزوبار پوتاشيل:

ايزو ترم - ايزوبار پوتاشيل په يوه سیستم کي اتالپي، انتروپي او د تودوځي د درجي فكتوروونو محصلې خخه مو چې مخکې ولوستل ډيرې کيمياوي مواد او په مجموع کې سیستمونه ميل لري، چې بې نظمي خواته وخوئيږي. مثلاً کله چې يو ماليکول په اتمونو، ايونونو او یا راديکالونو توټي ګيرې، انتروپي یې ډيرې او مواد ميل لري، چې ډيرې انتروپي خواته وخوئيږي. برعکس که اتمونه، ايونونه او یا راديکالونه سره يو ځای شي او ماليکولونه جوړکري، په دې حالت کي سیستم د بې نظمي خخه د نظم خواته خوئيږي یا په بل عبارت انتروپي یې لړ ګيرې، خرنګه چې د دواړوو ډولونو کيمياوي تعامل امكان موجود دي له دې ځایه پايله اخلو چې يوازي د انتروپي د فكتور په پیشندلو سره نشوکولي د تعامل د جهت وړاندوينه وکړو په همدي ترتیب په (Exothermic) کيمياوي تعاملونو کي يو مقدار تودوځه ازادېږي، د تودوځي تولید په کيمياوي تعاملونو کي بشي چې د تعامل جهت د تولید، تعامل محصول (خواته دي).

برعكس په (Endothermic) کيمياوي تعاملونو کې يو مقدار تودو خه تعامل کونکو موادو پوسيله جذب کېږي، چې د تودو خې جذب اساساً د تعامل جهت د تعامل کين خواته، تعامل کونکو موادو خواته دي.

په هر صورت د تودو خې په تولید او جذب سره کيمياوي تعامل تر سره کېږي، نو ځکه نشو کولی يوازي د اتالپې فكتور پوسيله د کيمياوي تعامل جهت وړاندوينه وکړو.

د کيمياوي تعامل د وړاندويني او د جهت د تاکلو لپاره باید د اتالپې ، اتروري او تودو خې د درجي د فكتورونو محصله په پام کې ونيسو، چې دي محصلې ته د ايزوبار او ايزوترم پوتانشيل وايي او د لاندي رابطي پوسيله بشودل کېږي.


$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \dots \dots \dots \quad (1)$$

پدې رابطه کې ( $\Delta G$ ) د ايزوبار - ايزوترم پوتانشيل بدلون ( $\Delta H$ ) د اتالپې بدلون ( $T$ ) د مطلقه تودو خې درجه ( $\Delta S$ ) د اتروري بدلون نسيي او د ( $\Delta G$ ) قيمت پوسيله کولی شو د تعامل جهت وړاندوينه وکړو . خرنګه چې د ( $\Delta G$ ) قيمت له صفر خخه لې وي ( $\Delta G < 0$ ) دی کيمياوي تعامل جهت نسيي خواته دي او د ( $\Delta G > 0$ ) قيمت سره د کيمياوي تعامل جهت کين چې (خواته دي او  $\Delta G = 0$ ) د تعادل حالت نسيي .

که چېري په يوه کيمياوي تعامل کې ( $\Delta G < 0$ ،  $\Delta H < 0$ ،  $\Delta S < 0$ ) وي په دې صورت کې ( $\Delta G < 0$ ) کېږي او تعامل په خپل سر نسيي خواته مخ ته ځي، چې دي ډول تعاملونو ته مستقيم تعاملونه هم وايي.

که چېري ( $\Delta S < 0$ ،  $\Delta H < 0$ ) وي د کيمياوي تعامل جهت د ( $\Delta G$ ) تر قيمت پوري اړه لري ، که ( $\Delta G$ ) له صفر خخه لې، قيمت خان ته ونيسي د تعامل جهت نسيي خواته او که ( $\Delta G$ ) د صفر خخه زيات قيمت ونيسي نو په دې صورت کې تعامل جهت کين خواته دي.

که چېري ( $\Delta S < 0$  او  $\Delta H < 0$ ) وي، دي ډول تعاملونو ته (Endothermic) تعاملونه وايي، چې په دې صورت کې د تعامل جهت هم د ( $\Delta G$ ) تر قيمت پوري اړه لري د بيلګي په توګه لاندي تعامل په پام کې نيسو:



$$\Delta S = -79 \text{ J/mol} = -0.079 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta H = -1675 \text{ KJ/mol}$$

$$T = 298K$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -1675 \text{ KJ/mol} - 298K(-0.079 \text{ KJ/mol})$$

$$\Delta G = -1675 \text{ KJ/mol} + 23.542 = -1651.456 \text{ KJ/mol}$$

$$\Delta G < 0$$

په پورتنې تعامل کې  $(\Delta G)$  منفي قيمت بنيي چې د کيمياوي تعامل جهت بني خواته يعني  $(Al_2O_3)$  توليد خواته دي.


د (Entropy) او (Enthalpy) فكتورنو سربيره د تودخې درجه هم د کيمياوي تعاملونو د تر سره کيدو لپاره موثره ده، خوباید ووايو چې په تعامل کې د تودخې درجه د (Entropy) له قيمت سره تړاو لري . که چېري  $(\Delta S < 0)$  وي د تودخې ديريدل د  $(\Delta G)$  د قيمت د ډيريدو سبب کېږي او د تعامل جهت بني خواته سوق کوي .

که چېري  $(\Delta S < 0)$  وي پدې صورت کې د تودخې ديرول د  $(\Delta G)$  قيمت لړ کوي او تعامل کين خواته سوق کوي.

که چېري  $(\Delta S = 0)$  وي په دي حالت کې د تودخې ديريدل د کيمياوي تعامل جهت او د  $(\Delta G)$  په قيمت تاثير نه لري، نوئکه  $(T\Delta S = 0)$  کېږي.

پدې ترتیب کولی شو د (Entropy)، او تودخې درجې د فكتورنو په پیژندلو سره او د  $(\Delta G)$  د محصلې پوسيله د کيمياوي تعامل وړاندوينه وکړو.

په یوه کيمياوي تعامل کې کولی شو د ايزوبار - ايزوترم پوتانشيل بدلون د تعامل د محصول ايزوبار - ايزوترم پوتانشيل مجموعې او تعامل کوونکو موادو د ايزوبار - ايزوترم پوتانشيل مجموعې له توپير خخه لاسته راورو.



$$\Delta G = (d\Delta G_{298}D + e\Delta G_{298}E) - (a\Delta G_{298}A + b\Delta G_{298}B)$$

پدي رابطه کي  $(\Delta G)^{(d)}$  تعامل د ايزوبار - ايزو ترم پوتانشيل بدلون  $(d\Delta G_{298}D + e\Delta G_{298}E)$  د  
کيميا وي تعامل د محصول د ايزوبار - ايزو ترم پوتانشيل ستينه ره مجموعه او  $(a\Delta G_{298}A + b\Delta G_{298}B)$   
د تعامل کونکو مواد د ايزوبار - ايزو ترم پوتانشيل ستينه ره مجموعه بنبي  
باید ووایو چې د مرکبونو ستينه ره ايزوبار - ايزو ترم پوتانشيل په جدول کي ثبت دي او د  
 $(\Delta H)^{(\Delta S)}$  ستينه ره قيمت او په كتابونو کي د مواد د استينه ره موجود دي (1)

## اتم خپرکې

### د عناصر و دورايري جدول گروپونه

د لومړي اصلی گروپ عناصر (IA):

د لومړي اصلی گروپ د عناصر و معرفي کول:

د جدول په لومړي اصلی گروپ کې تېپک عناصر لکه ليتم (*Sodium*)، سوديم (*Lithium*)،

د پتاشيم سب گروپ پتاسيم (*Rubidium*)، روبيديم (*Potassium*)، سيزيم (*Cesium*)، فراسيم

(*Framcium*)، شامل دي.

نوموري عناصر د القلي فلزاتو په نوم هم يادېږي دا تول عناصر په کيمياوي تعاملونو کې

اكسيديشن نمبر اخلي (+1).

$NaOH$ ،  $Na_2CO_3$ ،  $NaCl$ ،  $Na_2O_2$ ،  $LiAlH_4$ ،  $LiH$ ،  $LiCl$  مهم مرکبونه يې

$CsCl$ ،  $RbCl$ ،  $K_2CO_3$ ،  $KOH$ ،  $KCl$ ،  $NaNO_3$ ،  $H_2O$ ،  $Na_2SO_4$  او نور.

طبيعي منابع: د ټمکې په کره کې په تخميني صورت،  $Na = 2.5\%$ ،  $Li = 32 \times 10^{-3}\%$

او  $Cs = 3.7 \times 10^{-4}\%$  او  $Rb = 1.5 \times 10^{-2}\%$ ،  $K = 2.5\%$  شته.

چير کم او راديواكتيف عنصر دي او  $Na$  او  $K$  تقریباً زیات پیداکېږي.  $Li$  او  $Rb$  کيميا به عناصر دي. فراسيم په طبیعت کې

نوموري عناصر په طبیعت کې په عنصری شکل نه پیدا کېږي د نورو عناصر و په شان هغوي

د خپلو الومينو سليکاتو د مرکبونو په شکل په طبیعت کې پیدا کېږي لکه:

د منزالونو کې موجود د  $(Ortoclase) K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$  او  $(Albite) Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$  په ترلې د دې.

د سوديم او پتاشيم زيات مرکبونه د بحر په او بو کې حل دي. د بحر په او بو کې لېتلې  $Na_2SO_4 \cdot H_2O$ ،  $KCl$ ،  $NaCl$ ،  $Na$  2.5% شتون لري او د بحد او بود تبخير په نتيجه کې  $(Carnalite) KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$  حاصلېږي. ليتيم زياتره په تركيبی شکل په الومينو سليكان او الومينوفوسفات کې موجود دي.

مهم منزال  $(Lepidolit) LiAlPO_4F$ ،  $(Amblegonite) Al_2O_3 \cdot 4SiO_2 \cdot Li_2O$  د دې.

د لپيدوليت په منزال کې رويديم هم ليدل کېږي سېزيم د  $4Cs_2O \cdot 4Al_2O_3 \cdot 18SiO_2 \cdot 2H_2O$  ( $Palocit$ ) په منزال کې شامل دي.

## د دويم اصلي گروپ عناصر (IIA)

د دويم اصلي گروپ د عناصر معرفې کول په دې گروپ پوري بيريليم  $(Be)$ ، مګنيزيم  $(Mg)$  د کلسيم د فرعی گروپ عناصر لکه کلسيم  $(Ca)$ ، سترانيم  $(Sr)$ ، باريم  $(Ra)$ ، راديم  $(Ba)$  ارتباط لري دا ټول عناصر د  $Be$  نه پرته خالص فلزي خواص لري په ازاد حالت کي سپين نقره ئي رنگ لري د القلى فلزاتو خخه سخت دي د ذوبان نقطه ئي په پوره اندازه لوره ده دا ټول فلزات پرته له  $Ra$  سپک دي او مهم خواص ئي په  $(10-1)$  جدول کې بسودل شوي دي.

ددې گروپ لومړي دوہ عنصر تقریباً ځاته موقعیت لري په ډېرو برخو کې د نورو خلورو عناصر و خخه فرق لري.


ددي گروپ د اخري عنصر ( $Ra^{226}$ ) تول ايزوتوبونه راديواكتيف دي د تولو خخه زيات عمر لري مخکي د راديوتراپي لپاره استعمالиде ولی اوس وخت کي د هغه په عوض نور ارزان قيمته راديوايزوتوبونه چې په مصنوعي هستوي رياكتور کي جوريبي، استعماليري.

ددي گروپ اتومونه په خارجي قشر کي دوه ولانس الکترونونه لري په بيريليم اتوم کي د اخیر خخه د مخه قشر کي دوه الکترونونه او په نورو عناصر و کي اته الکترونونه شته. د خارجي قشر دوه الکترونونه په اسانۍ سره جلاکيري او اتومونه یې په  $(+2)$  چارچه ايونونو بدليري په کيمياوي فعاليت کي د القلي فلزاتو خخه لې خه کم فعال دي، لکه بيريليم او مگنيزيم د اوبو سره ډير ورو تعامل کوي او هايدروجن آزاده وي. پداسي حال کي چه د لومري گروپ عناصر د اوبو سره په شدت تعامل کوي او هايدروجن ازادوي. ددي گروپ نور خلور عنصره د اوبو سره په تيزی تعامل کوي څکه د هغې هايدروکسایدونه په اوبو کي حل دي ولی د  $Be^{Mg}$  هايدرواكسایدونه په اوبو کي کم حل دي.

د  $Ca$ ،  $Sr$ ، او  $Ba$  عناصر چه په دوهم اصلی گروپ کي شامل دي د پخوا خخه د ئمکني القلي فلزاتو په نوم ياديدل علت یې دا دي چې د  $Ca$ ،  $Sr$ ، او  $Ba$  هايدروکسایدونه القلي خواص لري او د دغۇ فلزاتو اكسایدونه د  $Al_2O_3$  او نورو درنو فلزاتو د اكسایدونو سره د ئمکني فلزاتو په نوم ياديري د ذوب کيدلو په خاصيت کي ورته والي لري د ئمکني القلي فلزاتو په سوزولو سره د هغې اكسایدونه جوريبي پراكسايدونه ئي هم جوريبي ولی د القلي فلزاتو د پراكسايدونو په پرتله کم ثابت دي.

د  $Ba$ ،  $Sr$ ، او  $Ca$  اكسايدونه د او بوسره تعامل کوي هايدروکسايدونه جوره وي د هغى انحلاليت د  $Ba(OH)_2$  له خوا د  $Sr(OH)_2$  او  $Ca(OH)_2$  په طرف زياتيربي او قلوي خواصئي هم زياتيربي.

حتمكني قلوي فلزات د هايدروجن سره تعامل کوي هايدرايدونه جوره وي لکه:  $CaH_2$ ،  
حتمكني القلي فلزات د نايتروجين سره تعامل کوي او دا قابليت د اتممي د وزن په زياتوالی سره زياتيربي نوموري فلزات د کوتبي په تودو خه کي د نايتروجين سره په لاندي ډول سره تعامل کوي او نايترايدونه جوره وي:



د القلي فلزاتو سره په فرق لرلو، د حتمكني القلي فلزاتو مالگي په او بوكې کم حل کيږي چه په دې جمله کې کاربونيتونه، سليکاتونه، فاسفیتونه او نور شامل دي. حتمكني القلي فلزات په تولو مرکبونو کې په مثبت دوه  $(^{+2})$  نمبر اكسيديشن عمل کوي د حتمكني القلي فلزاتو سمبول، اتممي نمبر، ولانس او انرژيکي سوبې په لاندي جدول کې بنو دل شوي دي.

#### 1.10 جدول: د دوه ګروپ د عناصر و ځيني ځانګړتیاوی او اريتالي جورېستښي

| نام       | نمېر | وزن | تجزیه | K |     | L      | M       | N     | O   | P | Q |
|-----------|------|-----|-------|---|-----|--------|---------|-------|-----|---|---|
|           |      |     |       | 1 | 2   | 3      | 4       | 5     | 6   | 7 |   |
|           |      |     |       | S | S-P | S-P-d  | S-P-d-f | S-P-d | S-P | S |   |
| بريلیم    | Be   | 4   | 2     | 2 | 2   |        |         |       |     |   |   |
| مگنیزیم   | Mg   | 12  | 2     | 2 | 2-6 | 2      |         |       |     |   |   |
| کلسیم     | Ca   | 20  | 2     | 2 | 2-6 | 2-6    | 2       |       |     |   |   |
| سترانيسيم | Sr   | 38  | 2     | 2 | 2-6 | 2-6-10 | 2-6     | 2     | 2   |   |   |

|                |          |          |        |        |            |                  |                     |               |          |          |
|----------------|----------|----------|--------|--------|------------|------------------|---------------------|---------------|----------|----------|
| باريم<br>راديم | Ba<br>Ra | 56<br>88 | 2<br>2 | 2<br>2 | 2-6<br>2-6 | 2-6-10<br>2-6-10 | 2-6-10<br>2-6-10-14 | 2-6<br>2-6-10 | 2-6<br>2 | 2-6<br>2 |
|----------------|----------|----------|--------|--------|------------|------------------|---------------------|---------------|----------|----------|

همدارنگه د نوموري گروپ ھيني خواص د خارجي قشر الکترونونو جوربنت، اتومي شعاع، د ايونايزيشن انرزي، ايوني شعاع، کثافت، د ذوبان تودو خه، د غليان تودو خه، د هغې فيصدې د ھمکي په قشر کې د هايدرواكسايدونو  $K_{sp}$  قيمت د ستندرد الکترود پوتانيشل، انحلاليت او نور په لاندي جدول کې تحرير شوي دي.

### جدول د بريليم، مگنيزيم، راديم، کلسيم، سسترانيم، او باريم ھيني ھانگپتباوی

| Ra             | Ba   | Sr            | Ca            | Mg           | Be             | د خارجي قشر الکترونونو جوربنت      |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| $7s^2$         | $6s^2$                                       | $5s^2$        | $4s^2$        | $3s^2$       | $2s^2$         | مهيم ھانگپتباوی                    |
| 0.235          | 0.221  | 0.215         | 0.197         | 0.160        | 0.113          | اتومي شعاع په nm                   |
| 5.28           | 5.21   | 5.69          | 6.11          | 7.62         | 9.32           | $ev. E \rightarrow E^+$            |
| 10.15          | 10.00  | 11.03         | 11.87         | 15.03        | 18.21          | $ev. E^+ \rightarrow E^{2+}$       |
| 0.144          | 0.138  | 0.120         | 0.104         | 0.074        | 0.034          | آيوني شعاع $nm. E^{2+}$            |
| $\approx 6$    | 3.76   | 2.63          | 1.54          | 1.74         | 1.85           | کثافت (كتله حجمي $g/Cm^3$ ) جامد   |
| 969            | 727  | 770           | 842           | 650          | 1285           | $C^\circ$ د ذوبان تودو خه په       |
| $\approx 1500$ | $\approx 1860$                               | 1390          | 1495          | 1095         | 2470           | $C^\circ$ د غليان تودو خه په       |
| $1x10^{-10}$   | $5.7x10^{-3}$                                | $1x10^{-2}$   | 2.0           | 2.0          | $1.2x10^{-3}$  | د ھمکي په قشر د هفه %<br>شتواي مول |
|                | $5x10^{-3}$                                  | $3.2x10^{-4}$ | $1.3x10^{-6}$ | $9x10^{-12}$ | $1.6x10^{-26}$ | د فلز د هايدرواكسايد Ksp           |
|                | د قلوبي هايدرواكسايدونو د قرفت د زياتولي جهت |               |               |              |                |                                    |

|  | -2.90              | -2.89              | -2.87              | -2.34              | -1.85              | ستدرد الکترودیپوتانشيل<br>$E^\circ (M^{2+}/M)$                 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|  | $2 \times 10^{-1}$ | $7 \times 10^{-2}$ | $2 \times 10^{-2}$ | $5 \times 10^{-4}$ | $8 \times 10^{-6}$ | انحالیت<br>$20C^\circ \text{ په } E(OH_2^2)$<br>په مول فی ليتر |

د فعالو غير فلزاتو سره په عادي شرایطو کې په چېکتیا سره تعامل کوي او هغه غير فلرات چه کم فعال وي (لکه نایتروجن، هایدروجن، کاربن، سیلکان او نور) د تودوخي په مرسته ورسره تعامل کوي.

د ولتاژ په سلسله کې کلسیم او د هغې مشابه عناصر د هایدروجن خخه وړاندې واقع دي. د اوبو سره د سودیم په شان په عادي شرایطو کې تعامل کوي او هایدرواکسایدونه جوره وي چه په اوبو کې کم يا زیات منحل دي او د هغې د تعامل فعالیت د کلسیم ( $Ca$ ) سترانسیم ( $Sr$ ) او باریم ( $Ba$ ) په قطار کې د  $Ca$  خخه د  $Ba$  پطرف زیاتیرې او  $Sr$  د الکترولیز د عملیې په واسطه د هغې د ذوب شوو کلورایدونو خخه حاصله وي او  $Ba$  د الومینو ترمی په طریقه د  $BaO$  خخه لاس ته راوري ځمکني القلي فلرات زیات کیمیاوي فعالیت لري نو ځکه په تیلو کې ساتل کېږي همدارنګه یې په لیم شوی فلزي قطیو کې ساتل کېږي.

### طبیعی حالت:

ټول ځمکني القلي عناصر په طبیعت کې د  $Mg^{+2}$  کتیون په شکل پیدا کېږي، بیریلیم (څلورڅلويشتمن عنصر دي) په طبیعت کې د پیدائیست له نظره او اکثراً المونیم سره د بیریلیم المونیم سلیکات (بریل)  $Be_2Al_2Si_6O_{18}$  په شکل پیدا کېږي هغه بریل چه کروم هم ولري شین بنکلی رنگ لري او د زمرد په نوم یادېږي. مگنیزیم په طبیعت کې (د پیدائیست په لحاظ) اتون عنصر دي د

$Mg^{+2}$  په شکل په خپلو مالگو کې لکه  $MgCO_3$  شته او همدارنګه په او بو کې په محلول ډول پيدا کيربي د  $CaCO_3$   $MgCO_3$  طبيعي رسوبونو ته دولميت وايي.

كلسيم په طبيعيت (د پيداينبت په لحاظ) شپرم عنصر دي په آهکي ډبرو  $(CaCO_3)$ ، ګچ  $Ca_3(PO_4)_2$  کې پي او هدوکې هم د  $CaSO_4 \cdot 2H_2O$  خخه جورې شويدي سترانشىم په طبيعيت کې (د پيداينبت په لحاظ) اته ديرشم عنصر دي کم پيدا کيربي، د خپلو معدنۍ تيربو (ډبرو) لکه: سترانسيانت په شکل  $(SrSO_4 \cdot SrCO_3)$  پيدا کيربي.

$BaSO_4$  په طبيعيت کې (د پيداينبت په لحاظ) اتلسم عنصر دي نسبتاً کم پيدا کيربي د  $Ba$  معدنۍ تيربو (ډبرو) په ډول شته.

راديوم  $(Ra)$  يوراديواكتيف عنصر دي په کمه اندازه د يورانيم په معدنۍ تيربو کې لکه: په دې تناسب په پيچ بلند  $(Ra : u_3O_8 = 1 : 10^{12})$  کې  $(u_3O_8)$  پيدا کيربي.

حمنکني القلي فلزات اکثراً د ترکيب په حالت کې وي لکه: سليکاتونه  $(Be, Mg, Ca)$ ، کاربوناتونه  $(Mg, Ca, Sr, Ba)$ ، سلفيتونه  $(Be, Mg, Ca)$ ، کلورايد  $Mg$ ، فلورايد  $(Ca)$  او کلسیم فاسفیت په طبیعت کې پیدا کيربي.

نوموري عناصر سپك فلزات دي مخصوص وزن ی د 5 خخه کم دی د  $Mg$  د سوزولو خخه په هوا کې  $MgO$  مگنیزیم اکساید جورېږي او سپین روبنانه رنګ ورکوي دا نور د فوتوشیمی یو مؤثر نور دی د هغې خخه په عکس اخستلو کې ګټه اخلی د عکاسي په فلش کې د  $Mg$  او یا د هغې الیاژ لکه  $Mg$  او  $Al$  الیاژ استعمالېږي او دا الیاژ په الوتکو جورې ولو او موټر جورې ولو کې هم پکاريږي.

## د 13 يا IIIA گروپ عناسو

**بورون (B)، المونيوم (Al)، كاليلوم (Ga)، انديلوم (In) او تاليلوم (Tl)**

دا گروپ عناسو په خپل خارجي الکتروني قشر کې د  $ns^2np^1$  د دريوو ولانسی الکترونونو په لرلو سره مشخصيري. ددي عناسو د اكسيديشن نمبر په مرکباتو کې  $3+$  دی. اما د اتممي کتلې په زياتيدو د تېت اكسيديشن نمبر هم بىكاره کوي.


|    |     | VIIIA |     |    |     |      |    |  |
|----|-----|-------|-----|----|-----|------|----|--|
| 1  | 2   | 13    | 14  | 15 | 16  | 17   | 18 |  |
| IA | IIA | IIIA  | IVA | VA | VIA | VIIA | He |  |
| Li | Be  | B     | C   | N  | O   | F    | Ne |  |
|    | Mg  | Al    | Si  |    |     |      |    |  |
|    | Ca  | Ga    | Ge  |    |     |      |    |  |
|    | Sr  | In    | Sn  |    |     |      |    |  |
|    | Ba  | Ti    | Pb  |    |     |      |    |  |
|    | Ra  |       |     |    |     |      |    |  |

د دريم گروپ عناسو موقعيت په پريوديك جدول کې  
شکل


## د ديارلسم گروپ عناسو فزيكي او كيميا وي خواص

په ديارلسم يا IIIA گروپ عناسو کې فلزي خواص له پورته خوا کښته خواته زياتيري، ددي گروپ لمپنى عنصر بورون دي چې يوشبه فلز شمبېرل کېږي او خو الوتروپي (مختلف شکلونه) لري. د بورون يو الوتروپي تور څلیدونکې کرستلي شکل لري. بوريک اسيد ( $H_3BO_3$ ) د بورون يو معمولي مرکب دي او د اتنې سېپتنيک مادي په توګه په کار وړل کېږي. د حرارت ورکولو په واسطه بوريک اسيد په بوريک اکسайд  $B_2O_3$  بدليږي. د بورون تيزابي اکسайд خخه د مقاومت لرونکو شيشو په جورولو کې ګته اخستل کېږي، نومورې شيشي د پايركسو (Pyrex) شيشو په نامه يادېږي. بورون د خارجي قشر الکترونونو په واسطه اشتراكې اړيکه جوړه وي، او د  $3+$  اكسيديشن نمبر اختياروي. ددي گروپ نور عناسو فلزات دي، د هغو اکسайдونه د  $R_2O_3$  فورمول

لري. المونيم يوه مهمه تعميراتي ماده ده  $Al_2O_3$  يا المونيم اكسايد امفوتيريك خاصيت لري؛ يعني دا ماده هم تيزابي او هم قلوي خاصيت له ئانه بسي. المونيم اكسايد په تيزابونو کې حل کيږي او د المونيم آيون جوروي.



نوموري اكسايد په قلوي کې هم حلېري:



په جدول کې د المونيم لاندي د Ga عنصر قرار لري، دا فلز که د لاس په ورغوي کې ونيول شي، ويلى كيږي.

دا فلز په  $30^{\circ}C$  کې ويلى كيږي او په  $2400^{\circ}C$  کې په ايшиدو رائي؛ نوله دې كبله د لورو درجو په ترماميترونو کې استعمال يېري.

شكل

د Ga د آيونايزيشن انرژي له Al خخه لبرد؛ ئىكە چې اتومي شعاع په يوه گروپ کې له پورته نه كښته خواته ديرېري. او له دې كبله ده چې د Ga کيمياوي خواص تغييرکوي. گاليم، انديم او تاليم له اكسيدن او سلفر سره ديرېر ترکيبي، كلورين او برومین په عادي حرارت کې، اما له آيودين سره د حرارت په مرسته تعامل کوي، گاليم هم د المونيم په شان په القلي کې حلېري.



خوانديم او تاليم د اكسيديشن کوونکو په نه موجوديت کې د القلي په مقابل کې باشاته دي. المونيم اکثراً کوولانسي مركبات جوروي، مګر ئىيني ايونيك مركبات لکه  $AlF_3$  هم منځ ته راوري. د مثال په توګه د المونيم د مالگوله حل کولو خخه په اوپو کې د  $Al^{3+}$  کتيون توليد يېري.

گاليم، انديم او تاليم هم ايونيك مرکبات لري، د هغو کتيونونه د او بو په جور شويو محلولونو کي موجود وي. المونيم يوازي  $+3$  اكسيديشن نمبر لري او دير اهميت هم لري. د گاليم او انديم يو شمپر مرکبات چې د  $(+1)$  اكسيديشن نمبر لري هم موجود دي، اما تاليم  $+1$  او  $+3$  د اكسيديشن نمبر لري چې دواړه يې دير مهم دي.

[917.4]

ددي ګروپ ځينې خواص په 1.1 جدول کې خاى ګړل شوي دي. [692.1]

| نورمال شکل             | کنافت<br>$g/cm^3$ | د ايشيدو<br>$C^\circ$ | د ويلی<br>کيدوتکې<br>$C^\circ$ | اتومي کتله<br>a.m.u | اتومي<br>نمبر<br>(Z) | سمبول | دعصر<br>نوم |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------|-------------|
| غیر فلز،<br>نصاري پودر | 2.47              | 3700                  | 2030                           | 10,81               | 5                    | B     | بورون       |
| سپین نقره اي<br>فلز    | 2.70              | 2350                  | 660                            | 26,98               | 13                   | Al    | المونيم     |
| سپین نقره اي<br>فلز    | 5.91              | 2400                  | 30                             | 69,72               | 31                   | Ga    | گاليم       |
| سپین نقره اي<br>فلز    | 7.29              | 2050                  | 157                            | 114,82              | 49                   | In    | انديم       |
| نرم فلز                | 11.87             | 1460                  | 304                            | 204,37              | 81                   | Tl    | تاليم       |

## څوارلس (14) یا IV ګروپ عناصر (کاربن C، سليسيم Si، جرمنيوم Ge، قلعي Sn، سرب Pb)

د څوارلس (14) ګروپ عناصر و ځينې خواص په 1.2 جدول کې ليکل شوي دي. کاربن دير مرکبات جوړه وي او په کيميا کې يې خانګړې برخه؛ د بىملګې په ډول: عضوي کيميا چې خانګړې

مضمون د کيميا په برخه کي دي، د کاربن د کيميا په نامه يادېږي؛ خوپه هر حال د کاربن اکسайдونه او اوکسوانيونونه د هغه غير عضوي مركبات دي. 1.2 شکل [330.10]

| 1<br>IA | 2<br>IIA | 13<br>IIIA | 14<br>IVA | 15<br>VA | 16<br>VIA | 17<br>VIIA | 18<br>VIIIA<br>He |
|---------|----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------|
| Li      | Be       | B          | C         | N        | O         | P          | Ne                |
|         |          | Al         | Si        | P        |           |            |                   |
|         |          | Ga         | Ge        | As       |           |            |                   |
|         |          | In         | Sn        | Sb       |           |            |                   |
|         |          | Ti         | Pb        | Bi       |           |            |                   |
|         |          |            |           |          |           |            |                   |

د IV گروپ د عنصر و نو خينې خانګړتیاوي  
شکل

### د پنځلسم (15) یا (VA) گروپ عناصر

(نايتروجن N، فاسفورس P، ارسنيک As، انتي موني Sb او بسموت Bi)

د VA گروپ عناصر په ولانسي الکتروني قشر کې د  $ns^2np^3$  جورښت لري. اما ددي گروپ اتمونه د مرکب جوړولو په وخت کې دي الکتروني جورښت ته په مختلفو طریقو تغییر ورکوي په ډير لې حالتو کې هغوي درې الکتروونه اخلي ترڅو چې د نجیبه گازاتو الکتروني جورښت اختيار کړي په خاصه توګه د نايتروجن او فاسفورس اتمونه. د As، Sb او Bi اتمونه د  $P^3$  الکتروونه له لاسه ورکوي او ددي لامل ګرئي چې د نوموري عناصر الکتروني جورښت په خارجي مدار کې 2+18 شي.

په خينو مواردو کې ددي عناصر و تول پينځه ولانسي الکتروونه په مرکب جوړولو کې برخه اخلي، او د 5+ اکسیديشن نمبر ټاته اختيارو ی.

په دې عناصرو کې د الکترونيگاتيوتي خاصيت د نايتروجن له خوا د بسموت خواته لوبېري د نوموري گروپ هیخ يو عنصر عالي فلزي خاصيت نلري. په بل عبارت ددي گروپ عناصر د 1 او 2 گروپ عناصر و په مقاييسه دير لې فلزي خواص لري.

| 1<br>IA | 2<br>IIA |    |    |    |    |    | 18<br>VIIIA |
|---------|----------|----|----|----|----|----|-------------|
| H       | Be       | B  | C  | N  | O  | F  | He          |
| Li      | Mg       | Al | Si | P  | S  | Cl | Ar          |
| Na      | Ca       | Zn | Ga | As | Se | Br | Kr          |
| K       | Rb       | Sc | Cd | In | Sn | Sb | Te          |
|         | Sr       | Y  |    |    |    |    | I           |
| Cs      | Ba       | La | Hg | Ti | Pb | Bi | Po          |
| Fr      | Ra       | Ac |    |    |    |    | At          |
|         |          |    |    |    |    |    | Rn          |

## د شپارسم (16) يا گروپ عناصر

(اکسیجن 0، سلفر S، سیلینوم Se، تیلوریم Te، پولینیوم Po)

دادي گروپ ولانسي الکتروني جوربنت  $ns^2np^4$  دی. په دې گروپ کې لمري درې عنصره چې له اکسیجن 0، سلفر S او سیلینیوم Se خخه عبارت دي د غير فلزاتو له جملو خخه دي. او دوه نور يې يعني تیلوریوم Te او پولینیوم شبه فلز يا نیم فلز (Semimetal يا Metalloid) دي.

| 1<br>IA | 2<br>IIA | 13<br>IIIA | 14<br>IVIA | 15<br>VA | 16<br>VIA | 17<br>VIIA | 18<br>VIIIA |
|---------|----------|------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Li      | Be       | B          | C          | N        | O         | F          | He          |
|         |          |            |            | P        | S         | Cl         |             |
|         |          |            |            | As       | Se        | Br         |             |
|         |          |            |            | Sb       | Te        | I          |             |
|         |          |            |            | Bi       | Po        | At         |             |
|         |          |            |            |          |           |            |             |

اکسيجن يو داي اتميک  $O_2$  گاز دي، حال دا چې د سلفر او سيلينوم ماليکولي فورمول او  $Se_8^{S_8}$  دي. تيليريوم او پولونيوم درې بعدي جورښت لري. د پولونيوم عنصر د راديواكتيف خاصيت لري او د هغه مطالعه او خيرل په عادي لابراتوارونو کې ستونزمن کار دي، د سلفر مهم مرکبات د  $SO_2$ ،  $SO_3$  او  $H_2S$  دي، د  $SO_4^{H_2SO_4}$  او ابود تعامل کولو خخه د ګوګورو تيزاب يا ترلاسه کيري.

## د اولسم (17) یا VIIA ګروپ عناصر

(فلورين F، ڪلورين Cl، برومین Br، ايدين I او استاتين At)

ددې ګروپ ټول عناصر غير فلز دي او عومويي فورمول يې  $X_2$  دي. د X توري د هلوجن له عنصره خخه استازي توب کوي.

| 1  | 2   | 13    | 14   | 15 | 16  | 17   | VIIA |
|----|-----|-------|------|----|-----|------|------|
| IA | IIA | III A | IV A | VA | VIA | VIIA | He   |
| Li | Be  | B     | C    | N  | O   | F    | Ne   |
|    |     |       |      |    | S   | Cl   | Ar   |
|    |     |       |      |    | Se  | Br   | Kr   |
|    |     |       |      |    | Te  | I    | Xe   |
|    |     |       |      |    | Po  | At   | Rn   |
|    |     |       |      |    |     |      |      |

شکل

دا عناصر فعاله کيميا وي عناصر دي، په طبعت کې هيڅکله په عنصری شکل نه موندل کېږي. ددې ګروپ وروستني عنصر استاتين  $At$  دي، او راديواكتيف خاصيت لري، ددې عنصر د خواصو په هکله لې معلومات په لاس کې لرو.

فلورين ډير فعاله او کارنده عنصر دي، له اوبو سره تعامل کوي، د هغه خخه اکسيجين ازاده وي.



د او بو او فلورين ترمنج د تعامل مي خانيکيت ډير مغلق او پيچلي د، د تعامل محصول د تعامل په شرايظو پوري ترلى د.

د هلو جنونو ايونونه د هيلايدونو په نامه ياد يېي. مثلاً د  $F^-$  فلورايد آيون،  $Cl^-$  كلورايد آيون،  $Br^-$  بروماید آيون او د  $I^-$  ايودايد آيون.

## د اتلسم (18) يا (VIIIA) ګروپ عناصر يا نجیبه گازونه

(هيليوم، نيون، Ar، Kr، ارگون، Ne، رسينون، Xe، رادون Rn)

تولنجي به گازونه په يوه اتمه شکل موجود دي. 1.6 شکل. همدارنگه په 2.6 شکل کي نوموري عناصر په تيوبونو کي د تحریک په حال کي بسودل شوي دي. په دې ګروپ عناصر و کي خارجي فرععي اور بيتابل په بشپړه توګه ډک دي او فوق العاده با ثباته دي. د دې ګروپ عناصر د اضافي ايونايزيشن انرجي نسبت تولو نورو عناصر و په پرتله لوره دي. دا ګروپ عناصر د اضافي الکترونونو اخستلو ته ميل نلري. تر ديرو کلونو دا عناصر د عاطل يا تنبيل گازونو (Inert gases) په نامه ياد يدل، اما د شلم قرن په شپيتمه (60) لسيزه کي د نوموري عناصر و يو شمېر مرکبات

کشف شول:

| 1<br>IA | 2<br>IIA | 13<br>IIIa | 14<br>IVa | 15<br>Va | 16<br>VIa | 17<br>VIIa | 18<br>VIIIA<br>He |
|---------|----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------------|
| Li      | Be       | B          | C         | N        | O         | F          | Ne                |
|         |          |            |           |          |           | Cl         | Ar                |
|         |          |            |           |          |           | Br         | Kr                |
|         |          |            |           |          |           | I          | Xe                |
|         |          |            |           |          |           | At         | Rn                |
|         |          |            |           |          |           |            |                   |

شكل

## د d بلاک عناصر يا انتقالی عناصر

**انتقالی عناصر:** د عناصر و هغه لري په پريوديك جدول کي تشکيله وي چې له دريم گروپ خخه تر دولسم 12 گروپ پوري ئاي لري، په هغو کي د d او f الکتروني قشر په تدریج سره ڈكيربي د انتقالی عناصر يا د d بلاک عناصر په نامه يادېږي. دا عناصر په زړه پوري فزيکي او کيميا وي خواص لري. حتی ددي عناصر د یوه خاصيت تشریح کول هم ددي فصل له حوصلې خخه وتلي دي. په دې اساس زموږ بحث یوازې د هغو انتقالی عناصر په هکله مت مرکز دی چې د هغود d الکتروني مدارونه په بشپړه توګه ندي ډک شوي او تمایل لري مغلق ايونونه تولید کړي.

### د انتقالی عناصر و فزيکي او کيميا وي خواص:

د d بلاک ټول عناصر فلز دی، کولاي شو هغوي د d فلزاتو په نوم هم ياد کړو. ددي عناصر و ډيرى یې د برق او حرارت هادي دي. د هغو له جملو خخه نقره تر ټولو نسه ده. دا عناصر د خټک خورلو، سيم کيدو او خلا خواص لري. نوموري عناصر سپين نقره ايسې رنگ لري. ددي گروپ عناصر د ويلی کيدو او ايشيدو تکي نسبت د اصلی گروپونو عناصر وته لور دی. سره له دې هم ځينې استثنآات په هغو کي ليدل کيربي. مثلاً d سيماب د ويلی کيدو تکي تيټ دی، د کوتې د حرارت په درجه کي مايع حالت لري، مس سور نصواري رنگ، او طلا زير رنگ لري، ګر چې جست کديم او سيماب د انتقالی عناصر یاد d بلاک عناصر و خخه ندي، مګر سره له دې هم د مشترک خواصو په لرلو هغوي د انتقالی عناصر په ډله کي شاملوي. [912.10]


خرنگه چې بسكاره ده، په یوه پريود کي اتممي نمبر له کينې خوا خخه نسي لورته زياتيري، په بهرنې الکتروني مدار کي الکترونونه اضافه کيربي. او ددي لامل ګرزي چې د هستي چارج د پروتونونو د زياتيدو په اثر لور شي. په دريم پريود کي له سوديم خخه بيا ترا ګونه پوري ئاي لري د هستي د جذب ضعيفه قوه د خارجي مدار په الکترونونو باندي د مندليف جدول په یوه پريود کي له کينې خوانه نسي لورته ډيرېږي. د پروتونونو د زياتيدو په تيجه کي دا د جذب قوه لاهم قوي کيربي. او ددي لامل کيربي. چې اتممي شاعع له سوديم خخه د ارگون خواته لږ شي، برعكس

الكترونيگاتيوتي او د ايونايزيشن انرژي ديريري. په انتقالی عناصر دا پروسه توپير لري. په دی عناصر کې مثلاً له  $Sc$  خخه تر ( $Cu$ ) پوري د هستي چارج زياتيري. او په مقابل کې يې د الکترونونو شمېر هم د  $3d$  په فرععي مدار کې ديريري. دا د  $3d$  الکترونونه د  $4s$  الکترونونه پونسي او لامل کيربي، چې اتوميك شعاع په چټکي سره کوچنۍ شي. په همدغه دليل الکترونيگاتيوتي او د ايونايزيشن انرژي د  $Sc$  خخه تر ( $Cu$ ) پوري، د سوديم، اړکون په مقاييسه


ددي ګروپ ټيني خواص به 1.7 جدول کې سودل شوي دي

څه ناخه ديريري.

| ایونی<br>شعاع<br>$+3$<br>په<br>$A^{\circ}$ | ایونی<br>شعاع<br>$+2$<br>په<br>$A^{\circ}$ | ایونايزيشن<br>ارزېي<br>$KCal/mol$ | کثافت<br>$g/cm^3$ | د<br>ایشيدو<br>تکې<br>$^{\circ}C$ | د ويلې<br>کيدو<br>تکې<br>$^{\circ}C$ | اتومي<br>کنه<br>کنه | اتومي<br>نمېر | اتومي<br>نمېر | سمبول    | د عنصر<br>نوم |
|--|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 0,81                                       | -  | 154                               | 3,0               | 2831                              | 1541                                 | 45,0                | 21            | Sc            | سکانديوم |               |
| 0,76                                       | 0,9  | 157                               | 4,5               | 3287                              | 1660                                 | 47,9                | 22            | Ti            | تitanium |               |
| 0,74                                       | 0,88                                       | 155                               | 6,0               | 3380                              | 1890                                 | 51,0                | 23            | V             | وناديوم  |               |
| 0,69                                       | 0,84                                       | 155                               | 7,2               | 2672                              | 1857                                 | 52,0                | 24            | Cr            | کرومیوم  |               |
| 0,66                                       | 0,80                                       | 171                               | 7,2               | 1962                              | 1244                                 | 54,9                | 25            | Mn            | منکانیز  |               |
| 0,64                                       | 0,76                                       | 180                               | 7,9               | 2750                              | 1535                                 | 55,9                | 26            | Fe            | وسپنه    |               |
| 0,63                                       | 0,74                                       | 180                               | 8,9               | 3870                              | 1495                                 | 58,9                | 27            | Co            | کوبالت   |               |
| 0,62                                       | 0,72                                       | 175                               | 8,9               | 2732                              | 1453                                 | 58,7                | 28            | Ni            | نيكل     |               |
| -  | 0,72                                       | 176                               | 7,9               | 2567                              | 1083                                 | 63,5                | 29            | Cu            | مس       |               |
| -  | 0,74                                       | 216                               | 7,                | 907                               | 419                                  | 65,4                | 30            | Zn            | جست      |               |



شکل: خیی انتقالی عناصر په طبیعی حالت کی



شکل: د انتقالی عناصر د کیونونو رنگ دهه په محلوغل کې

انتقالی فلزات د الکالی او ئەمکنی الکالی فلزاتو په پرته له لب الکتروپوزتیف (دیر الکترونیگاتیف) دی. ددې عناصرو ارجاعی ستندرد پوتاشیل Reduction Potential پر اساس ویلای شو چې پرته له مس خخه نور تول د قوي تیزاب په مقابل کې عاطل دي او یا په ھنډ او سستي تعامل کوي. ئىكە چې د نوموري عناصرو په سطحه د هغود اكسايدونو محافظظوي قشر تولیديري، او د تعامل له پرمختگ خخه مخنيوي کوي. مثلاً کرومیوم سره له ددې چې منفي ارجاعی ستندرد پوتاشیل لري د کيمياي خواصو له نظره كاملاً عاطل عنصر دي. ئىكە چې د هغه په سطحه د کروم  $Cr_2O_3$  اكسايد III قشر تولیديدل ددې لامل گرزي چې تعامل توقف وکړي. له هم ددې کبله د فلزاتو په سطحي کې د کرومیوم محافظظوي نازکه طبقه ورکوي ترڅو چې د فلزله زنګ و هلو مخنيوي وشي.

د موتيرونونو د پمپرونو، د رندو نوكى<sup>\*</sup> د كروميم پواسطه ملمع کوي ترخو چې بنيا يسته او بنکلا ورکړل شي. له دي چې د لومړي قطار خخه د دوهم قطار خواته په فلزي شاعع کې عمومي زياتوالی منځ ته رائي په تير شويو کربنسو کې په دي هکله پوره توضيحات ورکړل شوي. (نوي کواتسي مدار د الکترونونو پواسطه د اشغاليدلو په حالت کې دي، اما په دريم قطار کې نوموري زياتوالی يا تزايد هومره نه ليدل کيربي. او که وي هم دير لب او حتى د اغماض وړ د. ددي دير لب بدلون علت د هغه په شاعع کې د لنتانيدونو کانترکشنې خاصيت پورې تړلي دي. د عناصر دا قطار د لنتانيدونو په نامه يادېږي، څکه چې د هغه وروستني عنصر لنتانيوم او د ټبلاك موجوديت په دي قطار عناصر دا کې د هغه مشخصات سمېرل کيربي. د الکترونونه چې په لنتانيدونو کې موجود د. نظر د الکترونونو ته د هستې د چارج ترضعيف پوشش لاندې قرار لري. او ددي عواملو په نتيجه کې فلزي شاعع د ټبلاك عناصر د قطار په طول کې لړوالي پيدا کوي. هر خومره چې د هستې چارج دير وي هومره الکترونونه بنه ځان خواته را کابري.

په بل عبارت هغه عناصر چې فرعوي مدار يې قسمًا ډک شوي وي او معمولي اکسديشنې حالت ولري، د ټبلاك انتقالي عناصر يا داخلې انتقالي عناصر په نامه يادېږي. د ټبلاك انتقالي عناصر د پريوديك د جدول کښته خواته په دوو قطارونو کې ځای لري. د لمړي قطار عناصر د لنتانيدونو یا د ځمکې نادره عناصر په نوم يادېږي، او هغه عناصر چې په دوم قطار کې ځای لري د اكتينيانيدونه راديو اکتيف دي. نېټونيم د 93 عنصر او هغه ته ورته نور عناصر په مصنوعي شکل تر لاسه کيربي. هغوي د هستوي تعاملاتو په ریکتورونو کې او یا د ذراتو په سرعت ورکونکو (accelerator) کې استحصالېږي.

\* رنده د نجاري یا ترکاني آله ده

د فلزاتو کيميا وي خواص د هغود مغلق مرکباتو د تشکيلولو قابليت، د کتالست په توګه عمل کول او د وسیع اکسیديشن نمبر لرل دي. د فلزاتو وسیع اکسیديشن نمبر لرل په لاندي جدول کې ليدل کيربي.

جدول: د عناصر و اکسیديشن نمبر


| Sc | Ti                               | V                                      | Cr                                     | Mn   | Fe   | Co                               | Ni                   | Cu             | Zn             |
|----|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| -  | -                                | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5             | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7 | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7       | -<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7        | +1<br>+2<br>+3<br>+4             | +1<br>+2<br>+3<br>+4 | +2<br>+3<br>+1 | +2<br>+3<br>+2 |
| Y  | Zr                               | Nb                                     | Mo                                     | Tc   | Ru   | Rh                               | Pd                   | Ag             | Cd             |
| +3 | +1<br>+2<br>+3<br>+4             | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5             | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7 | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7<br>+8 | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7<br>+8 | +1<br>+2<br>+3<br>+4             | +1<br>+2<br>+3<br>+4 | +1<br>+2       | +2             |
| Lu | Hf                               | Ta                                     | W                                      | Re   | Os   | Ir                               | Pt                   | Au             | Hg             |
| +3 | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6 | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7 | +2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7<br>+8 | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7<br>+8 | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6<br>+7<br>+8 | +1<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+6 | +1<br>+2<br>+3<br>+4 | +1<br>+2<br>+3 | +1<br>+2<br>+3 |

نوټ: هغه اکسیديشن نمبرونه چې په دايره کې ليکل شوي نظر نورو ته مهم شميرل کيربي.


په ياد باید ولرو چې تول د d بلاگ عناصر چې په ورستني قطار کې ئاي لري پرته له سيماب خخه برخیره پر (صفر) اکسیديشن نمبر يوازي د یوه اکسیديشن نمبر حالت لري سکانديوم فقط +3 اکسیديشن نمبر لري او جست  $Zn$  هم يوازي د (+2) اکسیديشن نمبر لرونکي دی نور تول عناصر لبتر لبه دوه د اوکسیديشن نمبر حالتونه لري. دير معمولي اکسیديشن نمبر د

په  $CuCl$  کي 1+ او  $CuCl_2$  کي (2+) دی. هغه عناصر چې د وهم قطار مرکز ته نژدي دی د هغو هريو ډير اكسيديشن نمبرونه لري. د مثال په توګه  $(MnO_4^-)$  په خپل مرکباتو کي تر 7+ پوري د اكسيديشن نمبر لري.

د اكسيديشن نمبر په مرسته کولاي شو چې د عنصر د مرکباتو خواص تشریح او توضیح کړو. په یوه مرکب کي چې د هغه عنصر لور اكسيديشن نمبر ولري، د اكسيديشن کولو لپاره بنه معیار شمپرل کېږي. مثلاً د پرمگنات  $MnO_4^-$  د ايون اكسيديشن کونکي قوه په تيزابي محلول کي په لاندي معادلي کي مطالعه کوئ:



په هغه مرکباتو کي چې د عنصر اكسيديشن نمبر منځني (متوسط) حالت ولري، ډيری وخت، نوموري عنصر د سپروپورشن کوي، لکه په دې معادله کي:



په کوم مرکباتو کي چې د عنصر اكسيديشن نمبر تيټ وي مثلاً  $Fe^{2+}$  اکثراً د بنه ارجاع کونکي په توګه عمل کوي:



د فلزاتو ډيری اکسایدونه د قلوي خاصیت لري. اما هر خومره چې د عنصر اكسيديشن نمبر لوړېږي نوموري عنصر د تيزاب خاصیت بنودلو ته تمایل پیدا کوي. مثلاً د کروم اکسایدونه په لاندي جدول کي گورو:

## جدول:

| خاصیت     | اکسیدیشن نمبر | اکساید    |
|-----------|---------------|-----------|
| قلوی      | +2            | $CrO$     |
| امفوتیریک | +3            | $Cr_2O_3$ |
| تیزابی    | +6            | $CrO_3$   |

- ار. بی. هسلوب- کی. حوتز ، ژبارن دوکتر میر عبدالله سید مجادی ، شیمی معدنی ،  
موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی ، کال ۱۳۶۶ لل
- اخکزی ، پوهنمل ڈاکٹر دوریزه ، کیمیا دوهم توک ، نارنج خپرندویه تولنه- کندھار ، کال ۱۳۸۷ لل
- الفت ، بنویالی ولی امام ، د تکرہار عالی دارالعلمین محاسبوی کیمیا لکچر نوت ،  
کال 1387 ل
- بروس ه ماہان ، ترجمه دکتر ناصر صادقی ، شیمی عمومی جلد اول ، انتشارات پوهنتون  
تهران ، کال ۱۳۷۱ لل
- بارکزی ، انجینر محمد ظاهر ، اسانه کیمیا ، کال 1384 لل
- همکار ، پوهاند محمد ظفر ، تحلیلی کیمیا ، د بنوونکود روزنی لوى ریاست ، کال 1388 ل
- همکار، پوهندوی دیپلوم انجینر محمد ظفر، دکتور ت. چ. ادرسیوف، اساسات کیمیای  
تحلیلی توصیفی مسایل و تمرینات ، انتشارات پوهنتون کابل ، کال 1364 لل
- و. ف. کوڅپین ، ن. و. مارچینگو، ت. ک. دتروفانون، ژبارن محمد غوث (حکیمی)  
پولیتکنیک انسٹیتوت کابل ، کال ۱۳۵۱ ل
- ورد ، عبدالغفار ، محمد غوث (حکیمی) ، حبیب الله (فریدون) ، نیمه میکروانالیز  
کیمیای توصیفی (۱)، کابل پوهنتون

- ماموند، پوهاند دوکتور خيرمحمد ، الکتروليتي محلولونه او الکتروکيميا ، د افغانستان د کلتوري ودي تولنه جرمني، کال 1389 لـ لـ .
- عربشاهي دوکتور باهره ، مبادي شيمي ، انتشارات شرح، کال ۱۳۸۴ لـ لـ .
- فرحمند ، عبدالرسول، کيميات تحليلي ، مطبعه تعليم و تربيه کابل ، کال 1366 لـ لـ .
- تهی وال ، پوهاند دوکتور محمد عارف، زبارن احمد فهيم "سپين غر" ، متقبل خپرندويه تولنه ، کال ۱۳۹۰ لـ لـ .
- سيدی ، پوهندوي سيد جمال الدين ، تنگرهار پوهنتون بسوونې اوروزني پوهنهئي تحليلي کيميا لکچرنوت ، کال 1390 لـ لـ .
- سيدی ، پوهندوي سيد جمال الدين ، تنگرهار پوهنتون بسوونې اوروزني پوهنهئي تحليلي کيميا (I او II) لکچرنوت ، کال 1386 لـ لـ .
- قيومي ، پوهنيار سيد معصوم خان ، تنگرهار پوهنتون بسوونې اوروزني پوهنهئي د کامپليكس کيميا لکچرنوت ، کال 1390 لـ لـ .
- الفت، ولی امام ، د کيميا لابراتواري کړني ، ختيح خپرندويه تولنه ، کال ۱۳۹۰ لـ لـ .

**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)**  
**Ketabton.com: The Digital Library**